

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書


子部
第四七冊



魯新登字 07 號

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0478-0



9 787533 304782 >

EB66/01

四庫全書存目叢書·子部四七

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 45.875 印張

1995 年 9 月第 1 版 1995 年 9 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0478-0

Z·27 子部定價：78300 圓

子部第四七冊目次

子部·醫家類

普門醫品四十八卷

〔明〕王化貞輯

故宮博物院圖書館藏明崇禎元年刻本

.....一

醫品補遺四卷

〔清〕郎廷模輯

中國科學院圖書館藏清康熙三十三年郎氏娛暉堂刻本

.....六二八

普門醫品四十八卷

〔明〕王化貞輯

故宮博物院圖書館藏明崇禎元年刻本

醫品補遺四卷

〔清〕郎廷模輯

中國科學院圖書館藏清康熙三十三年郎

氏娛暉堂刻本

附《四庫全書總目·普門醫品

四十八卷附醫品補遺四卷》

提要

普門醫品

中丞王公肖乾既泥明醫理
學以活人為事日應膏藥物
應人之求有以病狀來詢諄
問既審報為幾可予藥意
不立奏功者既刻有石急施
方及產輒遠寄法而忘
未已也問醫語未曰夫使世多
良醫之効不若使人能自為醫
之効也人必可以活於世為醫者

所求乎醫者望非方與藥乃
醫而非良方藥且多誤人明乎
方藥而無誤則人皆謂此本
草綱目一書每藥下多為之
方而數見難求繼覽無從焉將
摘錄而彙之而方藥不可遂
用矣余曰是善以於手錄諸
方分門列次條貫井然備矣已
而徐察其病既多遠方亦有漏
心後未已以此是詳簡諸病區

別其門窮盡其熱而他人之
音驗者多而增益者幾無待
方矣已而思存方經步鄒野
之人安在其孰可用孰非可用
且未至病安在方以蓋躊躇未決
志也於是安一病門冠以辨端
發揮其陰陽虛實之形斟酌
其進退輕重之變而指其表裡
時物之狀使瞭然於病之情因
確然於方之用而後以今以之精

神全出以示人不待隔垣之見而
多病多可也地急藥左右逢原
容於世間多餘皆疾是也如權
與於本字虎元於藥海三易
稿而後全書當見之集友如福持
汗盤為海聖孤映其鏡然
候此候後目望之病凡百取十
門留凡道有餘前乎後有六派
如來來受而談之於作而作曰仁
矣其以之用心乎動矣其以之

生乎蒼軒以降之書以重
標近世待氏暗統解氏暗藥
當以百卷計非不浩汗該極也
然學士大夫讀且中廢下為名
益無能舉之矣獨是之情而
收約之用而而難之功自有
醫書以來未有若此之明而較
詳而有易通而不隨徑而用
無隱者此種此種中實
人師子但得是正於此字者

諸西按方而索業維牛溪馬勃
 土甚卑物皆可適於用然後
 去果有能使人自為醫之功
 什百千萬於世多良藥之功也
 而公之心如竭性不為待懷時朱
 方伯淨業因拈古一語曰文
 殊菩薩令善財採藥曰是藥者
 採將來善財徧觀大地無有不
 是藥者遂於地上拈一莖草
 度與文殊文殊拈得是起示

衆曰此藥亦能殺人亦能活人
 然則公之意殆稱是乎公笑而
 不答噫嘻天地間諸藥也習
 而不察者一經指出便得無
 處藏之用維一莖草徧一切處
 是就仁壽之域夫是之為大醫
 王請帝之曰普門醫品時
 天酉丙寅中秋日東甘來
 居士高出拈提

醫門醫品自序

余自幼習軒岐家之竊有志
于活人壽世之事而恨其不
廣也請室多暇無所用心日
抄錄方書得本草綱目于孩
之高公取至中善方彙而集
之彙彙盈几樊然鞅掌一日
出南胡公過余見而悅之謂
余曰本草單方為奇効常歎
會萃成書不果就公其勉率

業焉余感于其言斯夕肆力
不間寒暑始繇約而博繼繇
博而約歷再稔而書始成共
得四十八卷列證頗詳具方亦
備指示病情開陳治法但解
書者瞭然易辨使人不能自
為醫而在、可以得系斯則余
之心也是書之成高公發其端
胡公贊其決善之字楊句此
芟獲補漏往復數十過以成

實出則陳生憲紳之力為多
 至銀梓之費取給耕獲之餘
 與辟廬之積以索饘不充幾
 至中輟賴諸公捐助而後得
 以訖工余何敢隱人之善並書
 名氏于後使後之人知此書
 之所繇成也
 崇禎改元冬至日瑯琊王化
 貞書于諸案

助刻普門醫品姓氏

高出

號縣國山東萊陽人原任山西按察司副使助銀二十兩

臧爾令

號王岩山東諸城人見任禮部儀制司主事助銀四十兩

高岸

號之果山東萊陽人見任河南泌陽知縣助銀十兩

祖大壽

號福宇遼東寧遠衛人見任遼東總兵助銀一百兩

普門醫品目錄

卷之一

序文

目錄

凡例

卷之二

中風

附中氣

破傷風

卷之三

傷寒

附傷風

瘟疫

附辟穢

卷之四

普門醫品

目錄

卷一一

暑證

寒證

濕證

火證

燥證

鬱證

卷之五

內傷

吞酸

附嘈雜

痞滿

呃逆

噎膈

卷之六

痰飲

欬嗽

眩暈

附麻木

厥證

卷之七

霍亂

瘧疾

嘔吐

附惡心

卷之八

泄瀉

痢疾

卷之九

諸氣

附梅核氣

積聚

附痞塊

疸證

附黃腫

普門醫品

目錄

卷一二

卷之十

鼓脹

水腫

喘急

卷之十一

大便閉

附脾約

小便閉

附遺溺及不禁

關格

即大小便閉

卷之十二

服食

附辟殺

中毒

卷之十三

虛勞	怔忡驚悸
虛煩不寐	汗證
卷之十四	
失血	
卷之十五	
遺精	濁證 <small>附交腸</small>
淋證	
卷之十六	
消渴	肺癰肺痿 <small>附腸癰</small>
普門醫品	目錄 <small>卷一 三</small>
脫肛	腋氣 <small>即狐臭</small>
卷之十七	
頭痛	心痛 <small>附胸脇痛</small>
腹痛	
卷之十八	
腰痛	脇痛
背痛	手臂痛
寒風	痺證 <small>附女證</small>
卷之十九	

脚氣 <small>附脚氣諸病</small>	癰疽
前陰諸證	
卷之二十	
顛狂癰證	邪祟尸疰
卒中暴死	五絕
奇病	
卷之二十一	
鬚髮	面病
卷之二十二	
普門醫品	目錄 <small>卷一 四</small>
耳病	鼻病
卷之二十三	
眼病	
卷之二十四	
口舌諸病	牙齒諸病
卷之二十五	
咽喉諸病	諸物哽喉
卷之二十六 <small>以下外科</small>	
癰疽 <small>附疔毒</small>	

卷之四十以下小兒科

初誕

驚風 癰風 嘔口

天鈞內鈞盤腸

客忤

卷之四十一

驚風

發搐

胎驚

癰證

卷之四十二

發熱

欬嗽

喘急

夜啼

普門醫品

目錄

卷一上

悲哭

卷之四十三

傷寒

驚觸

傷食

嘔吐

泄瀉

痢疾

瘡疾

卷之四十四

諸疳

癖積

腹脹

卷之四十五

虛羸

癰病

解頤

赤遊丹毒

發斑

卷之四十六

頭面瘡

耳病

目病

喉痺

口瘡

牙疳

舌病

普門醫品

目錄

卷一八

卷之四十七

大便閉

小便閉 附遺尿

淋證

脫肛

煩燥 附渴證

雜證

卷之四十八

諸蟲

諸瘡

痘疹

普門醫品目錄終

凡例

一是書之刻始于本草綱目故各門之方出于本草者十之七八不足則旁摭諸名家之方以益之其有病而本草無方者補以名醫所錄及諸驗方以成全書

一是書之刻本以嘉惠寒賤故所錄方多從簡易尋常草木雖微不遺其有貴不易得遠不經見與修治繁難者皆不錄

一古方品味甚少且多單用力專氣厚取效甚捷但

普門醫品

凡例

卷一 九

其中偏寒偏熱本以因時制宜恐至拘執成誤且古今氣化不同人之腑臟亦異未可效顰故一切攻伐峻利之方率多刊削

一刻中有一證而臚列數十方者非驚博也地異產殊時移物換此之所有彼之所無若必尋桔梗于沮澤責凌冰于炎夏得者鮮矣但欲因便取材不妨多載備用總之爲寒賤者慮耳

一各證敘論皆引證經義取衷前哲其間斷章摘句義存簡要金不敢逞臆妄談觀者細心檢閱使心

無疑病病無疑方庶不致自誤誤人也

一各證止書病候金不及診法非謂診可廢也三部九候之法世醫未必盡諳而何以望之鄉鄙之人故知醫者不必與言不知醫者不可與言是書爲不知醫者設耳

一病有變證多端疑候難明使人眩昏不知爲計如大科之傷寒幼科之痘疹非可以嘗試漫爲者是書所載方可通用證所共曉與首尾之有定候者耳若夫參詳變化宜檢全書

普門醫品

凡例

卷一 十

一古方多用大劑煮湯分服用藥則幾斤幾兩用水則幾斗幾升今皆減爲小劑以從俗便

一古方各註姓氏及書籍名目其有諸書互載未詳所出者姑闕之以存疑

一藥名古今稱謂不一有互見者姑兩存之而明註于下其有不明者詳藥物考

一眼前一切無物非藥蟲魚之氓有習其物而未識其用者有聞其名而未諳其狀者比比也特作藥物考一十六卷庶用者可據以采取云

一藥之形像諸家摹畫不一真偽淆亂今多以瀕湖考據爲定其有各處所產不同者不妨並載

一炮製之法有因病而異者附載各方中至尋常修治皆見藥物考

一煎藥宜微火令小沸每藥一兩用水二鍾卽世俗所用小小茶鍾也多則加水少則減之宜用砂器密封小心看守火用木炭蘆葦水須新汲若發汗藥用紫火熱服攻下藥亦宜紫火溫服補中藥宜慢火溫服陰寒急病亦宜紫火又有陰寒煩燥及

普門醫品

凡例

卷一 十二

暑月伏陰在內宜水中沉冷凡補湯欲熟多水而少取汁利藥欲生少水而多取汁

一藥中有用飴糖芒硝阿膠者須候湯熟絞汁方納于內再煎二三沸烺盡乃服

一藥中有用沉香木香乳香沒藥一切香藥者須研細末待湯熟先傾少汁于盞內調服訖然後盡飲

一湯藥有用酒醋童便竹瀝薑汁者亦候湯熟絞汁盞內加入便服其有酒煎煮不在此例

一散藥宜旋製合不堪久留致泄氣味服之無效去

急病用之須研極細或用酒煎氣味薄者煎熟和渣服

一丸藥用糊者以麪入水作餅云酒糊者用酒云醋糊者用醋并入麪云蒸餅丸者以蒸餅去皮水浸和爲丸云飯丸者卽以煮飯和合成丸云蠟丸者溶蠟作丸取其難化也煉蜜丸者每藥末一斤用蜜十二兩文火煎煉掠去沸沫令色焦黃滴水成珠爲度再加清水四兩攪勻和藥于石臼內杵搗千百自然軟熟易丸一應糊丸者亦倣此法

普門醫品

凡例

卷一 十二

一丸藥有用硃砂或金箔爲衣者必須丸成乘濕粘上

一藥劑分兩有云方寸七者作七正方一寸抄散取不落爲度約有二錢半也有云刀圭者十分方寸七之一准如梧子大也云一字者二分半也一撮者四刀圭也云一升者卽今之大白盞也十撮爲一勺十勺爲一合十合爲一升古之一升今之二合半也用幾銖者六銖爲六錢半二十四銖爲一兩也

一清藥酒皆須細切生絹袋盛入酒密封隨寒暑日數漉出滓暴乾微擣亦可更漬及為散服有煮酒者以生絹袋盛藥入罈密封置大鍋中水煮一日埋土中七日出火毒乃飲

一合九散皆須密絹重篩篩畢于臼中合擣數百遍色理和同乃佳中有巴豆杏仁胡麻諸膏膩藥皆先炒黃擣如膏乃稍稍入散中合研再以疎絹篩之使勻

一丸散藥亦先切細曝燥乃擣之有可合擣者有宜

普門醫品

凡例

卷一 十三

各擣者金須隨方如天門冬地黃輩宜量增分兩切曝獨擣碎更曝若逢陰雨微火烘之既燥停冷擣之或煮膏擣入

普門醫品卷之二

東武王化貞元起父編輯

門人陳斌憲卿父較閱

中風門

急救取痰通治失音手足攣廢
口眼喎邪中氣附

論中風謂卒中昏倒不省人事牙關緊急痰涎壅盛或口眼喎邪或肢節不舉或瘖不能言其外候也皆未有不由虛而感者顧有血虛氣虛之不同有中腑中臟之各異有宜汗宜下有可治不可治

普門醫品

中風

卷二 十四

非可膠柱鼓瑟粗工嘗試者今特舉倉皇卒救所宜與通用調補諸方耳至于臨證區別收功萬全非國手未可幾也

中腑者多著四肢有表證惡風寒拘急不仁中臟者多滯九竅唇緩失音耳聾鼻塞目瞽大便秘結中腑者宜汗中臟者宜下

凡口開手撒眼合遺尿吐沫直視喉如鼾睡肉脫筋疼者皆不治頭直上撩面赤如粧汗綴如珠者亦不治

治風以治痰爲先凡半身不遂大半多痰在左屬死血及無血宜用四物湯加飛仁紅花竹瀝薑汁在右屬痰有熱氣虛宜用六君子湯加竹瀝薑汁治之

痰壅盛者口眼喎邪者不能言者皆當吐吐法輕用瓜蒂散汁皂角重用藜蘆半錢或三分加麝香灌入鼻內或口內一吐不愈宜再吐之有虛而不可吐者誤吐昏倒急以參耆補之

有類中風者中暑中濕中火中氣食厥痰厥尸厥

普門醫品

中風

卷二 十五

房勞血運中惡卒死等證皆類中風然各有治法宜細辨之不可藥用風藥

初昏倒急用指襯衣插入中至醒然後用藥

急救九方

搐鼻法 治中風卒暴昏塞不醒牙關緊急藥不得下咽者

真細辛去土豬牙皂角等分爲細末每以紙撚蘸藥入鼻或用竹管輕輕吹入得嚏然後進藥不嚏者不治聖惠方

搐涎散 治中風涎潮鼻塞氣閉不通

明礬豬牙皂角肥實不蛀者炙去皮弦各一兩爲末每服一二錢不拘時白湯調服醫統

通關散 治中風痰厥昏迷卒倒不省人事欲絕者

豬牙皂角去皮弦五錢生半夏藜蘆各三錢細辛苦參各二錢爲末每用少許吹鼻內不嚏者不治

中風卒倒不省人事

細辛研末吹入鼻中危亦林得効方

中風牙噤無門下藥者

普門醫品

中風

卷二 十六

五月五日下午時用龍腦天南星爲末等分每以一字揩齒二三十遍口自開

又方

南星半夏細辛各等分爲末中指蘸點牙根以烏梅肉頻擦自開一開即用薑自然汁化蘇合丸連服乃佳

又方

熟艾灸承漿一穴頰車二穴各五壯千金方

普生丹 治全上

荊芥穗爲末酒服二錢立愈

中風口噤舌本縮者

芥菜子一升研醋二升煎一升傳頰頰下

取痰九方

中風口噤不開痰涎潮壅

皂角一挺去皮猪脂塗炙黃色爲末每一錢溫酒調下氣壯者二錢以吐涎爲度

一切中風痰厥喉痺急證

燈盞油以鷲翎掃入取吐卽効

普門醫品

中風

卷二十七

中風痰厥不省人事四肢不收氣閉膈塞者

白礬一兩牙皂角五錢爲末每服一錢溫水調下

吐痰爲度

陳師古方

風涎潮上氣塞倒仆

瓜蒂一錢爲末輕粉半錢溫水半鍾調灌良久涎

自出不出含沙糖一塊下咽卽涎出也

寇氏衍義

回生丹治中風痰厥不省人事

葱管藜蘆二兩用河水一斗煮汁青礬石二兩火

煅通紅淬入汁內數次濾淨堆猪膽十個取汁攪

前汁內再用重湯煮成膏候冷入片腦末一錢五

分入磁礬黃臘封口每用黃豆大一粒新汲水化

開男左女右鼻孔吹進痰自退出牙關緊不能吐

者以烏梅擦口或撥開痰出任下別藥

風痰卒中痰涎潮盛不語及一身風癱

生銅綠二兩研細水飛去石慢火熬乾取辰日辰

時辰位靜處修合再研入麝香一分糯米粉糊丸彈

子大陰乾卒中者每丸作二服薄荷酒研下餘風

疎砂酒研下吐清碧涎瀉下惡物大効

經驗方

卷二十八

普門醫品

中風

一切風痰白僵蠶直者七個細研薑汁調灌之

勝金方

中風口噤取痰法

蘿蔔子牙皂莢各二錢水鍾半煮一鍾溫服取吐

丹溪方

一切風痰蝦汁吐法

蝦帶殼半斤入醬葱薑等料物煮汁先喫蝦後飲

汁以翎勾引吐必須緊勒肚腹凡用鷲翎必先以

桐油浸過却以皂角水洗淨晒乾用之

通治 十二方

中風不省。涎潮口噤。語言不出。手足躄曳。得病之日。便進此藥。可使風退氣和。不成廢人。

栢葉一握。去枝。葱白一握。連根研如泥。無灰酒一升。煎一二十沸。溫服。如不飲酒。分作四五服。方進。

他藥 楊氏家藏方

稀荬丸 治一切風痰。口眼喎斜。左癱右瘓。失音不語。四肢麻痺。腰膝無力。疼痛等證。

五月五日。六月六日。采稀荬草。去地五寸刈之。溫

普門醫品

中風

卷二十九

水洗淨。摘葉及枝頭。入木甌中。層層洒酒與蜜水。

蒸之。凡九蒸九暴。不必過蒸。但以足數爲度。焙乾。

搗末。煉蜜丸。梧子大。空心溫酒下三十九。米飲亦

可。服至一月。疾覺愈加。蓋藥力相攻之故。服至三

月後。卽康壯如常。唐節度成訥。宋刺史張詠。皆有

進稀荬丸表。具述其効。

中風不語。手足不遂。口眼喎邪。言語蹇滯。歷節風。頭

風。心風。破傷風。狂犬咬風。紫白癜風。腎臟風。皮膚風。

癢。手足頑痺。腰膝疼痛。曾經損墜。頭疼流涕。黃疸黑

疸。面目浮腫。肚腹脹滿。咳嗽喘急。坐臥不安。大小腸秘。瘰癧疥癬。煩人經閉。氣血冲心等證。金皆治之。

葳靈僊。采根不聞水聲者。陰乾。月餘。擣末。溫酒調

服一錢。空腹服之。壯者加至五六錢。利過一二行。

卽減服。忌茶及麪。此藥通行十二經。朝服暮効。

召巢氏家傳

左癱右瘓。三十六種風。偏正頭風。厲風。一切疼風及

脚氣。打撲傷折。服過百粒。卽爲全人。

紫背浮萍。晒乾爲細末。煉蜜和丸。彈子大。每服一

普門醫品

中風

卷二十九

丸。以炒黑豆淋酒化下。石磬堯書。

中風諸病

麻黃八斤。去根。以旺相乙卯日。取東流水三十三

大碗。用淨鍋先入水一半。煮四五沸。掠去沫。逐旋

添水盡。至少半許。流渣。澄定。再濾。取渣再熬。至三

碗許。再澄。再濾。取極清汁一碗。密封收之。一二年

不妨。每一二匙。熱湯化服。取汁爲効。仍服補氣血

藥 宣明方

一切諸風。不問遠近。

檉葉半斤枝亦可。荆芥半斤。水五升。煮二升。澄清。

入白蜜五合。竹瀝五合。新瓶盛之。油紙封。重湯煮。

一伏時。每服一小盞。日三服。普濟方

一切風疾十年二十年者

牛旁根一斤。生地黄。枸杞子。牛膝。各半斤。以絹袋

盛。無灰酒十斤。浸十日。任意飲之。凡筋攣骨疼。髮

落。膚痺之人。服無不効。外臺秘要方

中風半身不遂。皮膚不仁。

僵靈脾。即淫羊藿一斤。細剉。生絹袋盛。于不津器

普門醫品

中風

卷二 二十二

中。用無灰酒二升。浸之。重封。春夏三日。秋冬五日。

每日暖飲。常令微醺。不得大醉。酒盡再令。無不効。

驗。合時忌鷄犬婦人。太平聖惠方

白花蛇酒。治中風。傷濕。半身不遂。口眼喎斜。骨節

疼痛。及年久疥癩。惡瘡。癰諸證。

白花蛇一條。酒洗。潤透。去骨刺。取肉四兩。羌活二

兩。當歸身二兩。天麻二兩。秦艽二兩。五加皮二兩。

防風一兩。各剉勻。生絹袋盛之。入金華酒罈。以無

灰好酒十斤。浸藥。用箬葉密封。于大鍋內懸胎煮。

一日取起。埋地七日。取出。每飲一二盃。仍以滓晒。

乾研末。酒和。九梧子大。每五十九。用藥酒下。忌見

風犯慾。及魚羊。鴛鴦。鴛鴦。風之物。源湖集簡方

世傳白花蛇酒。治諸風。手足緩弱。口眼喎邪。語言

蹇澁。或筋脉攣急。肌肉頑痺。皮膚瘙癢。骨節疼痛。惡

瘡疥癬等疾。

白花蛇一條。溫水洗淨。頭尾各去三寸。酒浸去骨。

取淨肉一兩。全蠍炒。當歸防風。羌活。各一錢。獨活。

天麻。白芷。赤芍藥。甘草。升麻。各五錢。剉碎。以絹袋

普門醫品

中風

卷二 二十二

盛。用糯米蒸熟。如常造酒。以袋置缸中。待熟取酒。

同袋。密封。煮過。置陰地七日。出毒。每溫飲數盃。當

令相續。源湖集簡方

凡患風人多熱。

常以荆瀝。竹瀝。薑汁。和勻熱服。瘥為度。千金翼方

失音。六方

中風不語。

獨活一兩。酒二升。煎一升。大黑豆五合。炒有聲。熱

投藥酒內。煮之良久。溫服三合。未効再服。小品方

又方

肉桂着舌下。嚙汁千金方

又方

槐花炒。三更後仰臥嚼嚙危氏傳方

又方

大豆煮汁煎稠如飴。食之。并飲汁時後方

又方

用龜尿。點少許于舌下。神妙 齊域神方

中風不語口中涎沫聲如曳鋸

醫門警品

中風

卷二 二十三

藜蘆二分。天南星一個。去浮皮。于臍上剋一坑。納入。仍滴陳醋二匙。四面川炭火通黃色。研爲末。生麵丸小豆大。每服三丸。溫酒下。經驗方

手足攣廢四方

中風攣縮

夜合枝。栢枝。槐枝。桑枝。石榴枝。各五兩。金生剉。糯米二斗。黑豆五升。羌活二兩。防風五錢。細麴五斤。先以水五斗。煎五枝取二斗五升。浸米豆。蒸熟入麴。并防風羌活。如常釀酒法。封三七日。榨汁。每日

飲四五次。勿過醉致吐。常令有酒氣。奇効良方

中風身直不得屈伸反覆者

取槐皮黃白者。切碎以酒水煎。時時服之。時後方

暴得風疾四肢攣縮不能行

大豆三升淘淨蒸熟入瓶中。傾入醋二升。少頃取出攤于地上。設席豆上。令病人臥之。蓋衣五六層。

豆冷漸漸減衣。仍令一人于被內引挽。急處更

蒸豆再作。并飲荆瀝湯。如此三晝夜愈。崔氏纂要

中風癱瘓手足不舉及諸風

醫門警品

中風

卷二 二十四

穿山甲。左癱用右甲。右癱用左甲。炮熟。大川烏頭

炮熟。紅海蛤如碁子大。各二兩爲末。每用半兩。搗

葱白汁和成厚餅。徑半寸。隨左右貼脚心。縛定密

室安坐。以脚浸熱湯中。待身麻汗出。急去藥。過半

月再行一次。除根。酒謹避風。忌口遠色。衛生寶鑑

口眼喎斜十四方

中風面目相引口喎頰急舌不可轉

桂心。酒煮取汁。故布蘸搗病上。正卽止。左喎搗右。

右喎搗左。常用効。千金方

中風口眼喎邪

以葦筒長五寸。一頭刺入耳內。四面用麪密封。一頭用艾灸七壯。患左灸右。患右灸左。勝金方

又方

葶麻子仁搗膏。左貼右。右貼左。即正。本草綱目

又方

蓖麻仁七七粒。研作餅。右喎安左手心。左喎安右手心。却以壺盛熱水坐藥上。冷即換。五六次即正。婦人良方

普門醫品

中風

卷二 二十五

又方

新石灰醋炒。調如泥塗之。左喎塗右。右喎塗左。立便牽正。寇氏衍義

又方

青荆芥一斤。青薄荷一斤。同于木盆內研爛。生絹絞汁。于砂鍋內熬成膏。濾去滓。日乾爲末。以膏和丸。梧子大。每服三十九。白湯下。早晚各一服。忌動風之物。經驗方

又方

黃鱈魚尾上取血。同麝香少許塗額頰上。左喎塗

右。右喎塗左。正即洗去。本草綱目

又方

鼈血調烏頭末塗之。待正即搗去。肘後方

又方

巴豆七枚。去皮研。左喎塗右手心。右喎塗左手心。仍以暖水一盞安藥上。漬更即正。洗去。聖惠方

又方

皂角五兩。去皮爲末。三年老醋和之。左喎塗右。右

普門醫品

中風

卷二 二十六

喎塗左。乾更上之。外臺秘要方

又方

生烏頭青磐。各等分爲末。每用一字。嚙入鼻內。取涕吐涎。立効。篋中秘寶方

又方

天南星。生研爲末。薑自然汁調。左貼右。右貼左。存堂方

四物湯 治見論

熟地黃。川芎。白芍藥。當歸。各一錢。水鍾半。煎七分。

溫服

六君子湯 治見論

人參白朮半夏茯苓各一錢甘草陳皮各七分水
二鍾薑三片棗二枚煎八分服

附中氣

論許學士云世言氣中者雖不見方書然暴怒傷
陰暴喜傷陽氣多厥逆往往迷惘昏塞牙關緊急
若便作中風用藥多致殺人惟宜蘇合丸灌之使
醒然後隨寒熱虛實而調之無不愈者玉機微義

普門醫品

中風

卷二 二十七

云。中氣即七情內火之動氣厥逆由其本虛故也
經云無故而瘡脉不至不治自已謂氣暴逆也氣
復則已

治方

中氣不省人事閉目不語如中風之狀

南木香爲末冬瓜子煎湯調服三錢灌下痰盛者
加竹瀝薑汁

衛生方

破傷風門

論破傷風不論金刃傷竹木傷及諸瘡但皮破血
出風邪襲之傳播經絡皆成此病其證寒熱更作
身體反張口噤不開是以古人與中風混同論治
不另立門自劉河間始分表裏中三法與傷寒同
治其言病因有外傷于風亦間有瘡久不愈灸火
之毒發熱生風或瘡作白痴毒氣閉塞鬱熱生風
者特與中風相似耳但中風之人尚可淹延歲月

普門醫品

破傷風

卷二 二十八

而破傷風犯之多致不救蓋中風尚有在經在腑
在臟之異破傷風始雖在表隨即傳臟故多死也
寒熱拘急筋惕搐搦爲在表急汗之乍寒乍熱
頭有汗身無汗爲半表半裏宜和解口強舌噤項
背反張痰涎壅盛胃腹滿悶便溺不利爲在裏宜
疎導之

有類破傷風者癰疽潰後筋糜肉爛膿血大泄陽
隨陰散或筋脉拘急惡寒惕搦甚者舌強口噤項
背反張痰涎壅盛便閉汗出不時發熱此氣血俱

虛而傳變雖與破傷風相類不可作風治宜大補氣血若果係風證亦須大補氣血爲本而兼以治風之藥方不差悞必壯盛之人及新傷成風者乃可專作風治

通治

防風湯 治破傷風表證未傳入裏急服此

防風羌活獨活川芎各等分每服五錢水鍾半煎七分調蜈蚣散二錢溫服

附蜈蚣散方

普門醫品

破傷風

卷一 二十九

用蜈蚣一條炙魚鱉三錢炒成珠爲末聽用

大芎黃湯 治破傷風邪傳于裏舌強口噤項背反張筋惕摘搦疾涎壅盛宜急服之

川芎酒洗羌活黃芩酒炒大黃煨各一兩每服五錢水鍾半煎七分溫服

急風散 治一切破傷風項強口噤喉如拽鋸

丹砂一兩草烏二兩半生半燒存性醋淬川烏生二錢半麝一錢另研爲細末酒下五分血止痛定

破傷風發熱

蟬蛻炒研酒服一錢醫學正傳

破傷風手足顫掉搐搦不已

人手足指甲燒存性六錢南星薑製獨活丹砂各二錢爲末分作二服酒下立効普濟方

破傷中風牙關緊急角弓反張吐沫直視

天南星防風等分爲末每服二錢熱酒送下二服卽止經驗後方

又方

左盤龍卽銀黃左盤者炒江鱉炒僵蠶炒各五錢

普門醫品

破傷風

卷二 三十一

雄黃飛一錢爲細末蒸餅爲丸梧桐子大每服二十丸溫酒下醫方

又方

乾蠍麝香各一分爲末敷患處普濟方

又方

鷄矢白一升大豆五升炒黃以酒沃之微烹令豆溼下隨量飲取汗避風經驗方

又方

瘡蟪一個將脊背插住待口中吐水就取抹瘡上

覺身麻汗出無不愈者

又方

蜈蚣研末擦牙。追去涎沫立瘥。

又方

蟾酥二錢湯化乾蝦酒炒天麻各半兩為末合搗

九絲豆大每服一九至二九豆淋酒下

又方

草烏尖白芷金生研末每服半錢冷酒一盞入葱

白一根同煎服少頃以葱白熱粥投之汗出立愈

普門醫品

破傷風

卷二 三十一

儒門事親

又方

雄黃白芷各二錢為末酒一鍾煎灌之即甦

人經驗方

又方

避陰槐枝上皮旋刻一片安傷處艾灸百壯不痛

灸至痛痛者灸至不痛槐皮壞即易

又方

亂髮一鷄子大于無油皿中炒焦研末以酒一盞

沃之入何首烏末二錢灌服少頃再灌

破傷風發搐口噤強直者

魚鰾燒存性一兩麝香少許為末每服二錢蘇木

煎湯調下仍煮一錢封瘡口

破傷風口噤身強

肉苁蓉切片晒乾用一小盞盛燒爛于瘡上熏之

累効

破傷中風口噤

大豆一升炒去腥氣勿令太熟杵末薄透放瓶內

普門醫品

破傷風

卷二 三十二

以酒一升淋之溫服取汗以其渣敷瘡上千金方

凡金瘡折傷及潰瘍俱不得用扇當風犯者發瘡口

噤項直目瞪角弓反張其則死人

急飲竹瀝二三鍾忌冷飲食及酒

金瘡中風角弓反張

杏仁杵碎蒸一飯時絞濃汁服一盞効

又方

蒜一升去心無灰酒四升煮極爛并泔服之外臺

秘要方

金瘡中風口禁搐搦

蒼朮八錢炒白芷川芎細辛麻黃各五錢川烏炮

草烏炮各三錢薄荷一錢爲細末每服一錢熱黃

酒調服蓋覆取汗愈加乳香一錢治疼風經驗方

灸法治一切破傷風及顛狗咬傷神効

用核莢殼半箇內填人屎滿用槐白皮襯扣傷處

艾炷灸殼上遍身汗出其人大困即愈經驗方

又方

槐子一合炒好黃酒一碗煎八分熱服汗出愈經

普門醫品

破傷風

卷二 二十二

驗方

普門醫品卷之三

東武王化貞元起父編輯

門人陳斌憲卿父較閱

傷寒門

傷寒者冬傷于寒也感而即病名曰傷寒不即病者其寒毒藏于肌膚至春而發在夏至前爲瘟病至夏而發在夏至後爲暑病暑病熱之極也以其始由于寒故總名爲傷寒耳

論傷寒者冬傷于寒也感而即病名曰傷寒不即病者其寒毒藏于肌膚至春而發在夏至前爲瘟病至夏而發在夏至後爲暑病暑病熱之極也以其始由于寒故總名爲傷寒耳

普門醫品

傷寒

卷三 三十四

一日太陽經受病頭項痛腰脊強其脉浮二日陽明經受病身熱日痛鼻乾不得眠其脉長皆爲在表宜汗三日少陽經受病胃脘痛耳聾往來寒熱其脉弦爲半表半裏宜和解四日太陰經受病腹滿噎乾其脉沉細五日少陰經受病口燥舌乾而渴其脉微緩六日厥陰經受病少腹滿囊縮而厥其脉沉澁皆爲在裏宜下此共大凡六日後邪氣衰當不治而愈亦有不罷再傳者或有間經而傳者或有傳至二三經而止者有節終只在一經

者或有越經而得者或有初入太陽不作鬱熱便入少陰而成真陰證者或有直中陰經而作寒證者其間千變萬化疑似難明非神工國手未易窮其變而析其微俗醫浪試鮮不誤人是以有不用藥爲中醫之說惟一二日初覺頭痛發熱邪正在表尋常發散亦可奏功是集所舉多係明白簡要可通用者其至于汗下補瀉之宜不勝書亦未敢的指也

普門醫品

傷寒

卷三 三十五

一傷寒頭疼又身熱便是陽證不可服熱藥蓋太陰病頭不疼身不熱少陰病有發熱而無頭疼厥陰病有頭疼而無發熱故知頭疼又身熱卽是陽證若投熱藥決致死亡

一傷寒必須且攻毒氣不可補益蓋邪氣在經絡隨證攻之自愈若妄補正氣使毒氣騰熾每致殺人

一傷寒不思飲食不可溫補脾胃蓋傷寒邪氣在胃故不食不死理中健脾等藥不可輕服丁香砂仁之類尤不可服

一傷寒腹疼亦有熱證不可輕服溫藥凡身大厥逆而腹疼者方是陰證若見腹疼便投熱藥每致殺人

一傷寒自利當辯陰陽不可倒服補藥熱藥及止瀉藥蓋自利惟身不熱手足溫者屬太陰身冷四逆者屬少陰厥陰其餘身熱下痢皆屬陽證依仲景法治之切勿輕投熱藥

普門醫品

傷寒

卷三 三十六

一傷寒胃脘疼及腹脹滿不可妄用艾灸惟寒厥陰證宜灸每見村落間無藥之處傷寒每用艾灼多致毒氣隨火而盛發喘而死者有之不可不戒也

一傷寒手足厥冷當辯陰陽不可倒作陰證蓋傷寒有陽厥有陰厥醫者多不辯往往誤藥殺人凡初病發熱至三四日後熱氣已深大便秘小便赤或語昏憤而厥者陽厥也所謂熱深厥亦深急用大承氣湯下之若初病不熱大便秘小便數引衣自蓋無熱證而厥者卽是陰厥方可用四逆湯之類二厥脈皆沉然陽厥脈沉而滑陰厥脈沉

而弱陽厥指爪時溫陰厥則常冷此爲別也

一傷寒病已在裏卽不可用發汗藥蓋傷寒證須分表裏如發熱惡寒是表證宜發汗如不惡寒反惡熱卽是裏證不宜發汗又有半表半裏之證及無表裏之證皆不可下不可汗宜隨證治之

一傷寒飲水爲欲愈不可令其恣飲過度凡病人大渴欲飲水當與之以消熱氣故仲景以飲水爲欲愈但因而恣飲恐將來爲嘔爲喘爲咳逆爲下利爲腫爲悸爲水結胃爲小便利者多矣宜常

普門醫品

傷寒

卷三 三十七

令不足爲善

一傷寒病初愈不可過飽及勞動或食羊肉行房諸厚味飲酒亦不必再服藥蓋脾胃纔復不可過食不能消化病卽再作若食羊肉飲醇酒及行房者犯之必死

一傷寒用藥必須以證察脉方保無悞恐知脉者鮮宜辨視舌色分其表裏初病邪在表舌色白紅而無白黃等胎邪入于半表半裏則白胎見邪入于裏則黃胎見爲胃毒也宜調胃承氣湯下之胎

去而安若悞用湯丸及失下其胎必黑變爲壞證此爲難治若胎色純黑如漆者十死一生心火亢極也宜速下之

一傷寒陰陽二證治法天淵然有陽證似陰者四肢厥冷昏迷不醒似是陰證然身雖寒反不欲衣口渴指甲紅色大便秘小便赤其脉沉滑此爲陽證似陰法當承氣湯下之不可作陰證治有陰證似陽者煩躁面赤身熱似是陽證然身雖熱反欲得衣口不出指甲黑色大小便利手足逆冷脉沉

普門醫品

傷寒

卷三 三十八

微此爲陰證似陽法當溫之不可作陽證治

一傷寒腹痛不辯寒熱將凉水一碗與之飲其痛稍可者屬熱當用涼藥清之清之不已連臍硬疼大便結實者急用寒藥下之其或飲水痛甚則屬寒當用溫藥和之和之不已四肢厥冷嘔吐瀉痢急用熱藥溫之

一傷寒六七日後若尚有表證頭痛發熱汗者以羌活冲和湯微汗之若有裏證便惡熱者以大柴胡湯微下之二方平和中病當愈卽不中病

亦可無害若麻黃承氣等湯并知脉明理者必不可用

初起發汗

陰陽散 治傷寒初覺或三五日無汗宜服此

麻黃去節一兩綠豆粉二錢用豕白芷紫蘇葉各一錢石膏二錢甘草一錢為細末每服二錢涼水調服吃水二三次蓋被避風以身涼為度

時氣初起一二日者

麻黃一兩去節以水四升煮去沫取二升去滓着

普門醫品

卷三 十九

米一合或少許為稀粥先以湯浴後乃食粥厚覆取汗即愈

傷寒初得不問陰陽

肥皂角一挺燒赤為末以熱水五合和頓服之陰病極効

凡初覺頭疼身熱脉洪一二日內便以葱湯治之

葱白十餘莖豉一斗用絹袋盛入水三升煮至一升乘熱頓服取汗或加葛根二兩再不汗加麻黃一兩

數種傷寒不能分別及天行時氣初覺頭疼發熱

葛根四兩豆豉一合水三碗煎取一碗入生薑汁熱服之汗即愈

傷寒頭疼如破者

葱白連須半斤生薑二兩水一碗煎碗半溫服凡傷寒初起一二日內不能分別者用此取汗

時氣頭疼壯熱

生葛根洗淨搗汁一大盞豉一合煎六分去滓分

普門醫品

卷三 四十

服汗出即愈末汁再服心熱加梔子

一切傷寒不問陰陽輕重老少男女孕婦皆可服

白芷一兩生甘草半兩薑三片葱白一寸葉一枚

豆豉五十粒水三碗煎八分熱服取汗不汗再服

藥煎出如黃色病即愈如黑色或誤打胡即難愈

可卜吉凶至數勿令煩人

取吐

傷寒已三四日發汗不解胃中悶惡者

豉一升鹽一合水四升煮一升半分二三服取吐

此法也。梅師方

傷寒煩躁壯熱。胃中煩痛四五日不解。

烏梅十四個。鹽五合。水一升。煎半升。溫服。取吐。後

避風良。梅師方

發狂。十二方

傷寒發狂奔走。人難制伏。

病人房內。着火一盆。用醋一碗。傾于火上。其醋氣

入鼻內。即安。察其虛實。方用別藥。醫統

傷寒發狂踰垣上屋。

普門醫品。傷寒

卷三 四十一

石膏二錢。黃連一錢。為末。甘草湯冷調服。本事方

熱病狂邪不識人。不避水火。

苦參為末。每服二錢。溫水調服。即愈。千金方

傷寒發狂煩燥極熱。

鷄子一枚。生吞。効。食鑑

熱病發狂奔走似顛。如見鬼神。及不知人事者。

以人中黃。即乾人尿煅半日。出火毒。研末。新汲水

服三錢。未退再服。斗門方

大熱狂渴。

乾人屎為末。于陰地淨黃土中作五六寸小坑。將

末三兩匙。于坑中以新汲水調勻。良久澄清。細細

與飲。即解。錢宗素衍義

傷寒失汗下。狂言妄語。亂走。毒氣在臟也。

鐵粉二兩。龍膽草一兩。為末。磨刀水調服。一錢。小

兒五分。金匱心鑑

陽毒傷寒。失下。以致發狂。奔走不定。

宜黃連。寒水石。等分為末。每服三錢。濃煎甘草湯

下。易簡方

普門醫品。傷寒

卷三 四十二

熱病及時氣瘟病。六七日。熱極發狂。見鬼欲走者。

取白狗從背上刺破。取血。乘熱攤胃上。冷乃去之。

此治垂死者亦活。無白犬。但純色者亦可。肘後方

傷寒六七日。熱極狂言。見鬼欲走。

桐皮。削去黑皺。斷四寸。一握。酒五合。水一升。煮半

升。去滓。頓服。當吐下青黃汁數升。即愈。肘後方

大承氣湯。治傷寒五六日後。譫語煩渴。大便秘結。

口燥咽乾。日晡發熱。

大黃五錢。芒硝一合。厚朴二錢。枳實一錢。水二升。

先煎朴實至盞半。加大黃煎至一盞。去渣。納硝二

二沸。溫服。得利止服。

小承氣湯 七日不大便。腹脹滿潮熱。狂言而喘。

大黃四錢。厚朴二錢。枳實一錢。水二盞。先煎枳朴至盞半。入大黃煎一盞。溫服。

陰證 四方

傷寒直中陰經。真寒證。或陰毒證。腹中絞痛。嘔逆。沉重。不知人事。四體冷如冰。石甲。唇青色。藥不入口。六脉沉細欲絕。或無脉。

普門醫品

傷寒

卷三 四十三

葱白。縛一握。上下切去。約寸厚。如餅狀。先將麝香半分。填于餅中。後加葱餅于上。以火熨之。爛則易之。換二三餅。稍醒。灌入生薑汁。服回陽急救湯。如不醒。再灸關元氣海穴二三十壯。以回陽氣。若手足溫。汗出。醒者。即生用此法。手足不溫。汗不出。不省人事者。不治。回陽急救方見十七卷。腹痛門。

陰證傷寒腹疼厥逆

芥菜子研末水調貼臍上。生生編

傷寒陰毒腹疼欲死及一切中寒腹疼。

烏藥一合。炒起黑烟。投水中。煎三五沸。服一大盞。汗出陽迴。即愈。斗門方

四逆湯 傷寒陰證。自利。不渴。脉沉身痛。

附子三錢。甘草乾薑各錢半。水盞半。煎八分服。

發斑 二方

熱病發斑赤色煩疼。

大青七錢半。犀角二錢半。梔子十枚。豉二撮。分二服。每服水一盞半。煎八分。溫服。南陽活人書

傷寒赤斑

普門醫品

傷寒

卷三 四十四

青黛二錢。新汲水調服。活人書

發黃 三方

熱病發黃

竹葉三升。小麥一升。石膏五兩。水十大碗。煮取七碗。時時服之。盡劑愈。肘後方

又方

先以燒酒噴身上。取雞蛋清二枚和蜜五錢調勻。塗手掌內。遍身擦之。小腹及前陰兩旁尤加重擦。擦畢以手屢按急起。按其熱氣如前法。又擦一遍。

綠豆熟湯青布蘸洗仍以青布蘸擦口舌却與重

灸覆之取汗黃自退屢用活人甚効經驗方

發黃頭汗出小便不利

茵陳三錢煎濃調四苓散二錢服方見八卷泄瀉

結胃三方

陽毒結胃按之極痛或通而復結喘促煩燥狂亂

生地龍四條洗淨研爛生薑汁少許蜜一匙薄荷

汁少許新汲水調服若熱熾者加片腦少許即與

揉心下片時自然汗出而解不應再服傷寒論要

普門醫品

傷寒

卷三 四十五

陰毒傷寒心結按之極痛大小便閉但出氣稍暖

急取巴豆十粒研入麴一錢捻作餅安臍內用小

艾炷灸五壯氣通即愈金匱要略方

傷寒汗後卒患胃膈閉痛

枳實麴炒爲末米飲服二錢日三服子禮濟生

軀逆四方

傷寒咳逆發軀諸藥不効

雄黃二錢酒一盞煎七分乘熱嗅之即止活人書

傷寒軀逆

枳殼半兩木香一錢爲末每白湯下一錢太平方

又方

丁香一兩乾柿蒂焙一兩共爲末每服一錢人

參煎湯下簡要濟衆方

傷寒軀逆聲聞四隣

四花青皮全者研末每服二錢白湯下醫林集要

喘急二方

傷寒喘急

防己人參等分爲末桑白皮煎湯服二錢本草方

普門醫品

傷寒

卷三 四十六

傷寒氣喘不止

紫蘇葉一把水三碗煎一碗稍飲之肘後方

狐惑二方

傷寒口唇生瘡及下部疼癢蟲蝕其臍名爲狐惑瘡

雄黃半兩燒于餅中薰其下部聖惠方

狐惑蟲蝕病人齒無色舌上白或喜睡不知痛癢口

唇生瘡宜急視下部若治其上不治其下蟲食其肛

爛見五臟則死

艾葉一握雄黃少許于瓶中燒烟以肛門對其上

薑之効 附後方

勞傷食復 十一方

傷寒病後受勞傷食復病欲死

鼈甲燒研水服二錢 附後方

又方

紫蘇葉煮汁二升飲之或與生薑豉同煮亦可

附後方

又方

蘆根煮濃汁飲之 附後方

普門醫品

傷寒

三 四十七

傷寒勞復發熱

雄鼠屎梔子各二七枚枳殼三枚爲細末葱白二

寸豉三十粒水一盞煎一盞分三服 活人書

傷寒勞復身熱大小便赤如血色

胡黃連五錢山梔子一兩去殼蜜水拌炒令微焦

爲末猪膽汁和丸梧子大每服二十九用生薑二

片烏梅一個童便三合浸半日澄清食後將童便

煮溫吞之少時再服効 圖經本草

傷寒食復

卽用所食之飯燒研末米飲服二三錢 本草綱目

又方

神麴二兩水二碗煮汁一碗飲之 領要方

傷寒食復及因交接復發欲死不能語

梔子三十枚水三升煎一升服之令微汗 梅師方

傷寒勞復因交接者腹疼邪腫

葱白搗爛醋一盞和服効 千金方

又方

蓼子一握水揉取汁飲一盞 附後方

普門醫品

傷寒

卷三 四十八

熱病汗後交接復發忽邪縮入腸疼痛欲死

女人月經未燒爲末熱水服二錢卽定 扁鵲方

陰陽易 五方

傷寒初愈陰陽交合必肢體拘急手足拳攣小腹急

疼頭不能舉名陰陽易當速汗之過四日則不治

藍葉一把雄鼠屎二十一枚水二鍾煎一鍾服取

汗 聖惠方

又方

禪襦燒灰服之并所交女人衣裳燒之 藏器本草

又方

手足爪甲二十片中衣箱一片燒灰分三服溫酒下男用女女用男

本草綱目

陰陽易病男子陰腫小腹絞疼頭重眼花及勞復

殺鼠屎二十八粒韭根一大把水二盞煮七分去渣再煎二沸溫服得汗愈未汗再服

南陽活人書

傷寒瘥後交接復發欲死眼不開不能言語及新瘥

早起或多食復發

山厄子三十枚插碎水煎熱服微汗愈

梅師方

普門醫品

傷寒

卷三 四十九

舌出一方

巴豆燃子

巴豆一粒去油紙卷成撚納鼻中舌印收

普濟方

舌胎二方

傷寒舌上生胎不拘滑白黃黑

俱用井水浸青布片于舌上洗淨後用生薑切片

時時浸水刮之其胎自退病熱亦減若見舌上黑

胎芒刺者多死此熱毒入深心火亢極也

調胃承氣湯 傷寒不惡寒反惡熱大便秘結語謔

逆舌上生胎

大黃四錢苦硝一合甘草一錢水三升煎八分去渣納苦硝微煎溫服

鼻衄一方

傷寒鼻衄成流久不止者

方

山厄炒黑色為細末吹入鼻內外將水濕草紙搭于鼻銜數易之其血自止

醫統

又方

用酒浸足卽以涼水浸紙搭眉棱及印堂上

驗方

普門醫品

傷寒

卷三 五十

吐血一方

傷寒吐血不止

用韭汁磨京墨卽下卽止

醫統

口乾一方

望梅飲

生藕汁生地黃汁童子小便各半盞煎八分溫服

魏安時傷寒論

懊憹一方

傷寒吐下後心中懊憹或汗下後身熱不去心中痛

者全用此手或湯

肥大厄子十門枚水二盞煮一盞入豉半兩同煮至七分去渣服得吐止 傷寒論

昏迷一方

傷寒昏迷不省人事

皂莢研末然紙燒烟入鼻有嚏可治隨用皂莢末五分半及白礬各三分為細末薑汁調服探吐去痰涎即甦若無嚏者不治

餘熱一方

普門醫品

傷寒

卷三 五十一

時氣汗後餘熱不退燥渴四肢無力不能飲食

牛旁根搗汁服一小盞 聖惠方

煩燥一方

時行熱病心神煩燥

藍澱一匙新汲水一盞調服 聖惠方

熱極一方

傷寒熱病失于汗下熱邪傳裏亢極無解

黃連二兩水二升煎一升井中浸冷浸青布搭留上稍熱即易待熱勢稍退則除毋久作冬月莫用

通中散

通中散

麝皮一升并炒熟絹包于病人腹上款款熨之藥氣得熱則行大便通矣

天一方

因驚恐而得者為夾驚以寒

紫背浮萍一錢犀角屑半錢釣藤鈎二十一個為末每服半錢蜜水調下連三服出汗為度 聖濟方

聖濟方

普門醫品

傷寒

卷三 五十二

奪命散 治傷寒壞證不問陰陽老幼姪嬙因失治

誤藥危困垂死六脉沉伏不省人事七八日以後者皆可服之百不失一

人參一兩水二鍾煎一鍾以井水浸冷服之少頃

鼻梁汗出脉復立瘥此方活人無數 百一選方

惡熱便秘一方

大柴胡湯 治傷寒內實大便難不惡寒反惡熱

柴胡三錢黃芩酒炒芍藥酒炒各二錢半夏一錢

大黃二錢枳實一錢半生薑三片棗二枚水二鍾

煎八分溫服以利爲度未利再服

傷風

論傷風之證頭痛發熱亦類傷寒但不惡寒而惡風鼻塞聲重或欬嗽吐痰爲異耳傷風多自汗宜因衛氣兼散風邪如桂枝湯之屬

治

感冒風寒

芥末水調填臍內用熱鹽隔衣熨之簡便卑方

感寒喘急

普門醫品

傷寒

卷三 五十三

紫蘇葉三兩橘皮四兩酒四升煮一升半分再服肘後方

傷風流涕

白芷一兩荆芥穗二錢爲末酒服三錢日一選方

風寒無汗發熱頭痛

核朮肉葱白細茶生薑等分搗爛水一鍾煎七分

熱服覆衣取汗談野翁方

九味羌活湯

治春夏秋感冒頭疼脊強發熱無汗羌活二錢防風一錢半蒼朮米泔浸一錢川芎酒

浸一錢半細辛三分白芷生地黃黃芩酒炒各一錢甘草五分生薑三片葱白三根水二鍾煎八分熱服劉河間方

中和湯 治春夏秋感冒非時暴寒亦有頭疼惡寒身熱脈浮緩自汗

羌活二錢二分白朮川芎白芷黃耆各一錢黃芩

生地黃防風細辛各八分甘草六分生薑三片葱

白三根水二鍾煎八分溫服劉河間方

桂枝湯 治傷風自汗金匱冬月正傷寒

普門醫品

傷寒

卷三 五十四

桂枝芍藥各二錢甘草一錢水二盞薑三片棗一枚煎服仲景方

瘟疫門

通治 辟穢

論瘟疫者衆人所病一般男女老少長率皆相似如有鬼疰之氣人多發于春分之後夏至之前故曰瘟疫又曰癘疫又曰天行時疫其證與傷寒相似傳經表裏亦無不同惟是時令已暖暑氣鬱蒸與傷寒微有不同是以發散宜用辛平之劑如麻黃

等劑法不可用也

大頭瘟為天行邪氣容于太陽陽明少陽之經而
為大陽病發于頭上并腦後項下及目後赤
腫明病發于鼻頭及面部赤腫二日不開少陽
病發于耳之上下前後金頭角赤腫三陽經俱受
邪併發于頭面耳鼻一時俱腫宜用劑防敗毒散
日乾舌燥咽喉腫疼者用普濟消毒飲或防風通
聖散外以清涼藥敷之

治大頭瘟不宜速攻邪氣方盛而速攻之若邪氣

普濟消毒

瘟疫

卷三 五十五

不伏反攻于內而傷人也治法清熱解毒應者兼
益元氣胃虛食少者兼助胃氣內實熱盛大便秘
結者以酒浸大黃下之此為先後緩急之法

大頭瘟先從鼻腫次及于目又次及于耳至頭上
絡腦後結塊不散者必出膿而後愈

蝦蟇瘟為天行邪氣容于少陽項并腮頰腫大
如蝦蟇樣故名蝦蟇瘟宜用人參敗毒散外以側
柏汁調蠶蚶糞敷之

凡看瘟疫病未知端的宜先以人參敗毒散與之

看歸何經再隨經用藥

通治十九方

五瘟丹 治一切瘟疫

黃芩黃藥黃連山梔子香附子紫蘇甘草稍各
一兩七味俱生用為末于冬至日用錦紋大黃三
兩濃煎去渣熬成膏和前藥丸如彈子大硃砂雄
黃末為衣并以金箔貼之每用一九新汲井水化
服連服已年甘草為君乙庚年黃芩為君丙午年
黃藥為君丁未年山梔為君戊辰年黃連為君過
當為君者用二兩餘四味為臣與香附紫蘇各一
兩仲景方

普濟消毒

瘟疫

卷三 五十六

二聖救苦丹 治瘟疫傷寒不論傳經過經皆可服

錦紋大黃四兩切片酒拌蒸晒乾牙皂角二兩炙
去皮弦俱為末稀糊為丸綠豆大每服五七十九
冷綠豆湯送下以汗為度

人參敗毒散 治傷寒瘟疫頭疼項強增寒壯熱不

問老人小兒皆可服

人參羌活獨活藁朮柴胡川芎枳殼桔梗白茯苓

各等分甘草減半每服五錢水鍾半薑三片煎一
鍾溫服或為細末沸湯點服

東垣方

時氣瘟病頭疼壯熱初得一日

用生梓木削去黑皮取裏白者切一升水二升五
合煎至八合溫服即瘥

肘後方

薰法 治瘟疫傷寒服發汗藥不汗者

用麻黃一握煎沸湯一盆令病人仰臥曲膝將沸

湯盆放曲膝下空處却將夾被連頭覆之汗即出

俟周身透足底澀澀然為度

普門醫品

聖方

卷三 五十七

普濟消毒飲子 治疫癘頭面腫痛口不能開上喘

咽喉不利口乾舌燥

黃芩半兩酒炒黃連半兩酒炒人參三錢陳皮去

白二錢甘草二錢連翹二錢玄參二錢僵蠶七分

升麻七分柴胡八分桔梗板藍根馬勃牛旁子各

一錢共為細末湯調時服之或加酒浸大黃二

錢以利之腫甚以砭針刺之

東垣方

時氣瘟疫

用廟社中西南栢樹東南枝曝乾研末每服一錢

新水調下日三服

又方

常以東行苑枝煎湯浴之佳

類要

呪法 治瘟疫并治邪瘡

用桑一枚呪曰重桂一氣念七遍望西北方取

氣一口吹瘡上令病者吃之湯水任下

時氣頭疼煩熱

皂角燒研新汲水一中盞薑汁蜜各少許和二錢

服之先以暖水沐浴後服藥取汗愈

聖惠方

普門醫品

聖方

卷三 五十八

瘟疫發熱不止口渴咽乾飲水不解者

以青布浸涼水中畧搗乾置患人背上以兩手心

按之良久布熱易之洎更當汗出如水而愈

又方

生藕汁一盞生蜜一合和勻細服

聖惠方

天行面赤項腫名蝦蟆瘟

金線龜搗汁水調空腹頓服屢用活人

博濟方

時氣煩燥五六日不解

青竹瀝半盞煎熟數飲之厚覆取汗

千金方

天行病腹脹滿兩脇刺痛臍下如腫

諸枝汁隨意服之小便利即消

菟葉蒸法 治天行病屢發汗不出法當死可蒸之

燒地令熱去火以少水灑之布乾菟葉于上厚二

三寸安席葉上臥之溫覆得大汗被中以粉撲之

及燥便瘥凡栢葉麥麩蠶沙皆可作此法

治大頭瘟蝦蟇瘟

僵蠶二兩薑黃二錢半蟬蛻二錢半大黃四兩共

為細末薑汁打糊為丸重一錢一丸大人服一丸

普門醫品

溫病

卷三 五十九

小兒半丸蜜水調服

防風通聖散 治見論

方見卷之二十二鼻病門

荆防敗毒散 治見論

方見卷之二十八楊梅瘡門

附辟瘟

辟穰瘟疫

上品硃砂一兩細研蜜和丸麻子大常以太歲日

平旦一家大小勿食諸物向東各吞三七丸勿令

近齒永無瘟疫

又方

每臘月二十四日五更取第一汲井水乳香玉

元旦五更溫熱從小至大每人吞香一塊飲水三

呷則一年無時疫

又方

除夜以紅小豆川椒各十七粒投井中勿令人知

能却瘟疫或以大麻子二十一粒于元旦投井中

亦良

普門醫品

瘟疫

卷三 六十

又方

正月七日新布囊盛赤小豆置井中三日取出男

吞七粒女吞二七粒竟年無病

又方

麻子仁赤小豆各二七枚除夜着井中飲水可免

瘟疫

又方

並春後遇庚子日用蔓菁取汁令家大小盃溫服

之不限多少一年可免時疫

又方

元旦面東以蠶水吞赤小豆三七枚。一年無諸疾。
本草綱目

又方

五月五日午時採蒼耳嫩葉陰乾。臨時爲末。冷水服二錢。或水煎。舉家皆服。能辟邪惡。
千金方

又方

六月六日采馬齒莧。過曬乾。元旦煮熟。同鹽醋食之。可解疫氣。
唐陸龜蒙方

普門醫品

瘟疫

卷三 六十一

又方

以絳囊盛馬蹄屑佩之。男左女右。
肘後方

又方

遇天行時。本家有一人病者。卽取其衣服于饌上蒸過。則一家不染。
瀕湖方

烏金散

治瘟疫傷寒不拘陰陽一切心腹腹疼赤眼暴腫無名腫毒婦人乳癰小兒急驚麻痘發不出等證。以此藥點眼神効。

透明白犀角蜜犀亦可。黑枯者不用。山慈姑鮮明。

者油黑不用。血竭鮮紅者皮硝大塊者麻黃陳者。

去節淨五味各一兩俱切。豆大塊用生薑半斤搗。

自然汁拌勻。浸一宿。搗藥並薑汁分作二十四分。

用烏金紙包住。外用線扎牢。又用小紅棗六七斤。

蒸太核搗爲泥。亦分作二十四團。裹前烏金紙包。

于內如彈子狀。外用綿紙二三層包之。使見火不。

裂。若裂者以棗泥完固。用沙鍋一口入藥四五丸。

于內再用沙鍋一口仰蓋之。要中周有空藥得轉。

動。上下用炭火煨之不時將藥撥轉。使火候得勻。

普門醫品

瘟疫

卷三 六十二

以黃黑烟盡藥輕爲度。取出埋乾黃土內。另入。

別丸二十四丸俱煉完。埋土內一宿。次日取出連。

棗灰收之。臨用去棗灰不用。只以內藥研末。每藥。

一錢加水片一分。研勻。磁罐固封。聽用。令患者閉。

口。以銀簪蘸藥。麻油粘藥少許。點入二大眼角。又。

用管挑藥少許。吹二鼻內。男先左女先右。吹完雙。

手兜住陰囊側臥。候汗至足。心爲度。放手汗後調。

養數日。忌諸葷冷麪。若無汗者不治。
本草綱目

東武王化貞元起父編輯

門人陳 斌憲卿父較閱

暑證門

中暑 傷暑 冒暑

論暑證有中暑傷暑冒暑之不同。暑而得之者，為中暑。所謂避暑于深堂大厦之中，涼臺冷甃之上，陰氣所遏，使周身陽氣不得通越，其證多頭疼惡寒，身體拘急，肢節疼痛而煩，肌膚大熱而無汗，正暑間醫品

辛溫之劑以解表散寒。紫蘇、乾葛、厚朴、藿香、羌活、蒼朮之類，若外既受寒，內復食生冷瓜果，前藥內加乾薑、砂仁、神麴之類，此非治暑也，乃治因暑所致之病也。動而得之者，為傷暑，所謂暈也。行人或農夫于炎天烈日之中，勞役太過，為暑所傷，其證頭痛發躁惡熱，捫之肌膚大熱，大渴引飲，或大瀉無力以動，乃天熱外泄元氣也，宜清暑益氣，用香薷、黃連、扁豆、人參、黃耆、五味、知母、石膏之類。冒暑者，虛弱之人，感日暑氣，腹疼水瀉，惡心頭眩，或

作吐，宜用清暑益氣湯，十味香薷飲之類。

夏月多食冷物及過飲茶水，致傷脾胃，吐瀉霍亂。

故治暑藥多用溫脾消食行濕利小便，醫者要識。

此意不可不投寒涼之劑。

若內傷水水及冷物，腹痛泄瀉或霍亂吐逆，宜縮。

脾飲甚者用附子大順散，或附子理中湯，加白芍。

藥

夏月卒倒不省人事，名為暑風，有因火者，有因痰。

者，內火因外火以動，其勢炎燥，所以卒倒，虎人多。

普門醫品

暑證

卷四

二

痰因暑氣冲激痰飲，寒呀心窵，手足不知動躡而卒倒也。此二者皆可吐。

秋初夏末頭疼脚軟，食少體熱倦怠，名為。

注夏，宜用補中益氣湯，去柴胡升麻，加妙黃芩。

麥冬五味，或用生脉散。

中暑

中暑暈死

熱湯徐徐灌之，少舉其頭，令湯入腹，即甦。

又方

胡麻一升微炒令黑。為末。新汲水調服三錢。驗後方

又方

新汲水和麩一大抄服之。

又方

即取道中熱土堆心口少冷即易氣通即活。本草

又方

以熱土圍臍旁令人尿。臍中仍用熱土大蒜搗水。

普門醫品

卷四

三

去滓灌之即活。本草綱目

凡中暑毒欲死者

用大蒜二三瓣爛嚼溫水送下即時甦醒。普門醫品

中暑不省人事

皂莢一兩燒存性甘草一兩微炒為末溫水調一

錢灌之

普門醫品

夏月人在途中熱死

用車輪上半合冷水調澄清服之更以新汲水滴

鼻中用扇扇之若與冷水飲即死。普門醫品

注夏虛病

枸杞子五味子研爛滾水泡封三日代茶飲之。攝生方

補中益氣湯。治見論

方見本門後日暑條

傷暑

一切傷暑發熱頭疼身疼或吐利心腹疼或轉筋或乾嘔或四肢逆冷或煩悶欲死

香薷一兩厚朴薑汁炙五錢黃連三錢甘草二錢

普門醫品

卷四

水三盞酒一盞煎二盞分作二服水中沉冷服之

少頃再一服即愈泄瀉加白扁豆四錢。普門醫品

傷暑或吐或瀉或嘔小便赤澀煩渴及霍亂

滑石飛四兩藿香丁香各一錢湯服二錢。普門醫品

十味香薷飲。治伏暑身倦體困神昏頭重吐利

黃耆蜜炙人參白朮米泔製炒白茯苓陳皮木瓜

各七分香薷一錢白扁豆八分厚朴甘草炙各五

分薑三片棗二枚水二鍾煎一鍾溫服暑風去黃

耆加梔活一錢五分

清暑益氣湯 治夏月暑熱蒸人四肢倦怠胃滿氣

促肢節疼氣高而喘身熱而煩心下痞脹小便黃數大便溏瀉或痢或渴不思飲食自汗體重

人參黃耆升麻蒼朮各一錢白朮神翅各五分陳

皮甘草炙黃蘗音麥麥門冬常歸乾葛各四分五味

子七粒澤瀉五分青皮三分水二鍾煎三片棗二枚煎八分溫服東垣方

人參白虎湯 治夏月中暈舌燥發渴身熱脉虛

人參錢半知母二錢石膏煨五錢甘草炙一錢水

普門醫品

附證

卷四 五

二鍾粳米一合煎一鍾溫服和劑方

大順散 治日晡伏熱引飲過多及食瓜果生冷脾

胃受濕陰陽氣逆頭疼拘急霍亂嘔吐臍腹不調

乾薑炮三錢甘草三錢杏仁去皮尖三錢官桂去

皮二錢先將甘草用細沙炒次入乾薑又次下杏

仁炒黃篩去沙淨合桂為末每服三錢白湯點服

附子大順散 治見論

方即大順散加熟附子二錢

縮脾飲 除煩渴消痞止吐瀉

白扁豆炒乾葛甘草各二兩烏梅肉砂仁草果各

一兩每服四錢水一鍾煎半鍾不拘時冷服

理中湯 治夏月過食生冷嘔吐腹疼或去後無度

或中氣虛弱口舌生瘡或入房犯寒食冷心腹絞痛

手足厥逆

人參白朮炒乾薑炮甘草炙各等分每服五錢

或一兩水二鍾煎一鍾微溫服仲景方

附子理中湯 治見論

方即理中湯加熟附子二錢

普門醫品

附證

卷四 六

益元散 治伏暑煩渴泄瀉

滑石六兩研細水飛大甘草搗末一兩調勻每服

三錢入蜜二匙調服仲景方

又方

枯礬為末醋糊為丸量大小用木瓜湯下經驗方

夏月卒倒昏冒角弓反張不省人事手足或發搐搦

此為暑風不可作風治

香薷厚朴薑汁炒白扁豆炒黃連薑汁炒各一錢

羌活二錢虎人多汗加黃耆人參各一錢水鍾半

煎八分溫服

消暑 五方

人參益氣湯 治暑熱傷氣倦怠嗜臥手指麻木

人參一錢二分黃耆二錢白芍藥七分甘草一錢

五味子三十粒柴胡六分升麻五分水二鍾薑三

片棗二枚煎一鍾食遠服

補中益氣湯 治中氣不足或誤服尅伐之藥四肢

倦怠口乾發熱飲食無味自汗體倦少食

黃耆人參白朮各一錢五分甘草炙一錢當歸八

普門醫品

暑證

卷四

七

分陳皮五分升麻柴胡各三分水二鍾薑三片

二枚煎八分食遠溫服

東垣方

生脈散 治傷暑脈微而渴服之生津液益元氣

人參麥門冬各三錢五味子一錢水二鍾煎二沸

時時服

水瓢丸 消暑止渴

百藥煎臘茶等分爲末烏梅肉搗和爲丸艾子大

每含一丸

事林廣記

桂漿 暑月飲之解煩渴益氣清痰

官桂末二兩白蜜一碗先以水十碗煎取六碗入
淨磁瓶內乃下一物打二三百轉用油紙一重復
加綿紙三重封之每日去紙一重三日後開取氣
味香美格韻絕高夏月宜作之

寒證門

論寒證即經所謂陰證也其證臍腹疼痛手足厥
冷身體拘急口噤唇青緩治則死陰證非盡由入
房而得世人譚言此病又實無房事由以陰證之

普門醫品

寒證

卷四

八

藥抵拒不服往往自誤性命良可悼恨不知此病
先由五臟不足元氣太虛寒邪直入於經故名陰
證拘于房事豈不悞哉

寒邪直入于三陰急痛拘攣戰慄強直昏迷厥冷

口噤失音謂之中寒又謂之陰證傷寒以溫中散

寒爲主不與傷寒同治其由入房感風或食生冷

而得者亦寒邪乘虛而入總是中寒同一治法但

房事中寒者其疼多在少腹耳

寒中三陰一時昏不知人口噤失音四肢強直亦

似中風若以風藥治之必死急以附子理中湯若厥逆唇青囊縮無脈者用葱熨法仍灸關元氣海二三十壯為妙

中寒之候絕無發熱法當無汗有汗者多死

寒中太陰則中脘疼痛宜理中湯寒中少陰則當臍而痛宜五積散寒中厥陰則少腹痛宜四逆湯加吳茱萸

通治十八方

五積散 治中寒及感冒寒邪頭疼身痛腰背拘急

普門醫品

寒證

卷四

惡寒嘔吐腹疼不問外感風寒內傷生冷並治

白芷蒼朮厚朴陳皮當歸川芎白芍藥枳殼桔梗半夏薑製各一錢乾薑官桂各五分麻黃八分甘草三分薑三片棗二枚水二鍾煎七分溫服

四逆湯 治手足厥冷名四逆用此即愈

大附子一箇去皮臍切片生用甘草炙六錢乾薑五錢水三大碗煎二碗分二次服甚者加吳茱萸

三錢

中寒腹疼漸覺冷氣入陰囊者即欲死

以布裹熱椒包囊下熱氣大通日再易之以消為度千金方

中寒四肢逆冷

吳茱萸一升酒拌濕絹袋二箇包蒸極熱更互熨足心候氣透疼即止聖惠方

冬月感寒

吳茱萸五錢煎湯服之取汗本草綱目

陰症腹痛

露蜂房三錢燒存性葱白五寸同研為丸男左女

普門醫品

寒證

卷四

右着手中握陰臥汗出即愈本草綱目

揉臍法 治全上

吳茱萸二三合麩皮一升食鹽一合拌勻炒熱以絹包之于腹上下揉熨自然有效

陰毒卒痛

用雄雞冠血入熱酒中飲之暖臥取汗或以烏雞血沖酒服傷寒蘊要

男女陰證

用五月五日獨蒜一枚銀硃輕粉各一錢湯和作

餅貼手心內男左女右放臍下兩手合定頃間氣

迴汗出即愈但口中微有氣即活唐陸龜蒙方

陰症小腹絞痛面青唇白

鴿糞一大抄研末熱酒一鍾和勻澄清服劉氏方

陰症死逆

乳香硫黃同燒烟喫之德家藥要

脫陽危證凡人入房之後感冒寒邪或食寒物或

大吐大下之後為寒所中以致小腹絞痛外腎搐縮

四肢厥逆不省人事冷汗自出須臾不救

普門醫品

寒症

卷四十一

急以葱白搗爛炒熱熨臍復以葱白二十一莖搗

爛用酒灌之陽氣即迴華方

房勞陰證

胡椒七粒葱心二寸半磨香一分搗爛以黃蠟溶

和做成條子插入陰戶少頃即愈張氏集驗方

灸法治陰證四肢厥冷唇青囊縮口瘖失音

氣海穴在臍下一寸五分丹田穴在臍下二寸關

元穴在臍下三寸用艾火灸二七壯但手足溫暖

脈至即愈

葱白法治同上

用葱頭一把切餅十餘片連縛四五餅先川麝香

少許填于臍中放葱餅于上以熨斗盛火于葱餅

上熨之餅爛更換再熨熱氣入腹以通陽氣即愈

一切陰寒腹痛至危者皆治

附子理中湯治見論

方見本卷前暑證門

理中湯治見論

方見本卷前暑證門

普門醫品

寒症

卷四十二

濕證門

論經曰諸濕腫滿皆屬脾土又曰濕熱傷脾濕盛

則濡泄濕甚者為着痺此可以知濕之為病

濕有從内生者酒麪積聚湯飲停留濁液不行濕

由之起又有從外人者坐臥濕地蒙犯霧雨澡浴

涉水皆能致濕二者雖有內外之不同皆由脾氣

虛弱濕邪乘而襲之故曰壯者氣行則愈怯者着

而成病

治濕之法宜利小便為主故曰治濕不利小便非其治也大約在上者宜汗散從中起者宜疎利其輕重在下者宜淡滲以利小便

濕之中人也無形其為病也冬端濕氣勝者為著痺詳見痺門濕勝則濡泄見泄瀉門濕注生痰見痰飲門濕為痰源見痰飲門濕鬱為疔證見黃疸門

濕熱成痰見痰飲門濕為脚氣見脚氣門

通治

除濕湯 治中濕身體重着腰腿痠疼大便澀小便

普門醫品

津液

卷四 十四

或澀或利

半夏麴蒼木厚朴赤茯苓各半錢陳皮七分藿香甘草各五分水二鍾薑三片棗二枚煎八分食遠溫服

二木四苓湯 治諸濕腫滿一身盡痛發熱煩悶二便不利

白木蒼木白茯苓猪苓澤瀉黃芩羌活赤芍藥梔子仁各等分甘草減半水二盞薑三片燈心一撮煎八分空心溫服

甘草苓木湯 治冷濕傷腎腰重不起

甘草炙乾薑各五錢白朮白茯苓各一兩水五盞煎三盞作三次溫服

火證門

論王機微義曰火之為病其害甚大其變甚速其勢甚彰其死甚暴何者蓋能燔灼焚燎飛走狂越銷燦於物莫能禦之遊行于三焦虛實之兩途曰君火曰相火君火入火也相火天火也經謂一水

普門醫品

火證

卷四 十四

不勝二火二火謂君火即心火也相火三焦火也經曰諸熱昏癡暴瘧目昧躁擾狂越罵詈驚駭跽踴疼痠逆衝上禁懷如喪神守嘔嘔瘡瘍喉痺耳鳴及聾嘔涌溢食不下目昧不明暴注睨癰暴病暴死皆屬于火

氣有餘便是火氣從左邊起者肝火也氣從臍起者陰火也熱從腳下起入腹者虛之極也蓋相火起于九泉之下此病十不救一陰虛火動者難治飲酒人發熱者難治不飲酒人

因酒發熱者亦難治

東垣云有元氣虛損而熱有五臟之熱有內中外之熱輕手捫之便熱者熱在皮毛也屬肺火其候當日西甚重手按之熱者熱在筋骨也屬肝火其候當寅卯時甚不輕不重而熱者熱在肌肉也屬心火其候當日中甚又云晝則發熱夜則安靜是陽氣自旺于陽分也晝則安靜夜則發熱煩燥是陽氣下陷于陰中也晝夜不分而陽無陰也亟瀉其陽峻補其陰

普門醫品

火證

卷四 七五

虛火可補實火可瀉人火正治龍火反治鬱火可發龍火即相火也

人壯氣實火盛顛狂者可用正治如硝黃水水之類人虛火盛狂者可用生薑湯與之若投以永水正治必死凡火盛者不可驟用涼藥必用溫散陽勝則外熱陰虛則內熱風寒客于榮衛腠理閉塞而發熱者為自外而內之熱勞倦內傷殺氣衰少寒熱間作或蒸蒸燥熱發于肌肉之間者為自內而外之熱皆酒麪煎炙多服雄附峻補皆能作

熱謂之積熱

肥白人有熱必兼痰藥蒼朮茯苓南星半夏之類瘦黑人有熱兼血藥當歸赤仁牛膝之類

通治三方

神芩丸 治一切熱證風熱雜病結滯壅塞神氣不和常服除痰飲消食清頭目利咽喉能令遍身氣血宣通神強體健耐傷省病

大黃黃芩各二兩牽牛滑石各四兩黃連薄荷川芎各半兩為細末煉蜜丸如小豆大溫水下二十

普門醫品

火證

卷四 十六

九日二服久病鬱熱無問憔悴老弱俱可服欲急下者便服四五十丸未利再服以利為度小兒丸如麻子大治積熱驚風

宣明方

柴胡飲子 治一切肌熱骨蒸寒熱往來畜熱寒戰及傷寒發汗不解或下後熱未愈汗後勞復及一切邪熱口乾煩渴肺痿喘嗽

柴胡人參黃芩甘草大黃煨當歸白芍藥各半兩為末每服三錢水一盞薑三片煎七分溫服日三服甚者加之

宣明方

火證渾身壯熱心內煩燥口乾狂言

石膏半斤。掘地爲坎。火燒半日去火入藥。用盆合住。四面濕土擁起。經宿取出。入甘草末。天竺黃各二兩。龍腦二分。糕丸彈子大。蜜水化下。集驗方

燥證門

論經曰。諸澁枯涸。乾勁揭皺。皆屬于燥。原病式曰。澁燥也。枯不榮生也。涸無水液也。乾不滋潤也。勁不柔和也。皺揭皮膚啓裂也。

醫門醫品

燥證

卷四十七

燥由水液衰少而燥。澁氣行壅滯而不得通利所致。在外則皮膚皺揭。在內則消渴煩躁。在上則咽鼻焦乾。在下則腸胃枯澁而便難。在手足則痿弱無力。在脉則澁而微。此皆陰血爲火熱所傷而腎水失生化之原也。

身熱皺揭。乾疥爪枯。爲燥在表。消渴飲水大便秘結。爲熱在裏。治法總以滋陰養血爲本。而佐以辛涼之藥。

通治四方

生血潤膚飲 治燥證皮膚拆裂手足搔之屑起十指甲厚反不可以搔

川當歸酒洗。生地黄酒洗。熟地黄。黃芩酒炒。各一錢。天門冬去心。錢半。麥門冬去心。一錢。五味子九粒。黃耆一錢。括婁仁。苑仁泥。五分。酒洗。紅花一分。升麻二分。水二盞煎一盞。食後溫服。如大便結燥加麻仁。郁李仁。各一錢。虞氏方

通幽湯 治大便秘結燥治在幽門

當時生地黄。苑仁另研。各一錢。紅花三分。升麻熟

醫門醫品

燥證

卷四十八

地黃各七分。炙甘草三分。水鍾半煎七分。調枳殼末五分。溫服。或加大黃。東垣方

天門冬膏 治血虛肺燥皮膚拆裂及肺痿咳血

天門冬鮮者不拘多少。洗淨去皮心。細搗絞汁。以布濾去渣。用砂鍋慢火熬膏。每用二匙。空心熱水調下

地僊煎 治諸燥證

山藥一斤爲末。杏仁一升去皮尖。半乳二大碗。將杏仁搗細。入牛乳。山藥拌勻。絞汁用新磁甕密封。

重湯煮一日每服一二匙空心熱水或酒下

鬱證門

論鬱者結聚不得發越也當升不升當降不降當變化不變化故傳化失常而鬱病作矣大抵諸病多有兼鬱者或鬱久而生病或病久而生鬱或藥雜亂而成鬱故凡病必參鬱治

丹溪曰氣血冲和百病不生一有佛鬱百病生焉

鬱證大率有六曰氣鬱曰肝肺疼痛脉沉而澀曰濕

鬱門醫品

鬱證

鬱證

鬱周身走痛或關節疼痛遇陰而發脉沉而細曰熱鬱脊悶心煩尿赤脉沉而數曰痰鬱動則喘息脉沉而滑曰血鬱四肢無力能食便血脉沉而花曰食鬱噎酸腹飽不喜飲食左手脉平而右手脉緊

諸病久則氣血凝滯而成鬱每用本病之藥而不効者皆其鬱之之故也醫者不知妄變他方愈變愈訛而病劇矣皆不達于兼鬱治之之法也

凡鬱在中焦以蒼朮撫芎開提其氣以升之假令

食在氣上氣升則食降餘倣此

治方

六鬱湯 解諸鬱

陳皮去白一錢半夏薑製蒼朮撫芎各一錢赤茯苓梔子炒各七分香附二錢炙甘草五分砂仁研五分水二鍾薑三片煎一鍾食遠溫服○氣鬱加烏藥木香檳榔紫蘇倍香附砂仁濕鬱加蒼朮白朮熱鬱加黃芩倍梔子痰鬱加南星枳殼小兒角血鬱加莖仁紅花牡丹皮食鬱加山

鬱門醫品

鬱證

鬱證

查神效寒藥

越鞠丸 治全上

神翅炒香附童便浸炒蒼朮米泔浸炒撫芎山梔仁炒各等分爲末水丸綠豆大每服五十丸溫水

生韭飲 治食鬱久胃脘有瘀血作痛

生韭搗自然汁一盞加酒一二杯同服先以莖仁連皮細嚼數十枚後以韭汁送下

東武王化貞元起父編輯

門人陳斌憲卿父較閱

內傷門

傷元氣 傷飲食
傷酒 茶病

論內傷者對外感而言也。有飲食之傷。有勞倦之傷。飲食不節則胃病。胃病則氣短精神少。而生大熱。有時火上行。獨燎其面。胃既病則脾無所稟受。故亦從而病焉。形體勞役則脾病。脾病則怠惰嗜

普門醫品

內傷

卷五

一

臥。大便滯瀉。脾既病則胃不能獨行津液。故亦從而病焉。雖其受傷有先後。其為病則一也。百病皆由脾胃而生。醫以調理脾胃為主。不可輕用剋伐之藥。專以攻病為事。胃氣實者攻之即去。而疾恒易愈。胃氣虛者攻之不去。而其疾自如。非藥不能去病也。主氣不能行藥力也。若峻攻之。元氣益傷。病且益甚。攻盡元氣則死。此東垣所以著脾胃論。諄諄以戒後人也。

內傷與外傷俱有寒熱。舉世盡將內傷飲食失節

勞役不足之病。作外傷寒邪有條表實之證。反泄

其表。枉死可勝言哉。夫外傷寒邪。發熱惡寒。寒熱

併作。其熱也。翕翕拂拂。發于皮毛之上。稍一袒露

已不能禁其寒矣。其惡寒也。雖重衣下幕。逼近烈

火。終不能禦其寒。必待邪傳入裏。作下證乃罷。其

寒熱齊作。無有間斷。○內傷亦有頭痛項強腰痛。

與太陽表證相似。其惡寒也。但見風寒。或居陰無

日處便惡之。但避風寒。及溫暖處。或添衣蓋溫養

其皮膚。便不知寒。其熱也。渾身躁熱。上徹頭頂。傍

徹皮膚。須待袒衣露居。近寒涼處即已。或熱極而

汗出亦解。惡寒常有之。躁熱則間而有之。二者不

齊作。躁作寒已。寒作躁已。非如外傷之寒熱齊作

無間斷也。

外感風寒。惡風自汗。頭疼鼻流清涕。常常有之。日

夜增加。傳裏乃罷。○內傷亦惡風自汗。若在溫暖

無風處則不惡。惟惡窓隙。此小賊風。居露地遇漫

風起。亦不惡。

內傷之證。顯在口。蓋脾氣通于口。飲食所傷。勞役

普門醫品

內傷

卷五

二

失節。必口不知穀味。亦不知五味。不欲飲食。○外傷之證。顯在鼻。蓋鼻者肺之外候。傷寒則面赤鼻塞。而乾傷風則鼻流清涕。口中知味而和。不能食而不惡食。

內傷者。心肺之氣先損。四肢無力以動。口鼻中少氣。不足以息。或喘。懶語。人有所問。十不欲對其一言。怯而無力。其聲低微。皆內傷氣少不足之驗也。

○外感則心肺元氣初無減損。又添邪氣助之。故鼻氣壅塞不利。氣不能出。併從口出。但發一言。必

醫門醫品

內傷

卷三

前輕而後重。其言高厲而有力。聲啞如從甕中出。皆外傷氣盛有餘之驗也。

內傷頭痛有時而作。有時而止。○外傷頭痛常常有之。直須傳裏乃罷。

內傷之病。手心熱。手背不熱。○外傷之病。手背熱。手心不熱。內傷挾外感者。手背手心俱熱。

內傷必怠惰嗜臥。四肢不收。無力以動。○外傷風寒則筋骨爲之疼痛。不能搖動。便着床枕。非扶不起。

脾胃病常臍有動氣。按之牢或疼。有是者爲脾胃病。無者非也。

治飲食傷。當問病人從來稟氣盛衰。所傷寒物熱物。傷寒物者。半夏神効。乾薑三稜莪朮之類。傷熱物者。枳實青皮陳皮麥芽黃連之類。亦有宜吐者。亦有宜下者。然不可過劑。過劑則反傷脾胃而益之病矣。

丹溪曰。傷食必惡食。胃膈必痞塞。亦有頭疼發熱者。但身不疼耳。

醫門醫品

內傷

卷五

食在膈上未入于胃者可吐之。如不可吐則消導之。待食下入胃變化糟粕。外證已解乃可下也。挾寒者宜先散邪。不可先攻其食。

張潔古曰。脾胃虛弱不可用峻利之藥。凡用利藥一時稱快。病去之後。脾胃既損。真氣元氣敗壞。促人之壽。不可不戒。

傷酒病者。只宜發散汗出則愈。此最妙法也。其次莫如利小便。上下分消其濕。何酒病之有。切不可用牽牛大黃下之。金匱要畧曰。酒疸下之。久久變

爲黑疽慎不可犯此戒宜葛花解醒湯主之

傷元氣 八方

補中益氣湯 治內傷勞役元氣下陷發熱一切內虛口不知味四肢無力倦怠嗜臥蒸熱者

黃耆蜜炙錢半人參去蘆白朮米泔浸土炒各一

錢當歸酒浸七分陳皮五分甘草炙八分升麻三

分柴胡三分水二鍾薑三片棗二枚煎至八分午

前溫服不過二三服當微汗而愈○頭疼加蔓荊

子炒五分疼甚者加川芎六分○項痛腦痛加藁

普門醫品

內傷

卷五

本五分細辛三分○煩躁周身刺痛血不足也加

當歸身酒洗五分○精神短少氣喘促加人參去

蘆五分五味子十五粒○口乾咽燥加乾葛五分

咽痛者加桔梗玄參各五分○夏月欬嗽加麥門

冬去心七分五味子二十粒○冬月欬嗽加不去

根節麻黃五分秋涼亦如之秋溫者加款冬花佛

耳草各五分○心下痞悶加枳實麩炒黃連炒各

七分○腹中痞加枳實麩炒砂仁炒各五分木香

三分厚朴薑製四分奔悶者加白芍藥酒炒一錢

冬月加乾薑煨四分○有痰加半夏薑製白茯苓

各八分○腹疼加白芍藥酒炒七分甘草炙三分

如惡寒冷痛加官桂五分夏月不惡寒而惡熱者

加白芍藥酒炒一錢黃芩酒炒甘草炙各五分

垣方

枳實丸 健脾胃消痞化食

白朮土炒二兩枳實麩炒一兩爲末荷葉煮老米

飯爲丸綠豆大不拘時白湯下一百丸○凡元氣

素弱飲食難化腹疼作瀉加人參去蘆白芍藥酒

普門醫品

內傷

卷五

炒神麩炒麥芽炒各一兩砂仁炒木香各半兩○

有痰之人胃膈鬱塞吞酸暖氣加黃連薑汁炒白

芍藥酒炒橘紅石膏煨各一兩生甘草半兩傷食

食不消腹痛瀉泄者加半夏製砂仁炒乾薑煨神

麩炒麥芽炒各半兩○因惱怒傷食氣滯不通加

川芎香附炒各一兩木通黃連炒各半兩○能食

但食後飽悶難化此胃火旺脾陰虛也加白芍藥

酒炒石膏煨各一兩人參去蘆七錢生甘草半兩

黃連炒香附子炒木香各四錢 案古方

加味枳朮丸 治脾胃虛弱飲食減少自滿膨悶酒傷食積氣滯腹滿常服進食寬中和暢脾胃

白朮米泔浸土炒二兩枳實麩炒一兩神麴炒麥芽炒取粉陳皮山楂音香附炒各一兩砂仁炒半兩如上法丸服

寬中進食丸 滋形氣喜飲食

白朮土炒神麴炒麥蘖炒黃取麩各一兩半夏製

白茯苓各八錢猪苓澤瀉各三錢如上法丸服

安胃丸 溫中補氣安胃進食

普門醫品

內傷

卷五 七

白朮土炒二兩白茯苓一兩陳皮青皮麩炒砂仁

炒麥芽炒各半兩木香乾薑炮各二錢為木湯浸

蒸餅丸胡椒大每五十丸食前白湯下東垣方

脾胃俱虛飲食不消痞悶膨脹口不知味倦怠嗜臥

及虛寒吐瀉

神麴炒四兩麥芽炒二兩乾薑炮三兩白茯苓三

兩山藥炒三兩烏梅肉焙二兩為末蜜丸梧子大

每米飲下五十丸日再服和劑局方

脾胃虛弱胃膈不快不進飲食

畢澄茄為末薑汁打神麴糊丸梧子大每薑湯下七十丸日二服濟生方

又方

麥芽炒四兩神麴炒二兩白朮土炒陳皮各一兩為末蒸餅丸梧子大每服五十丸食遠人參湯下本草綱目

傷食 十一方

一切停食氣滿膨脹

杏仁二百粒巴豆十粒同炒色變去豆不用研杏

普門醫品

內傷

卷五 八

仁為末每一錢橘皮湯下楊氏家藏方

食物過飽不消遂成痞膈脹悶不食

馬牙消一兩吳茱萸一兩煎汁投消乘熱頓服良

久未轉更進一服立愈經驗方

平胃散 治脾胃不和嘔吐惡心不思飲食

蒼朮炒二錢厚朴薑製陳皮各一錢半甘草炙一

錢水二盞薑三片棗二枚煎一盞食遠服一方加

草果炒一錢或為細末每服二錢鹽湯調下亦可

脾胃食物不化胃腹酸刺脹悶者

每食後嚼山樅音子二三枚絕佳但不可多用恐反尅伐也本草綱目

食飽煩脹但欲臥者

大麥芽麴炒微香爲末白湯調服四五匙肘後方

穀勞病因飽食便臥所致令人四肢煩重嘿嘿欲臥食畢輒甚

大麥芽炒一升花椒炒一兩乾薑炮三兩共爲末每服二錢白湯下日三服肘後方

食肉不消

諸門醫品

內傷

卷五

山樅音

肉四兩水煮食之并飲其汁簡便方

法製青皮

安神調氣消食解酒益胃不拘老幼

青皮一斤浸去苦味去瓢煉淨白鹽五兩甘草六兩

船茴香四兩甜水一斗煮之不佳攪勿令着底

候水盡慢火焙乾勿令焦去甘草茴香只取青皮

密收每食後咀數片王氏簡方

傷食成積

白麴炒一兩白酒麴炒二兩爲末每服二匙白湯調下如傷肉食山樅音湯下簡便方

保和丸 消滯寬胃進食虛者卽以補脾藥送下

山樅音肉二兩蘿蔔子炒半兩半夏製陳皮白茯苓

神麴炒各一兩連翹三錢爲末神麴糊丸梧子

大每五十丸空心白湯下脾弱加白朮土炒二兩

備急丸 治胃膈脹滿心腹卒痛如錐大便不通

大黃煨一兩乾薑炮巴豆仁去油膜各五錢爲細

末煉蜜搗丸黍米大每服三丸實者加二丸孕婦

勿服如飲食停在膈上兀兀欲吐者則探吐之

傷酒

方

諸門醫品

內傷

卷五

葛花解醒酒

治飲酒太過嘔吐痰逆心神恍惚胃

膈不利手足戰搖飲食減少小便澀

人參去蘆白朮土炒白茯苓白豆蔻炒葛花砂仁

炒各一錢陳皮青皮麴炒猪苓澤瀉各七分神麴

炒五分水二盞薑五片煎八分入木香末五分熱

服取微汗東垣方

中酒經日不醒

黑豆一升煮取汁溫服不過三盞卽愈

又方

白萊子炒二合細研井水一盞調作二服聖惠方

又方

九月九日甘菊花爲末水服二錢即醒 外臺秘要

大醉不堪病困累日

蔓菁菜入少米煮熟去滓冷飲之以蔓菁根蒸三

遍晒乾研末酒後水服二錢畧無酒氣 肘後方

酒多致病

檉柳晒乾爲末每服一錢溫酒調下衛生易簡方

又方

普門醫品

內傷

卷五 十二

豆豉葱白各半斤水二升煮一升頓服千金方

又方

生葛汁飲二升便愈千金方

飲酒不醉

取赤黍漬以紙血陰乾飲酒時取一粒置舌下含

之則不醉壽世方

又方

凡飲酒先食鹽二錢飲酒自倍肘後方

燒酒醉死心頭熱者

熱豆腐切片過身貼之冷即換麪乃止本草綱目

所酒不飲

虎屎中骨燒灰酒服二錢即不復飲千金方

又方

臘鼠頭燒灰柳花水等分睡時酒服一錢千金方

茶病二方

多食茶人面黃肌瘦

川椒炒熱杵去黃膜取紅研末糊丸梧子大每服

十九茶湯下簡便方

普門醫品

內傷

卷五 十二

嗜茶成癖

以新鞋盛茶令滿任意食盡再盛一鞋如此三度

自不復食男用女鞋女用男鞋集簡方

吞酸門

附儲雜

論吞酸與吐酸不同吞酸謂食物覺酸即俗所謂

醋心也吐酸者吐出酸水也俱是飲食入胃脾虛

不能運化鬱積之久濕熱相蒸故作酸也

丹溪曰凡吐酸吞酸皆屬于熱必用吳茱萸順其

性而折之炒黃連炒梔子爲必用之藥

通治十一方

榮連丸 治濕熱停滯吞酸吐酸

黃連炒一兩黃芩炒吳茱萸湯泡乾各五錢蒼

朮米泔浸炒七錢陳皮二錢爲末伸縮桐九綠豆

大食遠津嚥下三十九

榮萸丸 治吞酸自利

吳茱萸一兩泡過晒乾爲末六一散一兩用梗米

飯爲丸梧子大每服五六十丸食遠白湯下丹溪

普門醫品

本散

卷五 十三

方六一散 即鹽元散 方見四卷暑證門

安胃散 治脾胃虛弱不進飲食嘔吐酸水

人參去蘆二錢藿香一香各一錢陳皮八分爲細

末每服二錢食遠薑湯調服 東垣方

一切噫氣吞酸痰逆嘔惡及宿酒不解

香附子炒半斤砂仁炒四兩甘草炙二兩爲末食

遠白湯入鹽調服二錢 和濟局方

口中作酸流清水心下連臍疼痛此冷痰在胃也

萼芽去挺醋製半兩厚朴薑汁製一兩爲末熟細

魚淨肉一兩梔子九綠豆大食遠米飲下二十九

延壽方

吞酸口吐清水

乾蘆艾煎湯嚥之 怪症奇方

又方

羅剎生嚼數片葉亦可乾者熟者鹽醃者皆可用

類聚集簡方

又方

檳榔四兩陳皮一兩爲末每服二錢空心生蜜湯

普門醫品

本散

卷五 十四

下梅師方

醋心上攻胃中如蜚

吳茱萸湯泡晒乾一合水三盞煎七分食遠頓服

吳郡子集方

又方

胡荽爛嚼以生薑湯下立止 本草綱目

又方

吳茱萸湯炮七次焙乾薑炮等分爲末食遠白湯

服一錢 聖惠方

附傳雜

論傳雜之證候而腹中如火空空無物似辣非辣似饑非饑似痛不痛而有懊懷不自寧之狀得食暫止或嘔或氣或兼惡心乃火動其痰也川二陳湯加薑汁炒黃連炒梔子宜多加青黛凡吞酸體雜惡心久而不治皆成噎膈反胃

通治

三聖丸 治傳雜

白朮炒四兩黃連炒五錢橘紅一兩為細末神炮

普門醫品

吞酸

卷五 上

糊丸綠豆大每服五十九食遠薑湯下

東垣方

清鬱二陳湯 治吐酸水及吞酸體雜

陳皮半錢薑汁製白茯苓各一錢杏仁炒八分川

芎八分黃連薑汁炒香附子炒山梔子仁炒各二

錢白芍藥炒八分甘草炙三分薑三片水鍾半煎

八分食遠溫服

體雜吐水

真橘皮去白為末每五更安五分子掌中舐之即

腫三日必效皮不真則不驗

怪症奇方

二陳湯 治見論

方見六卷痰飲門

痞滿門

論原病式曰痞與否同不通泰之謂

丹溪曰痞滿與脹滿不同脹滿內脹而外亦脹痞則內覺痞悶而外無脹急之形也蓋由陰伏陽蓄氣血不運中央填滿否塞皆主邪之所為有因誤下裏虛邪氣乘虛而入于心之分為痞者有不因

普門醫品

痞滿

卷五 十六

下而得如中氣虛弱不能運化精微為痞者有飲食痰積不能施化為痞者有濕土太甚邪着心下為痞者

玉機云治痞惟宜上下分清其氣果有內實之證庶可略與疎導世人苦于痞塞喜行利藥以求速効暫時通快痞者再作益以滋甚是皆不察下多亡陰之意也結胃是實邪大陷胃湯主之痞是虛邪半夏瀉心湯用之可也

通治

九方

七氣湯 治七情所傷憂思鬱結心胃痞悶

半夏製白茯苓各二錢厚朴薑炒錢半紫蘇葉一

錢水一鍾薑三片煎八分食遠溫服和劑局方

橘皮枳朮丸 消食去痞助胃寬中

橘皮枳實麩炒白朮各等分荷葉燒飯爲丸梧子

大食遠白湯下五十九月方

枳樓實散 治胃脇痞滿微痛喘急妨悶

枳樓實另研枳殼麩炒半夏製桔梗各等分爲末

薑汁糊丸小豆大每服五十九薑湯下煎服亦可

醫門醫品

痞滿

卷五 十七

枳殼散 治心下痞悶多噯氣如敗卵臭

枳殼麩炒白朮各三錢香附子炒五錢檳榔二錢

爲末每服二三錢米飲下日三服

痞滿不能飲食

神麴炒蒼朮米泔浸炒等分爲末開丸梧子大每

米飲服五十九胃冷者加煨乾薑減半日一運方

檳榔散 治傷寒下後及一切虛痞滿而不疼按之

虛軟

檳榔枳殼麩炒等分爲末每服三錢食遠黃連湯

調下宜與調方

破氣湯 治婦人氣上逆胃脘痛滿悶

烏藥香附子炒各一錢紫蘇陳皮檀香薑黃砂仁

炒甘草炙各七分水一鍾薑三片煎八分去渣入

沉香木香末各三分食遠調服

大陷胃湯 治見論

生大黃四錢水二鍾煎一鍾納芒消三錢再煎二

沸去渣納甘遂末二分和勻溫服得利則止此藥

極迅不得已而用之仲景方

醫門醫品

痞滿

卷五 十八

半夏瀉心湯 治見論

半夏製一錢黃連炒五分人參去蘆生甘草黃芩

炒乾薑煨各一錢水鍾半薑五片棗五枚煎八分

溫服仲景方

飢逆門

論格致餘論云欬逆者俗謂之飢逆是也氣逆自
膈下直上出于口而作聲之名也又謂之打呃又
曰呃忒又噦者即乾嘔之謂與飢小異

欬逆證。古方多作胃寒。故用丁香柿蒂。薑附熱劑。此亦一偏之法。惟傷寒雜證。汗吐下後。過服涼劑。胃氣虛寒者。可用溫補。除此之外。因痰與胃火者極多。宜用竹茹麥門冬。橘皮之類。便秘以小承氣湯下之。

凡忍氣鬱結積怒之人。并不得行其志者。多有欬逆之證。宜降火清痰順氣。不效者。瀉吐法。以人參蘆煎湯入蝦蟇少許飲之。少頃探吐。膠固痰涎。其欬立已。

普門醫品

欬逆

卷五 十九

丹溪治一老人患滯下後欬逆。用人參白朮煎湯下大補丸而愈。治一女怒後作嘔。用人參蘆吐之而愈。足見虛實不同治也。

凡無故作嘔者。當從實治。其吐利之後作嘔者。生薑半夏橘皮竹茹之類。虛者加人參白朮。寒者加薑桂丁香柿蒂。

通治

十四方

橘皮竹茹湯 治吐利後胃虛欬逆。膈熱者。

橘皮去白。竹茹。人參去蘆。各錢半。甘草炙六分。水

一鍾。薑三片。棗一枚。煎七分。食遠溫服。

丁香柿蒂散 治吐利之後。胃中虛寒。欬逆連聲不止者。

丁香。柿蒂。各五分。人參去蘆。半夏製。橘皮。白茯苓。各一錢。生薑二錢。良薑。甘草炙。各五分。水二鍾。煎八分。食遠熱服。

嘔逆不止

川椒四兩。去閉口及子。炒研。麴糊丸。梧子大。每服十丸。食遠醋湯下。神效。邵以正經驗方。

普門醫品

嘔逆

卷五 二十

又方

荔枝七箇。連皮核燒存性。爲末。食遠白湯調服。立止。楊拱醫方摘要。

又方

石蓮肉六枚。炒赤黃色。研末。生熟水共半盞。食遠和服。便止。蘇頌圖經。

又方

黃蠟燒烟。張口薰二三。次即止。醫方摘要。

上氣欬逆

砂仁炒研生薑連皮等分搗爛熱酒食遠泡服二錢神効簡便方

又方

舶上硫黃燒烟嗅之立止醫方摘要

欬逆短氣

紫蘇莖葉二錢人參去蘆一錢水一鍾煎七分食

遠溫服普濟方

嘔噦飢逆飲食不下屬虛寒者

細辛四兩丁香二錢爲末每一錢食遠柿蒂湯

普門醫品便逆

下

胃冷呃逆氣厥不通

母丁香三箇陳橘紅一塊焙木一鍾煎半鍾食遠

熱服便良方

又方

沉香紫蘇白豆蔻仁炒各一錢爲末食遠柿蒂

湯服五七分吳球活人

瘟病發噦因伏熱在胃令人胃滿氣逆則作噦或大

下之後胃中虛冷亦至噦

茅根葛根各半斤切碎水三升煎一升半每食遠溫飲一盞噦即止傷寒卒病論

小承氣湯 治見論

方見三卷傷寒門

噎膈門 通治 噎證 膈證

論嚴氏云五噎五膈皆由喜怒太過七情傷于脾

胃鬱而生痰痰與氣搏升而不降飲食不下滯于

咽嗑則成五噎水飲可行食物難入或入亦不多

普門醫品噎膈 卷五 二十二

故名曰噎結于胸膈則爲五噎食雖可入難盡入

胃良久復出故名曰膈又曰翻胃所因不同病出

一體

丹溪曰大率屬血少氣虛有痰血液枯槁則痰涎

凝滯咽喉窒塞食不能下

張鷟峰曰噎膈是神思間病惟內觀自治

子和云小腸熱結則不善滲大腸熱結則後不通

膀胱熱結則津液涸三陽既結則前後閉必反而

上行所以飲食不下縱下而復出也宜先潤養而

後治其結

治嘔噎當潤養津血為主。厚火散結。古方悉指為寒。用辛燥大熱之藥治之。使血愈耗。火愈熾。則病益不可為矣。

翻胃病久。或吐下相延。寢成虛寒者。亦或有之。但藥用辛熱之藥。則不可也。

嘔噎證年高者不可治。氣血俱虛故也。糞如羊屎者不可治。大腸無血故也。吐痰如蟹沫者不可治。氣血俱敗故也。

普門醫品

噎膈

卷五 二十三

丹溪云。凡治嘔噎反胃。悉當用二陳湯。加薑汁竹瀝。童便。韭汁之類。為主。多飲牛羊乳為妙。但不可服人乳。以有七情之火。及烹飪之火存于中也。

通治

五方

噎膈反胃

牛涎一盞。入麝香少許。銀絲燒熟。先以帛束胃脘。令氣喘解。開乘熱飲之。仍以丁香水搗取汁入粥與食之。醫學集成

又方

歲時節一把握蜜各半盞。煎五分服之。吐出宿痰。金匱經方

又方

用生合蝦蟆木噉者。泥包燒存性研末。米飲調服一錢。

又方

白蘿蔔蜜煎浸。細細嚼嚥良。普濟方

大力奪命丸 治全上

牛膝草。杆頭糖各半斤。糯米一升為末。入砂糖二

普門醫品

噎膈

卷五 二十四

兩。取黃母牛涎和。丸龍眼大。煮熟任意食之。醫學

正傳

噎膈

十二方

噎食不下

鳳凰花子。即魚肝子。酒浸三宿。曬乾為末。糊丸綠

豆大。每服八九丸。溫酒下。不可多用。摘玄方

又方

古塚內罐罌中水。飲之。極有神驗。奇效神方

又方

雞嘔兩分。食濕紙包黃泥。日存性。木香。

丁香。谷末一錢。棗肉九。梧子。薑汁下三九。

又方

取鴉鳥未生毛者一對。用黃泥同濟煨存性。為末。每服一錢。溫酒服。壽域神方

又方

頭垢。大酸漿水煎膏。服之立愈。本草綱目

又方

麝羊角末。米飲服二錢。仍以角摩噎處。外臺秘要

普門醫品

噎膈

卷五 二十五

又方

用狼喉。日乾為末。每用半錢。米飲下。聖惠方

又方

人乾屎。入蘿蔔內。火燎三炷。香取研。每服三錢。黃

酒下。三服効。海上名方

又方

蕎麥。醋水淋汁。入鍋內煎取白霜。一錢入蓬砂一

錢研末。每服半錢。白湯調下。海上方

又方

寡婦木梳一枚。燒灰。煎鑰匙湯調下。二錢。生生編

噎食數月不愈者

葳靈。二兩。鹽二錢。全搗如泥。將水一鍾攪勻。去

渣。頓溫。入狗寶末一分。調服。日二服。不過三日愈。

後服補藥。本林摘要

老人噎疾

黃雌雞肉四兩。白茯苓二兩。共切。白麴六兩。包作

餛飩。入豉汁煮食。三五服効。養老書

噎證 三十二方

普門醫品

噎膈

卷五 二十六

反胃轉食

地龍糞一兩。木香三錢。大黃煨七錢。為末。每服五

錢。無根水調服。忌煎燂酒醋薑椒。御真入經驗方

又方

白土粉二兩。火內煨赤。以米醋一升淬之。再煨再

淬。醋乾為度。研取一兩。乾薑炮二錢。半為末。每服

一錢。熱水調下。服至一斤以上為妙。千金翼方

又方

取螺螄一斗。水浸取泥。晒乾。每服一錢。酒調下。立

效

又方

竈心土年久者爲末。米飲調服三錢。百一選方

又方

皂礬五兩。用麪饅頭一箇頭上開口空。將礬填滿。以新瓦合住。鹽泥封固。空土窖安放。文武火燒半日。取出研末。棗肉爲丸。梧子大。每服二十九。空心酒湯任下。醫方摘要

又方

普門醫品

噎膈

卷五 二十七

稀蒼草焙爲末。密九梧子大。每白湯下五十九。百一選方

又方

陳倉米炊飯焙乾研。每五兩入沉香末半兩。和勻。每米飲調服二三錢。普濟方

又方

韭汁二杯。薑汁牛乳各一杯。細細溫服。本草綱目

又方

梁上塵二錢。炒研。黑鹽尿調服即止。集簡方

又方

胡椒醋浸日乾。如此七次爲末。酒糊丸。梧子大。每服三四十九。醋湯下。戴原禮方

又方

乾柿餅。乾飯。日日同食之。絕不用水飲。如法食之。其病自愈。經驗方

又方

甘蔗汁七碗。薑汁一碗。和勻。日日細呷之。梅師方

又方

普門醫品

噎膈

卷五 二十八

石蓮肉末二錢。肉豆蔻麪包煨熟。末三分。米湯調服。直指方

又方

千葉白槿花陰乾爲末。陳糯米湯調送三五口。不愈再服。經驗方

又方

蠶繭十箇。煮汁。烹雞子三枚食之。以無灰酒下。日

二服神効。或以縹絲湯。煮粟米粥食亦妙。惠濟方

又方

真蚌粉每服二錢搗生薑汁一盞入米醋同調下
急救良方

又方

蜆殼田螺殼各取久在泥中者各等分炒成白灰每二兩入白梅肉四箇搗和爲丸再入砂礮中蓋定泥固煨存性研末每服二錢用人參縮砂湯調下或陳米飲調服亦可凡覺心腹脹疼將發反胃卽以此藥治之
百一選方

又方

普門醫品

噎膈

卷五 二十九

雞脫脰一具燒存性酒服男用雌女用雄
千金方

又方

五靈脂炒爲末黃狗膽汁和丸龍眼大每服一丸好酒半盞磨化服不過三服
本事方

又方

黑鉛化汁以柳木槌研成粉一兩入米醋一升砂鍋熬膏入蒸餅末少許搗丸小豆大每服一丸薑湯下
聖濟方

又方

茅根蘆根各二兩水四升煎二升頓服得下愈
濟總錄

反胃吐食脾胃極弱伏藥不下

粟米泔粉水九梧子大十丸煮熟入少塩空心和汁吞之得下便已
食醫心鏡

又方

大雪梨一箇母丁香十五箇刺入梨內濕紙包四五層煨熟食之
聖濟總錄

又方

普門醫品

噎膈

卷五 三十

三稜炮一兩丁香三錢爲末每服一錢沸湯點服
聖濟總錄

反胃嘔吐飲食入口卽吐困弱無力垂死百方不愈

人參去蘆三兩槌碎水一大升煮取四合二次熱服兼以人參汁入粟米雞子白雞白煮粥與噉卽瘥
李時珍集

又方

人參去蘆一兩半夏製一兩五錢生薑十片水一斗釜煎以均湯二百四十遍取三升入白蜜三合

煮一升半分四服 金匱玉函方

多年反胃不止

鉛二兩石亭脂即硫黃之多赤者二兩將鉛燒化

用鹽酒淬以鉛盡為度與亭脂同炒煖起取出煖

盡研勻蒸餅和丸梧子大每服二十九煎石蓮乾

柿湯下 聖濟方

反胃藥物不下結腸至七八日大便不通必死

白水牛喉一條去兩頭節并筋膜脂肉及如阿膠

黑片者用米醋一碗浸透微火炙乾淬之再炙再

普門醫品

卷五 三十一

淬醋盡為度研末厚紙包收遇陰濕時微火烘燥

用時每服一錢食前陳米飲調下 本草綱目

又方

大鯽魚一尾去腸留鱗入綠礬末令滿泥固煨存

性研末每米飲服一錢日二服 本事方

又方

虎肉生者勿洗存滓穢新瓦固煨存性入平胃散

末一兩和勻每白湯服三錢神効 保壽堂方 平胃

散方見五卷內傷門

又方

貓胞衣燒灰入硃砂末少許壓舌下甚効 經驗方

又方

蛭皮燒灰酒服二錢 普濟方

又方

赤電兒燈上燒存性一錢入寒肉一個平胃散二

錢溫酒調服食即可下 丹溪要

二陳湯 治見論

方見六卷痰飲門

普門醫品

卷五

三十一

普門醫品卷之六

東武王化貞元起父編輯

門人陳斌憲卿父較閱

痰飲門

消化 吐法

論張子和論痰有五曰風痰曰濕痰曰火痰曰食痰曰酒痰風痰因感風而發或因風寒怫鬱而成痰清白帶涎沫濕痰因停飲所致火痰生于積熱多食炙煇辛辣重裊厚禿之人食痰因飽食厚味

普門醫品

痰飲

卷六

酒痰浩飲宿醒

古方有五飲六飲之說仲景獨舉四飲有痰飲有懸飲有溢飲有支飲水走腸間漚漚有聲謂之痰飲飲後水流在脇下欬唾引痛謂之懸飲飲水流于四肢身體重痛謂之溢飲欬逆短氣不得臥其形如腫謂之支飲

諸書論痰飲為病多端所感不同難以類舉然總因脾弱不能運行致血氣失于滋養故不周流氣道壅滯中焦不能腐化遂停滯而為痰為飲變則

為寒為熱為喘為欬為反胃為腫滿為眩運為風瀉為噎氣為吞酸嘈雜為嘔噎為怔忡為疼痛之類不可名狀皆痰之變而為病其源出于脾弱水殺津液停滯之所致也

治法宜實脾燥濕又宜順氣為先分導次之順氣在于降火熱痰則清之濕痰則燥之風痰則散之鬱痰則開之頑痰則軟之食積痰則消之在上者吐之在中者下之若中氣虛者宜固中氣以運痰若攻之太過則胃氣虛而痰愈盛矣蓋中焦有痰

普門醫品

痰飲

卷六

二

胃氣亦賴所養不可攻盡總之治痰者須時時照管脾胃

百病中多有兼痰者人所不知或似熱非熱似寒非寒似病無病坐臥不寧心中焦躁欲哭欲叫者皆痰也審其人之虛實從痰治之無不立愈有痰病者眼皮及眼下必如灰烟黑色舉目便知不待診脉

痰在膈上必用吐法瀉亦不去痰在經絡中非吐不可吐中就有發散之義但服吐藥者宜先少服

不吐漸加之。以鵝翎探之。不出。以薑汁投之。不出。再探之。且投且探。無不出者。吐至昏眩頭疼。飲以新汲水立止。壯者一吐而安。弱者三四次吐之。庶無損也。

有不可吐者。○病人性行剛暴好怒者。不可吐。○病人左右多雜亂之言。不可吐。○病人頗讀醫書。實非深明其理者。不可吐。○病人無定見。輕聽好疑者。不可吐。○病勢險危。老弱困憊者。不可吐。○自汗自利。亡陽血虛者。不可吐。○諸失血證。不可吐。

普門醫品

痰飲

卷六 三

吐

消化

二十四方

二陳湯 總治一身之痰。如要下行。加引下藥。要上行。加引上藥。

陳皮去白。半夏薑製。白茯苓去皮。各三錢。甘草炙一錢。薑五片。水二鍾。煎一鍾。食遠溫服。和劑局方

滾痰丸 治一切濕熱食積等痰。窠囊老痰。此藥並不洞瀉元氣。但能取痰積惡物。次第而下。腹中糟粕。全不相傷。服者自知之。

大黃酒蒸。黃芩酒炒。各半斤。礞石如法煨過。一兩沉香五錢。為細末。滴水為丸。梧子大。每服三五十丸。薑湯下。量人虛實增減。○凡服滾痰丸之法。必須臨臥上床。用薑湯一口送藥過咽。即便仰臥。令藥在咽喉間徐徐而下。頭晚不可飲食。次早亦勿飲食。及起身行坐言語。直候藥力攻逐上焦痰滯。惡物過膈入腹。然後動作。方能中病。每次須連夜二服。次日痰物既下。次夜便減十丸。若只動一二次。所下不多。照前夜服。若全未行。比前加二十丸。

普門醫品

痰飲

卷六 四

壯實之人多服無妨

化痰丸 治一切風痰老痰。眩暈發癇。久不愈者。

生白礬一兩。細茶五錢。為末。煉蜜丸。梧子大。食遠薑湯下五十丸。久服痰自大便出。鄧筆峯雜興

千礬湯 治風痰壅盛。喘急。日夜不得臥。

大半夏七枚。用白礬皮清水浸三日。牙皂角灸去皮。弦一寸。大甘草炙一寸。四片作一服。水一盞。薑三片。煎七分。食遠溫服。即愈。和劑局方

三僊丸 治中脘氣滯。痰涎煩悶。頭目不清。

生南星去皮生半夏各五兩。金用湯泡七次爲末。自然薑汁和作餅。鋪竹篩內。楮葉包裹。待生黃成。麩晒乾。每用一兩。香附末一兩。糊丸。梧子大。每服四十丸。食後薑湯下。白一選方

竹瀝丸 清熱降火。化痰利膈。止喘定嘔。進食開胃。陳皮去白。白朮炒。白茯苓。各三錢。甘草炙。貝母去心。半夏麩。枳殼麩炒。神麩。各一兩。桔梗。黃芩炒。各三兩。玄明粉一兩。香附子酒炒一兩。共爲粗末。用大磁盆以竹瀝一碗。入薑汁酒半盞和勻。拌諸藥。普門醫品 痰飲 卷六 五

晒乾。仍依法入竹瀝薑汁拌晒七次。碾爲細末。滴水丸如綠豆大。食後或臥時。白湯送下。八十九。三日見効。久病七日効。重者一月全愈。海上道人傳

潤下丸 治濕痰因火泛上。停滯胃膈。欬唾稠粘。陳皮半斤。入砂鍋內。下鹽五錢。化水淹過。煮乾。甘草去皮蜜炙二兩。各取淨末。蒸餅和丸。梧子大。每服百丸。食遠白湯下。丹溪方

清上化痰利咽膈治風熱

薄荷爲末。煉蜜丸。芡子大。每嚙化一丸。簡便單方

停痰留飲。胃膈滿悶。惡心飲食不下。或吐痰水。半夏泡五兩。白茯苓三兩。每服四錢。薑七片。水一鍾。半煎七分。食遠溫服。甚捷。世刺局方

又方

香附子炒。皂莢水浸半日。各一兩。白礬末半兩。薑汁糊丸。梧子大。每服四十九。食遠薑湯下。仁存方

痰涎壅盛。咽膈不利。頭目不清。

半夏湯泡七次。四兩。桔礬一兩。爲末。薑汁打糊爲丸。梧子大。每食遠薑湯下。二十九。寒痰加丁香五。普門醫品 痰飲 卷六 六

錢熱痰加煨寒水石四兩。和劑局方

消痰開胃。去胃膈壅滯。

半夏湯泡七次。焙乾爲末。自然薑汁捏作餅。濕紙

裹煨。每二錢。入鹽五分。水二盞。煎一盞。食遠服之。

大壓痰毒及酒食甚。驗。世刺局方

痰飲胃膈壅滯。

白芥子炒五錢。白朮炒一兩。爲末。棗肉丸。梧子大。每食遠白湯下。五十丸。摘玄方

胃中痰結

皂莢三十挺去皮弦切水五升浸一夜按取汁慢熬成膏再熬至可丸丸如梧子大每食後搥水下十丸或用醋煮過半夏爲末以皂莢膏和勻入明礬少許以柿餅搗膏丸如彈子大噙之聖惠方

老人痰氣喘嗽胃滿懶食不可妄投燥利之藥

白芥子炒二錢紫蘇子炒蘿蔔子炒各一錢如順氣紫蘇子二錢餘一錢如消食蘿蔔子二錢餘一錢

錢絹袋盛煮湯食後飲之勿煎太過則苦辣不可食大便堅者入蜜一匙冬月加薑三片韓氏醫通

普門醫品

痰飲

卷二

痰涎積聚于胃膈之間心腹疼痛不止或乾嘔噦食

蛤粉一兩巴豆七粒同炒赤去豆不用醋和粉丸

梧子大每服二十九食遠薑酒下丈夫臍疼大箇

香湯下女人血氣疼童便和酒下孫氏仁存方

痰壅嘔逆心胃滿悶不下食者

厚朴一兩薑汁炙黃爲末米飲調下二錢聖惠方

痰氣喘急

蘿蔔子炒皂莢燒存性等分爲末薑汁和煉蜜丸

梧子大每服五十丸食遠白湯下簡便方

又方

瓜蒌仁五箇明礬張大一塊同燒存性爲末以熟

藥酒煎食兼治除聖惠方

風痰逆元元欲吐眩運欲倒

半夏一兩湯泡七次煑黃三錢研飛薑汁浸蒸餅

爲丸梧子大每服三十丸食遠薑湯下活法機要

痰壅欬嗽久不愈者

陳皮去白半兩半夏薑製二錢半爲末分二服水

普門醫品

痰飲

卷二

痰欬不止

瓜蒌仁一兩文蛤五錢爲末以薑汁澄下濃汁和

丸如彈子大噙之梅氏方

化痰治嗽

明礬爲末醋糊丸梧子大每睡時茶下二三十丸

定西侯方

又方

明礬半枯半生梔子炒黑等分爲末薑汁糊丸如

上方服醫方摘要

吐法 七方

吐一切痰及風痰眩悶

石錄三錢入龍腦三四豆許研勻以薄荷汁合溫酒調服。服臥須臾疾自口角流出乃愈。金不涌吐其功速于他藥。

痰結胃中。氣不升降。不能飲食。

蜜陀僧一兩。醋水各一盞煎乾為末。每服二錢。以

熱水半盞。入酒半盞。空心溫服。少頃吐出痰涎為

効 聖惠方

普門醫品

痰飲

卷六 九

胃中痰飲

常山酒浸焙。甘草炙各一兩。水五升煎一升。入蜜

二合。空心溫服半升。取吐。不吐再服其半。千金方

風痰壅盛不省人事

膽礬末一錢。溫湯入醋。空心調服。立吐出痰便醒。

小兒一字 韓氏小兒方

又方

藜蘆一錢。鬱金二分。每以一字。溫漿水一盞和服。

探吐。欲止用葱白煎湯呷之。 經驗方

何痰積飲不化

蘿蔔子半升。搗細。水一碗。漚取汁。入香油及蜜。此

須溫服。以桐油浸過晒乾的。驚風探吐。 丹溪方

又法

苦瓜蒂一錢為末。輕粉五分。溫水半鍾調服。良久

痰自出。不出。合沙糖一塊下咽。涎即出。欲止以麝

香少許研水飲之。 危氏衍義

欬嗽門

通治 寒嗽 熱嗽 痰嗽 勞嗽 久嗽

普門醫品

欬嗽

卷六 十

論 丹溪曰。欬嗽有風有寒。有痰有火。有虛有勞。有

鬱有肺脹

河間云。嗽謂無痰而有聲。肺氣傷而不清也。欬謂

無聲而有痰。脾濕動而為痰也。欬嗽謂有痰有聲。

蓋因傷于肺。氣動於脾。濕欬而嗽也。肺氣清則不

嗽。脾無痰則不欬。

王太僕云。欬嗽之病。雖分六氣五臟之殊。而其要

皆主于肺。蓋肺主氣而聲所出也。治法須分新久。

虛實。新病風寒則散之。火熱則清之。久病則瀉之。

久病使弱虛弱氣虛則補氣血虛則補血兼鬱則開鬱滋之潤之欬之則治虛之法也

因欬而有痰者欬為重主治在肺因痰而致欬者痰為重主治在脾但是食積成痰以致欬嗽者只治其痰消其積而欬自止不必用肺藥以治欬也河間曰治欬欬者當以治痰為先治痰者必以順氣為主是以南星半夏勝其痰而欬嗽自愈枳殼陳皮利其氣而痰嗽自除

久嗽肺脹者須收欬五味子烏梅罌粟殼款冬花

普門醫品

欬嗽

卷六 十二

訶子五倍子枯礬之類

凡久嗽肺虛須用人參款冬花紫苑馬兜鈴五味子之類補之

通治 一方

主方

杏仁去皮尖白茯苓各一錢橘紅七分桔梗甘草炙各五分五味子三分水二鍾薑三片煎八分隔臥服○春是上汁之氣宜抑肝潤肺加川芎半夏製各一錢麥門冬去心黃芩炒知母炒各五分若

春日傷風欬嗽鼻流清涕加防風薄荷各一錢○

夏是火熱炎上宜清金降火加桑白皮蜜炙知母

炒黃芩炒麥門冬去心石膏煨各一錢○秋多濕

熱傷肺宜清熱瀉濕加蒼朮炒桑白皮蜜炙各一

錢防風黃芩炒山梔仁炒各五分○冬是風寒外

感宜解表行痰加麻黃去節桂枝半夏製乾薑煨

防風各一錢○素有肺火者加黃芩酒炒知母炒

各五分若發熱頭疼鼻塞聲重再加藁本川芎前

胡各一錢若老弱人勞傷元氣而患前證者用補

普門醫品

欬嗽

卷六 十二

中益氣湯方見五卷內傷門加防風前胡川芎各

七分有痰加半夏製枳殼麩炒風痰加南星製濕

痰少食加白朮炒蒼朮炒有痰而口燥咽乾者勿

用半夏南星加知母炒貝母去心黃芩炒瓜蒌仁

○上半日欬者胃中有火加貝母去心石膏煨黃

連炒五更欬者同○午後嗽多者屬陰虛即勞嗽

宜補陰降火加川芎當歸酒洗白芍藥炒熟地黃

薑汁竹瀝天門冬貝母各去心瓜蒌仁○黃昏欬

者火浮于肺不可正用寒涼藥宜加五味子五倍

子炒。訶子皮炮。欬而降之。○久嗽肺虛。補氣血。加人參。黃耆。阿膠。當歸。款冬花。馬兜鈴之類。肺熱者。去人參。用沙參。此兼補氣血也。

寒嗽十方

卒得欬嗽

好梨去核。搗汁一碗。川椒四十粒。煎一沸。去渣。納糖。臨一兩。消化。收。起。細細含嚥。圖經本草

又方

以梨切片。酥油煎食之。孟詵方

普門醫品

欬嗽

卷六 十三

又方

搗梨汁一升。入酥。蜜各一兩。地黃汁一碗。煎成膏。含嚥。凡治嗽。須喘嗽既定。冷食之。若正嗽時。或梨未冷。皆不可食。孟詵方

又方

百部生薑。各搗汁等分。食後煎服二合。葛洪方

又方

百部。藤根。搗汁。蜜等分。重湯煮膏。含嚥。張文仲方

華蓋散 治肺受風寒。頭疼發熱。欬痰飲。

麻黃去節。杏仁炒。杏仁去皮。炙。桑白皮。蜜炙。

赤茯苓。橘紅。各一錢。甘草炙。五分。水二鍾。薑五片。棗一枚。煎八分。食後溫服。張仲景方

冷氣欬嗽。胃腹結脹者

乾薑。根。為末。熱酒。食後調服。半錢。或飴糖丸。如芡實大。噉之。張僧坦方

寒嗽痰喘

白果。十箇。煨熟。以熟艾作七丸。每果入艾一九。紙裹。再煨。香。去艾。喫之。乾神方

普門醫品

欬嗽

卷六 十四

欬喘失聲

白果仁四兩。白茯苓。桑白皮。蜜炙。各二兩。烏豆半升。沙蜜半斤。煮熟。日乾。為末。以乳汁半盞。拌濕。九蒸。九晒。九綠豆大。每服三五十九。食後白湯下。余

居士方

寒嗽

乾薑炮。皂莢炮。去皮。子桂心。紫色者。並搗篩。等分。煉白蜜。和搗三千杵。九梧子大。每米飲服十九。嗽發。即服。日三服。忌葱。麪。油。膩。劉禹錫傳信方

蘇氏十二方

人參平肺散 治心火尅肺金欬嗽喘嘔痰涎壅盛
胃脘痞滿咽噎不利

人參去蘆青皮麩炒白茯苓天門冬去心陳皮地
骨皮黃芩炒各八分五味子二十粒知母炒一錢
甘草炙五分桑白皮蜜炙一錢水二鍾薑三片煎
七分食遠服 枚草方

紫菀膏 治肺熱久嗽身如火灸將成勞

枇杷葉去毛木通款冬花紫菀杏仁去皮尖炒桑

普門醫品

欬嗽

卷六 十五

白皮蜜炙各一兩大黃煨半兩共為細末煉蜜丸

櫻桃大夜間嚙化三五丸 醫林摘要

杏仁膏 治欬嗽喘急喉中枯燥如物塞

杏仁去皮尖炒研如膏四兩真酥三兩河膠炒珠

研末二兩生薑汁一合白蜜五合蘇子微炒研如

膏二兩共和勻於銀石器內慢火熬成膏每服二

匙不拘時米飲下 蘇氏方

潤肺止嗽歌

一兩清油二兩蜜半兩生薑自然汁紫菀麻黃及

杏仁細辛桔梗宜添入訶子枯礬等二錢慢火煎

熬如黑漆臨睡每服三五匙明朝欬嗽無踪跡

欬嗽上氣不得臥或面腫或足腫或遍體腫並宜此

甘草子一升微火炒研以絹袋盛浸酒五升冬

七日夏三日春秋五日飲一二盃日三夜一冬月

日二夜二急者不待日滿絞服之 曹知博方

欬嗽胃滿氣喘

桃仁去皮尖三兩以水一大升研汁和粳米二合

煮粥食之 食醫心鏡

普門醫品

欬嗽

卷六 十六

欬嗽口乾

甘草汁一升梁米四合煮粥日食二次 蘇氏方

肺燥欬嗽

松子仁一兩胡荽仁二兩研骨和熟蜜半兩收之

每服二錢食後沸湯點服 蘇氏方

方

鮮百合四兩蜜和蒸軟時將含一片嚙津 聖惠方

又方

生訶黎勒一枚含之嚙汁瘥後口爽不知味者煎

消渴湯一盃服之立便知味 程駟方

乾嗽無痰

熟瓜瓠搗爛絞汁入蜜等分加白礬一錢熬成膏

類含燕汁 楊超然便方

乾嗽不止

白堊殼爲細末米飲調服一錢日三服 救急方

痰嗽 九方

痰飲欬嗽

蘿蔔子半升淘淨焙乾炒黃爲末以糖餠和丸芡

普門醫品

欬嗽

卷六 十七

子大綿裹食後食之燕汁甚妙 勝金方

又方

胡桃肉三顆生薑三片臥時嚼服即飲湯兩三呷

又再嚼飛薑如前數即靜臥必愈 洪邁方

痰多喘嗽

五味子枯白礬等分爲末每服三錢以生猪肺炙

熟蘸末細嚼白湯下 普濟方

又方

甜葶藶子紙襯炒令黑知母炒貝母去心各一兩

爲末棗肉半兩砂糖一兩和丸彈子大每以新綿

裹一丸含化嚥津甚者不過三丸 蘇中

又方

真蚌粉新瓦炒紅入青黛少許用淡蘆水麻油數

點調服二錢 本草綱目

風痰喘嗽夜不能臥

白僵蠶炒研好茶末各一兩每用五錢臥時沸湯

泡服 瑞竹堂方

又方

普門醫品

欬嗽

卷六 十八

百藥煎黃芩炒橘紅甘草炙各等分共爲細末蒸

餅丸綠豆大時時乾嚥數丸 類聚醫案

鴨掌散 治痰嗽哮喘

銀杏五箇麻黃二錢半甘草炙三錢水一鍾半煎

八分臥時服 類聚醫案

痰嗽帶血

大柿餅飯上蒸乾批開每用一枚搥真青黛一

錢臥時食之薄荷湯下

勞嗽 十二方

陰虛火動有痰不堪用燥劑者

天門冬水浸去心取肉十二兩下白楊烟五味子

水洗去核取肉四兩晒乾不見火共搗丸梧子大

每服二三十丸白水下日三服便方

欬嗽寒熱旦夕加重少喜多噦面色不潤忽進忽退

積漸少食

杏仁去皮尖五兩童便浸一日一換夏月一日二

三換滿半月取出焙乾研細每服三錢薄荷一葉

蜜三匙水一鍾煎七分食後溫服忌腥物勝金方

普門醫品

欬嗽

卷六 十九

肺虛欬嗽氣急煩滿咽乾燥渴欲飲冷水體倦肌瘦

發熱少食音嘶不出

黃蠟溶化憑淨漿水煮過八兩再化作一百二十

丸以蛤粉四兩為衣養藥每服一九胡荑半個細

嚼溫水下即臥閉口不語普濟方

肺虛欬嗽

猪膽一具醋煮食不過二服肺後方

欬嗽帶血

款冬花百合蒸焙等分為末蜜丸龍眼大每臥時

啗一九薑湯下濟生方

又方

熟地黃末酒服一錢日三聖惠方

又方

用小兒胎髮燒灰入麝香少許酒下每箇作一服

男用女女用男朱氏集驗方

欬嗽上氣喘急欬血咯血虛羸無力者

人參去蘆為末三錢雞子清調五更服服後即去

枕仰臥一服即愈年久者再服不過一兩靈苑方

普門醫品

欬嗽

卷六 二十

蜜酥煎治欬嗽胃疼上氣喘咳唾血兩日浮腫

白沙蜜一斤牛酥一斤杏仁去皮尖三升研如泥

將杏仁於磁盆內用水瀝取汁五升於淨銅鍋內

先傾三升汁于中刻木記其淺深熬令減半又傾

汁二升以緩火煎再減少半即入酥蜜二味再煎

二三沸收貯淨磁器中每日二次溫酒調服一匙

不飲酒者米飲亦可此方非獨治嗽兼補虛損去

風燥澤肌膚煩人尤宜奇效良方

欬嗽膿血咽乾乃虛中有熱不可服涼藥

黃耆蜜炙四兩甘草炙一兩爲末每服二錢熟水服席延實方

吐血後欬嗽者

紫苑五錢焙研蜜丸芡子大每合化一丸前南方

久勞欬嗽吐痰者

尋水邊蛇吞青蛙未嚥者連蛇打死泥固煨研空

心酒服二錢忘生冷五七日永不發乾坤秘韻

鳳髓煎 潤肺止咳

牛髓脩骨中者一斤白蜜半斤杏仁去皮尖八兩

普門醫品

欬嗽

卷六 二十一

研如泥乾山藥炒四兩胡荽仁去皮另研四兩先將牛髓白蜜沙鍋內熬沸以絹濾去渣盛磁瓶內入杏仁等三味以紙密封瓶口重湯煮一日夜取出冷定每晨以白湯化服一二匙長方

飲肺劫嗽

百藥煎 訶梨勒炮制并德等分爲末薑汁入蜜和

九芡子大時時嚥之長方

久嗽 十七方

熏法 治久嗽

每旦用款冬花五錢少蜜水拌潤置銅鐵器中少火炙之上用瓦罐蓋定底鑽一孔孔內安一筆管以麩泥縫好令泄氣使烟從管出口吸其氣嚥之如說話以指按住管勿令烟漏烟盡乃止如此一連五日至六日飽食羊肉一頓即瘥本草綱目

久嗽不瘥

紫苑款冬花各一兩百部半兩搗末每用三錢薑

三片烏梅一箇煎湯調下以二服若嗽未久者紫

苑款冬各五錢水一鍾煎半鍾溫服經本草

普門醫品

欬嗽

卷六 二十二

又方

烏梅肉微炒罌粟殼去筋膜蜜炒等分爲末每服

二錢睡時蜜湯調下本草綱目

久嗽不止有膿

葇葇子五錢淘去浮者煮令半出炒研爲末真酥

一鷄子大棗七枚同煎令酥盡取棗日食三枚本草綱目

久嗽痰喘

蘿蔔子炒杏仁去皮尖炒等分蒸餅爲丸麻子大

每服三五丸。時時津熱。醫學集成

又方

生薑五兩。糖餠半斤。煎熟食盡愈。功靈世必効方

又嗽喘急

豬蹄甲四十九枚。瓶盛。安天南星一枚。蓋之。鹽泥

固。濟穀烟出爲度。取出。款冬花半兩。麝香。龍腦。

少許。研勻。每服一錢。食後桑白皮湯下。聖濟總錄

又款肺脹

五味子二兩。粟殼半兩。白傷炒爲末。仍用白傷化

普門醫品

款嗽

卷六 二十三

開爲丸。彈子大。每服一丸。熱水嚥服。衛生家寶方

又方

五味子五錢。甘草炙一錢半。五倍子。風化消。各二

錢。爲末。每用少許。嚥化。丹溪方

又款上氣。十年二十年諸藥不効

蝙蝠除翅足。泥固。燒焦。研末。米飲服二錢。百一方

肺虛又嗽

人參去蘆二兩。鹿角炙研一兩。爲末。每服三錢。用

薄荷。淡豆豉。煎湯一盞。入葱白少許。煎一二沸。傾

盞內。遇款時。呷三五口。甚効。食療本草

又方

浮石煨爲末。蜜丸如綠豆大。白水下三十丸。或爲

末。米湯調服二錢。肘後方

又嗽經年

阿膠炒。味人參去蘆。各二兩。爲末。每三錢。淡豉湯

少許。煎服。日三次。聖濟總錄

遠年款嗽

羊脂三具。大棗百枚。酒五升。漬七日。飲之。肘後方

普門醫品

款嗽

卷六 二十四

又方

百部根。搗取汁。煎如飴。每服二三匙。日三服。加飴

減半更妙。千金方

老人喘嗽。氣促。睡臥不得。服此立定

胡龜肉。去皮。杏仁。去皮尖。牛蒡各一兩。研。竹。煉蜜

少許。和丸。彈子大。每臥時。嚥一丸。能湯下。普濟方

又嗽唾血

白前。製。桔梗。桑白皮。炒。各二兩。甘草炙一兩。各咀

分六服。每服米二鍾。煎一鍾。食遠溫服。外臺秘要

眩暈門

附麻木

論眩暈者言其黑運旋轉目閉耳聾如立舟車之上起則欲倒由下而上實所致疲勞過度痰涎鬱結金瘡吐衄便利及婦人崩傷產後去血過多皆能令人眩暈當隨其所因而治之

肥人眩暈是氣虛有痰瘦人是血虛有火傷寒吐下後必是陽虛

丹溪曰痰在上火在下火炎上而動其痰也此病

普門醫品

眩暈

卷六 二十五

屬痰者多蓋無痰不能成眩暈也雖有因風者亦必有痰也又曰火動其痰陳湯加苓連蒼朮羌活挾虛者以治痰爲上

眩暈不可當者以大黃酒炒爲末茶清調下卽止

或用黑錫丹鎮壓之皆急則治其標也

通治

頭目眩暈其則屋轉視物如飛或見一爲二

鹿茸酥炙半兩無灰酒三盞煎一盞入麝香少許

食遠溫服

證治要訣

火眩暈

南星製半夏製桔梗陳皮各一錢甘草五分枳殼麩炒七分白茯苓黃芩炒六分各八分水二鍾煎三片煎八分食遠溫服

加味二陳湯 治今上

陳皮半夏製人參去蘆白茯苓黃芩炒各一錢甘草炙六分水二盞煎三片煎八分入木香末五分食後服

普門醫品

眩暈

卷六 二十六

芳菊散 治風虛頭旋眼黑倦怠心忪

芳菊前胡人參去蘆蔓荊子天麻酒浸炒各一兩白僵蠶炒防風各五錢共爲細末每服二錢食後酒調服

玉液湯 治七情氣鬱生涎隨氣上逆頭目昏暈心忪眉痛

大半夏泡七次四錢沉香磨汁三匙生薑十片水

一鍾煎半鍾食後溫服

頭暈吐逆不思食者胃冷生痰也

乾薑炮二錢半甘草炙一錢二分水一鍾半煎七

分食後溫服累用有效 傳信通用方

麻木

論麻木多屬四肢及手足指此則四末氣虛克榮不到故多麻木也不痛不仁如繩扎縛初解之狀十指木者胃中多有濕痰死血宜二陳湯加蒼白朮薤仁紅花之類

丹溪曰麻是氣虛木是濕痰死血或有氣血俱虛但麻而不木者有虛感濕麻木兼作者有虛因風寒熱三氣乘之故周身痺痛麻木並作者宜先

普門醫品

卷六

二十七

汗而後補有痰滯四肢或一指麻木逾年而中風之病作此皆氣血先虛之兆也須預調補方免

通治

遍身麻木不仁

用芥子末醋調擦之

黃耆湯 治全上

黃耆蜜炙二錢陳皮五分人參去蘆一錢甘草炙七分白芍藥炒一錢蔓荊子四分水盞半煎八分臨臥溫服甚者再加黃耆一錢芍藥一錢小便澀

加澤瀉五分大熱加黃藥音三分

手足麻木不知痛痒

霜降後桑葉煎湯頻洗 救急方

風冷氣血閉手足身體疼痛冷麻

五靈脂水淘二兩沒藥一兩乳香半兩各焙燥川

烏頭炮去皮一兩半為末滴水丸彈子大每用一

丸生薑溫酒磨服 本草綱目

凡手及十指麻木大風麻木皆是濕痰死血

橘紅一斤連流水五盞煮爛去渣再者至一盞頓

普門醫品

卷六

二十八

服探吐此吐痰聖藥也不吐加瓜蒂末 柳玄方

三妙丸 治濕熱下流兩脚麻木熱如火烙

黃藥音酒炒四兩蒼朮製四兩牛膝酒洗二兩為

末糊丸桐子大每服七十九丸鹽湯下忌魚腥煎炒

厥證門

論丹溪曰厥者逆也手足逆冷也因氣血逆而冷也有氣虛血虛痰鬱三者所致故手足麻者氣虛也手足木者濕痰死血也

黃帝問曰厥之寒熱者何也岐伯對曰陽氣衰于下則為寒厥陰氣衰于下則為熱厥是厥有寒熱之不同然就其病言之耳既名為厥則皆冷矣故曰熱厥而厥者陽極似陰也寒極而厥者獨陰無陽也

初病發熱頭疼便閉飲水煩燥不臥諸語昏憤而厥者此為陽厥脈雖沉伏必數急宜大小承氣湯隨其輕重治之

得病即四肢厥冷擊臥惡寒引衣蓋覆不飲水或

普門醫品

厥證

卷六 二十九

下利清穀而厥者為陰厥脈必沉細宜四逆湯之

屬治之為速矣關元氣海百壯方得回陽與四卷

寒證門

厥有卒然頭旋運倒不知人事牙緊口噤手足厥冷頭面青黑肌膚粟起此為中惡鬼擊目犯不正之氣所致名飛屍卒厥

詳見二十卷卒中暴死門

凡厥逆卒暴即與蘇合左菹湯濃調灌之通其關竅甦醒後却耐寒熱陰陽治之若陰陽稍差則促死甚易此為常病發厥與傷寒二厥不同

常人病寒厥者寒逆于下也五指至膝上皆寒宜

六物附子湯熱厥者陰氣衰于下陽往凌之令人

足下熱甚則謂三陰而上逆昏目不知人宜六味

地黃丸主之又有薄厥因怒火起于肝氣血上行

故令血逆于上血氣亂于胸中謂薄而厥逆也宜

清黃湯主之又有煎厥虛人煩勞動操陽氣張大

火亢于上火炎則水涸故令精絕遷延至夏月內

外皆熱水益虧而火益亢孤陽厥逆如煎如熬宜

人參固本丸尸厥者五尸之氣是注于人亂人陰

普門醫品

厥證

卷六 三十

陽血氣相離不相順接故令暴厥如死宜蘇合香

丸痰厥者痰迷悶四肢逆冷宜蘇附湯有虵厥

因胃寒虵蟲皆從口出宜烏梅丸及理中湯有氣

厥因氣拂鬱不能達故令手足厥冷與中風相似

但中風身溫中氣身冷耳宜八味順氣散

治方

蘇合香丸 治一切厥逆中氣中痰中惡卒暴等證

沉香真正沉水者麝香訶子肉丁香青木香安息

香香附華撥白朮白檀香各二兩薑蘆香 即乳香

蘇合油龍腦各一兩朱砂研飛五錢各細末稱足
用蘇合香入煉蜜爲丸重一錢每服一丸滾水或
薑湯化服用蠟包裹爲善

大承氣湯 治陽證發厥脈沉數而有力
方見三卷傷寒門

六味附子湯 治寒厥口噤兩足冷至膝息微欲絕
大附子生用肉桂去粗皮防已各四錢炙甘草二
錢白朮炒茯苓各三錢水二鍾煎一鍾溫服

八味順氣散 治中氣卒倒四肢厥逆

普門醫品

厥證

卷六 三十一

白朮炒白茯苓人參去虛烏頭去毒皮麩炒陳皮白
芷等分甘草炙減半水二盞薑三片煎一盞溫服

倉公散 治血厥

苦瓜蒂紫葳明礬煨雄黃飛等分爲細末每用少
許吹鼻中得嚏卽愈此藥能起死回生

四逆湯 治陰證厥逆脈沉者

附子炮三錢甘草炙乾薑煨各錢半水盞半煎八
分畧溫服

理中湯 治厥逆腹痛

人參去蘆白朮炒乾薑煨各一錢甘草炙一錢小
二盞煎一盞溫服腹疼甚加附子製二錢

調氣平胃散 治卒暴厥厥脈沉邪氣昏暈卒倒
白豆蔻炒丁香檀香木香各二錢藿香砂仁炒各
四錢甘草炙六錢爲末每二錢鹽湯調服

追氣湯 治卒厥暴死奄忽氣絕口噤

麝香去節三錢杏仁去皮尖二十五粒甘草炙一
錢水盞半煎一盞口噤櫛開灌之若不下分病人
頭髮左右提之藥下卽甦

普門醫品

厥證

卷六 三十二

尸厥奄然死去四肢冷腹中氣出如雷時

焰消五錢硫黃二兩研爲粉作三服每服好酒一
大盞煎服焰消起急傾酒內蓋佳候溫服如人行
五里又一服酒三服卽醒

蒲黃湯 治見論

蒲黃一兩炒褐色清酒一大盞熬沃之溫服
薑附湯 治寒痰塞悶四肢逆冷

乾薑二錢大附子三錢水鍾半煎七分頓服
烏梅丸 治口內吐蟲不止四肢厥冷

專門醫品

厥登

卷六
五十三

東武王化貞元起父編輯

門人陳斌憲卿父較閱

霍亂門

吐瀉 乾霍亂 霍當作瘧
今從俗便

論巢氏病源曰霍亂吐瀉皆因溫涼不調陰陽混
淆二氣相干。變而爲霍亂。寒氣客於脾則瀉。客於
胃則吐。脾胃俱傷。吐瀉交作。最爲急證。其勢可畏。
然吐利雖急。十死一二。若揮霍撩亂而不得吐利。

普門醫品

霍亂

卷七

者名乾霍亂十死八九此係內有所傷外有邪氣所遺也世多用鹽湯探吐以提其氣最是良法霍亂雖屬於熱然未有不感于寒者故有陰陽二證世俗多以涼水漬之雖愈者頗多然因而死者不少至其變生他證又不必言也張仲景治法熱多欲飲水五苓散寒多不欲飲水理中湯凡覺此證或先服五苓散益元散桂苓甘露飲俱妙霍亂病最忌米粥食之立死且與水飲待吐瀉定後微以稀湯漸漸養之以遲爲妙

霍亂吐瀉 三十一方

霍亂吐瀉將死藥不可下者

以鼠屎臍中于鹽上灸七壯即愈或刺委中穴
即退靜對膝處出血或刺十指頭出血亦愈此皆
屢試屢驗者 行驗方

又方

先飲陰陽水 即生無不效口即愈或以向陽壁上

土煮汁溫服亦可 本草方

霍亂吐瀉垂死者

普門醫品

霍亂

卷七 二

藿香陳皮各半兩水二盞煎一盞溫服 百一選方

又方

豌豆三合香薷二兩水三盞煎一碗溫服 聖惠方

又方

蠟一彈丸熱酒一碗化服即止 肘後方

霍亂吐瀉

綠豆粉白糖各二兩新汲水調服即愈 生生編

又方

用梨枝煮汁飲之 聖惠方

又方

胡椒綠豆各四十九粒研勻木瓜湯調服一錢 直
指方

又方

枯白礬末一錢百沸湯調下 華陀危病方

又方

飲以冷水仍以新汲水盆盛浸足立止勿飲熱水
及米湯 急救良方

又方

普門醫品

霍亂

卷七 三

塩梅煎湯細細飲之 如宜方

又方

白扁豆香薷各三錢水一鍾煎六分溫服 千金方

又方

以米醋入塩煎服甚良其有不得吐下者尤宜多

服 如宜方

暑月脹滿欲作霍亂未得吐下者

鮮紫蘇搗汁飲一盞其効 肘後方

五苓散

治中暑煩渴身熱頭疼霍亂吐瀉心神恍

忽小便赤少

猪苓澤瀉各一錢白朮炒白茯苓各一錢五分肉桂五分水一鍾煎六分空心溫服

水浸丹 治伏暑霍亂吐利

巴豆二十五箇去皮心及油黃丹炒研一兩二錢半化黃蠟和丸綠豆大每服五七丸水浸少頃別以新汲水吞下 和劑局方

霍亂腹痛

厚朴製四兩桂心生薑各二兩枳實麩炒五枚水

普門醫品

霍亂

卷七 四

四升煎二升分作三服 附隱居方

又方

木瓜五錢桑葉三片棗肉一枚水一鍾煎半鍾溫服 聖惠方

霍亂煩渴

麥子一兩香薷二兩水二鍾煎二三沸每服半鍾 聖惠方

霍亂煩燥大渴不止多飲則殺人

黃梁米一升水三升煮一升取清徐徐飲 肘後方

又方

藕汁一鍾薑汁半鍾和勻服 聖濟總錄

霍亂煩悶

茶末一錢煎水調煨乾薑末一錢服 聖濟總錄

霍亂煩燥坐臥不安

葱白二十莖大棗二十枚水三碗煎二碗分三次服 深師方

霍亂吐利及轉筋

白扁豆爲末醋和服 蘇恭方

普門醫品

霍亂

卷七 五

又方

白扁豆葉一把生搗入少醋絞汁服立瘥 蘇恭方

又方

良薑生剉二錢大棗一枚水一鍾煎半冷服立定 普濟方

又方

鍋底墨竈額上墨各半錢百沸湯一盞急攪數十下以盥蓋之通口服一二口立止 經驗方

又方

香薷一兩。水二鍾。煎一鍾。溫服。若四肢厥冷。汗出者。加薤子二錢。煎服。本草綱目

益元散 治見論

滑石飛六錢。甘草炙一錢。研細末。以新汲水入。蠶調服。三錢

桂苓甘露飲 治見論

白茯苓、澤瀉各一兩。白朮炒。石膏煨。寒水石煨。各二兩。滑石飛四兩。猪苓。官桂各五錢。爲細末。每服三錢。溫水調下。宜引方

普門醫品 霍亂

理中湯 治見論

方見六卷厥證門

乾霍亂 十一方

霍亂脹滿。上不得吐。下不得瀉。名乾霍亂。亦名攪腸沙。

小蒜一升。水三升。煮一升。頓服。肘後方

又方

乾黃土地。掘深三尺。以新汲水投之。攪濁。稍澄。取清飲之。連服三五盞。卽愈。大忌米湯。千金方

又方

生薑自然汁半盞。和童便半盞。服之立解。肘後方

又方

檳榔末五錢。童便半盞。水一盞。煎八分。溫服。聖濟總錄

又方

亂髮一團。燒灰。鹽湯一碗。和服。取吐。十便良方

落盞湯 治全上

千年石灰。研細。沙糖水調服二錢。或淡醋湯亦可。

普門醫品

摘玄方

乾霍亂。心腹脹痛欲死。

已豆一枚。去皮。心熱水研服。得吐利。愈。本草綱目

絞腸沙。手足厥冷。腹疼不可忍。

溫水微帶熱。于病者膝灣內。用手拍打。看有紫黑點。以針刺去惡血。卽愈。醫方大成

霍亂乾嘔不止

吳茱萸湯。炮炒。乾薑炮。各二錢。水一鍾。煎半鍾。溫服。聖濟總錄

霍亂不得吐瀉。出冷汗。氣欲絕。

用鹽一大匙。刀頭燒令黃色。淬水內服之。入口即吐。立愈。或以童便和服更妙。可南易得傳

乾霍亂。腹疼。手足冷。身上多有紅點。

以鹽草煎油。點火于點上。遍燂之。清急方

霍亂轉筋

霍亂轉筋

以鹽青木瓜二字于痛處。仍令病人口呼木瓜。隨聲而愈。余曾親驗之。其效其理亦不可解。劉弘景

普門醫品

霍亂

卷七 八

又方

木瓜煎湯服。仍以湯浸青布。裹其足。聖惠方

又方

用大蒜搗塗足心。立愈。永類鈴方

轉筋不可忍者

男子以手挽其陰。女子以手牽其乳。近兩旁邊。即愈。或以熱湯漬之。亦可。此皆屢經試驗者。經驗方

霍亂轉筋。治霍亂吐瀉轉筋。手足厥冷。多汗。

乾薑炮附子。製各二錢。水鍾半。煎七分。溫服。清人書

霍亂轉筋。欲死。腹有暖氣者。

以棉填臍中。灸臍上七壯。即愈。腹疼者。炒鹽一包。熨其腹。令氣透。又以一包熨其背。救急方

又方

蓼葉煎湯。漬脚。持之。仍煎湯入香豉和服。藥性論

又方

以故綿浸醋中。醃蒸熟。裹之。冷即易。勿停。取瘥而止。

普門醫品

霍亂

卷七 九

止外臺方

又方

青銅錢四十九枚。木瓜一兩。烏梅炒五枚。水二盞。

煎一盞。作二次溫服。聖濟總錄

霍亂轉筋腹痛

以醋煮絮。裹之。即愈。聖惠方

霍亂轉筋。心腹脹滿。不得吐下。

梔子十四枚。燒研。熱酒服之。肘後方

霍亂轉筋入腹者。殺人。

小蒜鹽各一兩搗敷臍中灸七粒立止 聖濟總錄

又方

以器盛湯熨之仍令踞器使足底熱徹冷則易之

金嘉祐本草

轉筋入腹

吳茱萸炒二兩酒二盞煎一盞分二服得下即安 聖濟總錄

又方

皂角末吹豆許入鼻取嚏即効 梅師方

普門醫品

霍亂

卷七 十

又方

敗木梳一枚燒灰酒服即愈 千金方

又方

敗蒲席一片切碎漿水一盞煮汁溫服 聖惠方

霍亂轉筋入腹疼不可忍

以車轂中脂塗足心 千金方

又方

以醋煮青布擦之即愈 千金方

轉筋入腹其人臂脚直

難矢爲末水和二錢溫服 張仲景方

瘧疾門

通治 熱瘧 老瘧 邪瘧

論丹溪曰瘧有老有風有濕有痰有食積久而發者爲老瘧不已者爲瘧母暑風之瘧因夏月在風涼處歇汗閉不得泄暑含于內故大法當汗之瘧而惡飲食者必自飲食上得之當用清脾湯之類三日一發者受病一年間日一發者受病半年一日一發者受病一月連發二日住一日者氣血俱

普門醫品

瘧疾

卷七 十一

病俗名脾寒其實非脾寒也

瘧癰獨熱壯瘧單寒溫瘧先熱後寒外諸瘧皆先

寒後熱

有疫瘧一歲之間長幼相似有鬼瘧夢寐不祥多

生恐怖有瘧瘧乍寒下熱乍有下無南方有之有

食瘧飲食所傷有勞瘧經年不瘥微勞不任結成

瘧癖名曰瘧母審證治之

治瘧之法無汗要有汗散邪爲主帶補有汗要無

汗正氣爲主帶散

凡癰疽發之後已經發散和解者復發之久則中氣虛弱邪愈深而難治又不可早截早則邪氣閉塞而成壞證當在四五發後截之為妙
久癰之人正氣虛者不可用切藥損其胃氣有欲吐不吐者宜探而吐之

癰發于陰分者血受病為難愈須漸漸截早方是佳兆欲截者必用藥散歸陽分方可截

小柴胡湯加常山截癰神効婦人久癰用小柴胡合四物湯服之

普門醫品

癰疽

卷七 十二

通治二十方

一切癰疾

常山四兩草果二兩各炒焦為末糊丸梧子大臥時冷酒服五十九五更再服忌熱物和劑局方

萬安散 治一切初癰氣壯用此最効氣虛胃弱及妊婦勿服忌熱物

蒼朮炒厚朴薑炒陳皮檳榔常山酒浸甘草炙各錢半水二鍾煎一鍾露一宿臨發早溫服濟生方
諸癰不拘老少孕婦只兩服便止

橘皮去白切生薑自然汁浸過一拈銀器內重湯煮乾焙研末每服三錢用隔年紅棗十箇水一盞煎半盞發前服以棗下之通用方

驅癰湯 王隱者云用此四十年奇効不能盡述切勿加減

常山酒煮晒乾知母炒貝母去心草果煨各一錢半水一鍾半煎七分五更熱服渣以酒浸發前服養牛生論

碧霞丹 治一切癰神効

普門醫品

癰疽

卷七 十三

東方甲乙木巴豆取肉去油南方丙丁火官桂去粗皮中央戊己土硫黃去土石西方庚辛金白礬壯方壬癸水青黛各等分五月初一日修治俱各自另研細末各用紙包以盤盛依前方位排定勿令婦人見之安頓神前至端午日午時用五家粽角尖和前藥研勻丸如梧子大令患人以綿裹一九于未發前半日塞在鼻孔男左女右約度發過之時方除百一選方

五種癰疾

菴奴十四枚。巴豆七粒。去皮心及油。黑豆一兩。研
勻。冷水和。丸梧子太。硃砂爲衣。發日五更。念藥王
菩薩七遍。井水下一丸。不過二次。瘡養生主論
七寶飲。治一切瘡疾。或先寒後熱。或先熱後寒。及
鬼瘡。食瘡。大有神効。

常山。厚朴。薑製。青皮。麩炒。陳皮。甘草。炙。檳榔。草果。
煨。各一錢。末。發隔夜。水一盞。酒一盞。煎一盞。去渣。
露一宿。再將渣煎出。另放。亦露一宿。來日當發之。
前二時。頓溫。面東。先服頭服。少頃。再服渣。易簡方

普門醫品

瘡疾

卷七 十四

瘡疾。寒多熱少。或單寒不熱。或大便洩而小便多。不
能食。

草果。炮。取仁。熟。附子。各二錢。半。生薑。七片。棗肉。二
枚。水三盞。煎一盞。溫服。醫方大成

截瘡

小蒜。不拘多少。研如泥。入黃丹少許。丸如芡子大。
每服一丸。面東。新汲水下。唐慎微方

又方

生薑。四兩。搗自然汁。一酒盃。露一夜。發日五更。面

壯立飲。卽止。未止。再服。易簡方

又方

菴仁一百枚。去皮尖。研成膏。不得犯水。入飛黃丹。
三錢。凡梧子大。每服三丸。當發日。面壯。溫酒吞下。
五月五日午時合之。忌婦人雞犬見。唐慎微本草

又方

用罽上自乾菴子十四枚。爲末。酒水。九梧子大。硃
砂爲衣。每服一丸。使展面東。井華水下。聖濟總錄

又方

普門醫品

瘡疾

卷七 十五

苦瓜蒂二枚。水半盞。浸一宿。頓服。取吐。愈。如吐不
止。以麝香少許。研水飲之。千金方

又方

旱蓮草。槌爛。男左女右。置寸口脉上。以古文錢壓
定。帛緊縛住。良久起小泡。謂之天灸。卽愈。資生經
食瘡積瘡

巴豆。去皮心及油。二錢。皂莢。去皮子。六錢。搗丸。綠
豆大。每服一丸。冷水下。肘後方

溫瘡

黃丹半兩青蒿二兩童便浸半日曬乾爲末每服二錢寒多酒服熱多茶服仁存堂方

又方

端午日用黃丹炒二兩獨蒜一百箇搗九梧子大每服九丸空心長流水面東下二三發後方可用神効治痢亦効普濟方

瘧疾體虛汗多

黃丹飛炒一兩常山末三兩蜜九梧子大每五十丸溫酒下平日及將發時各一服無不効肘後方

晉門醫品

卷七

十六

小柴胡湯

治見論

柴胡二錢黃芩炒半夏製各一錢人參去蘆七分甘草炙六分薑三片棗二枚水鍾半煎七分溫服仲景方

四物湯

治見論

方見三十三卷調經門

熱癰

同方

清脾飲

治癰瘡但熱不寒或熱多寒少口苦咽乾小便赤澀

青皮麩炒厚朴薑製白朮土炒黃芩炒草果炮柴胡白茯苓半夏製甘草炙各等分爲末每服五錢水鍾半薑五片煎七分不拘時溫服濟生方

瘧疾熱極煩燥

取生地龍四條洗淨研如泥入生薑汁薄荷取汁各少許蜜一匙新汲水調末發時服直指方

熱瘧不寒

穿山甲一兩紅棗十箇同燒存性爲末每服二錢發日五更井華水服楊氏家藏方

晉門醫品

卷七

十七

瘧疾渴甚

童便和蜜煎沸未發時頓服直指方

老瘧

久瘧不止或一日二發一日二三發或二日一發者五靈脂頭垢各一錢占城石灰二錢研末飯丸皂子大每服一九五更無根水下神効海上方

老瘧勞瘵

鼈甲醋炙研末酒服二錢隔夜一服清早一服臨時一服無不斷者入雄黃少許更佳肘後方

瘧疾不止

龜板燒存性研末酒服二錢 海上方

又方

白僵蠶直者一箇切作七段綿裹爲丸硃砂爲衣作一服日未出時面向東用菟李枝七寸煎湯送下 御藥院方

又方

野雉鷄屎炒熊膽五靈脂恒山等分爲末醋糊丸黑豆大止發時冷水下一丸 聖惠方

普門醫品

卷七

十八

又方

蝙蝠一枚蛇蛻一條各燒蜘蛛一枚去足炙鼈甲一枚醋炙麝香半錢爲末五月五日午時研勻入煉蜜和丸麻子大每未發時溫酒下五丸 聖惠方

又方

蝙蝠屎五十粒硃砂半兩麝香一錢爲末糯米飯丸小豆大未發時白湯下十丸 聖惠方

又方

車軸垢水洗下麪和丸彈子大灸作餅未發時食

一枚發時又食一枚 聖惠方

又方

常山錢半檳榔一錢丁香五分烏梅一箇酒一盞浸一宿五更飲之一服便止永不再發少壯者宜此老弱忌之 醫聖正傳

久瘧有母

木鼈子仁穿山甲炮等分爲末每服二錢空心溫酒下 醫方摘要

又方

普門醫品

卷七

十九

鼈甲醋炙一兩三棱莪朮各五錢醋煮香附炒七錢海蛤粉青皮麩炒薏仁去尖各六錢紅花麥芽炒各四錢神麴一兩打糊爲丸梧子大每五十丸未發時醋湯下

邪瘧 七方

呪藥治瘧法

執棗一枚呪曰吾有一枚棗一心歸大道優他或優降或劈火燒之念七遍吹棗上與病人食之卽愈 阿曠神書

邪瘡

隔年全曆端午日午時燒灰糊丸梧子大發日早
用無根水下五十九衛生易簡方

又方

衛矛即兄箭製錢輕甲燒灰各錢半為末每以
一字發時噴于鼻聖濟總錄

又方

野狐肝膽一具新瓶陰乾阿魏一錢為末醋糊丸
茨子大陰時男左女右把一九嗅之仍以緋帛包

普門醫品

一九繫手中指聖惠方

又方

五月五日取花蜘蛛曬乾絳囊盛之臨期男左女
右繫臂上勿令知之普門醫品

邪瘡不愈

用黑牛尾燒研酒服二錢日三服普門醫品

又方

白驢蹄剉炒砒霜各二分大黃四分綠豆三分雄
黃硃砂各一分研糊丸梧子大未發平旦冷水服

二九即止七日忌油附後方

嘔吐門

附惡心

論有聲有物謂之嘔有物無聲謂之吐有聲無物
謂之噦

劉河間曰胃膈熱甚則為嘔火氣炎上之象也朱
丹溪曰嘔為火氣炎上特其一耳有氣逆者有寒
氣鬱于胃口者有食滯胃脘新食不得下而反胃
者有痰在胃中而嘔者有久病胃虛不納穀者

普門醫品

嘔吐

卷二十一

機要曰吐有三因氣積寒也皆從三焦論之食已
即吐渴欲飲水人便結燥氣上衝胃者上焦病也
治當降氣和中或先痛而後吐或先吐而後痛者
中焦也治宜行其氣以去其積木香檳榔之類或
朝食暮吐或暮食朝吐小便清利大便秘而不通
者下焦也治宜通其秘塞溫其寒氣而自愈也

通治二十方

藿香安胃散治一切嘔吐不止

藿香半夏製陳皮厚朴製蒼木炒各一錢甘草炙

三分水盞半薑七片薑二枚煎七分食遠溫服

吐逆不止不拘男女將飲湯藥不能下者

五靈脂治淨為末狗膽汁和九芡子大每一九煎

生薑酒磨化猛口熱吞不得漱口急將溫粥少許

壓之

嘔逆湯飲不下

半夏一斤湯洗七次焙研每一兩入麥麴一兩水

和作彈丸煮熟初吞四五枚日三服稍增至十五

枚旋煮旋吞忌羊肉錫糖

普門醫品

卷七 二十二

又方

大麻仁杵炒水研取汁着少鹽服之立効

又方

生薑一兩醋二合銀器煎半連渣呷之

又方

訶黎勒皮二兩炒研糊九梧子大空心湯服二十

九日三服

暴吐噦逆不下食

生滑石飛末二錢溫水服仍以末半錢乾煎即定

卷八 二十三

嘔噦不止厥逆者

薑棗四兩水煎濃汁頻飲或以童便煎服

胃虛氣逆嘔吐

黃丹二兩白礬二兩研勻入坩鍋內炭火煅赤更

養一夜出火毒一日入硫黃五錢同研粟米飯和

丸綠豆大每日米飲下十五丸

胃寒嘔逆

半夏湯泡炒黃二兩藿香葉一兩丁香半兩每服

普門醫品

卷七 二十三

四錢水一盞薑七片煎半鍾食遠服

又方

人參丁香藿香各二錢半橘皮五錢生薑三片水

二盞煎一盞溫服

竹茹二陳湯治胃中有熱膈上有痰嘔吐不已

竹茹二錢陳皮半夏製白茯苓各一錢甘草炙五

分水二盞薑七片煎八分食遠溫服

清膈散治胃熱吐食

蟬蛻五十箇去泥滑石飛一兩為末每服二錢水

一盞入蜜調服 衛生家寶方

嘔吐痰水

白檳榔一顆烘熟橘皮二錢半炙為末水一盞煎半盞溫服 千金方

又方

煎黃藤 即黃芩 煎汁呷之 肘後方

橘皮湯 治男女傷寒并一切雜病嘔噦手足逆冷

橘皮四兩生薑一兩水二升煎一升徐徐呷之即止 金匱要略

普門醫品

卷七 二十四

又方

北黃丹四兩米醋半斤煎乾用炭火就銚內煨紅

冷定為末粟飯丸梧子大每七丸醋湯下 集驗方

中酒嘔逆

赤小豆煮汁徐徐飲之 食鑑本草

瘡氣嘔逆

綠豆粉三錢乾胭脂半錢研勻新汲水調下一服

止止 普濟方

凡人嘔吐服藥不納者必有虢在膈間虢聞藥則動

動則藥出謂之曰蟲嘔

於嘔吐藥中加炒川椒十粒服之蓋虢見椒則頭伏也 藏原禮方

附惡心 四方

胃冷惡心食即欲吐

白豆蔻三枚炮取子搗細酒一盞溫服并飲數盃佳凡作惡心者嚼白豆蔻子最妙 張仲景備急方

惡心或嘔吐有痰

人參一兩水二盞煎一盞入竹瀝一盃薑汁三匙

普門醫品

嘔吐

卷七 二十五

食遠溫服以和為度老人尤宜 簡便方

乾嘔不止

甘蔗汁入薑汁四分之一溫服半升日三次 本草綱目

惡逆

惡逆

頻嚼生薑自止 本草綱目

東武王化貞元起父編輯

門人陳斌憲卿父較閱

泄瀉門

久泄

論戴原云凡水瀉腹不痛者是濕也飲食入胃不佳或完穀不化者是氣虛也水瀉腹鳴痛一陣瀉一陣者是火也或瀉或不瀉或多或少是痰也腹痛甚而瀉瀉後痛減者是食積也

普門醫品

卷八

原病式曰泄瀉小便清利不澀為寒赤澀為熱又完穀不化色不變吐利澄澈清冷身涼不渴脉遲細而微者寒也穀雖不化而色變小便赤澀者熱也凡穀消化無問色及他證便為熱寒瀉而穀消化者未之有也或火性急速傳化失常穀不化而殄泄者亦有之故仲景云邪熱不殺穀世俗治瀉類用瀉藥若瀉久而虛者或可行之初便用之多成滯下或變生他疾為禍不小惟分利小便最為上策

王節齋云泄本屬濕然多因飲食不節致傷脾胃而作須看時令分寒熱新久而施治宜補脾消食燥濕利小便亦有升提下陷之氣用風藥以勝濕亦有久泄腸胃虛滑不禁者宜收澀之

暴泄 十方

暴泄不拘老幼

大蒜搗貼足心或貼臍中 千金方

四苓散 治夏月暑熱傷人暴泄如注

白朮土炒白茯苓猪苓澤瀉各一錢水鍾半煎七

普門醫品

泄瀉

卷八

分食遠溫服和劑局方

胃苓湯 治傷食及夏月飲水作瀉

蒼朮炒白朮土炒白茯苓各一錢厚朴薑製陳皮

猪苓澤瀉各八分官桂甘草炙各五分水二鍾薑

三片煎八分空心溫服

暑濕泄瀉

白朮土炒車前子炒等分為末白湯下三錢 簡便

方

中寒水瀉色青白口不渴者

乾薑炮研末米飲服二錢即効

戊巳丸 治脾胃受濕瀉痢腹痛米穀不化

吳茱萸黃連白芍藥各一兩同炒爲末蒸餅丸梧子大每服二三十九米飲下

脾虛泄瀉

白朮土炒一兩白芍藥炒一兩冬月加煨肉豆蔻五錢共爲末飯丸梧子大每五十九米飲下日二

丹溪方

二神丸 治全上

普門醫品

破故紙炒四兩肉豆蔻生月二兩爲末煨肉和丸

梧子大每空心米飲下五七十九

水瀉

訶黎勒炮一兩肉豆蔻煨五錢爲末米飲每服二

錢 聖惠方

老人虛瀉

肉豆蔻三錢麪裹煨熟去麪研乳香一兩爲末陳米糊丸梧子大每服七十九米飲下

瑞竹堂方

久世 十九方

泄瀉不止

白龍骨白石脂各煨等分爲末水丸梧子大紫蘇木瓜湯下五六十九小兒減半

全幼心鑑

又方

肉豆蔻煨一兩木香二錢半爲末棗肉和丸綠豆大米飲下四五十丸

百一選方

又方

陳石榴皮酸者焙研細末每服一錢米飲下忌三年百方不効服此便止不可輕忽

普濟方

普門醫品

泄瀉

卷八 四

又方

青州乾棗十枚去核入葇若子填滿札定燒存性爲末每米飲下一錢

聖惠方

又方

積猪肚煮爛平旦散末三兩搗丸梧子大每米飲下四十丸

普濟方

平胃散方見五卷內傷門

又方

罌粟殼一枚去蒂膜蜜炙烏梅肉大棗肉各十枚水一盞煎七分溫服

經驗方

又方

白朮土炒。白茯苓各一兩。糯米炒二兩。爲末。夾肉拌食。或作丸。棗湯下。補便方

滑瀉不拘老幼

白朮土炒四兩。山藥炒二兩。白茯苓一兩。爲末。飯丸。梧子大。每服五十九。米飲下。或加人參一兩。瀉

湖集簡方

白龍丹 治泄瀉下痢久不愈。并治瘡疾寒熱

枯礬爲末。飛羅麩醋打糊。爲丸。梧子大。每服二三

普門醫品

普濟方

卷八 五

十九。泄瀉瀉湯下痢疾。甘草湯下。瘡疾。東莖枝頭

七箇煎湯下。普濟方

水瀉久痢

破故紙一兩炒。粟殼炙四兩。爲末。煉蜜丸。彈子大。每服一丸。薑棗煎水化服。

又方

川椒去開口及目一兩。蒼朮二兩。各炒爲末。醋糊

丸。梧子大。每米飲下五十九。普濟方

久泄寒滑小便精出

赤石脂煨乾。薑炮各一兩。胡椒半兩。爲末。醋糊丸。梧子大。每空心米飲下五七十九。危氏行義

歲寒泄瀉倦怠少食

猪大腸一條。去脂洗淨。以吳茱萸末填滿。縛定。蒸熟。搗丸。梧子大。每服五十九。米飲下。奇效良方

腎虛久泄諸藥不効

骨碎補焙乾爲末一錢。入猪腎中。暴燥煨熟。與食自愈。本草綱目

每至五更即瀉。瀉一二次。經年不止者。名爲腎泄。蓋

普門醫品

普濟方

卷八 六

陰盛而然

五味子去梗二兩。吳茱萸湯泡七次。五錢。同炒香爲末。每旦陳米飲服二錢。許叔微本事方

飲酒成病。骨立不能食。但飲酒即瀉

嫩鹿茸酥炙肉。從蓉煨各一兩。麝香五分。爲末。陳

粟米飯丸。梧子大。每米飲下五十九。立效。普濟方

老人久泄不止

枯礬一兩。訶子麪包煨去核七錢半。爲末。米飲調

二錢。空心服。聖惠方

又方

吳茱萸三錢炒水一鍾煎六分入鹽少許通口服
仁存方

又方

烏骨母雞一隻治淨用豆蔻一兩薑棗二枚燒存
性研末摻入鷄腹內紮定煮熟空心食之

痢疾門

初痢 久痢 白痢 紅痢 噤口痢 辟厭

論內經曰諸下痢皆屬於濕又曰下痢稠粘皆屬

普門醫品

痢疾

卷八 七

於火又曰下痢膿血滯下皆熱證實證也

戴氏云痢雖有赤白二色終無寒熱之分通作濕
熱治但分新舊更量元氣用藥與赤白帶同

機要云後重則宜下腹痛則宜和身重則除濕脉
絃則去風膿血稠粘以重劑竭之大承氣湯加滑
石之類身冷自汗以熱藥溫之理中湯加吳茱萸
木香之類風邪內結宜汗之驚瘧而痢宜溫之通
劑宜早溫溫宜遲

身熱挾外感不惡寒小柴胡湯去人參 惡寒發

熱為表證宜微汗和解 後重積與氣鬱降下兼
升兼消或氣行血和積少但虛坐努力此為無血
信用當歸身却以生芍藥生地黃莖仁佐之以陳
皮和之

血痢久不愈者屬陽虛陰脫用八珍湯加升舉之
藥虛脫之久血陣陣自下手足厥冷脉漸微縮此
為元氣欲絕急灸氣海穴用附子理中湯稍遲之
則死

普門醫品

痢疾

卷八 八

噤口痢乃胃中濕熱之毒薰蒸清道以致胃口閉
塞而成噤口之證宜用黃連人參煎濃湯終日呷
之吐了再喫一口下咽即通矣

有疫毒痢一方一家大小傳染所痢相似須兼運
氣施治

有休息痢乍作乍止或因邪氣未盡緣盡遂用止
澁或初愈不禁飲食恣用厚味以致止而復作有
經年累歲者

大法治痢疾一二日元氣未虛宜疏通積滯此通
因通用之法三四日後不可疏通宜清熱解毒

云行血則便膿自止。調氣則後重自除。大腸積滯。瘞實而後重。當疏導。若大腸氣虛下陷而後重。當升補。

先濃血後水瀉者易治。先水瀉後濃血者難愈。有下鮮血者有如塵腐色者有如屋漏水者大孔如竹筒者嘔噦發呃煩燥身熱者俱難治。如魚腦髓身熱脈數大半生半死。

初痢二十八方

鐵刷丸 治痢疾初起

普門醫品

痢疾

卷八

九

百草霜

即篋額上墨尖中墨并鍋底下者三錢。金

墨一錢。半夏製七分。巴豆煮十四粒。研勻。黃蠟三

錢同香油化開。和丸綠豆大。每服二十九丸。小兒四

五丸。空心薑湯下。一服即効。蕭江方

又方

大黃煨。當歸酒洗。各三錢。檳榔二錢。水二鍾。煎一

鍾溫服。取利即愈。集簡方

一切痢疾不拘赤白

車前葉搗汁。入蜜煎溫服。聖惠方

又方

雞冠花煎酒服。赤痢用紅。白痢用白。集簡方

又方

生薑細切五錢。好茶一兩。水二碗。煎一碗去渣。入蜜一兩。再煎至七分。露一宿。空心冷服。若冷痢及純白痢。薑茶各一兩。溫服。崔元亮集驗方

又方

用蠟二棋子大。阿膠炒珠。黃連各二錢。當歸二錢半。黃蘗音一錢。陳倉米半升。水三鍾煮米一二沸。

普門醫品

痢疾

卷八

十

去米入藥。煎至一鍾。空心溫服。神効。千金方

一切下痢不拘男婦老幼

木香一塊約三四錢。黃連五錢。用水半升同煎乾。

去黃連。切木香焙乾爲末。分作三服。早一服。橘皮

湯下。午一服。陳米飲下。晚一服。甘草湯下。此一婦

人久痢將死。夢中觀音授此方而愈。孫兆秘寶方

香連丸 治全上

黃連五兩。吳茱萸三兩。水拌濕。甑內蒸過。同炒乾。

去茱萸不用。木香麩煨一兩。共爲末。粟米飲九倍。

子大每四五十九空心薑湯下小兒量減易簡方

下痢赤白

五月五日午時取完好勃蕒洗淨拭乾勿令損破放瓶內好燒酒浸之黃泥密封收貯遇有患者取二枚細嚼空心用原酒送下唐孫經驗方

又方

荷葉燒研每空心服二錢紅痢蜜湯白痢沙糖湯下本草綱目

又方

普門醫品

痢疾

卷八 十一

好茶四兩搗末濃煎一二盞服孟詵方

又方

用細茶赤痢以蜜水煎服白痢以連皮薑汁入水煎服直指方

又方

黃丹炒紫黃連炒等分爲末米糊丸麻子大每服五十九空心生薑甘草湯下普濟方

又方

烏梅肉一兩去核燒過爲末每空心服二錢米飲

下立止聖濟總錄

赤白雜痢困重者

益母草麝乾陳烏梅燒存性等分爲末每空心服三錢白痢乾薑湯下赤痢甘草湯下衛生家寶方

變通丸

治赤白痢日夜無度及腸風下血

黃連吳茱萸各二兩湯泡七次同炒香揀出各自爲末粟米飯丸梧子大另收每空心服三十九赤痢甘草湯下黃連丸白痢乾薑湯下茱萸丸赤白痢各用十五丸米湯下此方救人甚多下一選方

普門醫品

痢疾

卷八 十二

紅九子 治一切痢屢用神効

木香乳香各八錢槐花三錢黃丹炒二兩巴豆去油九十八粒先用黃蠟一兩化開入前藥末攪勻冷成膏密收旋丸如粟米大每二十九薑湯下

治赤白痢小腹疼不可忍下重或面青

黃蠟阿膠各三錢同鎔化入黃連末五錢攪勻分三次熱服神妙金匱玉函方

黃連阿膠丸 治冷熱不調下痢赤白裏急後重腹痛小便不利

阿膠一兩水化成膏黃連末三兩茯苓末二兩搗丸梧子大每五十丸空心米湯下日三和劑局方

下痢肛痛不可忍者

炒鹽布包坐熨之肘後方

下痢腹痛欲死

玄胡索炒爲末三錢空心米飲調服雷公炮炙論

裏急後重

用皂莢子瓦上焙乾米糠炒過枳殼麩炒等分爲末飯丸梧子大每空心米飲下三十丸普濟方

普門醫品

例方

卷八 十三

又方

枳殼麩炒二兩四錢甘草炙六錢爲末每空心沸

湯服二錢嬰童百問

積滯作痢裏急後重腹痛

杏仁去皮尖巴豆去皮心各四十九箇俱麩包燒

存性研泥溶蠟和丸綠豆大每服二三丸溫水下

劉守真宣明方

痢疾仙方

紅棗二枚去核入花椒丁香巴豆去殼各一粒湯

紙包裹滑火煨熟搗研爲丸麻子大每服五九小兒二丸白痢姜湯下紅痢薄荷湯下周無輕傳

泄痢一日百起

用六月六日神麴炒黃馬蘭子炒等分爲末空心

米飲服二錢無馬蘭子用牛骨灰代之普濟方

大承氣湯 治見論

方見三卷傷寒門

小柴胡湯 治見論

方見三卷傷寒門

普門醫品

例方

卷八 十四

又痢 十七方

久痢不止無論赤白

茄根燒灰石榴皮焙焦等分爲末空心沙糖水服

二錢簡便單方

又方

烏梅白梅肉各七箇搗爛入乳香末少許杵丸梧

子大每服二三十九茶湯下日三袖珍方

又方

酸石榴一箇煨烟盡出火毒一夜研末仍以後留

一塊煎湯服神効無比並治久瀉

又方

罌粟殼醋炒金櫻子等分爲末蜜丸芡子大每服五七丸空心陳皮煎湯化下

又方

五倍子醋炒七次爲末空心米湯送下二錢

又方

吳茱萸泡炒黃連炒各二錢水一鍾煎半鍾溫服

普門醫品

痢疾

卷八 十五

取効聖惠方

下痢不止諸藥不効服此三服即變黃色屢驗

皂莢子九上焙乾爲末米糊丸梧子大每服四五十九陳茶下

又痢不止羸困者

罌粟殼醋炙爲末蜜丸彈子大每服一九水一盞

薑三片煎八分空心溫服

殘泄滑痢不止

白茯苓一兩木香煨半兩爲末空心紫蘇木瓜湯

下二錢百一選方

大腸風虛飲酒過度挾熱下痢疼甚多日不瘥

樗根白皮炒入參各一兩爲末每服二錢空心溫

酒調服米飲亦可忌油膩濕麪青萊果子魚腥蒜

薤等物

脾腎虛弱每至立秋前後即患痢兼腰痛

樗根白皮炒搗篩和好麪捻作餛飩如皂子大水

煮熟每日空心服十枚金無禁忌

人泄痢不止不能飲食

普門醫品

痢疾

卷八 十六

人參去蘆一兩鹿角屑炒五錢各爲末每服二錢

米湯調下日三服

凡痢疾先白後赤者爲正若先赤後白則爲腸蠱

用牛膝二兩搗碎以酒一升漬經一宿每飲一兩

盃日三服

又方

訶黎勒三枚兩炮一生盆取皮爲末以沸漿水一

合服之若只水痢加炙甘草末一錢若有膿血加

三錢

劉禹錫傳信方

又方

訶子十二箇。六生六煨。去核煨爲末。赤痢生甘草湯下。白痢炙甘草湯下。不過再服。趙元陽濟急方

休息痢疾經年不愈者

虎骨炙黃焦搗末。米飲服二錢。日三服。食療本草

又方

獾豬肝一具切片。杏仁去皮尖炒一兩。於淨鍋內

一重肝一重杏仁。入童便二升。文火煎乾食之。日

一次。千金方

普門醫品

痢疾

卷八 十七

白痢

即冷痢七方

冷痢

沙牛角鯁燒灰。空心米飲服二錢。日二。本草綱目

冷痢腹疼下白凍如魚腦

赤石脂煨乾。薑炮等分爲末。蒸餅丸綠豆大。每服

二十九。空心米飲下。小兒減半。日三服。和劑局方

冷痢厥逆。六脉沉細欲絕

人參去蘄。大附子製。各三錢。生薑五片。丁香十粒。

粳米一撮。水二盞。煎一盞。空心溫服。經驗方

冷痢腹疼不能食

肉豆蔻醋和麴。裝煨去皮一兩。搗末。每服一錢。空

心粥飲調下。聖惠方

痢疾既久。日夜無度。腥臭不可近。臍腹撮痛

椿根白皮炒訶子炮取肉。各半兩。母丁香三十箇。

爲末。醋糊丸梧子大。每服五十丸。空心米飲下。唐

聖經驗方

又方

五倍子炒半斤。陳倉米一升。母丁香細辛。木香。各

普門醫品

痢疾

卷八 十八

三錢。花椒五錢。爲末。每服一錢。蜜湯下。日二服。忌

生冷魚肉。集靈方

理中湯 治見論

方見四卷寒證門

紅痢

即熱痢血痢十九方

連歸散 治紅痢

黃連二兩切瓦上焙焦。當歸酒洗焙一兩。爲末。人

麝香少許。每服二錢。空心陳米飲下。本事方

血痢

胡黃連烏梅肉雷心土等分爲末空心茶下三錢
立効 普濟方

又方

三七三錢研末空心溫米泔水調服 類聚集簡方

又方

木賊五錢水一鍾煎五分空心溫服 聖惠方

又方

地膚子淘淨三兩地榆黃芩炒各六錢爲末每服

二錢半空心溫水調下 聖惠方

普門醫品

痢疾

卷八 十九

又方

以大麻子水研瀝汁者綠豆食之極効 必効方

又方

荷葉蒂水煮汁空心溫服 普濟方

又方

白綿紙三張裹鹽一匙燒赤研末分三服米飲下
聖惠方

又方

地錦草洗暴乾爲末米飲服二錢止止 經驗方

又方

文蛤炒研末烏梅肉水浸和九梧子大每服七十

丸空心烏梅湯下 本草綱目

又方

地榆晒研爲末每用二錢摻于羊血上炙熟空心

食之以捻頭 即微子煎湯送下 本草綱目

又方

罌粟殼醋炙一兩陳皮半兩爲末每服三錢空心

烏梅湯下 普濟方

普門醫品

痢疾

卷八 二十

血痢不止痛如錐刺

豆豉大蒜等分杵九梧子大每三十九空心鹽湯

下或只以豆豉炒焦水浸汁服亦驗 王氏博濟方

赤痢腹痛

烏梅肉炒黃連各四兩爲末煉蜜丸梧子大每米

飲服二十九日三服 聖惠方

又方

薔薇葉搗汁二合入蜜空心溫服 聖惠方

酒毒血痢

百藥煎五倍子陳槐花等分焙研末酒糊丸梧子大每服五十丸米飲下 本草方

酒痢便血腹疼或如魚腦五色者

乾絲瓜一枚連皮燒研空心酒服 經驗方

八珍湯 治見論

人參去蘆白朮炒白茯苓甘草炙白芍藥炒熟地

黃當歸芍藥各一錢水二鍾煎八分食遠溫服

附子理中湯 治見論

方見四卷寒證門

普門醫品

痢疾

卷八 二十一

噤口痢 十六方

痢疾噤口絕不下食

人參去蘆蓮肉去皮心各三錢并華水二盞煎一

盞細細呷之或加薑炒黃連三錢 經驗方

又方

黃連人參去蘆石菖蒲石蓮子去皮心各一錢水

一鍾煎五分溫服如吐強呷之但得一口下咽便

好又用田螺搗如泥納臍中引火氣下行若誤用

辛熱之藥以火濟火 經驗方

又方

大蒜搗貼足心或貼臍中神効 千金方

又方

白蘿蔔搗汁一盞水密各一盞煎盡半早午各一

服無蘿蔔子亦可或加枯礬七分同煎 本草綱目

又方

用蘿蔔切片染蜜噙之嚥汁味淡再換覺思食煮

粥與食 普濟方

又方

普門醫品

痢疾

卷八 二十二

木鼈子仁六箇研泥分二分麪蒸餅一箇切作兩

半只用一半納藥于內乘熱覆病人臍上一時再

換半箇熱餅其痢即止遂思飲食 即真人經驗方

又方

山藥半生半炒爲末每二錢米飲下 衛生易簡方

又方

沙糖半兩烏梅一箇水二碗煎一碗時時飲之 補

玄方

又方

石蓮肉去皮心炒爲末。每二錢陳米飲調下。便思食。加入香連九尤妙。並治腸滑久瀉。丹溪心法

又方

紅木槿花去蒂。陰乾爲末。先煎麪餅二箇蘸末食之。趙宜真濟急方

又方

田雞一枚并腸肚搗碎。瓦上烘熟。入麝香五分作餅貼臍上。氣通卽能進食。本草綱目

又方

普門醫品

痢疾

卷八 二十三

鷄內金焙研。乳汁服之。本草綱目

又方

鯉魚一尾重一二斤者。如常治淨。用鹽醬葱花外入胡椒末三四錢。烹熟置病人前嗅之。待其欲食。隨意連湯飽食。卽愈。屢試屢効。醫方摘要

又方

白蠟二錢。雞子黃一箇。石蜜。米醋。髮灰。黃連末。各半。雞子殼。先煎蜜蠟醋雞子四味令勻。乃納連髮熬至可丸乃止。爲丸不拘粗細多少。薑湯下。二日

服盡神効無比。華陀方

血痢噤口

鮮卿魚翅剖穿孔去腸留鱗。入白礬末二錢。以櫻包紙裹。燒存性研末。每一錢。米飲下。日二。直指方

赤白下痢噤口及泄瀉

曉卿燒研。每服半錢。或一錢。燒酒調服。小兒以黃酒服立効。李延年方

辟厭一方

瓊珠丹

普門醫品

痢疾

卷八 二十四

七月立秋日。面西以井華水吞赤小豆七枚。一秋不犯。本草綱目

東武王化貞元起父編輯

門人陳斌憲卿父較閱

附梅核氣

諸氣門

論張子和云諸痛皆因于氣百病皆生于氣

經曰怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣下寒

則氣收炆則氣泄驚則氣亂勞則氣耗思則氣結

此九氣之為病也

普門醫品

諸氣

卷九

一

內經治七情九氣之法皆以五行五志之理制而勝之恐可以治喜喜可以治悲思可以治恐悲可以治怒怒可以治思寒可以治炆炆可以治寒寒以逸溫之驚以習見平之此所謂治之之法也夫何今人不諳此理不效此法而惟以方藥治之與情志之病殊不相通甚至藥用辛香燥熱之劑以火濟火虛虛實實誰執其咎

丹溪曰氣無補法世俗之誤也氣實而壅盛者不必補內傷勞役正氣虛者不補將虛而益虛脾胃

運納皆失其職陰不升而陽不降所謂天地不交

之否也經曰虛者補之人參黃芪之屬是也不審

虛實悉以破氣之藥與之以致天真元氣耗絕而

死醫殺之耳

葉雲林曰有虛氣有實氣虛者正氣虛用四君子

湯實者邪氣實用分心氣飲

通治十四方

交感丹 治一切氣公私拂情名利失志抑鬱煩惱

七情所傷不思飲食胃膈痞悶諸證極有神効

普門醫品

諸氣

卷九

二

香附米一斤長流水浸二日炒乾忌鐵器白茯苓

去皮四兩為末和勻煉蜜丸如彈子大每侵辰細

嚼一九白滾湯送下陳皮湯下更妙

分心氣飲 治男子婦人諸氣不和或忿怒傷神或

事不遂意抑鬱之氣留滯不散致心胃痞悶脇肋虛

脹噎塞不通吞酸暖氣嘔噦惡心口苦舌乾飲食減

少頭目昏眩並皆治之

木通赤茯苓半夏薑汁製紫蘊枳殼各一錢陳皮

青皮炒桔梗桑白皮黃芩香附子炒薑各八分

大腹皮五分厚朴薑汁炒六分甘草炙四分水二
鐘薑三片棗二枚煎八分入木香末五分食遠服
一切氣病不拘男女冷氣血氣積氣上壅搶心疼痛
冷汗喘息欲絕

烏藥小者酒浸一夜炒大茴香炒青皮去白炒良
薑炒等分爲末溫酒童便下衛生家寶方

心胃脇下有邪氣結實硬痛脹悶者

生薑一斤搗爛絞汁將渣慢炒待熟以絹包于患
處款款熨之冷再以汁炒再熨良久豁然寬快也

普門醫品

諸氣

卷九 三

閩華傷寒捷法

脇下逆氣搶心氣結胃中痞堅

枳實四枚厚朴薑汁炒一兩雄白半斤桔萸一枚

桂一兩以水五升先煎枳朴取二升去渣納餘藥

再煎三沸分三次溫服張仲景金匱要畧

四製枳殼丸 治諸氣逆上

枳殼去穰作四分一分茴香炒一分蒼朮炒一分
乾漆炒一分蘿蔔子炒用枳殼一味爲末糊丸梧

子大每服八十九白湯下

男女氣脹心悶飲食不下冷熱相攻久患不愈

厚朴薑汁炙焦爲末陳米炊服二錢日三斗門方

滯氣滿悶不能飲食

陳麴炒萊菔子炒等分研末每用三錢水煎入麴

香少許服普濟方

一切氣疾宿食不消

訶黎勒一枚入夜合之至明嚼嚥千金方

一粒金丹 治氣痛

鴉片二錢半阿魏一錢木香五分沉香五分牛黃

普門醫品

諸氣

卷九 四

二分半先將沉香木香牛黃爲末以鴉片放碗內

滴水溶化阿魏亦溶化同三味研作丸如綠豆大

金箔爲衣每服一粒熱氣寒涼水下冷氣寒涼水

下忌酒醋青菜一日久神効

香烏散 治男婦諸氣病

香附炒烏藥等分爲末每服二錢如飲食不進薑

棗湯下瘧疾乾薑湯下腹中有蟲檳榔湯下頭風

虛腫茶湯下婦人冷氣米飲下產後心脾疼並便

下婦人血海痛男子疝氣痛茴香湯下乾坤秘鑑

下一切氣

黑魚一尾頭有七星者開肚入胡椒末半兩大蒜
三顆縫合同紅小荳一升煮熟下蘿蔔三五顆葱
一握俱切碎煮熟空腹食之至飽并飲汁至夜洩
惡氣無限病即愈未愈五日後更作 本草綱目

四磨飲 治全上

沉香烏藥枳實檳榔等分俱用白湯磨服

氣脹氣蠱

蘿蔔子炒研以水濾汁浸縮砂一兩一夜炒乾又

普門醫品

諸氣

卷九 五

浸又炒凡七次為末每米飲服一錢 朱氏集簡方

附梅核氣

論梅核氣者係痰氣窒塞于咽喉之間咯之不出
嚥之不下如梅核之狀故俗謂之梅核氣此蓋濕
熱痰氣鬱結而然治法不外開鬱順氣消痰而已

通治

梅核膈氣

取半青半黃梅子每箇用鹽一兩淹一日夜晒乾
又浸又晒水盡乃止青錢三箇夾二梅麻線縛定

裝磁罐內封埋地下百日取出每用一枚去錢合
之嚥汁入喉即消收一年者治一人收二年者治
二人其妙絕倫 葉氏經驗方

加味二陳湯 治梅核氣不能飲食

半夏製陳皮茯苓各一錢甘草炙三分黃芩炒枳
殼蘿蔔子炒蘇子炒各八分山梔炒一錢白豆蔻
少許水二盞薑二片煎八分食遠徐徐服 仁齋方
法製消精湯 治梅核氣神効

臘月霜未下水者一斤朴消淨者半斤二味和勻

普門醫品

諸氣

卷九 六

磁瓶收貯密封置淨處每用二三匙煎湯一盞徐
徐飲之自愈不愈再服無有不効 經驗秘方

積聚門

諸積 肉積 果積 米積 蟲積
蠟瘕 酒積 茶癖 痞塊

論積者陰氣也發有常處不離其部上下有所終
始聚者陽氣也發無根本上下無所留止痛無常
處瘕者腹中堅硬按之應手一定不移其形狀可
徵驗也瘕者假也謂虛假可動也或有或無或上
或下或左或右故曰瘕此外又有痞癖痞謂幽玄

癰諸隱僻氣血凝于肌肉之間而成也數者總不外飲食痰飲氣血之凝滯在醫者量其虛實權其輕重以意消息之而已矣

素古曰壯人無積虛人則有之脾胃怯弱氣血兩衰四時有感皆成積若遇以磨堅破結之藥治之疾雖去而人已憊矣故治積者當先養正則積自除大毒之劑施于實者尚不可過況虛者乎治者所宜詳審

積久而堅未易卒去必先服補藥數劑然後攻之

普門醫品

積聚

卷九 七

或用磨積藥漸而消除可也

〔通治〕 二十三方

一切積聚

七八月收蒺藜子杵去刺水煮熟曝乾爲末蜜丸梧子大每服二十九食遠溫酒下以愈爲度其汁仍煎如飴服之 本草綱目

諸般積聚百物所傷

陳倉米四兩已豆二十一粒去皮膜同炒至米香豆黑勿令米焦去豆不用入橘紅四兩爲末糊丸

梧子大每服二十九食遠溫酒下五九日二服 百一選方

一切積滯

巴豆去油一兩蛤粉二兩皆炒三兩爲末水丸綠豆大每五九食遠溫酒下 醫學或問

停食成積

陳麴炒研白湯調服二錢日三服 本草綱目

下氣消食

訶黎勒一枚爲末先用水一升煎三兩沸下藥更煎二五沸入少鹽食遠飲之 食醫心鏡

普門醫品

積聚

卷九 八

氣積成塊

牛腦子一箇去筋雉鷄膽一箇連黃並以好酒浸一宿搗爛入木香沉香砂仁炒各三兩皮硝一碗杵干下入生銅鍋內文武火焙乾爲末入輕粉三錢和勻每服二錢空心酒服 聖濟總錄

又方

石鹼三錢山查三兩阿魏五錢半段真製猪牙皂角炙各一兩以醋化阿魏煮糊丸如綠豆大每服二三十丸空心溫酒下 梅安方

積聚塊作疼不可忍

延胡索炒不限多少為末猪胰一具切作塊子炙熟蘸末頓食之勝金方

積年氣塊臍腹疼痛

真正脊礪二兩木瓜三枚切頂去穰入礪于內盛于日中晒至瓜爛研勻以米醋五升煎如稀粥磁罐密收用時旋以附子末和丸梧子大食遠熱酒化下一丸聖惠方

癥瘕積聚腹脹堅硬

普門醫品

積聚

卷九 九

三稜一斤醋煮晒乾切水十碗入磁器中重湯煮如稠糖密收之每旦晚各酒服一匙千金翼方

又方

葶藶子一兩炒酒五升浸七日每食遠溫飲一小鍾日三千金方

癥塊如石作痛欲死

蒴藿根即陸英一小束洗淨細擘以酒二升漬三宿每食遠溫服半盞日三服若速用以熱灰中溫出藥味服之此方活人甚多古今錄驗

又方

牛膝二斤以酒一斗漬之密封于灰火中溫令味出每食遠服半盞多飲尤佳肘後方

腹脇積塊

風化石灰半斤瓦器炒極熱入大黃末一兩炒紅取起入桂末半兩略炒入米醋熬成膏攤絹上貼之內服消積藥極効丹溪心法

又方

三稜炮莪茂音炮各二兩青皮麴炒橘紅各五錢

普門醫品

積聚

卷九 十

木香檳榔枳殼麴炒各三錢白朮五錢為末糊丸梧子大每服五十丸食遠薑湯下御藥院方

又方

大黃二兩朴消一兩為末阿魏一兩酒化以大蒜同搗膏和貼之即効丹溪心法

又方

大黃朴消各一兩為末用大蒜搗膏和勻貼之

吳茱萸二升酒煮熟布裹熨臍上冷更炒熟更熨

裂之瘕移走逐裂之消乃止 地傳地集驗方

腹中積塊

黑牽牛一斤生搗末八兩餘渣于瓦上炒香再搗

取四兩煉蜜九梧子大每服二十九多不過三十

九食遠桐皮生薑湯下水効再服以積聚之物取

下為驗如尋常行氣消食不過十九 普濟方

化鐵丸 治全上

威靈仙格實子酒蒸各一兩為末每服三錢食遠

溫酒下 普濟方

普門醫品

積聚

卷九 十一

諸積鼓脹

石菖蒲八兩剉斑蝥四兩去翅足同炒黃去斑蝥

為末醋糊九梧子大每食遠服二三十丸白湯下

治腫脹尤妙或入香附末二錢 奇効方

血瘕瘕癖

鱉甲酥炙琥珀大黃等分為末食遠溫酒服一錢

少時惡血下即休服 魏權方

誤食菜中蛇精成瘕或食蛇肉成瘕腹常饑食即吐

赤足蜈蚣一條炙研末食遠溫酒服 衛生易簡方

肉瘕 一方

肉瘕思肉不止

白馬尿二升食遠飲之當吐肉出不吐者不可治

本草綱目

果積 一方

諸果成積腹脹氣急

麝香一錢桂心末一兩飯和九綠豆大每二十丸

小兒七丸食遠白湯下蓋果得腐落來遇桂枯也

齊生方

普門醫品

積聚

卷九 十二

米瘕 一方

食米成瘕好食生米口中出清水

以鷄矢同白米各半合炒為末以水一鍾食遠調

服良久吐出如米形即瘕 醫統

髮瘕 三方

凡人飲油至四五升方快者不爾則病此是誤吞髮

在胃氣血裹之化而為蟲名曰髮瘕

雄黃半兩為末水調服之其虫自出 袁子益奇疾

食髮成癥。心腹作痛。咽間如有虫。上下嗜食。油者。

豬脂二升。酒三升。煮三沸。食遠服。日三。本草綱目

又方

用白馬尿飲之佳。千金方

驚癥五方

驚癥。平生嗜酒。血入于酒。則為酒驚。多氣之人。血凝于氣。則為氣驚。虛勞痼冷。敗血雜痰。則為血驚。搖頭掉尾。上侵人咽。下食人肛。或附脇背。或隱胃腹。大則如孟。小則如錢。

普門醫品

積聚

卷九 十三

無莢炒。常煎服。兼用益胃理中藥。仁齋直指方

驚癥皮內隱隱見疹。不可忍。

鮮蝦作羹食之。久久痛止。類編

心腹驚癥。及宿癥。并卒得癥。

飯飼白雄雞取糞。同小便于瓦器中炒黃為末。每

食遠溫酒服二錢。日三服。集驗方

心下驚癥

黑貓頭一枚。燒灰。食遠溫酒服。壽域神方

腹中驚癥

藍葉搗爛。入水絞汁服之。日二次。千金方

酒積二方

酒癥九。治嗜酒之人。飲酒過度。頭旋惡心嘔吐。及酒積停于胃中。遇飲即吐。久而成癥。

雄黃如皂角子大六箇。巴豆連皮油十五箇。蠟稍去毒十五箇。同研入白麩五兩半。滴水丸如豌豆大。將乾入麩內炒香。將一粒於水試之。浮則取起。收之。每服二丸。食遠溫酒下。和劑局方

消導酒積

普門醫品

積聚

卷九 十四

鷄脫脰。乾葛為末等分。麴糊九。梧子大。每服五十丸。食遠溫酒下。袖珍方

茶癖一方

嗜茶成癖

石膏煨黃芩炒升麻等分為末。沙糖水食遠調服。

附痞塊

論積塊在皮裏膜外。須用香附開之。兼二陳。加補氣藥。須先斷厚味。

塊在中為痰飲。在右為食積。在左為血積。氣不

作塊成聚

治塊當降火消食積食積即痰也醋煮海石三稜

莪茂音木莖仁紅花五靈脂香附之類石城一物洗

滌垢賦又消食積有痰積有血塊皆可用

通治七方

痞氣結塊

阿魏五錢五靈脂五錢炒令烟盡俱為末以黃雄

狗膽汁和凡黍米大空心唾津送下三十丸忌羊

肉醋麪並治噎膈扶壽精方

普門醫品

積聚

卷九 十五

腹中痞塊

皮消一兩獨蒜一箇大黃末八錢搗作餅貼于臍

處以消為度蕭氏經驗方

又方

木鱉子仁五兩豬腰子二副批開將木鱉子仁

入在內簽定煨熟同搗爛入黃連末三錢蒸餅丸

綠豆大每服三十丸食遠白湯下醫方集成

又方

用檉柳煎湯露一宿五更空心飲數次吞消

生易簡方

又方

水紅花或子一盃以水三盃用桑柴文武火煎成

膏量痞大小攤貼仍以酒調膏服忌腥葷油膩

松石保壽堂方

脾積痞塊

豬脾七箇每箇用新針一箇刺爛以皮消一錢擦

之同以窰器盛七日鐵器焙乾又用水紅花子七

錢同搗為末無灰酒空心調下一年者一服可愈

普門醫品

積聚

卷九 十六

五年者二服十年者三服保壽堂方

癖堅如石

白楊木東枝去粗皮避風細切五升炒黃以酒五

升淋訖用絹袋盛渣還酒中密封再宿每食遠

服一合日三服外臺秘要

疽證

附黃脂

論戴氏云五疽周身皮膚并眼如梔子水染其因

食積黃者量虛實以下之其餘但利小便為先小

便利自其黃自退矣

丹溪曰五疸不必分。同是濕熱如會麴相似。輕者小溫中丸。重者大溫中丸。熱多加黃連。濕多茵陳五苓散。加食積藥。

疸而渴者難治。鼻出冷汗。腹膨形如烟薰。搖頭直視者難治。環口黎黑。汗如油者難治。凡五疸久久變黑者皆難治。

諸疸 二十四方

三十六樣黃病

普門醫品

疸證

卷九 十七

鷄子一箇。連殼燒灰研。醋一盞溫服。鼻中垂出爲効。極黃者不過三枚。外臺秘要方

小溫中丸 治一切疸證輕者

針沙十兩。醋炒七次。令通紅。另研。苦參一兩。夏加冬減。吳茱萸一兩。冬加夏減。山查二兩。白朮土炒五兩。川芎夏減。蒼朮炒。神麴炒。各半斤。香附米一斤。童便浸一宿。炒爲細末。醋糊丸。梧桐子大。每服七十九。食前鹽湯下。又可制肝燥脾。如脾虛用白朮湯下。

大溫中丸 治一切疸證重者

針沙十兩。製如前。陳皮。蒼朮炒。青皮麴炒。厚朴薑製。三稜醋煮。莪茂音木醋煮。黃連炒。苦參。白朮土炒。各五兩。生甘草二兩。香附子一斤。童便浸一宿。炒爲細末。醋糊丸。梧桐子大。每服七十九。食遠鹽湯下。茵陳五苓散。治濕熱成疸。煩渴引飲。小便不利。山茵陳。山梔子炒。各一錢。白朮土炒。赤茯苓。猪苓。澤瀉。黃連炒。各七分。甘草炙三分。水二盞。燈草十根。煎八分。食遠溫服。

普門醫品

疸證

卷九 十八

濕熱發疸

蕭蓄搗汁。頓服一升。多年者日再服之。藥性論

五種黃病。身體微腫。汗出如黃檗汁。

生茅根一把。細切。合猪肺作羹食。肘後方

遍身如金

苦瓜蒂。丁香。各四十九枚。甘鍋燒存性。爲末。每用一匙吹鼻。取出黃水。亦可揩牙追涎。經驗方

又方

薏苡根。煎湯頓服。本草綱目

又方

晴明時蚤起。勿令雞犬婦人見。取東引莖根細如
筋者一握。切細以水一大升煎一小升。空腹服。
三五日其黃離離如薄雲散開。可時時飲清酒一
杯。忌食熱麪。猪魚等物。百日平復。初虞世必効方

又方

茵陳一把。生薑二塊。搗爛。丁芎。前四肢不住擦之。
本草綱目

急黃疸證。及內黃腹結不通

普門醫品

疸證

卷九十九

蔓菁子搗末。水絞汁服。當嚏鼻出黃水。及下利而
愈。或以子壓油。每服一盞更妙。本草拾遺

又方

苦瓜一枚。開孔。以水煮之。取汁滴入鼻中。去黃水

即愈。本草拾遺

黃疸便結

蔓菁子搗末。水和絞汁服。少頃當瀉。一切惡物沙

石草髮並出。食療本草

黃疸睛黃小便赤

用蔓菁子微炒。爲末。熱水服。每服二錢。日三服。
真人食忌

黃疸腫滿

苦蘆蘆。如大棗許。以童子小便二合。浸一二時。
分兩塊。納兩鼻中。吸氣待黃水出。良。傷寒類要

穀疸食黃

牛膽汁一枚。苦參三兩。龍膽草一兩。爲末。和少蜜。

丸。梧子大。每薑湯下五十九。本草綱目

又方

普門醫品

疸證

卷九十九

苦瓜蒂。丁香。赤小豆。各七枚。爲末。吹少許入鼻。黃
水流出。隔日一用。瘥乃止。食療本草

又方

鷄矢白炒。小豆秫米。各二錢。爲末。分作三服。熱水
下。當有黃汗出。肘後方

又方

絲瓜連子燒存性。爲末。每服二錢。因麪得病。麪湯
下。因酒得病。溫酒下。連飲數服。衛生易簡方

酒疸

茵陳四枝梔子炒七箇大田螺一箇連殼搗爛以

百沸白酒一大盞沖汁飲之經驗秘方

酒疸黃遍身者

萱草根搗汁服藏器本草

女勞黃疸因大熱大勞交接所致身目俱黃發熱惡

寒小腹而急小便澀

猪膏半斤亂髮雞子大三枚同煎髮消分兩服附

後方

女勞黃疸氣短聲沉

普門醫品

疸證

卷九 二十二

女人月經衣燒灰酒服二錢一日再服三日瘥說必効方

黃疸變黑醫不能治

土瓜根搗汁平旦溫服一盞午刻黃水當從小便
出不出再服本草綱目

附黃腫

論黃腫病卽世俗所謂黃胖病也食積濕鬱所致

丹溪用大小溫中丸俱効

通治 九方

綠礬丸 治黃胖

綠礬六兩于鉄杓內醋炒七次乾爲度放地上出

火毒青星一兩咀炒黃陳廬一兩炒黃各爲末用

大皂角一斤煮爛搗出濃膠去渣入鍋入紅薑

六兩去皮取肉再熬成膠入前三藥搗丸梧子大

每服五丸早晚各一服薑湯下忌油膩煎炒如身

上發紅斑急煎棗湯解之

脾勞黃病

針沙四兩醋炒七次乾漆燒存性二錢香附童便

普門醫品

疸證

卷九 二十二

浸一宿炒三錢平胃散五錢爲末蒸餅丸梧子大
白湯下補玄方平胃散方見五卷內傷門

又方

以酸漿梗葉搗汁服弘景方

又方

皂礬四兩煨成赤珠子當歸四兩酒浸焙百草霜

三兩爲末以浸當歸酒打糊丸綠豆大每服五七

丸溫水下一月後愈時珍祖傳七世方

又方

普門醫品卷之十
平胃散四兩皂礬二兩為末醋糊丸米飲下

食氣黃腫氣喘胃滿

皂角去皮子醋塗炙焦為末一錢巴豆七枚去油
膜以淡醋研好墨和丸麻子大每服三丸食後陳
皮湯下日服隔一日增一九以愈為度經驗方

腹脹黃腫

亞腰壺蘆連子燒存性每服一箇食前溫酒下不
飲酒者白湯下十餘日見効簡便方

普門醫品

丸散

卷九 五十三

遍身黃腫

綠礬四兩五倍子炒百草霜各一兩木香三錢為
末酒煎飛麪為丸如梧子大每服五丸空心酒下
臨臥再服保命集

又方

皂礬四兩百草霜一斤炒麪半斤為末沙糖為丸
梧子大每服三四十九薑湯下本草綱目

大小溫中丸 治見論

方見本門痘證

普門醫品卷之十

東武王化貞元起父編輯

門人陳 斌憲卿父較閱

鼓脹門

論內經曰諸腹脹大鼓之如鼓皆屬于熱中空無
物而外形膨急有似于鼓故曰鼓脹

應象論曰濁氣在上則生填脹始于脾胃虛弱不
能運化精微清氣不升因而濁氣不降濕熱相蒸

普門醫品

鼓脹

卷十

遂成脹滿久之脾氣日虧氣凝血聚堅固如鼓俗
名單腹脹以其四肢皆不腫而惟腹腫如鼓膠固
難療又名為蠱謂血化為蠱及蠱瘕之義非良醫
弗能為也

大法宜補中氣行濕此乃脾虛之甚須以大劑人
參白朮佐以陳皮茯苓蒼朮之類使脾土健旺而
脹運行斯可愈醫者不察乎此急于見効病者喜
于去疾每用峻利之藥以求通快殊不知暫快一
時真氣愈傷腹脹愈急去死不遠矣夫經文所謂

下之則脹已者就脾胃虛者有餘者宜之也
豈可樂施于脾胃虛之人哉

通治

一切氣疾心腹脹滿

香附子童便浸炒一斤縮砂炒半斤甘草炙四兩為末每服錢白湯下人溫服為粗末煎服亦可和劑局方

脾氣不和壅遏不通遂成脹滿

白木土炒二兩陳皮四兩為末酒糊丸梧子大每

普門醫品

鼓脹

卷十 二

服三四十丸食前木香湯下指迷方

甘露散 治脾虛停濕腹脹中滿小便不利

人參去蘆白木土炒白茯苓猪苓各半兩滑石六兩飛澤瀉甘草炙各四錢為細末每服三錢食前

滾白湯調下

木通散 治胃腹膨脹脇肋刺痛小便赤澀大便不利或腫

木通紫蘇華陳皮甘草炙各二錢用水二鍾薑三片棗一枚燈心十莖煎一盞不拘時服

老幼血氣滯腹脹滿用此寬腸順氣

枳殼厚朴綠背者去穢四兩分作四分一分用

木一兩同炒一分用蘿蔔子一兩同炒一分用乾

漆一兩同炒一分用茴香一兩同炒炒黃去四味

只川枳殼為末以四味煎汁煮糊和丸梧子大每

食前米飲下五十九王氏簡易方

心腹作脹

蔓菁子一大合揀淨搗爛水一升和研濾汁一盞

頓服少頃自利或吐或汗自愈外臺秘要

普門醫品

鼓脹

卷十 三

心腹脹滿痛悶欲死

鹽半斤水一升煎一沸服之吐下即定不吐更服

梅師方

又方

桔梗枳殼麩炒等分水二鍾煎一鍾溫服活人書

又方

生薑煨熟綿裹納下部冷即易之梅氏方

脹滿短氣

草豆蔻一兩煨透去皮為末以木瓜生薑湯下

調服半錢 千金方

治痰氣膈脹

砂仁炒搗碎以蘿蔔汁浸透焙乾爲末每服一二錢食遠沸湯下 簡便方

腹脹忽瀉日夜不止諸藥不効此氣脫也

益智仁炒二兩濃煎食遠飲之 危氏得効方

腹脹

苦苧蘆子八兩以酒四升浸七日日服二三小鍾

久病虛弱者勿用 千金方

普門醫品

鼓脹

卷十 四

中滿鼓脹

三五年陳壺蘆一箇于炭火上炙熟入糯米酒

浸之如此三五次將蘆燒存性研末每食前服三

錢酒下神効 余居氏選方

十棗蠱氣

苦瓜蒂爲末棗肉和丸梧子大每服三十九食前

棗湯下甚効 瑞竹堂方

蠱脹

老絲瓜去皮一枚剪碎巴豆十四粒同炒豆黃去

豆以瓜同陳倉米再炒熟去瓜研米爲末糊丸梧

子大每服百丸食前白湯下蓋米收胃氣巴豆逐

水絲瓜象人脈絡借其氣以引之也 鮮于樞鉤玄

水蠱脹大動搔水聲皮屑色黑

巴豆九十粒去心皮炒黃杏仁六十枚去皮尖炒

黃搗爲末九絲豆大空心水下一丸以利爲度勿

飲酒 張文仲醫急方

又方

乾青蛙二箇以酥炙焦螻蛄七箇炒苦壺蘆半兩

普門醫品

鼓脹

卷十 五

炒爲末每空心溫酒服二錢不過三服 聖惠方

又方

猪肝一具洗切着葱豉薑椒炙食之或單煮羹亦

可食 醫心鏡

金陵酒丸 治氣鼓

真沉香一兩猪牙皂角一兩廣木香一兩檳榔一

兩爲末用南京燒酒爲丸每服三錢五更燒酒下

必大泄氣而愈水鼓苦苧蘆五錢煎酒送下

治鼓脹旦食不能暮食

用臘月乾鷄矢白斗斤袋盛以酒醅一斗漬七日
食遠溫服三杯日三服

又方

用錫矢燒研沸湯淋汁調木香檳榔末二錢服

金蟾散 治單腹脹

大癩瑕募一箇以砂仁填入其口使吞入腹以滿
爲度用泥確封固炭火煨令紅透烟盡取出候冷
去泥研末爲一服食前陳皮湯送下泄氣爲効

普門醫品

鼓脹

卷十

小腹堅大如盤胃滿食不能消

陳皮炒研二錢食前白湯調服日三服千金方

水腫門

論有水腫有肩腫以手按其前隨手而起如裹水
之狀此爲水腫身腫皮厚按其肩背而不起膚色
不變此爲膚腫

水腫之證初起眼胞上下微腫如裹水上則喘欬
氣急下則足膝浮腫大小便短澀不利或大便澀

泄皆由脾虛不能制水水行當以參朮補脾
氣則自能健運自能升降運動其樞機則水自行
惟宜補中行濕利小便切不可下

凡患水腫飲食之間切須忌鹽以秋石代用待
腫消病愈以鹽入確煨過少少用之

朝寬暮急者血虛暮寬朝急者氣虛朝暮急者氣
血俱虛大率以二陳湯加白朮人參爲主佐以蒼
朮炒梔子黃芩麥冬以制肝血虛加當歸白芍藥
腹脹少佐厚朴氣不運加木香木通氣若陷下加

普門醫品

水腫

卷十

升麻柴胡提之隨證加減必須補中一切破氣利
腸之藥不可輕用

大凡水腫先起于腹而後散四肢者可治先起于
四肢而後歸于腹者難治男從下腫上女從上腫
下難治掌腫無紋者死大便滑泄腫不消者死唇
黑齒焦者死臍腫突出者死缺盆平者死陰囊及
莖俱腫者死足腫口張脈絕者死附腫膝如斗者
死壯上青筋見瀉後腹脹者死

通治

五十七方

得功散 治諸水病

黑牽牛頭末四兩。大茴香一兩炒。爲末。每服二錢。生薑自然汁調下。久病老弱者勿服。儒門事親

十種水氣

澤漆三斤。卽貓眼草。夏月取嫩莖葉。入水三升。研汁約五升。砂鍋內慢火熬如稀餳。入磁碗收。每日空心溫酒調下一匙。以愈爲度。聖惠方

又方

大戟去芽。石灰水煮晒乾。白牽牛。木香等分爲末。

普門醫品

水腫

卷十九

每用一錢。以猪腰子一對。批開。摻末在內。濕紙煨熟。空心食之。左則塌左。右則塌右。清法錄要

通身腫滿

苦草蘆子炒爲末。四兩。棗肉和丸。梧子大。每服十五丸。桑白皮湯下。日三服。本草綱目

又方

又方

輕粉一錢。烏鷄子。去黃盛粉。麪包蒸熟。取出。苦草蘆子炒。一錢。同蒸餅杵丸。綠豆大。每服三五丸。車

前湯下。日三服。効。普聖元

又方

白木土炒。澤瀉。各一兩。爲末。或爲丸。每服三錢。空心白茯苓湯下。保命集

又方

用義藜。日日煎湯洗之。聖惠方

又方

土剉一箇焙。輕粉二分半。爲末。每嚙少許。入鼻內。黃水出盡爲妙。楊氏家藏方

又方

普門醫品

水腫

卷十九

大蒜。車前子。田螺。等分。熬膏攤貼臍上。水從便澀而下。數日卽愈。伏遠釋史

又方

赤小豆五合。大蒜一顆。生薑五錢。商陸根一條。剉碎同煮爛。去藥。空心食豆。旋啜汁令盡。本草綱目

又方

冬瓜任意吃之。連喫三四日。神効。兵部手集

又方

青龜三箇。每箇口內安銅錢一箇。上着胡黃連末。

少許。以雄猪肚一箇。洗淨包菴。扎定。煮一宿。取出。去皮腸。食肉并猪肚。以酒送下。忌酸鹹魚雞羊肉。宜食猪鴨。壽域神方

又方

赤尾鯉魚一箇。破開。不見水及塩。以生礬五錢。研末入腹內。用紙包裹。外以黃泥包。放灶內煨熟。取出。去紙泥。送粥食之。食頭上消。食身尾下消。一日用盡。屢試屢驗者。醫方摘要

又方

普門醫品

水腫

卷十 十

用鯽魚三尾。去腸留鱗。以商陸赤小豆等分。填滿。扎定。水三升。煮糜。去魚食豆飲汁。二日一作。不過三次。小便利愈。肘後方

又方

小豆一升。白雄雞一隻。煮肉食。飲汁令盡。肘後方

又方

大鯉魚一尾。赤小豆一升。水五升。煮熟食之。連汁一頓服盡。下利即瘥。外臺方

又方

甘遂二錢。生研爲末。猪腎一枚。批開入末。在內。濕紙包煨。令熟。空心食之。日一服。至四五服。覺腹鳴。小便利。是其効也。壯盛可用。老弱勿服。肘後方

又方

瑩淨苦瓠瓢炒。二兩。苦葶藶子炒。一兩。搗末。和棗肉爲丸。小豆大。每服五丸。日三服。水下止。千金方

又方

苦瓠瓢一枚。水二升。煮至一升。去渣。煎至可丸。如小豆大。每米飲下十丸。待小便利。作小豆羹食。勿

普門醫品

水腫

卷十 十一

飲水本草綱目

又方

椒目炒搗如膏。每酒服二錢。千金方

又方

浮萍日乾爲末。每服二錢。白湯下。日再服。聖惠方

又方

鍼砂醋煮炒乾。猪苓地龍糞各三錢。爲末。葱涎研和。傳臍中。約一寸厚。縛之。待小便多爲度。日二服之。入甘遂末三錢更妙。德生堂方

又方

烏柏皮、檳榔、木通各一兩為末，每服三錢，空心米飲下。聖惠方

又方

猪苓五兩為末，熱水服二錢，日三服。楊氏產乳

水腫垂死諸醫不治

大蒜十箇搗如泥，入蛤粉、九梧子大，每食前白湯下二十九丸，服盡小便下數桶，即愈。普濟方

一切腫脹不拘氣脹食脹水脹

醫門醫品

水腫

卷十 十二

乾鷄矢一升，燒黃以酒醅二碗，煮一兩，漉汁飲之，少頃腹中氣大轉動，利下，即自臍上皮膚消也。未盡隔日再作，仍以田螺二枚滾酒淪食，後用白粥調理。積善堂經驗方

暴水氣水風水通身皆腫

香薷葉一升，水一斗，熬爛去滓，再煎成膏，加土炒白朮末七兩，和九梧子大，每服三十九，食後米飲下，日三服，服至小便利為度。外臺秘要

又方

鹿葱根，即萱草根，晒乾為末，每服二錢，入蒂下，半錢，食前米飲下。聖惠方

十種水病腹滿喘促不得臥，或小便不通

用蠐螬下，焙研，空心水服半錢，立通，以下三方。

又方

端午日取蠐螬，陰乾，頭尾各收，治上身用頭七箇，治中用腹七箇，治下用尾七箇，各為末，食前溫酒服，乾坤秘韞

醫門醫品

水腫

卷十 十三

又方

螻蛄五枚，焙為末，入甘遂末，麩裹煨，二錢，商陸汁一匙，調藥一錢，空心白湯下。聖惠方

又方

海金沙三錢，白朮土炒四錢，甘草炙一錢，黑牽牛炒一錢，為末，每用一錢，煎倒流水，空心調下，得利為効。蘭石秘傳

又方

用大冬瓜一枚，切蓋去瓢，以赤小豆填滿，煮合

定以紙筋泥固濟日乾用稻糠兩大瓢入瓜在內
煨至火盡取出切片同豆焙乾爲末水糊丸梧子
大每服七十九食前煎冬瓜子湯下日三服小便
利爲度

易氏家藏方

渾身水腫或草腹脹

青葙一二枚去皮炙食之自消

證治要訣

又方

郁李仁一大合搗末和麪作餅吃即大便通泄氣
便愈

楊氏產乳

醫門醫品

水腫

卷十 十四

又方

取東引桑根皮燒灰淋汁煮赤小豆每饑即飽食
之不得吃湯飲

梅師方

水腫喘急大小便不通

甘遂麪裹煨大戟去芽石灰水煮晒乾羌花醋炒
各等分爲末以棗肉和丸梧子大每服四十九空
心熱湯下利去黃水爲効

三四方

水病腫滿喘急大小便澀

用大豆黃卷

即黑豆芽

炒乾大黃醋炒等分爲末

葱楸皮煎湯空心調服二錢以利爲度後用別藥
調補

聖濟總錄

又方

出了子蘿藦浮麥等分浸湯飲

聖濟總錄

水腫面赤口渴喘急小便短澀

苦葶藶子一兩半炒漢防已二兩酒洗晒乾以雞
頭鴨血和藥末先將鴨頭去毛嘴搗爛入藥合搗
千餘杵松爛丸梧子大甚者十九輕者五九空心
白湯下日三服五日止小便利爲驗

外臺秘要

醫門醫品

水腫

卷十 十五

水腫尿澀

茯苓皮椒目炒等分煎湯日飲取効

普濟方

又方

猪肝煎三塊綠豆四撮陳倉米一合同水煮粥食
毒從小便出

本草綱目

水腫發熱

山梔子仁炒研食前米飲服三錢若上焦熱者通
穀用

丹溪纂要

凡人晝腫夜消謂之陽水

敗荷葉燒存性研末。每服二錢。米飲調下。日三服。
正治要訣

凡人腹腫四肢瘦削。謂之石水。

苦瓠瓢炒。一兩。杏仁去皮尖炒。半兩。爲末。糊丸小豆大。每米飲下十九。日三服。水下止。
聖濟總錄

楮皮散 治風水身腫

楮白皮。猪苓。木通。各二錢。桑白皮。蜜水炒三錢。陳皮一錢。生薑三片。水二鍾。煎一鍾。空心服。日一服。
聖濟總錄

醫門醫品

水腫

卷十 十六

風水腫滿腹大腰重痛難轉移

火麻子半斤。研碎。水濾取汁。入粳米二合。煮稀粥。日日食之。
食醫心鏡

風水發腫汗出身重

防己一兩。酒洗晒乾。黃芪二兩二錢半。蜜炙。白朮七錢半。土炒。甘草半兩。炙咀片。每服五錢。生薑四片。棗一枚。水一盞半。煎八分溫服。良久再服。腹疼加白芍藥一錢半。
張仲景方

水病囊腫

牡蠣煨作粉。二兩。乾薑炮一兩。研末入白麴葱汁調成糊。掃上。須臾覺熱如火。乾則再上。小便利則愈。小兒不用乾薑。
古今錄驗

水病陰腫

縮砂仁炒。一錢。土狗一箇炙焦。研老酒服。
直指方

水腫從脚入腹則殺人
赤小豆一斗。煮爛。取汁五升。溫漬足膝。若已入腹。但食小豆。勿雜食。亦愈。
韋宙獨行方

手足腫

醫門醫品

水腫

卷十 十七

桐葉加赤小豆煮汁漬之。桐枝亦可。
聖惠方

水腫久不瘥垂死者
用獾肉作羹食之。下水大効。
蘇恭方

水蠱腹大有聲皮色黑者

山豆根爲末。酒服二錢。
聖惠方

病人飲水多小便不利而發腫者

白茅根一大把。小豆一升。水三升。煮乾。去茅食豆。水隨小便出。
肘後方

桑椹酒 治水腫脹滿。水不下則滿溢。水下則虛竭。

還張十無一活

桑白皮四兩切蜜炒。水二斗煮汁一斗。入桑椹一升。再煮取五升。以糯米飯五升。醪酒飲。普濟方

水腫服藥未全消者

甘遂末。塗腹連臍令遍。內服甘草水。其腫便去。河間保命集

喘急門

氣喘 痰喘

論戴氏曰。有痰喘。有氣急喘。有胃虛喘。有火炎上

喘急門

喘急

卷十八

喘。痰喘者。喘動便有痰聲。氣急喘者。呼吸急促。而無痰聲。胃虛喘者。按有懶肚。喘而不休。火炎上喘者。乍進乍退。得食則減。食已則喘。大槩胃中有實火。膈上有稠痰。得食墜下。稠痰喘即止。稍久食已入胃。反助其火。痰再升上。喘及大作。俗不知此。作胃虛治。以燥熱之藥者。以火濟火也。

王節齋云。喘與脹相因。必皆小便不利。喘則必生脹。脹則必生喘。但要識得標本先後。先喘而後脹者。喘為本而脹為標。當清金降氣為主。而行水也。

之先脹而後喘者。脹為本而喘為標。當實土行水為主。而清金次之。苟肺病而用燥脾之藥。則金得燥而愈喘。脾病而用清金之藥。則脾得寒而愈脹。大槩喘急之病。不可用苦藥涼藥。火氣盛故也。

凡喘暴作。必須發散攻邪為先。喘定之後。方可補養。久病喘者。未發之前。當扶正氣為主。已發之時。當以攻邪為先。若補其既發。則喘愈甚。此攻補先後之序。不可差也。世醫多不知。故發明之。

喘急與短氣不同。喘者促促氣急。聲粗息數。張口

喘急門

喘急

卷十九

擡肩。擡身懶肚。短氣者。氣少氣短。不能以續。似喘而不擡肩。似呻吟而不痛楚。呼吸雖急而無痰聲。二者狀略相似。而所以施治。大不相同。凡喘作于大病之後者。多危。上喘欬而下泄瀉者。亦然。汗出如油。痰潤而喘不休者。死。直視謔語而喘者。死。

有陰虛自小腹下火起。炎上而喘者。當補陰降火。短氣而促者。宜參耆補之。喘嗽傷肺者。須用阿膠元氣虛而氣短者。宜生脉散。

哮喘專主于痰宜先用吐法不可驟用寒涼必兼發散治哮喘必瀉薄滋味未發以扶正氣爲要已發以攻邪氣爲主

氣喘十五方

喘急欲絕

人參去蘆爲末白湯服一錢日五服肝後方

又方

韭汁飲一升効本草綱目

肺氣喘急

普濟醫品

喘急

卷十一

馬兜鈴二兩去殼及膜酥油半兩盤內拌勻慢火炒乾甘草炙一兩爲末每服一錢水一盞煎六分臨臥溫服或含之即愈前要附方

又方

蓬莪茂音五錢酒一盞半煎八分食後溫服保生

方

又方

蘿蔔子一合研細煎湯食後服之食醫心鏡

又方

杏仁、薤仁各去皮尖各半兩研水調生麩和丸梧子大每十丸食後薑蜜湯下微利爲度聖濟總錄

又方

故錦一寸燒灰食後茶服神功普濟方

定肺湯 治全上

紫苑、橘紅、杏仁去皮尖、五味子、枳殼麩炒、半夏薑汁製、桑白皮蜜水炙、紫蘇、甘草炙各一錢水二盞薑三片煎八分食後服

肺壅喘急不得臥

普濟醫品

喘急

卷十一

甜葶藶子炒黃搗末蜜丸彈子大每用大棗二十枚水三碗煎取二碗入藥一丸更煎至一碗食後溫服金匱玉函方

沉香散 定喘止嗽

沉香、阿膠、蛤粉炒成珠、人參去蘆、紫蘇、陳皮各二錢、桑皮蜜水炙一兩、虛人減半、甘草炙二錢半爲細末每服二錢食後棗湯送下選要

肺氣喘嗽煩熱吐逆

沙糖、薑汁等分慢火煎二十沸每嚥半匙効本草

肺氣欬腹滿羸瘦者

椒葉三斗水三斗煮三十沸去滓煎至可丸如棗

大納入下部中立愈海上集驗方

諸喘不止

椒日炒研二錢食後白湯調服三服効時珍發明

因急走疾奔後飲冷水致傷肺氣喘促不止

竹葉二斤陳皮三兩水十碗煎半細細服肘後方

生豚散 治氣虛而喘

普門醫品

喘急

卷十 二十二

人參三錢麥門冬二錢五味子一錢水二鍾煎八

分食後溫服

痰喘

十四方

齆喘促急遇厚味即發者痰也

蘿蔔子淘淨蒸熟晒研爲末薑汁浸蒸餅爲丸綠

豆大每三十九口津嚥下日三服神効醫學集成

痰氣喘急

生山藥搗爛半碗入甘蔗汁半碗和勻頓熱食後

飲之立止簡便單方

又方

用梨剉空納小黑豆于內令滿蓋佳札定糠灰煨熟搗作餅每日食之至効摘上方

又方

貓頭骨燒灰食後酒服三錢即愈醫學正傳

白果定喘湯 治全上

白果二十一箇炒黃麻黃三錢蘇子炒二錢款冬

花半夏薑汁製桑白皮蜜炙各二錢杏仁去皮尖

黃芩微炒各一錢半甘草炙一錢水三鍾煎二鍾

普門醫品

喘急

卷十 二十三

食後分作二服攝生方

神應丹 治全上

綠豆一合生白朮一錢共入砂鍋水煮豆爛研爲

糊焙乾再研爲末神麴糊丸麻子大每三十九小

兒十五丸七歲以下七丸臨臥冷茶下忌熱物

又方

榆白皮陰乾焙爲末每日旦夜用水五合末二錢

煎如膠服食療本草

肺風喘促流涎眼窳

阿膠蛤粉炒成珠紫蘇為粉白煨石各一錢水一鍾煎六分臨臥服

直指方

紫金丹 治胸喘遇天陰即發坐臥不安飲食不進或終身不愈或子母相傳服此七八服即除根

生白礞一錢枯礬三錢另研淡豆豉一兩水潤去皮蒸研如泥旋加二味末令勻熬作丸如綠豆大

但舉發用冷茶送下七丸甚者九九以不喘為度不可多增丸數小兒服一二丸

哮喘有聲睡臥不得

普門醫品

喘急

卷十 二十四

代赭石為末米醋調服時進一二匙神效

普濟方

痰喘欬嗽

猪牙皂莢三條去皮子一莢入巴豆十粒一莢入

半夏十粒一莢入杏仁十粒各以銅絲縛定杏仁

莢用薑汁巴豆莢用麻油半夏莢用蜜俱一同火

炙黃色為末每用一字安手心臨臥以薑汁調之

喫下神效

余居士選奇方

又方

白規數多年者燒過存性為極細末以米飲調食

後服一錢日三服

急散方

痰喘欬嗽不能睡臥

好茶一兩白僵蠶一兩為末放碗內蓋定傾沸湯

一小盞臥時再添湯點服

瑞竹堂方

痰嗽喘急

桔梗一兩半童便二鍾煎七分臨臥溫服

簡要方

哮喘不得眠

白前製烏末每食後溫酒服二錢

深師方

喘急晝夜倚壁不得臥喉中作聲呼吸欲絕

普門醫品

喘急

卷十 三十五

白前二兩製紫蘇半夏製各三兩大戟製一兩水

十碗煮取三碗分四五次服忌羊肉飴糖

孫氏方

氣喘因溺水遇雨得者名冷風哮

用蜜一斤薑一斤入罐內煎熟夜間任意連薑食

之旬日即愈

楊氏經驗方

東武王化貞元起父編輯

門人陳 斌憲卿父較閱

熱閉 虛閉 脾約

大便秘閉

論大便不通。名為秘結。有風秘。風痰結燥不通也。有氣秘。氣滯煩悶不通也。有熱秘。積熱消耗津液。大便結燥也。有寒秘。年高臟冷大便結滯也。有濕秘。濕熱鬱結津液不行而秘澁也。

普門醫品

大便閉

卷七

內經曰。腎主五液。故腎實則津液足而大便潤。腎虛則津液竭而大便燥。腎惡燥。急食辛以潤之。以苦泄之。

壯盛之人。身熱煩渴。大便不通者。為熱閉。宜用通利之藥。大承氣湯之類。久病而大便不通者。為虛閉。風證大便不通。為風閉。老人大便不通。為枯燥而閉。羸瘦及產婦并一切失血之人。大便不通。為血虛而閉。汗出太多。大便不通。為津液乾涸而閉。並宜潤燥通幽養血滋陰之劑。緩而潤之。庶不有

慎。如潤腸丸通幽湯之類。若用牽牛巴豆峻利之劑。津液既走。氣血愈耗。雖暫通而即秘矣。更生他

病。何可勝言。

杏仁麻仁潤血燥。杏仁郁李仁治氣燥。皂角仁治

風燥。

蜜導煎 治傷寒小便自利大便不通

蜜二合。銅器中微火煎如飴狀。可丸。乘溫拈作挺。

令頭銳大如指。長寸半。候冷。納穀道中。少頃即通。

普門醫品

大便閉

加皂角末少許。尤速。張仲景傷寒論

猪膽導法 治大便結燥不通。老幼虛實皆可用。

猪膽一枚。傾去少半。用香油醋灌滿。入小竹管繫

緊。入穀道。以手捻汁直射入內。少時即通。經驗方

大腸氣滯燥澁不通。及氣結關格腹內痞癖。

郁李仁泡。去皮及雙仁者。麪拌搗和。若乾少入水

作餅。如病者掌大。微炙使黃。不得過熟。空腹食之。

即利。不利更食。如利多以醋飯止之。量病輕重以

意加減。小兒亦可用。忌食乳酪及牛馬肉。必効方

導滯通幽湯 治大便秘結而秘氣不舒下

當歸全升麻 薤仁去皮尖研如泥各一錢生地黃

熟地黃各八分紅花甘草各三分水一碗煎八分

去滓調抵椰末五分空心稍熱服

潤腸丸 治大便秘風秘血秘不通常常結燥

當歸全大黃煨各一兩防風羌活各半兩火麻仁

二兩半皂角仁燒存性去皮研一兩薤仁去皮尖

二兩除薤仁麻仁另研為泥餘為細末煉蜜九楮

子大每五十九空心白湯下三二服後愈

普門醫品

大便秘

卷三

大腸乾結

厚朴生研猪臟煮搗和九楮子大每空心薑湯下

三十九

十便良方

大便卒結

羊蹄根一兩水一大盞煎六分空心溫服

又方

牽牛子半生半熟為末每服二錢空心薑湯下未

通再以太茶服或加檳榔一錢

簡要方

大便不通

生薑削如指塗鹽納下部立通薑薑更妙

又方

苦瓜蒂七枚研末綿裝塞入下部立通

簡要方

又方

烏柏木根方長一寸劈破水一鍾煎七分空心服

之立通不用多喫其功神速

倒換散 治同上

生大黃末荆芥末減半空心溫水服三錢

普濟方

又方

普門醫品

大便秘

卷三

當歸全白芷等分為末每服二錢空心米飲下

濟錄

大承氣湯 治熱閉

方見三卷傷寒門

虛閉

方

老弱人大腸虛閉

連翹葱一根薑一塊搗一捻淡豉七粒搗作餅烘

熱會臍上紫定良久氣透即通不通再作

直指方

又方

栝子仁松子仁火麻仁各焙燥等分研細密蠟丸
梧子大黃丹少許點湯且晚各服三十丸 宗奭方

又方

黃耆蜜炙陳皮去白各半兩爲末每服三錢用火
麻子一合研爛以水瀝漿煎至乳起入白蜜二匙
再煎沸調藥空心服甚者不過再服此藥不冷不
熱常服無秘塞之患其効如神 和劑局方

又方

阿膠蛤粉炒成珠二錢葱白三錢水煎化入蜜二

清門醫品

大便秘

卷十一

匙空心溫服 本草綱目

又方

大麻仁紫蘇子各二合洗淨研細入水再研瀝取
汁煮粥啖之 本事方

老人風秘氣秘

蘿蔔子炒一合搗水和皂莢末二錢空心服 壽域

神方

風人虛人脚氣人大腸或秘或利

皂莢子一千粒洗淨以酥油少許炒香爲末蜜丸

梧子大每空心以蒸梨子酸棗仁煎湯下三十丸
以和爲度 千金方

汗多便秘老人虛人宜此

肉苁蓉二兩酒浸焙乾研沉香末一兩研麻仁打
糊爲丸梧子大每服八分空心白湯下 濟生方

附脾約 一方

論活人書有脾約證乃胃強脾弱不能轉輸約束
津液不得四布但輸膀胱故小便數而大便難宜
用脾約丸

清門醫品

大便秘

卷十一

脾約丸

麻仁炒二兩另研大黃六兩蒸厚朴薑汁炒枳實
麩炒白芍藥炒各三兩杏仁去皮尖二兩另研煉
蜜丸梧子大每二十九臨臥白湯下便利止服 東垣方

小便閉

附遺溺及不禁

論丹溪曰小便閉有氣虛有血虛有痰有實熱有
濕有氣結其法宜吐之以提其氣氣升則水自下

蓋氣承載其水也。氣不利故不通。氣虛者用人參黃耆升麻等。先服後吐。或即以藥探吐。血虛用等歸湯。服後探吐。痰多二陳湯。先服後探吐。不吐煎渣再探之。實熱者宜利之。八正散最妙。

渴而小便閉者。熱在氣分。宜清肺飲子。不渴而小便閉者。熱在血分。宜滋腎丸。

妊婦多小便不通。乃氣血虛弱。胎壓膀胱所致。方

見妊娠轉胎門

通治 四十一方

普門醫品

小便閉

卷二

七

小便不通

蓖麻仁一粒。研細。紙撚挿入莖內。即通。摘玄方

又方

田螺大者一枚。小者四五枚。搗爛。入麝少許。鹽少許。攤臍上。以布隔手熨之。即通。或用田螺入水中。候吐泥。澄去水。用泥攤臍亦妙。螺仍放去。

又方

蚯蚓糞。朴消等分。水和。傅臍下。即通。普勸方

又方

滑石末半斤。以車前草汁和厚。塗臍之。四時方四寸。乾即易之。葱豉湯調下。益元散更妙。楊氏產乳

又方

濕紙包鹽燒過。研細。吹少許尿管中。立通。普濟方

又方

王瓜根搗汁。少水和之。以小筒吹入莖中。即通。肝後方

又方

萬莖子搗餅。貼臍中。即通。海上方

普門醫品

小便閉

卷二

八

又方

芫子仁十四箇。獨頭蒜一箇。食鹽少許。搗貼臍及

囊。良久即通。普濟方

又方

大蜈蚣一枚。炙研。入水片。鹽少許。翎管吹入莖

內。普濟方

又方

用蜈蚣後截。和麝搗。納臍中。縛定。即通。普濟方

又方

用新取猪胆連汁套陰頭一二時汁入即通

又方

車前草五兩水二碗煎一碗空心服或入桑葉汁攪服三服愈百一方

又方

龍葵根木通胡荽各二錢水鍾半煎一鍾空心服之本草綱目

又方

馬蘭花小茴香葶藶子各等分炒爲末空心酒服

普濟醫品

小便閉

卷上九

二錢十便夏方

又方

黃耆三錢水二盞煎一盞溫服小兒減半總微論

又方

萱草根煎水頻飲之杏林摘要

又方

鴨跖草即碧蟬花一兩車前草一兩搗汁加蜜少許空心服之集簡方

又方

胡荽二兩蜀葵根一握水二升煎一升入滑石末一兩分三四服聖濟總錄

又方

搜毛燒存性以水酒空心服二錢累試驗壽生方

又方

蒲瀟燒灰存性七分滑石飛末二分空心米飲服二錢金匱要略

又方

蜈蚣下截炙焦爲末空心溫酒服半錢談楚翁方

普濟醫品

小便閉

卷上十

又方

石韋去毛車前子微炒各二錢半水二盞煎一盞

空心服指迷方

又方

芒消三錢小茴香煎酒空心調服簡要濟衆方

小便閉尿滿欲死

葱白三斤剉碎炒熟用帕包作三箇更互熨之氣透即通或連葉搗爛入蜜罈外腎上亦可本事方

又方

苦瓠子三十枚炒。螻蛄三箇焙爲末。每空心冷水

又方

瓜蒌焙研。每二錢。熱酒下。頻服。以通爲度。聖惠方

倒換散 治同上

荊芥。大黃煨減半。共爲末。每服三錢。空心溫水下。普濟方

小便不利。莖中疼欲死。

用牛膝并葉。酒煮空心服之。肘後方

普門醫品

小便閉

卷十一

陰莖腫閉。小便不通。

葱切。入麻油煮黑色。去葱取油。時塗腫處。普濟方

老人尿閉

白頭蚯蚓。小茴香等分。杵汁空心飲。朱氏集驗方

清肺飲子 治見論

赤茯苓。猪苓。澤瀉。鹽水浸曬乾。各一錢半。車前子。

琥珀另研五分。木通。瞿麥。萹蓄各一錢。通草。燈心。

各七分。水二盞。煎一盞。空心服。東垣方

滋腎丸 治見論

黃藥音陌。知母。各酒拌陰乾。各二兩。肉桂去粗皮一

錢。共爲細末。熱水丸。梧子大。空心百沸湯下五十

丸。東垣方

小便澀滯及轉脬

乾箬葉。一兩。燒存性。滑石。飛半兩。爲末。空心米飲

服三錢。普濟方

胞轉不通。非小腸膀胱受病。乃強忍房事。或過忍小

便所致。當治其氣。不可用滲利之藥。

沉香。木香各二錢。爲末。空心腹白湯服。以通爲度。醫

普門醫品

小便閉

卷十一

聖元方

又方

琥珀爲細末。用葱白煎水。空心調服二錢。沙石諸

淋。三服皆効。聖惠方

又方

死蜚螂二枚。燒末。并華水一盞。空心調服。千金方

又方

甘遂麩裹煨末一錢。猪苓。沙空心調下。筆華雜興

轉胞便閉。腹脹如鼓。不拘男女。

用猪胞吹脹以翎管安上挿入陰中捻胞氣吹入
即大尿而愈

又方

用葱管吹塩花入玉莖內提効

芎歸湯 治見論

當歸川芎各五錢水二鍾煎一鍾服

二陳湯 治見論

方見六卷痰飲門

八正散 治見論

普門醫品 小便閉

大黃瞿麥木通滑石飛蒲蒿梔子炒車前子炒生

甘草各等分水鍾半煎一鍾服

附遺溺不禁

論遺溺不禁爲陰陽失調水火不濟必先用補中

益氣湯以治本後用秘元丹以治標

遺溺與小便不禁略有分別遺者自出睡中不知

日間方知不禁者時常欲出而不能禁止也皆爲

虛候而不禁者爲少輕

遺溺 十方

睡中遺溺

雄鷄肝桂心等分搗丸小豆大每服一丸食遠米

飲下日三服本草綱目

又方

桑螵蛸酒炒爲末薑湯臨臥服二錢

又方

枯白礬牡蠣煨等分爲末每服一錢空心溫酒下

日三服即效

又方

普門醫品 小便閉

用猪胞洗炙熟食之

又方

本人薦草燒灰臨臥水服三錢

又方

白龍骨煨桑螵蛸等分爲末每臨臥塩湯服二錢

梅師方

雞內金散 治同上

雞腔胚一具并腸洗淨焙乾燒存性男用雌鷄女

用雄雞爲末作一服空心溫酒調下

又方

猪脬一箇。燒存性爲末。入前雞內金散服。集驗方

補中益氣湯 治見論

方見第五卷內傷門

婦人遺尿

雄雞翎燒灰。食前酒服二錢。日三服。千金翼方

不禁 十四方

小便無度。腎氣虛寒也

破故紙酒蒸。小茴香鹽炒。各十兩。爲末。酒糊丸。梧

普門醫品

小便閉

卷上 十五

子大。每服百丸。空心鹽酒下。或以末入猪腎。煨熟

食之。普濟方

又方

益智仁鹽炒。去鹽。烏藥。等分爲末。酒煮山藥糊丸

梧子大。每七十九。空心鹽湯下。朱氏集驗方

又方

川萆薢酒浸焙乾一斤。爲末。酒糊丸。梧子大。每服

七十九。空心鹽酒下。集玄方

又方

菽英爲末。每服三錢。溫酒下。臨臥服。儒門事親

又方

山藥以礬水煮過晒乾。白茯苓。等分爲末。每空心

水服二錢。儒門事親

又方

白果十四枚。七生七煨。食之。取効止。本草綱目

又方

胡菹煨熟。臥時嚼之。溫酒下。本草綱目

小便不禁

普門醫品

小便閉

卷下 十六

赤石脂煨。牡蠣煨。各三兩。鹽一兩。爲末。糊丸。梧子

大。空心鹽湯下。五十九。普濟方

又方

酸石榴燒存性。無則用枝燒灰代之。每服二錢。用

栢白皮焙四錢。水二盞煎一盞。入栢灰再煎至八

分。空心溫服。聖惠方

又方

薔薇根煮汁。臨臥飲之。或爲末酒服。聖惠方

秘元丹 治腎虛脫氣。小便不禁。自汗

龍骨煨三兩。訶子麩裹炮取肉。砂仁炒各一兩。朱砂二兩爲細末。糯米糊丸。梧子大。每服三十九。空心鹽湯下。

老人弱人下元虛憊。小便數者。

蓮肉半斤。酒浸二宿。以豬肚一箇洗淨。入蓮肉在內縫定。煮熟。取出晒乾爲末。醋煮米糊丸。梧子大。每服五十九。空心白湯下。醫學發明

又方

牡蠣煨末五兩。童便三升。煎二升。分三服。丹溪方

普門醫品

小便閉

卷五 十七

又方

雄雞喉及脫肛并尿白等分焙焦爲末。空心粥清調服。衛生易簡方

又方

鹿角霜白茯苓等分爲末。酒糊丸。梧子大。每服三十丸。空心鹽湯下。梁氏總要

關格門

論關格者。謂膈中如有所礙。欲升不升。欲降不降。

飲食不食。欲便不便。爲氣之橫格也。

潔古曰。關者甚熱之氣。格者甚寒之氣。關者無出之由。故曰關。格者無入之理。故曰格。寒在胃中。過絕不入。熱在下焦。填塞不便。

雲岐子云。寒在胃中。舌上白胎。水漿不入。故曰格。格則吐逆。熱在丹田。傳導不迎。故曰關。關則不得小便。

陳氏曰。腑有邪則陽脉盛。臟有邪則陰脉盛。陰陽俱盛。既關且格。格則吐而食不下。關則二陰閉。不得大小便而死。

普門醫品

門格

卷三

得大小便而死

丹溪曰。關格必用吐法。提其氣之橫格。不必在出痰也。有痰宜吐者。二陳湯探吐之。吐中便有降。

通治

關格不通。大小便閉。脹悶欲死。

芒消三兩。泡湯一升。服之探吐。卽通。百一方

又方

甘遂麩裹煨爲末。生麩糊調敷臍中。及丹田。仍于上灸三壯。飲甘草湯以通爲度。聖惠方

又方

蔓菁子油一合。空腹服之。即通。汗出勿怪。聖惠方

又方

胡椒二十一粒打碎。水一盞煎六分。去滓。入苦消半兩。煎化服。聖濟總錄

又方

檳榔爲末三錢。以童便葱白同煎二三沸。服之。普濟方

又方

普門醫品

卷二

十九

米醋和鹽納臍中。乾即易之。仍以鹽汁入猪膽內。將管納入肛門。用手擠入。再飲鹽湯。楊氏家藏方

又方

搗葱白和醋炒熱。封入臍內及小腹上。仍灸七壯。愈。聖秘要

又方

猪牙皂焚燒研。粥飲下三錢。立通。千金方

又方

用皂莢燒煙于桶內。坐上薰之。聖惠方

又方

兔屎所末。安臍中。冷水滴之。令透。自通。聖惠方

又方

白礬末。填滿臍中。以新汲水服之。覺冷透腹內。即自然通。應平者。以紙團環之。經驗方。

蟻卵七箇。男用。頭女用。身土狗七箇。男用。身女用。頭新瓦焙研末。用虎目樹。即白栝樹。南向皮煎汁。調服。只一服。即通。本草綱目

普門醫品

卷二

又方

六七月。尋牛糞中大。燒脚十餘枚。線穿。陰乾。收之。臨時取一箇。金箔收淨。磚上四面以炭火烘乾。當腰截斷。如大便不通。用上截。小便不通。用下截。二便不通。全用。研末。酒調服。即解。楊氏家藏方

又方

冬葵子一升。水三升。煮取一升。納猪脂一兩。煎熟。頓服。即通。肘後方

又方

烏柏樹東南根白皮焙乾為末無水服二錢再以
坐消二兩煎湯服之甚效

又方

巴豆仁連油連心半兩搗碎子先搗葱薑汁滴
臍內安餅于上灸二七壯取利為度

治二便不通諸藥不効者

扁竹根即射干根 研服一盞即通

又方

滑石飛末一兩白湯調服

普門醫品

卷十二

又方

獨頭蒜燒熟去皮綿裹臍下即氣立通

又方

八角茴香七箇火麻仁半兩為末生葱白七根同

研煎湯調五苓散末二錢服之

見七卷霍亂門

二陳湯 治見論

方見六卷痰飲門

普門醫品卷之十二

東武王化貞元起父糾

門人陳斌憲卿父較

附辟穀及辟兵

門

論昔人有言無病服藥如壁裏安柱謂預行補助
為未然之防可無憂傾圮也顧不師匠而師心不
擇材而擇便未有不害其成而速之圮者天生斯
民養之以教及其有病治之以藥穀則氣之常

普門醫品

卷十二

食而不厭藥則氣之偏可用于暫而不可久漢唐
以來王公貴戚惑于方士服食致長生之說往往
以金石慄悍之劑日用服餌雖受其害迷而不悟
足用痛心今擇草木之氣味平和可為養老扶衰
之助者錄于篇使尊生君子得以采焉

補益 三十二方

男女積虛成病沉困疲疼盜汗少氣喘促或小腹拘
急心悸胃弱多臥少起漸至瘦削

烏雌雞一隻治如食法生地黃一斤搗碎

斤拌勻納雞腹內縛定銅器貯甕中蒸五升米熟取出食肉飲汁勿用鹽一月一作神効姚僧坦方

接命丹 治男婦氣血衰弱痰火上升虛損之證及

中風不語左癱右瘓手足疼痛動履不便飲食少進

人乳二盃香甜白者爲佳以好梨汁一盃和勻銀

石器內煎滾每日五更一服能消痰補虛生血延

壽以人補人其妙無比羅生象妙方

治虛損百病

女貞實十月上巳日收陰乾用時酒浸一日蒸透

普門醫品

晒乾一斤四兩旱蓮草五月收陰乾十兩桑椹三

月收陰乾十兩各爲末煉蜜丸如梧子大每服七

八十丸淡鹽湯下簡便方

返本丸 治全上

黃犍牛肉去筋膜切片河水洗數遍浸一夜次日

再洗三遍水清爲度用無灰好酒同入礬內重泥

固封桑柴文武火煮一晝夜取出焙乾爲末聽用

山藥蓮肉去心並以鹽拌炒過去塩白茯苓小茴

香各四兩爲末每牛肉半斤入藥末一斤以紅棗

蒸熟去皮搗丸梧子大空心酒下五十九日三服

斑龍丸 治全上

鹿茸酥炙鹿角膠炒成珠鹿角霜陽起石煨酒淬

肉蓯蓉酒浸酸棗仁炒梧子仁焙黃耆蜜炙各一

兩當歸黑附子炮地黃九蒸酒各八錢辰砂半錢

爲末酒糊丸梧子大每空心酒下五十九齋素

秋水乳粉丸 因元陽壯筋骨舉百病延年不老

秋石五錢頭生男乳晒粉五錢頭生女乳晒

普門醫品

錢乳香二錢五分麝香一分爲末煉蜜丸梧子大

金箔爲衣金紙包黃蠟吳收母令洩氣每月用

乳汁化服一丸仍日飲乳汁助之本草

秋石五精丸 補益卻病延年

秋石一兩蓮肉六兩真川椒五錢白茯苓二兩爲

末棗肉和丸梧子大每服三四十九空心鹽湯或

溫酒下常服之保壽堂經驗方

附煉秋石陰陽二法

陰煉法須秋月取童子便每缸入石膏末七錢桑

條洗定額去清液入秋露水提淨再傾去浮液再入水如此二三令淨以重紙鋪灰上胎乾完全取起輕清在上者為熟石重濁在下者則去別用男用童女溺女用童男溺更佳亦陰陽配合之道也

陽煉法用童男童女潔淨無體氣疾病者與紫素飲食及淡塩湯忌葱蒜韭雄辛辣腥膻之物待尿滿缸每石入皂莢汁一碗攪百千下候澄去清留泥如前攪澄取濃汁一二斗瀝淨入鍋熬乾刮下

普門醫品

卷十二 四

搗細再以清水煮化于竹器內鋪紙淋過再熬如此數次直待色白如雪方止各用陽城瓦烘固濟鉄線扎定火打一炷香連換鉄線打七火然後以男女者拌勻和作一處研開用紫淨香濃乳汁和成日晒夜露乾即添乳取日精月華四十九日數足收貯聽用

二至丸 補虛損生精血去風濕壯筋骨

鹿角鎊細以真酥一兩無灰酒一升慢火煮乾焙取四兩麋角鎊細以真酥一兩米醋一斗煮

乾焙取四兩蒼耳子酒浸一宿焙半斤山藥白茯苓黃耆蜜炙各四兩當歸酒浸焙五兩肉蓯蓉酒浸焙遠志去心人參沉香各二兩熟附子一兩通為末酒煮糯米糊丸梧子大每服五十九溫酒塩湯下日二服 楊氏家裁方

異類有情丸 凡中年覺衰便可服此蓋鹿乃純陽龜虎屬陰血氣有情各從其類非金石草木比也

鹿角霜龜板酒浸七日酥炙各三兩六錢鹿茸熏乾酒洗淨酥炙虎脰骨東流水浸七日酥炙各一

普門醫品

卷十二 五

兩四錢為末煉蜜入猪脊髓九條搗丸梧子大每空心塩湯下五七十丸如善食厚味及能飲者加猪膽汁一二合以瀉火 韓氏醫通

鹿茸酒 治陽事虛萎小便頻數面色無光

鹿茸一兩去毛水浸蒸切片山藥一兩絹袋盛置酒罈中七日取飲日飲三五溫酒作丸服 普濟方

思慮太過心腎虛損真陽不固漸有遺精白濁夢遺

兔絲子五兩白茯苓三兩石蓮肉二兩為末酒糊丸梧子大每服六十九空心塩湯下 和局方

僂靈脾酒 治陰痿陽絕莖中瀉利小便益氣力強筋骨理腰膝疼大益丈夫

僂靈脾一斤酒一斗浸五七日逐時飲之用完再合食醫心鏡

陽氣衰弱腰脚疼痛

羊腎三對羊肉半斤葱白一莖枸杞葉一斤同五味煮成汁下米作粥食之簡要方

補腎興陽

穀米一斤蛤蚧二枚茴香川椒各四兩並以青鹽

普門醫品

酒化火炒以木香粗末一兩和勻乘熟收新瓶中密封每服一匙空心溫酒嚼下甚妙本草綱目

蒼朮膏 除風濕健脾胃衰白駐顏補虛損大効

蒼朮新鮮者去皮薄切米泔水浸二日取出以井華水浸過二寸春秋五日夏三日冬七日漉出以

生絹袋盛之用一半原水揉洗津液出扭乾將渣

搗爛袋盛于一半原水中揉至汁盡為度將汁于

大砂鍋中慢火熬成膏每末一斤入白蜜四兩再

熬二炷香取起每膏一斤入水澄晒乾白茯苓末

半斤攪勻收貯每服三匙早晚臥各一服以溫酒送下忌醋及菘菜醫方

五加皮酒 順氣化痰去風壯骨補髓延年

五加皮地榆刮去粗皮各一斤裝盛入無灰好酒二斗大罈封固安大鍋內文武火煮之罈上安米

一合米熟為度取出去火毒以渣晒乾為丸每旦五十丸藥酒送下臨臥再服試驗方

金櫻子煎 活血駐顏添精補髓久服耐寒輕身

金櫻子去刺及子以水淘洗淨入鍋水煎不得絕

普門醫品

張良

卷十二 七

火煎減半瀝過仍煎似稀餒每服一匙用暖酒一

盞調服孫真人女忌

麥門冬煎 安神益氣悅色肥人其力甚駛

鮮麥門冬去心搗取汁和白糖器中重湯煮攪不停手候如飴乃收貯溫酒日服經本草

地僂丹 此異人赤脚張傳與壽氏縣一老人服之

壽百餘行走如飛髮白反黑齒落更生陽事強健此

藥性平常服能除邪熱明目輕身

春采枸杞葉名天精草夏采枸杞花名長生草秋

采子名枸杞子冬采根名地骨皮金陰乾用無灰

酒浸一夜晒露七七晝夜取日精月華待乾爲末

煉蜜九彈子大每早晚各用一丸細嚼以隔夜百

沸湯下此藥須採無刺而甜者方有益保壽堂方

還少丹 昔越王遇異人傳此方極能固齒牙壯筋

骨生腎水凡年未八十者服之鬚髮返黑齒落更生

年少用此至老不衰最宜珍重不可輕忽

蒲公英連根帶葉取一斤洗淨晾乾勿令見日入

食鹽一兩香附子末五錢拌蒲公英淹一宿分爲

普門醫品 服食 卷三 八

二十團用皮紙三四層裝定用蚯蚓泥固濟煨乾

以武火煨通紅爲度冷定去泥爲末早晚擦牙漱

之吐燕任便清竹堂方

金髓煎

拘杞子逐日摘淨者不拘多少以無灰酒浸之

蠟紙封固勿令洩氣兩月足取入砂盆中搗爛瀝

取汁同浸酒入銀鍋內慢火熬不住手攪候成膏

如錫淨瓶密封每早溫酒服二大匙夜臥再服百

日身輕氣壯清竹堂方 經方

悅澤面容

冬瓜仁七升以絹袋盛投沸湯中須臾取爆乾如

此三度又以清酒浸二宿曝乾爲末日服二三錢

令人肥悅白淨如玉明目延年不老食療本草

又法

冬瓜仁五兩薤花四兩橘皮二兩爲末食後米飲

服二錢日三服欲白加瓜仁欲紅加薤花三十日

面白五十日手足俱白食療本草

服黃精法

普門醫品 服食 卷三 九

黃精不限多少陰乾爲末每日水調服三錢一年

變老爲少久久可成地僊聖惠方

又法

黃精一石用水二石五斗煮之自旦至夕候冷以

手搗碎布袋搾汁將渣晒乾爲細末同入釜中煎

至稠膏丸如鷄子大每服一丸日三服絕糧輕身

除百病消渴飲水聖惠方

服甘菊法

甘菊以莖紫氣香味甘者爲真三月上寅日采苗

六月上寅日采葉九月上寅日采花十二月上寅日采根俱洗淨陰乾百日各等分以成日合搗爲末煉蜜丸梧子大酒服三十九日三服一年髮白變黑二年齒落重生五年老變爲童金匱玉函方

服蒺藜子法

蒺藜子七八月熟時收取日乾春去刺蒸半日晒乾爲末每新汲水調服二錢日三服勿令中絕服之一年冬不寒夏不熱二年老者復少髮白復黑齒落更生三年斷穀長生神隱秘旨

普門醫品

服食

卷十二

服菖蒲法

采石菖蒲葉小似魚鱗者一斤先以水次以米泔浸各一宿刮去皮切暴乾爲末以糯米粥和勻更入煉蜜攪和丸如梧子大每袋懸當風處令乾每旦晚各酒下三十丸服至一月消食二月疾除五年骨髓完顏色澤白髮黑齒落生普門傳略節

又法

七月七日取菖蒲爲末酒服三錢飲酒不醉久服聰明強記好事者服之每盒千金方

服胡麻法

胡麻三斗淘淨甑蒸令氣遍日乾以水淘去沫再蒸如此九度以湯脫去皮飯淨炒香爲末白蜜或棗膏丸梧子大每溫酒化下一丸日三服忌毒魚狗肉生菜服至百日能除一切痼疾一年身面光澤不饑二年白髮反黑三年齒落更生抱朴子方

服松栢法

三月四月采新生松葉長三四寸許并花蓋陰乾又于巖谷中采當年新生栢葉長二三寸者陰乾

普門醫品

服食

卷十二

爲末白蜜丸小豆大常以日未出時燒香東向持八十一丸酒下服一年延十年壽服二年延二十年壽欲長肌肉加火麻巨勝欲心力壯健加白茯苓人參此藥除百病益元氣滋五臟六腑清頭目強力不衰延年益壽以七月七日露水丸之更佳服時仍祝曰神僊真藥體合自然服藥入腹天地同年祝畢服之斷諸雜肉五辛孫真人枕中記

服栢實法

栢子仁烘二斤爲末酒浸爲膏蜜肉三斤白蜜白

本家生肌膏各一斤。搗勻九釐子大每嚼一丸。
一日三服。百日百病愈。久服延年壯神。奇効方。
食蓮花法

七月七日采蓮花十四兩。八月八日采子十六兩。
九月九日采藕十八兩。各陰乾搗碎。每服二錢。
溫酒調服。常以倍。以備耗折。大補平本方。

附辟穀方

耐老益氣。久服不饑

麻子仁二升。大豆一升。炒香爲末。蜜丸。日二服。抱

普門醫品

服食

卷三 十二

朴子方

又方

石蓮肉。蒸熟去心爲末。煉蜜九釐子大。日服三十
丸。德家方。

又方

松脂十斤。桑柴灰汁一石。煮五七沸。漉出冷水中。
旋復煮之。凡十遍。乃白。細研爲末。每服二錢。粥飲。
調下。日三服。服至十兩以上。不饑如飢。再服之。一
年以後。夜視日明。久服延年益壽。千金方。

又方

百煉松脂。研末。蜜和作丸。大如中。每日服。
彈子大一塊。一日三服。服至百日。耐寒暑。五年可
見神僊。千金方。

又方

天門冬二斤。熟地黃一斤。爲末。煉蜜丸。彈子大。每
溫酒化三丸。日三服。久服身輕。延年益壽。神方。
省糧辟穀

糯米一斗。淘汰淨。百蒸百嚼。湯水日食一餐。以水

普門醫品

服食

卷三 十三

又方

調服至三十日止。可一年不食。升後方。
粳米一升。酒三升。漬之。暴乾。又漬。酒盡。取出炒食。
之。可辟穀三十日。足一斗三升。辟穀一年。升後方。

又方

白茯苓五斤。去皮爲末。以熟絹袋盛。下二斗米。下
蒸之。米熟。卽止。暴乾。又蒸如此。三斗。牛乳二斗。和
合。銅器中。微火煮。如膏。收之。每食以竹刀刮食。
意。忌食。辛。甘。下。氣。如。飲。食。及。煎。茶。汁。飲。之。神方。

又方

白茯苓四兩白麴二兩水調作餅以黃蠟三兩煎熟飽食一頓便絕食辟穀至三日覺難受以後氣力漸生臨門觀事

濟饑辟穀

大豆五斗淘淨蒸三遍去皮取子三升浸一宿亦蒸三遍令口開取仁各搗為末和搗作團如拳入甌蒸從戌至子時止寅時出甌曬乾午時為末乾服之以飽為度不得食一切物第一頓得七日

普門醫品

服食

卷三十四

又方

不饑第二頓得四十九日不饑第三頓三百日不饑第四頓二千四百日不饑更不必服永不饑也不問老少但依法服食令人強壯容貌紅白永不憔悴口渴即研火麻子湯飲之轉更滋潤臟腑要重吃物用葵子三合研末煎湯冷服取下藥如金色任喫諸物並無所害

黑豆揀完美者生授令光煖徹豆內先日不食以冷水頓服十粒一切魚肉菜果不得復經口渴即

飲冷水初小因十數日後體力壯健不復思食左華龍手法

又方

黑豆買聚各一升煮熟去衆脂乾每日空心啖五七粒食一日木枝葉皆有味可飽也黃山各教饒

又方

蔓菁子不拘多少水煮三遍令苦味盡曝杵為末每二錢溫水下日三服固經本草

又方

普門醫品

服食

卷三十五

榆皮檀皮焙研日服數合可以度荒林荒本草

又方

用蜜蟬和松葉杏仁肉白茯苓等分為丸如梧子大食後服五十九日蕭歲多食蠟以度饑但合大車里嚼即爛本草

附辟兵

五兵盜賊一切克害

管火虫鬼箭羽蒺藜各一兩雄雞黃各二兩殺羊角般存性兩半礬石火燒二兩鉄鍾柄入鉄處燒

防風爲末調冷水灌之 積善堂方

中天雅附子草烏毒

金食怡糖卽解 總錄

中藜蘆毒

雄黃末一錢水服 外臺秘要

中鉤吻毒回青口噤欲死

以葱涕吹之卽解 千金方

誤服巴豆下利不止

黃連乾薑等分爲末水服二錢 肘後方

普門醫品

中毒

卷五 十九

解斑蝥毒

玉簪花根搗水服之卽解 趙真人濟急方

中鴆毒

葛粉二兩水二盞調服口噤者灌之 聖惠方

藥中有輕粉人中其毒骨痛筋攣

用出山鉛五斤打壺一把盛燒酒十五斤納土茯苓

苓半斤乳香三錢封固重湯煮一日夜埋土中出

火毒每日早晚任飲數盃後用瓦盆接小便有粉

出爲驗服至筋骨不疼乃止 醫方摘要

水銀入肉令人筋攣

以金物熨之水銀當出候金白色是也 本草拾遺

食輕粉口破者

以三年陳醬化水頻漱之中砒毒者調水服卽解

頤湖集簡方

砒毒 七方

砒霜毒人煩燥如狂心腹疼痛四肢厥冷命在須臾

黑鉛四兩磨水一碗灌之 華陀危病方

又方

普門醫品

中毒

卷五 十九

用錫器于粗石上磨水服之 濟急方

又方

桐油二升灌之吐卽解 華陀危病方

又方

白芷末井水調服二錢 事林廣記

又方

用真麻油灌之 衛生方

又方

綠豆粉寒水石等分以藍根汁調服三五錢 衛生

易簡方

又方

白扁豆生研水絞汁飲之永賴方

椒方 四方

閉口椒毒氣閉欲絕者

煮蒜汁灌之或以新汲水灌之即解張仲景方

又方

食紅棗即解或以棗搗熱水絞汁灌之一選方

又方

醫門醫品

中毒

卷三 二十一

急煎桂汁服之多飲新汲水一二升梅師方

又方

鷄毛燒煙吸之并水調服一錢千金方

蘭毒 二方

中野菌毒

芫花生研新汲水服一錢以利爲度危氏得効方

又方

急取鴛鴦草即忍冬藤啖之洪邁夷堅志

魚蟹毒 十二方

河脫魚毒人誤食其肝及子心迷悶至死

急用橄欖實及木煮汁飲即解或以其果生嚼嚥

汁亦良是以食脫魚及鱉者皆食橄欖本草綱目

又方

以脂麻油多灌取吐而愈衛生易簡方

又方

五倍子白礬末等分以水調下事林廣記

又方

槐花微炒與乾胭脂等分同搗粉水調灌之醫按

醫門醫品

中毒

卷三 二十一

中諸魚毒

鷄蘇煮濃汁飲之肘後方

食魚中毒

搗冬瓜汁飲之并解一切毒小品方

解諸魚毒及巴豆毒一切酒食毒

黑豆一升煮汁服得吐即愈衛生方

中鱉魚毒

食蟹即解董卿驗方

食魚蟹毒

橘皮去白煎湯飲之甚良

食鹽中毒

紫蘇煮汁飲二升。子亦効

又方

大蒜煮汁飲之

又方

生藕搗汁飲之

飲食毒

食一切物中毒

普門醫品

生韭汁服數升良

又方

細砂仁末水服一錢

又方

頭垢棗核大含之嚙汁能起

品方

解肉脯毒 凡肉密器蓋過夜者為鬱肉屋漏沾著

者為漏脯皆有毒素誤食者殺人

宜飲韭汁解之

食諸肉毒 吐下血不止療普者

胡荽子一升煮令發裂取汁冷服半升日夜各一

服即止

自死肉毒

故頭巾中垢一錢熱水服取吐

中牛馬毒

豆豉搗汁和人乳頻服之効

解燒酒毒

綠豆粉作索盪皮多食之即解

普門醫品

燒酒醉死

急以新汲水浸其髮外以舊布浸濕貼其胃脘仍

時時灌之醒乃已

蠱毒

中蠱胃脘痛脹為毒在上宜吐之

以熱水半盞入膽礬末五分通口服少頃以鵝翎

探吐毒物出盡自愈

中蠱腹中痛脹為毒在下宜瀉之

以鬱金末二錢空心米飲調下瀉去毒物自愈

卒中蠱毒或吐血或下血如爛肝者

苦瓠一枚水二升煮一升服之探吐即愈 肝後方

中諸蠱毒

伏龍肝末二兩水研服取吐即愈並治六畜肉毒千金方

又方

雄黃生礬等分端午日研化蠶九梧子大每服七丸念藥王菩薩七遍熱水下 蘇東坡良方

又方

普門醫品

中毒

卷三 二十四

白礬細茶等分爲末新汲水調下二錢得吐即効未吐再服 濟生方

又方

甘草節以脂麻油浸之年久愈妙每用嚼嚥或泡水服並治一切蠱毒 血品方

又方

薺荳根搗末水調服二錢立瘥 小品方

又方

馬兜鈴根一兩剉水二鍾煎一鍾頓服當吐蠱出

未盡再服或爲木水調服 肝後方

又方

密取山豆根和水研服少許未定再服已噤聲者亦愈 本草綱目

又方

以脂麻油多飲取吐即解 藥方

又方

白鷄血熱飲之 廣記

辟諸蠱毒

普門醫品

中毒

卷三 二十五

地栗晒乾爲末白湯調服二錢能辟蠱毒聞下蠱之家知有此物便不敢下

蠱毒入下血如蟬升或吐白或心腹疼痛如有物咬不即治者死

敗鼓皮燒灰酒服二錢當自汗蠱上注名 藥方

殺蠱蠱針蠱心腹脹疼口乾思水不能飲食悶當車落指半斤以煮酒新服之其毒即出 聖惠方

中蛇蠱毒飲食中得之咽中如有物不下注不出

心下熱悶者即是中毒

馬兜鈴一兩煎水服即吐出 崔行公纂要方

金匱要略

用石榴根皮煎濃汁服即吐出活蠱無不愈者 丹

藥論云方

人頭面上有光色人手近之如火燒者此中蠱也

搗蒜汁一小杯和酒服之當吐出如蛇狀 奇疾方

菴生毒 菴南有菴生之害于食食中行厭勝法魚

肉能反生于人及中人已死則陰發其家初得覺胃

腹疼次日刺人十日則生毒中矣

普濟醫品

中

卷三 二十六

凡胃膈疼即用升麻或膽礬吐之若膈下疼急以

米湯調礬金末二錢服即吐出惡物或合升麻礬

金服之不吐則下李異嚴為雷州推官鞠獄得此

方活人甚多 范石湖文集

藥炭毒 一方

治方

急移風涼處以清水灌之 唐瑞經驗方

藥箭毒 一方

治方

雄黃末敷之沸汁出愈 外臺秘要

蜈蚣毒 一方

治方

用雄雞剉血浸舌并嚥之 青囊雜案

普濟醫品

中

卷三 二十七

東武王化貞元起父編輯

門人陳斌憲卿父較閱

虛勞門

虛損勞瘵

論虛勞謂虛損與勞瘵也。虛損之證多由色慾過度喜怒不節起居不時飲食恣欲有所勞傷皆損其氣氣衰則火旺火旺則乘其脾土而胃氣散解不能滋營百脉灌注臟腑衛護周身故虛損之證

普門醫品

虛勞

卷十三

生焉其病則百脉煩疼腰脚痠軟胃滿氣短耳鳴目眩欬嗽寒熱交作盜汗遺精白濁殫泄食少無味不為肌膚或睡中驚悸午後發熱倦怠無力此皆虛損之候也

勞瘵因虛損之極精血耗竭遂成陰虛火動之病睡中盜汗午後發熱哈哈欬嗽倦怠無力飲食少進甚則痰涎帶血咯吐血身熱脉數肌肉消瘦此名勞瘵最重難治治之於蚤猶可望愈若到肌肉消鑠沉困着床脉沉伏細數則不可為矣又有

傳見勞瘵之證乃至戒門者有之

治勞瘵以滋陰降火為主王節齋論之詳矣顧人身精血自穀氣而生若脾虛不能輸運雖服滋陰之藥血亦不滋久服不已必致損胃胃氣一衰穀氣先絕尚何滋陰之望哉

薛立齋曰茲證係足三陰虧損虛熱無火之證故晝發夜止夜發晝止不時而作當用六味地黃丸為主以補中益氣湯調補脾胃若脾胃先損者當以補中益氣為主以六味地黃丸溫養肝腎多有

普門醫品

虛勞

卷十三

得生者若誤用黃藥音知母之類復傷脾胃飲食日少諸臟愈虛元氣下陷腹痛作瀉不可復為

虛損

二十方○十二卷服食門補益條可參看

滋陰降火湯 治陰虛發熱欬嗽吐痰喘急盜汗口乾此方與六味地黃丸相兼服之大補虛勞

當歸身酒洗白朮土炒白芍藥各一錢三分生地黃甘草炙乾薑煨黃藥音塩水炒各五分川芎熟地黃天門冬去心麥門冬去心各一錢知母塩水炒八分陳皮七分水二鍾薑三片棗一枚煎一鍾

去渣入竹瀝重便薑汁少許溫服。○骨蒸勞熱加地骨皮、柴胡各八分。薑汁加黃耆蜜炙、酸棗仁炒各一錢。○欬嗽加桑白皮炒、蜜炙各八分。○痰中帶血加牡丹皮七分、阿膠炒珠一錢、黃芩炒八分。○乾欬嗽無痰加片苓炒瓜、杏仁、貝母去心各八分。五味子十粒。○遺精加山藥、杜仲製各一錢。壯陽煖八分。破故紙七分。去天門冬、竹瀝方。

理主骨 治虛勞欬嗽唾血盜汗骨節酸痛口乾咽燥飲食無味常服髮白反黑齒落更生辟殺延年

普門醫品 虛勞 卷三 三

生地黃十六斤取汁人參去蘆一斤半白茯苓去皮三斤爲末白沙蜜一斤拌勻入瓶內箬封安砂鍋內桑柴火煮三日夜再換紙重封埋地中一日夜取起每以白湯煎服二匙 魏城申先生方

又方

以前方加天門冬麥門冬各去心枸杞子各末一斤甚妙 太醫院進御服食錄

六味地黃丸 治腎氣久虛盜汗發熱五臟齊損遺精便血消渴淋濁耳鳴目眩陰虛之證最宜服之

熟地黃八兩有痰者用薑汁焙乾山藥山茱萸酒蒸去核各四兩白茯苓去皮三兩澤瀉牡丹皮各二兩爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服七八十九空心鹽湯下。○若心腎不交消渴引飲加五味子二兩麥門冬去心三兩名腎氣丸。○兼補右尺加附子製肉桂各一兩名八味丸。

椒紅丸 治元氣傷憊目暗耳聾服此百日覺身輕少睡足有力是其効也服及三年心智爽悟目明倍常面色紅悅髮光黑

普門醫品 虛勞 卷三 四

劉椒去目及合口者炒出汗曝乾於竹筒中以木棍搗去裏面黃殼取紅用末盡再搗共取紅一斤以生地黃十斤搗自然汁三升於砂鍋中煎至一升候稀稠得時加取末九倍于大每空心熱酒下三十九合時勿令婦人雞犬見此方虛寒者宜服若有火人不宜 本草綱目

黃耆六一湯 治男婦諸虛煩悸焦渴面色萎黃不能飲食或先渴而後發瘧或先癰疽而後發渴金匱常服此藥終身可免癰疽之患

黃耆如箭幹者六兩一半生一半用鹽水潤濕飯上蒸透再潤再蒸共三次剉焙粉甘草去皮一兩半生半炙黃爲末每服二錢白湯點服蚤辰日午各一服煎服亦可外科精要

枸杞煎 補虛退熱輕身益氣一切癰疽永不發

枸杞二十斤春夏用莖葉秋冬用根實以水七斗煮取四斗以滓再煮二斗澄清去滓煎至如飴收之每早酒服一合千金方

補益虛損

普門醫品

虛勞

卷三十五

蘿摩四兩枸杞根皮五味子各一兩栝子仁去油取霜酸棗仁炒生地黃各三兩爲末每服二錢酒下日三服千金方

一切脾胃虛損少食羸弱倦怠嗜臥元氣不足等證

用白朮製一斤人參去蘆四兩切片以長流水十

五碗浸一夜煎汁六七碗取起再入水五碗煎取

三碗如此三次合前後汁濾淨同煎成膏入煉蜜

四兩收之白湯點服集驗方

面黃無血色食少嗜臥

蒼朮製一斤熟地黃半斤乾薑炮冬一兩春秋七錢夏五錢爲末糊丸梧子大每溫水下五十丸清生校方

補虛羸潤肌膚填骨髓能肥健人肥人勿服

黑豆一斗蒸爛鋪席以蒿覆之如會稽法待上黃取出晒乾搗末鍊猪脂丸梧子大每服百丸溫酒下神驗秘方也扁鵲遺方

虛損腰脚無力

莊子一升陳爭蒸兩時久暴乾去黑皮炒黃色搗

普門醫品

虛勞

卷三十六

粉安息香二兩水煮百沸去赤色和搗爲丸

梧子大如乾入少蜜下三十九丸以乾

飯三五匙壓之佳

腎虛腰脚無力

生果袋盛懸乾每旦喫十餘粒大喫倍腎補助之

果須細嚼連液吞嚥則有益若單食至飽反傷脾

胃莊子

心虛氣損羸弱乏力飲食減少及怔忡不寐等證

用猪腰子一枚水二碗煮至一碗半切碎入人參

膏歸身酒洗各半兩煮至八分于午前以腰子喫之將汁送下未盡者同渣作丸服百一選方

脾胃虛損久瀉少食

糯米一升水浸一宿漚乾慢火炒熟磨細入乾山藥末一兩調勻每日侵辰用半盞入沙糖二匙胡椒末少許以極滾湯調食大有滋補久服精暖有子松蘿經驗方

精虛無子

黃精枸杞子等分搗作餅日乾爲末煉蜜爲丸梧

普門醫品

虛勞

卷三 七

子大每空心熟水下五十九奇効良方

太乙金鎖丹 秘精益髓

五色龍骨煨覆盆子炒各五兩蓮花藥末開者陰

乾四兩鼓子花三兩五月五日之雞頭實一百

顆爲末以金櫻子二百顆去毛木白中搗爛水七

升煎汁一升去渣再熬和藥料二千餘下丸梧子

大每空心鹽酒下三十九至百日永不泄欲泄先

以冷水調車前子末半兩服之忌菜菜瑞竹堂方

交感丹

虛損黑鬚髮固精益氣令人有子

茅山蒼朮刮淨一斤分作四分用酒醋米泔鹽湯各浸七日晒研川椒小茴香各四兩炒研陳米糊丸梧子大每服四五十丸空心溫酒下聖濟總錄

四聖不老丹 強筋壯骨益壽延年

松脂一斤以無灰酒沙鍋內桑柴火煮數沸以桑枝攪稠乃住火傾入水內結塊復以酒煮九遍其脂如玉不苦不澁乃止爲細末十二兩入白茯苓黃菊花梧子仁去油取霜各半斤爲末鍊蜜丸如梧子大每空心好酒送下七十二丸須擇吉日修

普門醫品

虛勞

卷三 八

合勿令婦人雞犬見之白雲隱方外奇方

還少丹 固齒牙壯筋骨生腎水鬚髮反黑齒落更生年少服之至老不衰

蒲公英一斤連根帶葉洗淨勿令見日晾乾斗子

搥一兩香附子炒五錢二味爲細末入蒲公英內

淹一宿分爲十二團以皮紙三四層裹定用蚯蚓

泥如法固濟入甕焙乾乃以武火煨通紅爲度冷

定取出去泥爲末早晚擦牙漱之吐嚥任便久久

方効

瑞竹堂方

清中益氣湯 治見論

方見五卷內傷門

勞瘵 二十方

五勞七傷虛羸乏力

羊腎一對去脂切肉從蓉一兩酒浸一夕去皮和作羹下葱鹽五味食之 本草綱目

又方

羊肉山藥各一斤煮爛下米煮粥常食 飲膳正要

男婦怯證

普門醫品

虛勞

卷三 九

男用童女便女用童男便斬頭去尾日進二次乾

燒餅壓之月餘愈 聖惠方

虛勞骨蒸欬嗽

鹽一箇柴胡前胡貝母去心知母杏仁去皮尖各

五錢同煮待熟去骨甲再煮食肉飲汁將藥焙研

爲末仍以骨甲煮汁和丸梧子大每空心黃耆湯

下三十九日二服服盡仍以參耆藥補之 聖惠方

勞瘵失血欬嗽

山龜煮取肉和葱椒醬油煮食補陰降火婦用經

驗便民十療

骨蒸發熱

用三五歲童便五升煎取一升以蜜三匙和之每服一盞半日更服此後常取自己小便服之輕者二十日重者五十日瘥 孟詵心方

又方

猪脊髓一條猪膽一枚取汁童便一盞柴胡前胡烏梅胡黃連各一錢韭白七根同煎七分溫服不過三服其効如神 瑞竹堂方

普門醫品

虛勞

卷三 十

骨蒸勞瘦

鰾鱧二斤治淨酒二盞煮熟入鹽醋食之 聖惠方

戊戌丸

治男婦諸虛不足骨蒸潮熱等證

黃耆剉一隻去皮毛鴨肚同炒于砂鍋內用酒醋八升水二斗入地骨皮一斤黃連肉從蓉各二兩同煮一日去渣再煮一日去渣再煮肉如泥連湯入宮中連肉去皮以蜜各一斤厚朴製搗皮各末十兩甘草炙末八兩同研下丸梧子大每空心鹽酒下六七十丸 聖惠方

地僊散 治虛勞發熱及一切病後發熱

地骨皮二兩防風一兩甘草炙半兩每用五錢生

薑五片水鍾半煎七分溫服

虛勞發熱口乾小便澀

萎蕤五兩煎汁時時飲之

勞熱如燔

地骨皮二兩柴胡一兩為末每服二錢麥門冬湯

下聖濟方

男子色慾過度虛火上炎骨蒸盜汗陽舉不萎遺精

普門醫品

虛勞

卷三十一

白濁

用無病婦人乳三酒盃將磁螺曬極乾置乳于中

入麝香末少許水香末一分調勻服後飲濃茶半

盞即陽敗次日服泥元丹

混元丹 治虛勞怯弱延年補損其功不可盡述

用紫河車一具米泔水洗淨砂鍋內入無灰酒煮

爛再添酒化盡慢火熬成膏加麝香末一錢搗用

沉香硃砂另研水飛各一兩人參去蘆肉菟絲酒

浸炙白茯苓各三兩乳香另研安息香酒淘去砂

石各二兩為細末入河車膏和勻杵千百下丸梧

子大每服七丸空心沈香湯或溫酒送下

勞氣欲絕

麥門冬去心一兩甘草炙二兩梗米半合聚二枚

竹葉十五片水二升煎一升分三服

河車丸 治婦人勞瘵欬嗽虛損骨蒸等證

紫河車初生男子者一具以長流水中洗淨蒸爛

入山藥末二兩人參去蘆一兩白茯苓三兩為末

酒糊丸梧子大麝香養七日每服三五十丸溫湯

普門醫品

虛勞

卷三十一

下承鍾鈴方

婦人憔悴困倦喘滿虛煩翁翁少氣發熱多汗口乾

舌澀不思飲食名曰血風勞

五加皮牡丹皮赤芍藥當歸各一兩為末每用一

錢水一盞用青錢一文蘸香油入藥煎七分空心

溫服常服能肥婦人

斬三尸法

常以庚辰日去手爪甲午日去足爪每年七月十

六日將爪甲燒灰和水服之三尸九蟲皆滅一云

甲寅日三尸遊兩手剪去手爪甲甲午日三尸遊
兩足剪去足爪甲 太上玄科

退取勞蟲

用啄木禽一隻餓一晝夜將硃砂精豬肉各四兩
和勻飼之至盡以鹽泥固濟煨一夜五更取出勿
打破連泥埋土中二尺次日取出破開入銀石器
內研末以無灰酒入麝香少許作一服須謹候安
排待蟲出速鉗入油鍋煎之 玄雲經方

明月丹 治全上

普門醫品

虛勞

卷十三 十三

兔屎四十九粒兩砂如兔屎大四十九粒生蜜丸
梧子大月望前以水浸甘草一夜五更時取汁頓
溫送下七丸若有蟲下急鉗入油鍋內煎之三目
不下再服 備此方

天靈蓋散 治全上

用天靈蓋日久腐爛者中有一片如三指闊者以
檀香煎湯洗過酥炙一氣呪七遍曰雷公神電母
聖逢傳尸便湏定急急如律令爲末加尖檳榔五
枚阿魏二分麝香甘遂各三分俱爲末每服三錢

用童便四升入銀石器內以葱白薤白各十四莖
青蒿二握葱枝甘草各二莖五寸長柳枝酸榴枝
桑枝各二莖七寸長同煎至一升分作二次五更
初調服前藥一服蟲不下約人行十里又進一服
天明再進一服取下蟲物名我不一急鉗入油鍋
煎之可斷傳染之患虫青赤黃色可治黑色難
治 上清經方

怔忡驚悸門

附健忘

普門醫品

虛勞

卷十四 十四

論怔忡謂心中惕惕搖動而不得安靜無時而作
者是也驚悸者暮然而跳躍忽聞聲而即驚或觸
事而即悸有時而作者是也其爲證雖小異其爲
治則大同皆不外乎心肝膽過勞傷觸也
丹溪曰驚悸多是血虛有虛便動則虛也時作時
止者痰因火動瘦人多是血少肥人只是痰多時
覺心跳者亦是血虛
鬱痰留飲積于心胃胃口而致驚悸怔忡者有之
又不可藥以虛治虛者養心安神有痰者宜豁痰

或用吐法大便結而脉實者以硃砂滾痰丸下之
一服不愈再服無不愈者

通治

硃砂安神丸 治心神昏亂驚悸怔忡夜臥不安

朱砂另研飛黃連各半兩生地黃三錢當歸酒洗

甘草炙各二錢爲細末酒泡蒸餅爲丸如麻子大

朱砂爲衣每服三十丸臥時津液下

溫膽湯 治心膽虛怯怔忡多驚

半夏製枳實麩炒遠志製白茯苓陳皮各一錢甘

普門醫品

卷三 十五

草炙五分竹茹一丸水鍾半薑三片棗一枚煎七

分食遠溫服

硃砂消痰飲 治痰迷心竅驚悸不寧

牛膽南星半兩朱砂飛減半麝香二分另研爲細

末臨臥薑汁調服一錢

朱雀丸 治心病怔忡不止

白茯苓二兩沉香半兩爲細末煉蜜爲丸綠豆大

朱砂爲衣每服三十丸臥時人參湯下

琥珀定志丸 治心膽虛驚神不守舍妄言妄見恍惚

惚不定

南星半斤先將地掘一坑用炭火十八斤在坑內

燒紅去灰淨好酒十斤傾入坑內安放南星以瓦

盆扣住周圍以炭火擁定勿令泄氣次日取出爲

末琥珀一兩皂角水洗辰砂飛二兩猪心一箇剖

開入內用線縛住懸胎酒煮一時取出爲末人乳

數碗入瓦盆內勿攪動四圍晒乾刮放一處乾則

再刮乳乾用薑汁拌勻再晒乾用三兩人參去蘆

白茯苓去皮白茯苓神去皮木各三兩石菖蒲二兩

普門醫品

神驚悸

卷三 十六

猪膽汁煮過晒乾用共爲極細末煉蜜九梧子大

每夜卧時鹽湯送下五十丸

心虛驚悸羸瘦

荆瀝二碗煎至碗半分三次食遠服之

心病邪熱驚悸顛癇

猪心一箇不落水剖取血散花一匙硃砂飛一兩

同研九梧子大每二十九臨臥溫酒下

怔忡自汗心氣不足也

猪腰子二箇去膜切碎水一盞煎至蠶半入人

參去蘆。當歸酒洗。各半兩。細切。同煎至八分。空心喫腰子。以藥汁送下。其渣焙乾爲末。以山藥末作糊。丸綠豆大。每五十九。食遠棗湯下。百一選方。

寧志膏 治因驚失志

人參去蘆。酸棗仁泡去皮。紙炒。辰砂另研飛。各半兩。滴乳香焙一錢。研細末。煉蜜丸。彈子大。每一丸臨臥薄荷湯磨服。

夜間識語

用新死者供。早上果子。啖之。卽止。本草拾遺

普門醫品

杜仲驚悸

卷三 十七

朱砂滾痰丸 治見論

方見六卷痰飲門

附健忘四方

預知散 治健忘驚悸

虎骨酥炙。白龍骨煨。遠志肉製。等分爲末。生薑湯

調服二錢。日三服。久則令人聰慧。永類方

健忘

七月七日。采麻花一升。人參去蘆二兩。蒸令氣通。

晒乾研末。臨臥水服二錢。能盡知四方之事。永不

遺忘 范汪方

怔忡健忘。心昏喜臥。及心虛驚悸惶惑。

取牛馬猪羊雞犬心乾之爲末。向日酒服二錢。日三服。聞一知十。外臺方

治健忘。補中益心志。聰明耳目。

蓮子泡去心皮。爲粉。粳米二合。煮粥候熟。入蓮子粉攪勻。再煮二三沸。食之。易簡方

虛煩不寐門

附多眠

普門醫品

虛煩不寐

卷三 十八

論虛煩者。心胃煩擾而不寧也。巢氏病原曰。心煩

不得眠者。心熱也。但煩不得眠者。膽寒也。若病後

心煩。多是虛證。宜人參竹茹湯。酸棗仁湯。

凡病後及產後。或憂思過度。而不眠者。皆血氣虛

所致。卽有痰火。亦須以補養爲君。而畧佐以清痰

火之藥。其不因病後而不眠者。則以痰火處治。亦

必佐以養血補虛之藥。方爲當也。

通治八方

人參竹茹湯 治胃口有熱。吐逆虛煩不安。

人參去蘆半錢製竹茹各一兩分作五劑每劑水一銀匙三片煎八分臨臥溫服三因方

膽虛不眠

馬頭骨灰乳香各一兩酸棗仁炒二兩爲末每服

二錢食遠溫酒服聖惠方

骨蒸不眠心中煩躁

酸棗仁一兩水二盞研絞汁下粳米二合煮粥候

熟下地黃汁一合再煮勻食遠服聖惠方

振悸不眠

普門醫品

虛煩不寐

卷三十九

酸棗仁炒二升白茯苓白朮炒人參去蘆各二兩

生薑六兩水八升煮三升分十分食遠或臥時溫

服聖惠方

又方

酸棗仁炒香人參去蘆各一兩辰砂另研飛半兩

乳香焙二錢半煉蜜九梧子大每四十九龍眼煎

湯下或只以酸棗仁炒研二錢竹葉煎湯調服和劑方

心虛自汗不寐

積諸心一箇不見水帶血破開入人參當歸各二

兩煮熟去藥食遠服之不過數服全愈證治要訣

酸棗仁湯 治病後虛勞煩擾不得眠或發寒熱頭

疼運悶

酸棗仁炒一兩人參去蘆桂心各一錢知母炒白

茯苓各三錢石膏煨半兩甘草炙二錢每服七錢

水二盞薑三片棗一枚煎八分食遠溫服

大病後虛煩晝夜不睡心中多驚

酸棗仁榆白皮各炒等分爲末煎汁溫服

普門醫品

虛煩不寐

卷三十九

〔附〕多眠二方

昏沉喜眠者膽熱也

馬頭骨灰鐵粉各一兩朱砂飛半兩龍腦半分爲

末蜜九梧子大每三十九食遠竹葉湯下聖惠方

又方

用白芎葉煮熟食之令人齒白聰明少寐更解酒

毒及一切熱毒玉誥方

汗證門

自汗盜汗

論心之所藏。在內為血。發外為汗。蓋汗乃心之液。而自汗之證。本有不由心腎俱虛而得之。故陰虛陽必奏。發熱而自汗。陽虛陰必乘。發厥而自汗。皆陰陽偏勝所致也。

自汗陽虛。當補氣以衛外。盜汗陰虛。當滋陰以榮內。衛者陽氣。榮者陰血。治陽者人參黃芪防風桂枝之類。治陰者當歸地黃黃蘗黃精之類。

盜汗者。睡中汗出也。不睡則不能汗出。方其睡熟也。奏奏然出焉。覺即止而不復出矣。非若自汗之

普門醫品

汗證

卷二十一

無時自出也

自汗

十七方

諸虛自汗

補中益氣湯

方見五卷內傷門

加麻黃根浮麥各

一錢製附子四分內升麻柴胡俱用蜜水炒

又方

鬱金為末。臥時蜜調塗於乳上。

集簡方

又方

何首烏末。津調封臍中。

集簡方

又方

粳米粉。絹色頻頻撲之。

本草綱目

中湯

治表虛自汗

官桂五分白芍藥炒二錢日干一錢水二盞煎

三片棗一枚煎八分食遠溫服

仲景方

玉屏風散

治全上

防風黃耆酒炙各一錢白朮炒二錢水鍾半薑三

片煎七分食遠溫服

牡蠣散

治諸虛不足及大病後體虛津液不固常

普門醫品

汗證

卷二十一

常自汗

黃耆酒炙麻黃根牡蠣煅醋淬各一錢半水鍾半

加小麥百粒煎八分食遠溫服

本草方

又方

浮小麥文火炒為末每服三錢食遠米飲下日三

服或煎湯代茶飲炒

衛生寶鑑

又方

糯米麥麩同炒為末每服三錢食遠米飲下或者

猪肉點食

本草綱目

大病後及傷寒後虛弱日夜汗出不止口乾心躁

黃雌雞一隻治淨麻黃根一兩水七大盞煮汁三

大盞去滓及雞用肉蓯蓉酒浸一宿刮淨一兩牡

蠣煨粉二兩煎取一盞半一日服盡聖惠方

病後虛汗

杜仲製牡蠣煨等分爲末每服三錢食遠熱水調

服肘後方

自汗不止

白朮炒爲末每用二錢米飲調服日二服或以白

朮同小麥水煮乾去麥爲末每服二錢黃耆湯下

千金方

撲法止汗

敗蒲扇燒灰和粉撲之溫汗酒服一錢藏器本草

又法

牡蠣煨麻黃根天花粉白芷糯米粉敗蒲扇燒灰

爲細末用綿包裝撲身上證治要訣

又法

麻黃根牡蠣煨各一兩赤石脂煨龍骨煨各半兩

爲細末絹袋盛撲之

別處汗出心孔有汗思慮多汗亦多者宜養心血

以黃耆白茯苓末二錢服之日二服證治要訣

膚出血汗

郁李仁去皮炒研一錢烏梨搗汁調下聖濟總錄

證治要訣

當歸大黃湯治盜汗之聖藥

當歸酒洗生地黃熟地黃黃連黃芩炒黃礬音各

一錢黃耆酒炙二錢水二鍾煎八分食遠溫服或

普門醫品

加澤麥麻黃根各八分本草綱目

氣虛者

牡蠣煨杜仲製等分爲末蜜丸梧子大每服五十

丸食遠溫水下普濟方

又方

椒目微炒碾細一錢以生豬上唇煎湯一合睡時

調服無不効宗爽方

又方

酸棗仁炒人參去蘆白茯苓等分爲末每服二錢

食遠米飲調下 簡便方

脾虛盜汗

白朮炒四兩，切片。以一兩同牡蠣炒，一兩同石斛炒。一兩同小麥炒，一兩同五倍子炒，揀木為末。每服三錢，食遠米湯下。日三服。 丹溪方

又方

麻黃根，牡蠣煅為末，和勻撲之。 陶氏景方

又方

五倍子研末，津調填臍中，縛定，一夜即止。 集靈方

普門醫品

汗證

卷二 二十五

黃耆六一湯 治陰陽俱虛而盜汗

黃耆酒炙六錢，甘草炙一錢，水二盞煎一盞，食遠

溫服 本草綱目

虛勞盜汗煩熱口乾

青蒿一斤，取汁熬別膏，入人參去蘆，麥門冬去心，

各末二兩，九如梧子大，每食後米飲下三十丸。 聖

濟總錄

盜汗及遺精

鹿角霜二兩，龍骨煅，牡蠣煅各一兩為末，酒糊丸

梧子大每空心鹽湯下四十丸 普濟方

普門醫品

汗證

卷二 二十六

普門醫品卷之十四

東武王化貞元起父編輯

門人陳斌憲卿父較閱

失血門

吐血 咯血 唾血 衄血 九竅出血
瀉血 便血 舌上出血 汗出如血

論一切血證皆屬於熱。俱是陽盛陰虛火載血土錯經妄行而為逆也。血隨氣行氣逆則血逆鮮血者新血也宜止之紫黑成塊者瘀血也宜去之

戴氏曰瘀血者嗽出痰內有血者是嘔血者嘔出

普門醫品

失血

全血

全是血者是咯血者每咯出皆是血疙瘩衄血者鼻中出血也溺血小便出血也下血大便出血也雖名色不同俱是熱證但有虛實新舊之不同或妄言為寒者誤也

吐血

二十六方

卒暴吐血

石灰于刀頭上燒過研細井水調服二錢 普濟方

又方

伏龍肝末一升新汲水一升淘汁去渣和蜜飲之

効廣利方

又方

藕節荷蒂各七箇搗爛水二鍾入蜜少許煎入分

溫服 聖惠方

又方

百草霜五錢槐花炒二兩為末每服二錢茅根湯下 本草綱目

又方

龍骨煨末吹鼻 梅師方

普門醫品

失血

卷四 二

又方

黃藥 蜜炙為末麥門冬湯調服二錢 經驗方

勞心吐血

蓮子心七箇糯米二十一粒為末空心服 臨安張上舍方

又方

嫩荷葉七片搗水服甚佳 本草綱目

又方

乾荷葉生蒲黃等分為末每服三錢桑白皮湯調

下 本草綱目

氣鮮吐血

香附炒為末，童便調服二錢，丹溪方

肺損吐血

九節菖蒲為末，白麩等分，每服三錢，新汲水下，一日一服，聖濟方

又方

阿膠炒碎三錢，木香一錢，糯米炒一合半，為末，每服一錢，白沸湯點服，日一服，普濟方

普門醫品

失

卷四 三

肺熱吐血

新百合搗汁和水飲之，煮食亦可，衛生易簡方

又方

杏仁四十箇，去皮尖，以黃蠟炒黃，研入青黛一錢

作餅，用柿餅一箇破開，包藥，紙裹煨熟食之

丹溪方

男女吐血

地榆三兩，米醋一升，煮十餘沸，去渣，食前稍熱服

一合 聖惠方

吐血不止

好墨磨汁，同萊菔汁飲，或生地黄汁亦可，集簡方

又方

鍋底墨炒研細，井花水服三錢，連服三服，清急方

又方

白及為末二錢，米飲調服，其效如神，凡血吐在水內，浮者為肺血，沉者為肝血，半浮半沉為心血，各隨所見，以羊肺、羊肝、羊心煮熟，蘸白及末，日日食之，洪邁夷堅志

普門醫品

失

卷四 四

又方

白鷄冠花醋浸煮，晒研，每服二錢，熱酒下，經驗方

又方

白茅根一握，水煎服之，千金方

又方

白綿紙五張，燒存性，溫水服，效不可言，普濟方

吐血下血如湧泉不止，須臾不救

人參去蘆焙，側柏葉蒸焙，荊芥穗燒存性，各五錢為末，每用三錢，入飛羅麪二錢，以新汲水調如稀

粥服少頃再服立止 華陀中藏經

吐血似鷲鴨肝者

生犀角生桔梗各一兩爲末每服酒下二錢 總錄

吐血衄血唾血

鬱金末二錢加韭汁薑汁童便同服其血自清痰

中帶血者加竹瀝 震亨方

虛勞吐血困憊者

人參去蘆一兩肥棗五枚去核水二鍾煎一鍾服

後熟睡一覺生意勃然 十藥聖書

普門醫品

失血

卷五

吐血及傷胎產後崩漏金瘡拔血一切去血過多心

煩眩暈悶絕不省人事

當歸二兩芍藥一兩分作四服水七分酒三分煎

七分熱服日再服神效 婦人良方

咯血唾血 二十

槐花散

槐花炒研三錢糯米飲下仰臥一時取效 朱氏方

又方

柳絮焙研米飲服一錢 紅靈方

又方

熟艾二兩燒灰每服三錢溫水下 千金方

又方

三七一錢嚼爛米湯下 瀕湖集簡方

又方

紅綿二寸燒灰水服 聖惠方

又方

黃明膠炙黃新結燒研各一兩每服一錢食後米

飲服之日再 食療本草

普門醫品

失血

又方

黃藥子蒲黃等分爲末掌中舐之 百一選方

又方

白藥子燒存性糯米飲服三錢 聖惠方

海犀膏 治咯血

水膠一大片炙黃塗酥再炙研末用白湯化三錢

服之卽止 十門方

又方

白膠香焙銅青各一錢爲末入乾柿 市音 內紙包煨

熟食之 淡紫方

咯血煩熱不寧者

青黛二錢新汲水調服 聖惠方

又方

白芍藥炒末一兩犀角末二錢半新汲水調服二錢血止爲限 古今錄驗

又方

栢葉炒乾研末米飲服二錢水煎服亦可 聖惠方

又方

普門醫品

失血

卷四

生地黃汁一升二合白膠香二兩以磁器盛入甑蒸令膠消服之 梅師方

又方

生荷葉生艾葉生栢葉生地黃等分搗爛丸如彈子大每一丸水一盞煎三沸去渣食遠服 濟生方

蒲黃散 治全上

蒲黃末二兩溫水或冷水服二錢妙 簡要濟衆方

唾血不拘老幼

阿膠以蛤粉炒成珠一兩辰砂少許爲末藕節搗

汁入蜜調服 經驗方

唾血不止

阿膠炒二兩蒲黃二合生地黃二兩水五升煮三升分六服 千金翼方

又方

鼈甲蛤粉各一兩同炒色黃去蛤粉不用熟地黃晒乾一兩半爲末每服二錢食後茶下 聖濟方

又方

蠶蛻紙燒存性蜜丸如芡實大含化嚙津 集驗方

普門醫品

失血

卷四

吐血 三十二方

勝金方 治鼻衄

取葱汁入酒少許滴鼻中卽覺血從腦散下 本草綱目

又方

蘿蔔搗汁半盞入酒少許熱服并以汁注鼻中良衛生易簡方

又方

五倍子末吹之仍以末同新綿灰等分米飲服二

錢本草綱目

又方

硼砂為末一錢水服立止 集簡方

又方

蓖麻葉油塗炙熱熨額上大驗 蘇恭方

又方

生葛搗汁一盞頓服瘥 聖惠方

又方

青黛蒲黃各一錢新汲水服之或去青黛入髮灰

普門醫品

失立

卷十四 九

一錢生地黄汁調下 簡便方

又方

蝟皮一枚燒末半錢綿裹塞之 聖惠方

衄血吐血

川鬱金末井水服二錢甚者再服 恭居士易簡方

衄血不止

用白紙一張以接衄出之血令滿於燈下燒灰作

一服新汲水下勿令病人知 普濟方

又方

櫻櫚燒灰隨左右吹之 恭居士方

又方

麥門冬去心生地黄各五錢水二鍾煎八分服立

止或以新麥門冬取汁入蜜服之尤妙 活人心統

又方

槐花烏賊魚骨等分半生半炒為末吹之 普濟方

又方

栢葉千葉榴花各等分晒乾研末吹之 普濟方

又方

普門醫品

失立

卷十四 十

車前草搗汁飲之即止 圖經本草

又方

韭根葱根同搗棗大寒入界中頻効 千金方

又方

以大蒜搗貼足心衄止即拭去 本草綱目

又方

芥子研末水調塗額上即止 聖惠方

又方

雞矢取有白色半截者燒灰吹之 唐氏經驗方

又方

紙條蘸真麻油入鼻取嚏即止 普濟方

又方

蛤粉一兩研羅七遍槐花半兩炒焦研勻每服一錢新汲水調下 楊氏家藏方

又方

亂髮燒灰吹之立止永不發男用母髮女用父髮 本草綱目

又方

普門醫品

失血

卷五 十一

新汲水隨左右洗足即止累用有驗 本草綱目

又方

用冷水浸紙貼額上以熨斗熨之立止 葉氏方

又方

白瓷細末吹少許立止 經驗方

又方

濃墨汁滴入鼻中即愈 梅師方

又方

百草霜 即龜額上及突中煙墨與鍋底墨不同 未

少許吹入立效 本草綱目

鼻不止五七日不住者

人中白新瓦焙乾一錢入麝香少許溫酒調服立効 經驗方

又方

用艾燒灰吹之以艾葉煎服亦可 聖惠方

又方

當歸焙研末每服一錢米飲調下 聖濟錄

又方

普門醫品

失血

卷五 十一

萱草根汁一大盞和生薑汁半盞細呷之 宗奭方

鼻衄眩冒欲死

龍骨煨末吹之甚效 梅師方

〔九〕痰吐血 十一方

蒲艾湯

蒲黃阿膠炒珠艾葉各半兩每二錢水一盞生地

黃汁一合煎六分溫服急以帛繫兩乳止乃已 聖惠方

又方

又方

荆葉搗汁酒和服二合千金方

又方

用白麴入鹽少許冷水調服三錢普濟方

又方

荆芥穗煎酒通口服之或以荆芥燒過蓋地上出

火毒研細陳米飲調下更效直指方

又方

古牆頭苔按塞之海上方

又方

普門醫品

失血

卷四 十三

冷水嚥面即止葉氏方

又方

龍骨煨末吹鼻甚効梅師方

又方

人中白雞子大一團綿五兩燒研每服二錢溫水

服聖惠方

九竅出血服藥不止者

瞿麥穗一握梔子三十箇去皮炒黑生薑一塊甘

草炙半兩燈草一小把大棗五枚水二碗煎碗半

溫服聖濟總錄

方

生地黄汁半升生薑汁半合蜜一合和服聖惠方

又方

頭髮敗壞陳蓮蓬各燒存性等分每服三錢木香

湯下聖惠方

瀉血二十一

小便出血

蒲黃髮灰等分生地黄汁調下聖濟總錄

普門醫品

失血

卷四 十四

又方

葱白一握鬱金一兩水一升煎二合溫服日三次

本草綱目

又方

金陵草即旱蓮草車前草各等分杵取自然汁每

空心服三杯愈乃止醫學正傳

又方

車前草搗汁五合空心服外臺秘要

又方

荊芥穗縮砂炒等分爲末糯米飲服三錢集簡方

又方

香附子炒新地榆等分各煎湯先服香附湯三五呷後服地榆湯至盡未止再服以止爲度指迷方

小便尿血

胡麻一升杵末以東流水二升浸一宿平旦絞汁

頓熱服千金方

又方

五倍子末鹽梅搗和丸梧子大每空心溫酒服五

晉門醫品

失血

本草

十九集簡方

又方

栢葉黃連焙研空心溫酒服三錢醫方

又方

槐花炒鬱金煨各一兩爲末每服二錢空心淡豉湯下立効中秘寶方

又方

鮮地骨皮洗淨搗自然汁無汁則以水煎汁每服一盞入酒少許食前溫服簡便方

又方

綠刺二升水四升煎二升空心分服外臺秘要方

又方

荊葉取汁二合空心酒和溫服千金方

又方

籬下竹根入土多年者不拘多少洗淨煎湯空心連服數鍾即止救急方

又方

烏梅燒存性研末醋糊丸梧子大每服四十丸空

晉門醫品

失血

本草

心溫酒下本草綱目

又方

茅根煎湯頻飲爲佳談楚翁方

又方

玄胡索末一兩朴消七錢每四錢水一鍾煎七分空心溫服活人書

又方

當歸四兩酒三升煮取一升空心頓服肘後方

小便尿血及不通者

高莖菜搗敷臍上即愈 楊氏方

虛勞尿血

鹿角膠炙為末每三錢空心熱水和服 外臺方

小便血條

淡豆豉一握煎湯空腹飲入少酒佳 危氏得効方

便血 五十二方

諸般下血腸風血痔等證

賈衆去皮毛剉焙為末每服二錢米飲下或燒存

性為末入麝香少許照前服亦妙 普門醫品

普門醫品

又方

香附子炒末二錢百草霜一錢麝少許米飲下 厚禮方

大腸下血

三七末二錢空心淡白酒調服三服即愈或以一錢入四物湯煎服亦可 四物湯方見

三十三卷調經門

又方

黃藥一錢以絞乾存性五錢為末每服三錢五更

米飲下天明再服當日見效忌油膩毒物

又方

黃耆蜜炙黃連等分為末糊丸綠豆大每三十九

空心米飲下 聖濟總錄

又方

荆芥炒為末空心米飲服二錢婦人酒下 經驗方

又方

荆芥穗二兩槐花一兩同炒紫為末每服三錢空

心清茶下 聖濟總錄

普門醫品

又方

百藥煎荆芥穗各燒存性等分為末糊丸梧子大

每服五十九空心米飲下 聖濟總錄

又方

雞冠花榜根白皮炒等分為末煉蜜九梧子大每

三十九黃耆湯下日二服或只用白雞冠花并子

煎服 聖濟總錄

金虎九 治下血

黃藥一兩去皮雞子白塗炙為末水丸綠豆大

每服七丸。空心溫水下。普濟方

神效散 治全上

皂莢子。槐實各一兩。用鹽炒香。去糠爲末。空心

陳粟米飲下一錢。普濟方

無故遺血

亂髮。爪甲。燒灰。酒服二錢。千金方

下血不止

新槐花炒研。酒服三錢。日三服。或以槐白皮煎湯

調下。更妙。普濟方

普門醫品

失血

卷四 十九

又方

櫻爛皮半斤。枯樓一箇。各燒存性。每服二錢。空心

米飲調下。百一選方

又方

枳殼炒黑。存性。五錢。羊腰骨燒存性。三錢。五更米

飲調服四錢。如人行五里。再一服。卽効。普濟方

又方

臭橘核。檳根白皮。等分。同炒研。每服一錢。空心皂

莢子煎湯調服。本草綱目

大瀉下血及酒痢下血不止

烏梅肉燒存性。研末。醋糊丸。梧子大。每服四十丸。

空心溫酒下。普濟方

積年下血

寒食蒸餅。烏龍尾。即舊時灰各一兩。皂角七挺。去

皮。弦酥炙爲末。蜜丸。綠豆大。每空心米飲下二十

丸。聖惠方

遠年下血

卷栢。地榆焙。等分。每用一兩。水一盞。煎數十沸。空

普門醫品

失血

卷四 二十

心溫服。百一選方

糞後下血

萱草根。和生薑油炒。沖酒服。聖濟總錄

又方

木香。黃連。等分。爲末。人肥猪大腸內。兩頭紮緊。煮

極爛。去藥食腸。或連藥搗丸服。保壽堂方

又方

茶葉內。箬葉燒存性。每服三匙。空心糯米湯下。或

入麝香少許。百一選方

又方

旱蓮草瓦上焙研末。每二錢空心米飲下。經驗方

又方

羊蹄根洗切用連皮老薑各半盞同炒赤。以好酒
浸之。盤少頃去渣任意飲。永類鈴方

又方

骨碎補存性五錢為末。空心米飲下。仁存方

又方

大蒜五七枚去皮研膏。入豆豉搗丸。梧子大。每服

普門醫品

失血

卷十四 五二

五六十丸。空心米飲下。無不愈者。本草行義

腸風下血

活鯽魚一尾。去腸留鱗。入五倍子末填滿。泥固燒

存性為末。酒服一錢。或飯丸。日三服。日一方

又方

經霜茄連蒂燒存性為末。每日空心溫酒服二錢。

米飲亦可。只川蒂更妙。靈苑方

久病腸風下血

地榆五錢。蒼朮炒一兩。水二鍾煎一鍾。空心溫服

活中機要

又方

何首烏二兩為末。每服二錢。食前米飲下。聖濟方

腸風下血。積年不止。虛弱甚者。一服見効。

皂礬四兩。入砂礮內。蓋定。鹽水固濟。煅赤。取出。入

青鹽船上。硫黃各一兩。研勻。再入礮中。固濟煅赤。

取出。去火毒。研。入熟附子末一兩。粟米糊丸。梧子

大。每空心服三十丸。酒飲任下。永類鈴方

腸風痔漏脫肛瀉血。日久面色痿黃

普門醫品

失血

卷十四

五二

白朮炒一斤研末。生地黃半斤。酒洗飯上蒸熟。湯

和。再加酒糊丸。如梧子大。每服二十丸。米飲下。日

三服。普濟方

腸風下血。諸藥不效者

乾山檳去核為末。空心艾湯調下。應手愈。百一

聖方

腸風臟毒下血

猪大腸一條。入黃連末二兩。在內。紮緊。煮爛。搗丸

如梧子大。每空心米飲服三十丸。普濟方

又方

百藥煎燒存性烏梅連核燒存性白芷各等分爲末糊丸梧子大每服七十九空心米飲下衛生方

又方

豬臟一條入槐花末令滿扎定以醋煮爛搗丸梧子大每二十丸空心溫酒下奇効方

臟毒下血

乾柿市燒灰米飲服二錢日二神驗方 汴宅編

又方

普門醫品

失血

卷四 三十三

乾藕節研末人參白蜜煎湯調服日二全効心鑑

烏犀散 治全上

大蒜二枚九蒸九晒豆豉一兩同搗丸梧子大每服二十丸冷蠶水送下日二服安乃止本草綱目

又方

葶藶搗汁大半鍾好酒半鍾空心溫服神秘方

又方

隨四時方向承側柏葉燒平母空心米飲服二錢

百一選方

又方

地錦草洗暴乾爲末米飲服一錢立止經驗方

黃藥音刮淨一斤分作四分三分用酒醋童便各浸七日洗晒焙一分生炒黑色爲末煉蜜丸梧子大空心溫酒下五十九丸久服除根孫探玄集効方

又方

樗根白皮炒三錢水一盞煎七分入酒半盞空心溫服或作丸服虛者加人參等分仁存方

普門醫品

失血

卷四 三十四

酒毒下血

槐花半生半炒一兩梔子仁炒黑五錢共爲末空心新汲水調服二錢經驗良方

又方

槐花枳殼等分炒焦存性爲末空心井水服二錢袖珍方

又方

老梔子仁炒黑色研每新汲水服二錢聖惠方

酒毒下血或下痢

承祿栢葉九蒸九晒二兩陳黑花炒一兩爲末蜜

光梧子大每空心溫酒下四十丸普濟方

酒下血腹疼作渴

黃連四兩一分生用一分炒一分紙裹炮一分水

浸晒條黃芩炒防風各一兩爲末麪糊丸梧子大

每五十丸米泔浸枳殼煎水空心下楊氏家藏方

酒痔便血

青蒿用葉不用莖用莖不用葉晒乾爲末糞前冷

水服糞後溫酒服永類鈴方

普門醫品

失血

卷四 五五

又方

卷栢側栢櫻朮等分燒存性爲末每服三錢空心

溫酒下飯丸服之亦普濟方

腸風瀉血糞前有血名普濟方有血名內痔大腸

不收名脫肛穀道四面等處名舉痔有孔者名瘻瘡

有重名蟲痔並皆治之

槐角去梗炒一兩地榆當歸酒焙黃芩酒炒枳殼

麤炒各半兩爲末酒糊丸梧子大每服五十丸米

飲下和劑局方

痔下血

黃連子黃芩子荆芥子芫荽子蒿苳子蔓菁子蘿

菘子葱子等分以大鯽魚一個去鱗腸裝藥在內

縱合入砂石器內上下用火煉熟放冷爲末每服

二錢空心米飲下本草綱目

大小便血

劉寄奴爲末空心茶調服二錢集簡方

舌上出血一方

舌上出血竅如針孔者及治吐血衄血

普門醫品

失血

卷四 五六

用紫金沙即露蜂房頂上定處者是一兩貝母四

錢蘆薈三錢爲末蜜和丸龍眼大每用一丸水一

小盞煎至五分溫服吐血溫酒調服雲臺方

汗出如血一方

白堊散

人中白新瓦焙乾一錢入麝香少許溫酒調服立

効經驗方

普門醫品卷之十四 終

東武王化貞元起父編輯

門人陳斌憲卿父較閱

遺精門

夢遺 滑泄

論遺精之證有五。一曰因滿而遺。少年氣盛。鰥曠矜持。情不自制。如水之滿而溢出也。二曰因熱而遺。心火熾盛。精神飛越。陽氣不收。如水之熱而沸出也。三曰因想而遺。心有所慕。而不得遂。情動於

普門醫品

遺精

中不能自已。如水之蕩而流也。四曰滑而遺。真氣久虧。下元虛敗。心不攝念。氣不攝精。如瓶破而水自出也。以前三證皆因夢感。而遺在滿而遺者。可以以不藥其因。熱而遺。因想而遺者。第以清心降火之劑治之。自無不愈。惟腎虛滑脫。不必夢感。其證最重。非用大補兼以收澁。未易同也。此外又有一種神氣消靡。怪異橫生。風邪乘其虛。鬼氣干其正。往往與妖魅交通。是又厄運之不可曉者也。法藥兼治。誠哉是言。

夢遺 十八方

四精丸 治思慮色慾過度。遺精。小便數。遺精。

升石。白茯苓。芡實。蓮肉。去皮。心各二兩。馬末。蒸熟。

和丸。梧子大。每服三十丸。空心溫酒下。水煎方。

腎經虛損。心氣不足。思慮太過。真陽不固。淚有餘瀝。

白濁如膏。夢中頻遺。骨節拘痛。盜汗虛煩。食減乏力。

用五倍子一斤。白茯苓四兩。龍骨煨二兩。為末。水

丸。梧子大。每七十九丸。食前溫酒下。日三。和劑局方。

金櫻丸 治夢遺精滑。小便淋漓。遺溺。

普門醫品

遺精

卷五 二

金櫻子去核刺。芡實去殼。各一兩。白蓮藥。白龍骨

煨。各半兩。為細末。糊丸。梧子大。每服八十九丸。空心

鹽酒下。經驗方。

秘真丸 治思想無窮。所願不遂。意淫於外。夢與鬼

交。遺精流濁。

白龍骨煨。朱砂飛。各一兩。訶子五枚。炮取肉。砂仁

炒半兩。為末。糊丸。綠豆大。朱砂為衣。每服十丸。空

心溫酒下。河間方。

心虛遺精

蓮子內心一撮爲末入辰砂五分每服一錢前
白湯下日二服醫林集要

又方

藕節蓮鬚蓮肉去皮心芡實山藥白茯苓白茯神
各二兩爲末用金櫻子一斤槌碎水煎三次取味
盡濾汁熬成膏入少麯和藥丸梧子大每服七十
丸米飲下本草綱目

又方

白茯苓末二錢米湯調下日二服直指方

普門醫品

遺精

卷五

又方

龍骨煨遠志製等分爲末煉蜜丸梧子大朱砂爲
衣每服三十九空心蓮子湯下心說

腎虛遺精及白濁腰脊疼

五味子一斤水浸拔去核再水洗核取盡餘味
通置砂鍋中濾過入蜜半斤慢火熬成膏瓶收出
火毒五日每空心服二三匙白沸湯下保壽堂方

又方

韭子炒五合白龍骨煨一兩爲末空心酒服二錢

腎虛遺精多汗夜夢鬼交

猪腎一枚切開去膜人附子末一錢濕紙裹煨熟
空心食之飲酒一盃不眠三五服効經驗方

威喜丸

治元陽虛微精氣不固夢寐頻遺及婦人

白淫白帶

白茯苓去皮四兩一塊挖空作匱以猪苓末四錢
半入內蓋定淨布包繫煮二十餘沸取出日乾去
猪苓爲末化黃蠟搜和丸彈子大每嚼一丸空心

普門醫品

遺精

卷五

津下以小便清爲度忌米醋本草綱目

遺精白濁下元虛憊

烏骨雞一隻如常治淨以白果肉蓮肉去皮心江
米各五錢胡椒一錢爲末裝于腹內縫住煮熟空

心食之

本草綱目

秋石交感丹 治全上

秋石一兩白茯苓兔絲子炒各五錢爲末用百沸
湯一盞并華水一盞煮糊丸梧子大每服一百丸
空心鹽湯下鄭氏家傳方

遺精白濁盜汗虛勞

桑螵蛸炙白龍骨煨等分爲細末每服二錢空心
鹽湯調下外臺方

諸壯丸 治遺精夢泄進飲食健肢體甚有奇効肌
瘦氣弱漸成勞嗽並宜服之

白朮麩炒五兩參肥白者去紅皮三兩牡蠣左
顧者煨另研四兩爲細末用雄豬肚一具洗淨確
內煮極爛石臼內搗成泥和藥再加肚汁搗半日
丸如小豆大每服四十九日三服米湯下久服自

普門醫品

遺精

卷五 五

覺神旺夢遺永止

經驗方

夢遺及小便數

韭子二兩桑螵蛸一兩各微炒研末每旦酒服二
錢千金方

又方

乳香一塊如拇指大臥時細嚼含至三更嚥下三
五服即効醫方集要

滑泄八方

腎裏精自出小便頻數如米汁心神恍惚脫精食減

用桑螵蛸炒遠志製龍骨煨黃蒲人參土蘇白伏
苓當歸全酒洗鼈甲醋炙各一兩爲末臥時人參
湯調下二錢宗奭方

元氣虛寒精滑不禁大便洞泄手足厥冷

陽起石煨研鍾乳粉各等分附子末減半加麩酒
煮爲糊丸梧子大每空心米飲服五十九愈爲度
濟生堂

虛滑遺精

白茯苓二兩縮砂仁炒一兩爲末入鹽二錢用精

普門醫品

遺精

卷五 六

羊肉批片摻藥炙食以酒送下

普濟方

虛勞溺精

新韭子二升十月霜後采之好酒浸一宿曬乾以
晴明日童子向南搗一萬杵平旦溫酒服二錢日
再服外臺秘要

又方

鹿角膠二兩炒爲末溫酒和服

外臺方

金鎖匙丹

治男婦精滑遺泄不禁夢與鬼交

白茯苓白茯神各一兩遠志製龍骨煨各一兩五

錢左顧壯燭煨二兩為末酒糊丸梧子大每服四十丸空心鹽湯或酒下

滑洩遺尿

韭子一升稻米二升水一斗七升煮取六升分三服千金方

固精強骨

金毛狗春燎去毛酒浸蒸透遠志兩製白茯苓當歸身等分為末煉蜜丸梧子大每服五十丸空心鹽湯下集簡方

普門醫品

遺精

七

便濁門

附交腸

論戴氏曰赤白二濁俱是濕熱雖有赤白之異終無寒熱之分

丹溪曰便濁皆是濕熱有痰有虛濕痰流注宜燥中宮之濕與婦人赤白帶同治

虛勞者用補陰藥大藥不利熱藥

肥白人必多痰以二陳湯去其熱胃虛者兼用人參以柴胡升麻升胃中之氣

戴氏云所用二陳湯去痰加升麻柴胡升胃之清氣加蒼朮去濕白朮補胃全在活法

通治二十四方

分清丸 治一切濁證

芡實白茯苓等分為末黃蠟化蜜和丸梧子大每服百丸空心鹽湯下摘玄方

一切赤白濁及婦人帶下

青黛蛤粉椿根白皮炒滑石飛乾薑炮黃蘗音植水炒褐色為細末神麴糊丸綠豆大空心米飲下

普門醫品

便濁

卷五

六十九 丹溪方

赤白濁淫及夢遺精滑

黃蘗音植鹽水炒真蛤粉各五兩知母炒牡蠣煨山藥炒各四兩為末糊丸梧子大每服八十九空心鹽湯下潔古家珍

赤白二濁及尿滑

益智仁白茯苓白朮炒等分為末每服三錢空心

白湯調下本草綱目

赤白濁口乾煩熱眩暈怔忡

兔絲子酒煮麥門冬去心等分爲末蜜丸梧子大
每服七十丸空心鹽湯下 本草綱目

赤濁

益智仁炒茯苓去皮各二兩連志製去骨一兩爲
末酒糊丸梧子大空心薑湯下五十丸 本草綱目

又方

石蓮肉六兩去心甘草炙一兩爲末每服一錢燈
心湯下 直指方

腎虛白濁

普門醫品

便濁

卷五 九

肉蓯蓉鹿茸俱酥炙山藥炒白茯苓等分爲末米
糊丸梧子大每三四十丸空心棗湯下 聖濟總錄

又方

黃耆鹽炒半兩茯苓一兩爲末每服一錢白湯下

經驗良方

又方

雪白鹽一兩人瓦礫內築緊用泥固濟煨一日出
火毒白茯苓山藥炒各一兩爲末棗肉和蜜丸如
梧子大每服三十丸空心棗湯下 直指方

虛勞白濁

白皮二升水二斗煮取五升分五服 千金方

又方

猪葉爲末蒸餅丸梧子大每服三十丸白湯下 經

又方

蛤粉黃檗音砂鍋炒各二兩爲細末白水丸梧子
大每服一百丸食前溫酒下日二次 潔古方

又方

普門醫品

便濁

卷五 十

椿根白皮焙滑石飛等分爲末粥丸梧子大每空
心白湯下一百丸 丹溪方

又方

清明柳葉煎湯代茶以愈爲度 集簡方

傳金散 治酒色過度心腎不交小便白濁服此則

水火既濟源潔而流清矣

用絡石人參茯苓各二兩龍骨煨一兩爲末每服

二錢空心米飲下日三服 仁存堂方

小便如汁腎虛也

白石脂煨兒絲子酒煮各二兩桂心牡蠣粉王瓜根各一兩爲末每服二錢大麥飲下衛生寶鑑

白濁漩面如油澄脚如膏乃真元不足下焦虛寒

草解酒浸石菖蒲去毛益智仁炒烏藥等分每四錢水一盞入鹽一捻煎七分食前溫服本草綱目

又方

生白果仁十枚插水飲日一服取效止本草綱目

又方

糯稻草煎濃汁露一夜服楠玄方

普門醫品

便濁

卷五十一

又方

生蘿蔔剉空留蓋入吳茱萸填滿蓋定簽住糯米飯上蒸熟去茱萸以蘿蔔焙研末糊丸梧子大每服五十丸溫湯下日二服普濟方

又方

陳冬瓜仁炒爲末每空心米飲服五錢校急易方

又方

石蓮肉去心龍骨煨益智仁炒等分爲末每服二錢空心米飲下本草綱目

二陳湯 治見論

方見六卷痰飲門

〔通〕

〔論〕交腸證謂二便交錯糞從小便出也婦人生產努力太過多有此證

〔通〕

黃連阿膠丸 治二便交錯

黃連炒三兩白茯苓二兩爲末用阿膠二兩溶化共搗爲丸梧子大空心米飲下二十九許氏醫按

普門醫品

又方

破漆帽燒灰空心米飲下二錢愈片溪方

婦人因生產陰陽易位前陰出糞

舊幘頭燒灰酒服二錢仍間服五苓散分利之如無幘頭凡舊漆紗帽皆可代極効古今醫統五苓散方見七卷霍亂門

諸淋門

〔論〕內經曰血世淋閉皆屬于飲原病式曰淋小便

淋痛者，小腹脹結，不能滲泄，故也。其狀小便出少，起數，小腹弦急，痛引于臍。

淋有五證：氣石、血膏、勞是也。○氣淋者，小便澀，常有餘瀝也。○石淋，莖中痛，卒不得出，如有沙石在中也。○血淋者，尿血，結熱，莖痛也。○膏淋者，尿出似膏也。○勞淋，勞倦則發也。大抵此證多因心腎不交，積蘊熱，或酒後房勞，嗜食燥熱，七情鬱結所致。

東垣云：淋證當分在氣在血。以渴與不渴而辨之。

普門醫品

諸淋

卷五

十三

如渴而小便不利，熱在上焦，氣分肺金主之。宜用淡滲之藥，茯苓、澤瀉、琥珀、燈心、瞿麥之屬。不渴而小便不利者，熱在下焦，血分腎與膀胱主之。宜用氣味俱厚之藥，知母、黃蘗、滑石、滋腎丸之類。

淋證初作，當利之。八正散之屬，既利之不愈，又久而氣下陷者，虛也。宜升其氣，氣升而水自下，升而不愈，可用吐法，吐之而氣自升也。

通治

五十六方

八正散

治大人小兒心經蘊熱，臟腑閉結，小便赤

澀，癃閉，凡一切淋證初起，金宜服之。

車前子、瞿麥、蒲蓄、滑石另研飛，山梔子炒，木通、大黃煨、甘草等分。每服五錢，水二盞，燈心二十莖煎七分，食前溫服。

小便卒淋，并婦人產後淋漓。

紫草一兩為末，用井華水空心服二錢。千金方一切淋疼。

燈心草煮汁，空心服之。敗席煮服更良。開寶本草。

又方

普門醫品

諸淋

卷五

十四

葡萄自然汁、生薑自然汁、生地黃自然汁、白糖。生蜜各五合，和勻。每空心服一盞，砂器溫服。聖惠方。

又方

琥珀為末二錢，麝香少許，白湯調服。或萱草煎湯服。老人虛人，以人參湯下。普濟方。

又方

多年木梳燒存性，空心冷水服。男用女用男。

又方

蠶蛻紙燒存性麝香少許老便服二錢

又方

菖蒲煎湯頻飲最利小便生生編

清肺飲子 治全上

方見十一卷小便閉門

淋瀝及白濁

用老葱近根截寸許安臍中以艾灸七壯經驗方

急淋陰腫

葱白半斤煨熟杵爛貼臍上外臺方

普門醫品

諸淋

卷五 十五

下焦結熱小便淋瀝或有血出

瞿麥穗二兩甘草炙七錢五分山萸仁炒五錢為

末每服七錢連煎葱頭七箇燈心五十莖生薑五

片水二盞煎七分時時溫服千金方

久淋不愈

取葛上亭長破其腹中有白子如小米二三分安

白板上陰二三日收之若有人患十年淋者服三

枚八九年以來者服二枚服時以水一二匙著小

盃中爪甲研之當漏漏見于水中即而吞之勿令

近牙藥雖微小下喉自覺至下焦淋所有項藥作

煩急不堪者飲麥飯汁即解若無麥飯冷水亦可

當下淋疾如膿血連下或青或黃不拘男女皆愈

老少服三分之二若淋疾不下量增服之深師方

又方

雲母粉製如法空心溫水和服三錢立効千金方

老人一切淋痛

螺螄一盞連殼炒熟入白酒三碗煮至一碗挑肉

食之以此酒送下酒盡即愈扶壽精方

普門醫品

諸淋

卷五 十六

小便頻數似淋非淋日見羸瘦

麝香半斤搗水一斗煮五升每熱服一盞肘後方

淋痛或尿血或砂石脹痛

牛膝一兩水二盞煎一盞空心溫服或入麝香乳

香少許服尤妙直指方

又方

葵花根洗剉水煎五七沸服之如神衛生寶鑑

又方

檳榔煨煨赤芍藥炒各半兩為末每服三錢心

湯空心調服日二服

沙石淋痛不可忍

蘿蔔切片密浸少時炙乾不可過焦細嚼鹽湯下

日三服

又方

薏苡仁或子葉根皆可用水煎熟飲夏月冷飲以通為度楊氏經驗方

又方

葛勒蔓掘出根挽斷以盃于坎中承取汁服一升

普門醫品

諸淋

卷五 十七

其石當出不出再服范汪方

又方

用石首魚頭中石十四枚當歸尾酒洗等分為末

水三鍾煎鍾半空心頓服立愈外臺秘要

又方

車前子一升用絹袋盛以水四升煮取二升服之

石即下肘後方

又方

瞿麥子為末酒服二錢日三服三日當有石出外

李時珍

又方

以玉蜀黍煎湯頻飲時珍主治

獨聖散 治全上

黃葵花一兩炒為末每米飲下一錢甚効普濟方

沙石淋痛

用九肋鼈甲醋炙研末酒服二錢日三或以鯉魚

十個取齒焙焦研分二服酒下一口服盡肘後方

又方

普門醫品

諸淋

卷五 十八

鷄矢白晒乾炒香為末以酸漿服二錢日二服當

下石出古今錄驗

又方

屋上瓦松煎濃湯乘熱熏洗小腹約兩時即通或

即以所淋石水研服之石當盡出而愈經驗良方

氣淋結澁不通

白芷醋浸焙乾為末酒煎木通甘草空心調下二

錢連進二服普濟方

又方

榆子石燕子煎水頻服 普濟方

又方

人參去蘆黃耆蜜炙等分爲末以大蘿蔔一箇切一指厚大四五片蜜二兩塗炙令盡勿令焦煎藥

時時食鹽湯呷之 普濟方

氣淋臍疼

鹽和醋服之 廣濟方

血淋疼痛

茄葉熏乾爲末每服二錢空心溫酒或鹽湯下隔

普門醫品

年者尤佳金治腸風下血 經驗良方

又方

香附子炒陳皮赤芍藥炒各等分每用五錢水鍾半煎七分空心服 十便良方

又方

多年煮酒瓶口箬葉愈久愈佳每用七箇燒存性入麝少許陳米飲下日三服 百一選方

又方

生地黄汁車前葉汁各三合和煎二合服 聖惠方

又方

冬葵子一升水三升煮二升分三服以蜀葵梗焙爲末酒服亦妙 千金方

又方

車前子晒乾爲末每二錢車前葉煎湯下 普濟方

又方

赤小豆三合微炒爲末煨葱一莖酒熱調二錢空心服 修真秘旨

又方

普門醫品

諸淋

卷五 二十

苦蕒菜一把酒水各半盞煎七分空心服 資生經

又方

挑腸炒木通石膏煨各一錢水一盞煎七分食前服 楊氏家藏方

又方

亂髮燒存性二錢麝香少許空心米飲服 聖惠方

又方

蓮房燒存性爲末入麝香少許每服二錢半米飲下日一服 經驗方

又方

用血風草即地錦草三錢井水一盞搗之空心服

三度愈經驗方

又方

生梔子末滑石飛等分空心葱湯下二錢經驗方

又方

白茅根二兩水二盞煎一盞空心溫服附後方

又方

普門醫品 諸淋 卷五 二十一

馬齒莧杵汁空心服之聖惠方

又方

生藕汁生地黃汁葡萄汁各等分每用一盞空心

入蜜和服本草綱目

又方

野葡萄根七錢葛根三錢水一鍾煎七分入童便

三分空心溫服乾坤秘鑑

通神散 治全工

馬蘭花七枚故筆頭十四枚燒存性粟米炒一合

為末每服三錢酒下日二服本草綱目

血淋不止

櫻櫚皮半燒半炒為末水服二錢衛生家寶方

膏淋

苦楝子小茴香等分炒末每溫酒服一錢聖惠方

又方

葛勒蔓搗生汁二升入醋二合和勻空心頓服尿

下白汁而愈本草綱目

滋腎丸 治見論

普門醫品 諸淋 卷五 二十二

方見十一卷小便閉門

東武王化貞元起父編輯

門人陳 斌憲卿父較閱

消渴門

論河間曰三消之疾本濕寒之陰氣極衰燥熱之陽氣太甚水火不相既濟遂成三消。消而引飲飲水多而小便亦多名爲上消。若飲食俱多而不甚渴小便澀消渴者名曰中消。若渴而飲水

普門醫品

消渴

卷十六

一

不絕腿消瘦而小便有脂液濁者曰腎消此三消者皆燥熱之亢極也
上消肺也多飲水而少食大小便如常舌裂大渴以白虎加人參湯主之。中消胃也多飲食而小便黃形瘦自汗大便硬小便數食已即餓宜黃芩石膏主之。調胃承氣湯之類。下消腎也小便淋瀝如膠油之狀煩燥引飲耳輪焦乾腎水竭也宜六味地黃丸之類

丹溪曰三消多是血虛不生津液宜四物湯爲主

○上消加五味子人參麥門冬天花粉飲酒人煎生葛汁○中消加知母石膏滑石寒水石○下消加黃蘗音知母熟地黃五味子皆以漂絲湯代茶

迎治 三十七方

聖玉膏 治消渴

人參去蘆一兩葛粉二兩爲末每用燐猪湯一升入藥加蜜二兩慢火熬至三合狀如黑餳以瓷器收之常以一匙含嚥不過三服即効夜臥須用之
聖濟總錄

普門醫品

消渴

卷十六

二

金豆丸 治全上

白扁豆浸去皮爲末以天花粉汁同煉蜜和丸梧子大金箔爲衣每服三四十丸天花粉煎湯下日二服忌炙煇酒色宜服滋腎藥仁存堂方

又方

牛膝五兩爲末生地黃汁二碗浸之日晒夜曝汁盡爲度蜜丸梧子大空心溫酒下三十丸經方

又方

栝樓根去皮寸切水浸五日逐日易水取出搗研

濾過澄粉晒乾每服二錢水化下日三服入粥及乳酪中食之亦可 千金方

又方

新生韭苗日用三五兩或炒或煮作羹勿入鹽入醬無妨喫至十斤卽愈過清明勿喫有人病消渴得此方而愈 秦憲副方

又方

用出了子蘿蔔三枚洗淨切片日乾爲末每服二錢用猪胰煎湯澄清調下日二服漸增至三錢生

普門醫品

消渴

卷六 三

者搗汁亦可或以汁煮粥食之

圖經本草

又方

冬瓜一枚削皮埋濕地中一月取出破開取清水日飲之或燒熟絞汁飲之 聖濟總錄

消渴有蟲人所不知

苦楝根白皮一握切焙入麝香少許水二碗煎至一碗空心飲之雖困頓不妨下蟲如虵而紅色渴

自止

洪邁夷堅志

消渴飲水

多食梨佳或以好梨絞汁入蜜熬成膏瓶收日日以熱水調服冷水亦可愈乃止 普濟方

治消渴利水氣消腫除熱金解毒及金石發熱

桑根黑熟者桑取嫩者以布濾汁石器熬成稀膏量多少入蜜熬稠貯瓷器中每抄一二錢臨臥以沸湯煎服 宗奭方

又方

蝸牛十四枚形圓而大者以水三合密器中浸一宿取其水飲之不過一劑愈 崔元亮海上方

普門醫品

消渴

卷六 四

又方

鯽魚一枚去腸留脾以茶葉填滿紙包煨熟食之不過數枚卽愈 吳氏心鏡

又方

泥鯁十頭陰乾去頭尾燒灰乾荷葉等分爲末每用二錢新汲水調下日三服 普濟方

消渴飲水不止

人參去蘆爲末鷄子清調服一錢日四服或用人參瓜蒌根等分爲末陳蜜丸梧子大每百丸食前

麥門冬湯下口二服愈為度忌酒麪炙燥

消渴日夜飲水數斗

堆豬肚一枚煮汁入少豉渴即飲之煮粥亦可食

醫心鏡

又方

五靈脂黑豆去皮等分為末每服三錢冬瓜皮湯下無皮用葉亦可日二服更服八味丸去附子加五味子一兩若小渴者二三服即止保命集八味丸方見十三卷虛勞門

普門醫品

消渴

卷之五

又方

蜜陀僧二兩研末湯浸蒸餅為丸如梧子大濃煎蠶繭湯送下無繭用茄根湯亦可一日五九日增五九至三十九止不可多服五六服後見水惡心為驗惡心時以乾物壓之自定甚奇選奇方

又方

白浮石煨蛤粉蟬蛻焙等分為末鯽魚膽汁七箇調服三錢神効本事方

又方

浮萍湯汁飲之本草綱目

又方

糯稻炒出白花桑根白皮炒等分每用一兩水二錢煎濃汁飲之三四方

又方

黑豆置牛膽中陰乾百日吞盡即愈附後方消渴不止小便多者

乾冬瓜子麥門冬去心黃連各二兩附兩半水二鍾煎鍾半服凡冬瓜苗葉俱治消渴不拘新乾

普門醫品

摘玄方

消渴

卷之六

又方

桑根用入地三尺者剝取白皮炙黃剉以水煮濃汁隨意飲之亦可入少米勿用鹽附後方

消中易饑

肉苁蓉酥炙山茱萸去核五味子等分為末蜜丸梧子大鹽湯下二十九醫學指南

又方

雞內金洗黃連各五兩為末附九梧子大

每服三十九溫水下日三服 聖錄

消渴飲水骨節煩熱

用生芭蕉根搗汁飲之 聖惠方

消渴骨蒸

大冬瓜一枚去瓢入黃連末填滿安瓮內待瓜消盡同研丸梧子大每服三四十丸煎冬瓜湯下 經方

驗方

消渴羸瘦

兔一隻去皮爪五臟以水一斗煎稠去滓澄冷渴

消渴醫品

消渴

卷六 七

即飲之極重者不過二兔 崔元亮海上方

又方

生栝樓根切十片以水三斗煮至一斗濾淨入煉

淨黃牛脂一合慢火熬成膏瓶收酒服一盃日三

聖濟總錄

消渴煩悶

烏梅肉二兩微炒爲末每三錢水二盞煎一盞去渣入豆豉二百粒煎至半盞溫服 簡要濟衆方

又方

蠶蛹二兩以無灰酒一中盞水一大盞同煮一中

盞溫服 聖惠方

又方

黃栝樓一箇酒一盞洗去皮子取瓢煎成膏入白

礬末一兩丸梧子大每米飲下十九 聖惠方

忍冬丸 消渴之人愈後防發癰疽宜服

忍冬藤根莖花葉皆可不拘多少入瓶內以無灰

好酒浸糠火煨一宿取出晒乾入甘草少許煨爲

細末以浸藥酒打糊爲丸梧子大每服六七十丸

消渴醫品

消渴

卷六 八

至百丸湯酒任下此不惟敗毒兼能治渴凡消渴

已愈未愈皆宜服之 外科精要

白虎加人參湯 治見論

方見四卷暑證門

調胃承氣湯 治見論

方見三卷傷寒門

六味地黃丸 治見論

方見十三卷虛勞門

四物湯 治見論

肺癰肺痿門

附腸癰

肺癰其人欬胃內滿隱隱痛而戰咽乾口內辟辟燥不渴或渴時出濁唾腥臭惡風鼻塞右脇按之痛

有膿而嘔者不須治其膿止自愈又吐膿不

已如米粥者難治已破風入者不治

肺痿之證由久嗽不已或汗下過度重亡津液所

普門醫品

肺癰肺痿

卷六 九

致其人寒熱往來自汗濺濺欬短氣胃脹腸滿多唾涎沫而無膿脉數而虛為肺痿數而實為肺癰微緊而數者為無膿緊甚而數者為有膿肺痿小便數而不渴渴者自愈

肺癰 七方

桔梗湯 治肺癰欬嗽膿血咽乾作渴大便難小便赤澀

桔梗貝母去心薤白仁炒各七分當歸酒洗瓜蒌仁枳殼送下

草節杏仁炒去皮尖防已 各五分水二鍾薑二片煎八分食遠服大麥蘖加煨大黃八分

生方

甘桔湯 治肺癰欬嗽胃滿振寒咽乾不渴時出濁唾腥臭久久吐膿如粳米粥者

桔梗一兩甘草炙二兩水三升煮一升分二次溫服 金匱玉函方

肺癰欬出膿血久嗽不愈喉中氣塞胃膈噎疼

蛤蚧炙阿膠炒鹿角膠炒生犀角羚羊角各二錢

普門醫品

肺癰肺痿

卷六 十

半用河水三升銀石器內文武火熬至半升濾汁時時仰臥細呬 宗華方

肺癰欬嗽煩滿微熱心胸甲錯

嫩葶切片半斤水六碗煮三碗入薤仁去皮尖三十枚薤仁二合煮取一碗服之當吐出膿血而愈 金匱玉函方

肺癰口吐腥臭心胃甲錯

醇醋煮薤白仁令濃微溫服有血吐出愈 范江方

肺癰吐膿

黃耆二兩為末每用二錢六一錢煎至六分
溫服日三四服聖惠方

肺痿心中心隱疼吐涎沫咽燥而不渴

生大門冬搗汁一升酒一升飴半鍾紫菀汁半鍾
砂鍋煎稠硬丸如杏仁大每噲一丸日三肘後方

肺痿九方

潤肺膏治久欬肺燥成痿

羊脂一具杏仁去皮尖研柿霜酥油綠豆粉各
一兩白蜜二兩將羊肺洗淨次將藥入水攪勻灌

普門醫品

肺痿肺癰

卷六 十二

入肺中白水煮熟食之舊可久方

鹿髓煎治肺痿欬嗽

鹿髓生地黄汁各七合酥蜜各一兩杏仁薏仁各
三兩去皮尖酒一升同搗汁先煎杏仁薏仁地黃

汁減半入前三味煎如飴每合一匙日三聖惠方

肺痿久嗽涕唾多骨節煩疼悶塞寒熱

甘草二兩炙為末每用童便調服一錢廣利方

肺痿吐沫頭眩小便數而不欬肺中冷也宜溫之

甘草炙四兩乾薑炮二兩水三升煮一升五合分

三次服之金匱要略

肺痿時時寒熱久欬涕唾煩赤氣急

童便去頭尾五合大甘草一寸四破浸之露一夜
去甘草平旦頓服或入甘草末一錢同服亦可一

日一劑童子忌食五辛熱物范用集方

肺痿欬逆短氣胃中吸吸唾吐臭膿

用竹瀝時時服之日三五次李時珍集方

肺痿咯血多痰

防已葶藶炒等分為末糯米飲服一錢古今錄驗

普門醫品

肺痿肺癰

卷六 十二

又方

薏苡仁十兩杵破水三碗煎一升酒少許服之神

効梅師方

肺痿欬血

蘿蔔和鯽魚煮粥頻食普濟方

附腸癰

論腸癰小腹疼而堅硬小便數時時汗出甚者腹

脹大轉側作水聲或膿從臍出或從大便出宜丸

太乙膏服及吐裏藥

通治 九方

腸癰內痛

大棗連核燒存性。百藥煎等分爲末。每服一錢。空心溫酒服。直指方

又方

薑黃。桂枝。研末。水服。一錢。日三服。傳信方

又方

雄雞。上毛并尿燒末。空心酒服。二錢。千金方

腸癰有膿

普門醫品

腸癰

卷六 十三

薏苡仁一兩。附子製四錢。敗醬葉八錢。搗末。每服

二錢。熱水調服。金匱玉函方

腸癰腹痛。兩耳輪甲錯。或透唇。若如粟下膿血。

用白馬蹄灰和雞子白調塗。日校毒氣出。千金方

腸癰吐敗血。腥穢殊甚。臍腹冷疼。

紅葵花根白芷各一兩。枯白礬白芍藥各五錢。爲

末。黃蠟溶化和丸。梧子大。每空心米飲下二十九

但倦皆效方

腸癰小腹腫痛。小便似淋。或大便難。澀下膿。

甜瓜子炒。一合。當歸炒。一兩。蛇蛻一條。每四錢水

盪半。煎一盞。食前服。利下惡物爲妙。聖惠方

瘡在腸臟不可藥治者

皂角刺不拘多少。好酒一碗。煎至七分溫服。其濃

血卽從小便出。極効。不飲酒者。水煎亦可。經驗方

太乙膏 治見論

方見二十六卷癰疽門

脫肛門

普門醫品

腸癰

卷六 十四

論肺與大腸爲表裏。故肺經蘊熱。則肛門閉結。肺

氣虛寒。則肛門脫出。久則下陷而滑脫也。

子和曰。此大腸熱甚。或因洞瀉及用力過多。小兒

叫呼。并丸藥大下。及久痢努出。腸頭皆致脫肛之

病。不可不一宜用熱水厚洗。勿令冷澀難收。

內經曰。下者舉之。滑者澀之。此治脫肛之意也。

通治 三十七方

大腸脫肛

慈石半兩。火煅醋淬七次爲末。每空心米飲服一

錢直指方

又方

用慈石末麪糊調塗額上經洗去
簡便方

又方

槐角槐花各炒等分爲末用羊血煎藥炙熟空心食以酒送下或以猪腰子蘸炙食亦可
百一選方

又方

莨菪子炒研敷之
聖惠方

又方

普門醫品

脫肛

卷六十五

蟾蜍皮一片瓶內燒烟熏之并研傅之
孫真人方

虛冷脫肛

石灰炒熟故帛裹坐冷即易之
聖惠方

又方

苦參五倍子陳壁土等分煎湯洗之以木賊末敷之
醫方摘要

又方

木賊燒存性爲末摻之按入或加煨龍骨
三因方

又方

蔓陀羅子無明者連殼一對槌斗十箇同剉水煎

三五沸入朴消三錢洗之
儒門事親

又方

胡荽一升燒烟薰之
子母秘傳

又方

得麻鞋底炙熟頻按入仍以麻鞋底鼈頭各一枚燒研敷之按入即不出
千金方

又方

五倍子末二錢入白礬一塊水一碗煎湯洗之立

普門醫品

脫肛

卷十六

七

効三因方

又方

五倍子半斤水煮極爛盛坐桶上熏之待溫以手輕輕托上仍以人參去蘆黃耆蜜炙升麻各一錢水一鍾煎半鍾溫服之
簡便方

又方

蝟皮一箇燒磁石煨桂心各五錢爲末每服二錢空心米飲下
葉氏摘玄方

風熱脫肛

鐵粉研同白欬末敷上按入

又方

蒲黃研和猪脂敷之。日三五度。子母秘錄

又方

浮萍為末敷之。危氏得効方

又方

熊膽五分兒茶三分冰片一分為細末加入乳調

搽肛上熱汁自下肛自收矣。經驗方

又方

普門醫品

脫肛

卷六 十八

烏龍尾

即倒掛灰

同鼠屎燒煙于桶內坐熏之數

次即不脫。危氏得効方

又方

用不蛀皂角五挺。搥碎水拔取汁二升浸之自收

上。本草綱目

又方

黃皮桑樹葉三升水煎帶溫卷納之。仁齋直指方

又方

蜣螂燒存性為末入冰片一字研勻。搽肛上托之。

即入。醫學集成

又方

五倍子炒黃為末。放熱鞋底上托之即收。龔氏方

又方

乾蝸牛一兩炒焦研。每用一錢猪脂和敷。立縮。或

用羊脂溶敷送入亦効。聖惠方

又疳脫肛

枳實二三箇石上磨平密灸黃葉熱更互熨之。縮

乃止。千金方

普門醫品

脫肛

卷六 十八

又方

冷水調黃連末塗之。經驗方

又方

赤石脂煨伏龍肝等分為末敷。或加白礬。龔氏方

兒方

又方

槿皮或葉煎湯熏洗以白礬五倍末敷之。保嬰方

又方

白龍骨煨為末。搽之。聖惠方

又方

橡斗子燒存性研末猪脂和敷直指方

痢瀝脫肛黑色堅硬

巴豆殼燒灰取色焦自然汁煮一滾傾出入朴消

少許將肛洗軟用真麻油點火滴于上枯礬龍骨

煨各少許為末摻之以芭蕉葉托入元氏得効方

下血脫肛

白雞冠花炒成灰羌活等分為末每服二錢空心

米飲下永類鈴方

普門醫書

脫肛

卷六十九

痔漏脫肛

胡婁子一升粟糠一升乳香研末一兩拌勻以小

口瓶燒烟熏之儒門事親

又方

絲瓜燒灰多年石灰雄黃各五錢為末以猪膽雞

子清及香油和調貼之收上乃止孫氏集効方

又方

虎脛骨兩節以蜜二兩炙赤槁木蒸餅九指子大

每侵晨溫酒下二十九服効勝金方

脫肛歷年不入者

生鐵二斤水一斗煮汁五升洗之日再其効力

又方

鼈頭炙研傳之仍以米飲服二錢日再日華本草

腋氣門

論腋屬足厥陰肝經之分肝經鬱熱出于腋其臭

如狐又名狐臭有癢肝熱盛則竅開而泄于外益

不可近擦敷之藥僅療一時之急不能除其根必

普門醫書

腋氣

卷六十二

須內疎肝邪方可使之永絕也

通治十五方

腋氣除根法

先用刀剃去腋毛淨用好定粉水調擦患處六七

日後看中有一點黑者其孔如針大或如簪尖大

其氣即自此出用艾炷如米大灸之三四壯愈永

不再發其內邪未除可服聚香散

又方

用蝙蝠一箇以赤石脂末半兩塗遍黃泥包固

乾爛有性以田螺水調塗腋下待毒氣上冲急服

聚香散行一二次即除

聚香散 治腋氣

青木香三分丁香三分檀香一錢續斷八分大黃煨三錢水一鍾煎八分入麝香一分溫服以利爲度不利再加黃二錢

腋下胡臭

以三年陳米醋和石灰敷之

又方

普門醫品

雞子二枚煮熟去殼熱敷腋下待冷棄之又路日

勿回顧如此三次効

又方

薑汁頻塗之絕根

又方

先用漿水洗淨後以香油調蜜陀僧末塗之或用

熟蒸餅一箇切破去皮摻末夾之

又方

輕粉黃丹炒研細調蠟塗之

又方

用官粉常搽或以粉和膏重搽塗之

又方

先用清水洗淨次用酸漿洗淨微搥破取銅屑和醋熱搥之

蜘蛛散 治狐臭不可近

大蜘蛛一枚用黃泥少加赤石脂并鹽研爲膏包

裹蜘蛛于小火中煨乾漸加武火煨通紅候冷取

蜘蛛細研入輕粉一字和米醋調膏臨臥先將腋

普門醫品

洗淨後以膏搽之次早洗下黑汁惡物爲効宜僻

處埋之勿令染人不可穿舊衣凡舊衣俱澣洗過

又方

古錢十文鐵線串燒醋淬十次研末入麝少許調

塗患處良方

又方

膽礬一兩半生半熟輕粉少許爲末每用半錢以

生薑自然汁塗十分熟疼乃止數日一用以愈爲

度簡易方

又方

枯白礬細末。絹袋盛之。繫臍下。常以手搓令粉出。其妙許亮臣方

田螺散 治體氣凡患此病者。其內常有油濕

大田螺一枚。水中養之。俟其腐爛。以巴豆仁一粒。用針挑放在內。將螺拭乾。仰放。盛內。夏月一宿。冬五七宿。自然成水。取擦患處。絕根。丹溪心法

普門醫品

痰氣

卷之二十三

普門醫品卷之十七

東武王化貞元起父編輯

門人陳斌憲卿父較閱

頭疼門

通治 偏頭風 多年頭風 腫響 旋運 眉稜骨疼

論頭為三陽之部分。故活人書云。頭痛者。陽證也。頭與頭痛者。足太陽經也。橫竹痛。俗謂眉骨痛。足陽明經也。額角痛。俗謂偏頭痛。足少陽經也。

丹溪曰。頭痛多主于痰。痛甚者。火多。宜清痰降火。

普門醫品

痰氣

卷之一

用二陳湯加白芷。川芎為主。肥人多是濕痰。宜半夏蒼白朮。瘦人是熱與血虛。宜四物湯加酒炒黃芩。防風。勞役下虛之人。似傷寒。發熱汗出。兩太陽穴疼甚。此相火自下衝上。宜補中益氣湯加川芎。當歸甚者。加知母。黃芩。音蔓荊子。細辛。壯實熱疼。大便結燥者。宜下。巔頂痛者。宜加桑木。酒炒升麻。柴胡。面上紅腫。連頭痛者。胃風湯。面腫生瘡。調胃承氣湯。加薄荷。荊芥。

王節齋云。久病頭疼。略感風寒。便發寒。須重綿。

厚帕包裹者此屬鬱熱本熱而標寒也惟當瀉火涼血為主而佐以辛溫散表之劑以從法治之則病愈而根可除也若誤認為寒專主溫散是為以熱益熱

真頭疼腦盡痛手足寒至節死不治

通治二十九方

川芎茶調散 治諸風上攻偏正頭疼鼻塞聲重

薄荷二兩荊芥穗川芎酒浸各一兩羌活白芷甘草炙各半兩細辛防風各二錢半為細末每服二

普門醫品 頭疼 卷十七 二

錢茶清調下凡治頭疼藥俱食後服

八般頭風

魚鰾燒存性為末臨臥葱酒調服二錢

又方 本草綱目

生半夏研末百草霜少許作紙撚燒烟就鼻內噴

之口中含水有痰吐去再含三次見效 衛生寶鑑

又方

藜蘆一莖日乾研末入麝香少許每用一字吹鼻

即愈 本草綱目

又方

白僵蠶炒為末食後葱茶調服二錢 本草綱目

又方

用大蒜研汁噴鼻中 易簡方

又方

用大蒜七瓣去皮先燒地紅以蒜逐箇于地上磨

攤成膏却以僵蠶一兩去頭足安蒜上碗覆一夜

勿令透氣只取蠶研末噴入鼻內口中含水甚效

金治小兒驚風 聖濟總錄

普門醫品 頭疼 卷十七 三

又方

人中白乾地龍炒等分為末羊膽汁九芥子大每

新汲水化一丸注鼻中噴之 聖濟總錄

如神丹 治全上

船上硫黃製消石各一兩研細水九芥子大食後

嚼一丸茶下 普濟方

偏正頭風不拘遠近諸藥不効者

白芷芩藹各三錢為細末以黃牛腦子搽末在上

瓷器內入酒頓熟食後乘熱食之盡重一醉醒則

其病如失 謂壽室方

又方

白芷炒二兩五錢。川芎。甘草各炒。川烏頭半生半熟。各一兩。為末。每服二錢。食後細茶薄荷煎湯下。
談野翁試效方

又方

川芎一錢。茶葉二錢。水一鍾。煎五分。熱服。
簡便方

又方

荊芥穗。石膏煨等分。每服二錢。茶調下。
永類鈴方

普門醫品

頭疼

卷七 四

又方

甘菊花。石膏煨。川芎各三錢。為末。每服一錢半。茶調下。
簡便方

又方

決明子為末。醋和敷兩太陽穴。以紙貼之。又作枕用之。治頭風明日甚于黑豆。
普方摘玄

頭痛欲死

火燭消為末。吹鼻內。
炮炙論

又方

遠志為細末。鹽水煎。
普方

又方

當歸二兩。酒一升。煮六合飲之。日再服。
外臺秘要

又方

童便一盞。鼓心半合。煎五分。食後溫服。
普濟總錄

又方

杏仁去皮尖三升。水九升。研爛濾汁。煎如麻腐狀。

取和羹粥食。七日後大汗出。諸風漸減。此法神妙。

慎風冷雞豬魚蝦蒜醋。
千金方

普門醫品

頭疼

卷七 五

氣厥頭痛。因怒而得者。

烏藥。川芎等分為末。每服二錢。茶清調下。
濟生方

氣鬱頭疼。

香附子炒四兩。川芎二兩。為末。每服二錢。食後茶清調下。
濟世方

清調下

又方

香附子炒半斤。烏頭炒五錢。甘草炙一兩。為末。

蜜丸。彈子大。每服一九。食後葱茶嚥下。
本事方

又方

羌活防風紅小豆等分爲末附方

風寒傷腦頭痛不拘偏正最効非寒者勿用

大附子一個生切四片以薑汁一盞浸灸再浸再

灸汁盡乃止高良薑等分爲末每服一錢食後茶

清調下忌熱物三因方

又方

豆淋酒密封七日溫服詳見三十七卷產後諸證

門千金方

痰厥頭疼如破

普門醫品

頭疼

卷七 六

烏梅肉三十箇鹽三椀酒三升煮一升頓服取吐

即愈肘後方

痰癖頭疼不欲飲食

白礬一兩水二升煮一升入蜜兩許頻服酒更大

吐未吐以少熱湯飲之外臺秘要

風痰頭疼不可忍

梔子末二錢和蜜濃敷舌上吐即止兵部手集

頭風熱疼

井底泥和大黃末消末敷之千金方

又方

玄精石爲末入羊膽中陰乾水調一字吹鼻中立

止千金方

頭痛腦熱肺壅多涕名爲鼻淵

雞蘇葉麥門冬去心川芎桑白皮炒黃耆蜜炙甘

草炙生地黃焙等分爲末煉蜜丸梧子大每服四

十九食後人參湯下聖惠方

又方

雞蘇葉五兩皂莢炙去皮子三兩羌花醋炒焦一

普門醫品

頭疼

卷七 七

兩爲末煉蜜丸梧子大每服二十九食後芥子湯

下聖惠方

偏正頭風天陰風雨即發

桂心末一兩酒調塗額上及頂上聖惠方

又方

蔓荊子一升爲末絹袋盛浸一斗酒中七日食後

溫飲日三次千金方

飲酒頭疼

竹茹三兩入瓦碗煎三碗去渣令冷納雞子三枚

攪勻再煮三沸食後飲之

二陳湯 治見論

方見本卷心疾門

四物湯 治見論

方見二十三卷調經門

補中益氣湯 治見論

方見五卷內傷門

偏頭風 十五方

偏頭風在左屬血虛及風與火

普門醫品

頭疾

卷七 八

當歸酒浸川芎酒洗白芍藥酒炒生地黃酒洗各

一錢荆芥薄荷各七分黃芩酒炒八分水二鍾

煎一鍾食後溫服

偏頭風在右屬痰與火

半夏製陳皮去白茯苓炒白芷各一錢茶酒炒各一

錢氣虛者加人參去黃芩各一錢水二鍾

煎一鍾食後溫服

至靈散 治偏頭風

雄黃飛細辛等分為末每以一字吹鼻

右痛吹左

又方

火消一兩雄黃乳香沒藥川芎石膏各一錢全蝎

一對炙為細末口含冷水以藥吹鼻

又方

川芎細剉酒浸食後飲之

又方

川烏南星等分為末葱汁調塗太陽穴

又方

普門醫品

頭疾

卷七 九

鯉腸草即旱蓮草取汁隨左右滴鼻中

又方

生蘿蔔汁一蛻殼仰臥隨左右滴鼻中神効活人

不可勝數

偏頭風痛不可忍

乳香蓖麻仁等分搗餅隨左右貼太陽穴仍解髮

出氣甚驗

又方

蓖麻仁半兩棗肉十五枚搗金紙上捲筒插入鼻

中即止

又方

殺精草一兩，麩糊調，攤紙貼，處乾換之。集驗方

又方

殺精草、銅綠各末一錢，消石五分，隨左右吹鼻。聖濟方

偏正頭疼不可忍

玄胡索七枚，青黛一錢，牙皂二箇，去皮子為末，水

和丸如杏仁大，每以水化一丸，灌病人鼻內，隨左

普門醫品

頭疼

卷十七 十

右口咬銅錢一箇，當有涎出，成盆而愈。永類方

又方

倒鉤棘針四十九箇，燒存性，丁香一箇，麝香一皂

子大為末，隨左右噴鼻。聖惠方

又方

蚱蟬二枚，生研，乳香、焙砂、飛各等分，丸小豆大，

每用一丸，隨左右納鼻中，出黃水為效。聖濟總錄

冬年頭風

正頭疼久不除者

晴明時，將髮分開，用麝香五分，皂角末一錢，薄紙

裹置患處，以布包，炒鹽於上熨之，冷則易，如此數

次，即不冉發。簡便單方

又方

苦瓠瓢取汁，以葦筒灌入鼻中，其氣上衝腦門，須

臾，惡涎流下，其病立愈，除根，勿以昏遲為疑，或以

其子為末，吹入鼻，亦効。普濟方

又方

斬艾葉為丸，時時嗅之，以黃水出為度。普濟雜纂

普門醫品

頭疼

卷十七 十一

又方

楊梅為末，每食後薄荷茶服一錢。朱氏集驗方

腫

頭面忽腫，係風熱內攻，或連手足，觸着即疼，

牛旁子根洗淨，搗爛，煎濃汁，濾去渣，熬成膏，絹攤

貼腫處，仍以酒服二匙，腫消疼止。普門方

雷頭風諸藥不効

升麻一兩，蒼朮一兩，為末，每服五錢水一盞，煎七

分，用金荷葉一箇，燒研，調前藥食後服。保命集

雷頭風腫不省人事

掃帚子同生薑研爛沖酒服取汗即愈 聖濟總錄

頭中鳴響狀如虫蛀

以茶子爲末吹少許鼻中取效 醫方摘要

又方

皂角末吹鼻取嚏 斗門方

胃風湯 治見論

人參去蘆白茯苓川芎官桂當歸頭酒浸白芍藥

酒炒白朮炒水二盞煎八分食後熱服 和劑局方

普門醫品

頭疾

卷七 十三

調胃承氣湯 治見論

大黃芒消甘草各二錢水一大盞煎七分去渣內

消再煎沸服 仲景方

旋運

四方 六卷 旋運四可參看

頭風旋運眩目

用鴟頭一枚 即鴟頭 炙黃黃芩白朮各一兩川

椒半兩炒去汗爲末蜜和九梧子大每酒下二十

丸 聖惠方

半夏白朮天麻湯 治頭旋眼黑惡心煩悶氣促上

喘無力以言心神顛倒目不敢開如在風雲中頭疼
若掣身重如山四肢厥冷

黃蘗酒炒三分乾薑炒四分澤瀉白茯苓天麻黃

耆蜜炙人參去蘆蒼朮炒各七分神麴炒白朮炒

各一錢麥芽炒半夏製橘紅各一錢半水二盞薑

三片煎一盞食後稍熱服而愈此頭疼苦甚非

此不能除 東垣方

又方

蟬殼一兩微炒爲末酒下一錢白湯亦可 聖惠方

普門醫品

頭疾

卷七 十三

凡人登車坐船眩運煩悶頭疼欲吐者

用徐長卿石長生車前子李根皮各等分搗碎以

方囊盛半合繫于衣帶及頭上則免 肘後方

眉稜骨疼 三方

治方

白芷片芩酒炒等分爲末每服二錢食後茶清調

下 丹溪纂要

腦痛連眉稜疼不可忍

穀精草二錢乾地龍焙三錢乳香焙一錢爲末每

用半錢燒烟筒中隨左右熏鼻聖濟錄
頭痛連目

牛旁子炒石膏煨等分爲末茶清調服醫方摘要

心疼門

通治 暴疼 久疼 積疼 蟲疼 胃脘疼

論丹溪曰心痛即胃脘痛也雖日數多不喫飲食不死若痛方止便飲食還痛須三五服藥後方可喫物

大凡心膈之痛須分新久若明知身受寒氣口食

普門醫品

心寒

卷七 十四

寒物及新病當以溫散或溫利之藥如豆蔻丁香之類稍久則成鬱熱原病式中傳言之矣若久病鬱熱者欲行溫散寧無助火爲病乎故古方多以山梔爲熱藥之向导則邪伏而病易退正氣復而愈矣大槩胃口有熱而作痛非山梔子不可宜用二陳湯加蒼苔倍加炒梔痛甚者加炒乾薑從之病人有因平日喜食熱物以致死血流于胃口作痛用薤仁承氣湯下之必須問明以手按之疼止者挾虛也以二陳湯炒乾薑和之

有面上白斑唇紅能食時作時止者虫也先用茵陳汁或蜜引虫頭向上然後用打虫藥苦楝根錫灰之類治之

痛甚者脉必伏用溫藥附子之類不可用參朮

心疼有九種皆心之胞絡痛也真心疼者手足青至即旦發夕死夕發旦死

心下胃口作痛者脾痛也脾虛有痰每每停聚不散或滿或脹或不想食

心疼用山梔等藥止後復作用前藥必不効只用

普門醫品

心寒

卷七 十五

玄明粉一錢白湯調下効

無藥處以菰置刀頭上燒紅淬入水中乘熱飲之吐痰立愈

通治十六方

九痛丸 治九種心痛一蟲二疰三風四悸五食六

飲七冷八熱九氣也并治落馬墮車瘀血中惡等證用狼毒炙香吳茱萸湯泡巴豆去心炒研取霜乾薑炮人參去蘆各一兩附子炮去皮三兩爲末煉蜜爲丸梧子大每服一九溫酒下和劑局方

九種心痛及腹脇積聚寒氣

乾漆一兩搗炒烟盡研末醋煮麪糊丸梧子大每服五丸至九丸熱酒下簡要濟衆

九種心疼

當太歲上取新生槐枝一握去兩頭用水三碗煎取一碗頓服千金方

又方

胡椒四十九粒乳香一錢研勻男用生薑湯女用當歸酒下一方用胡椒綠豆各四十九粒研爛酒

普門醫品

心寒

卷十七 十六

下毒域方

又方

桂心二錢半爲末酒一盞半煎半盞飲聖惠方

心氣刺痛音痛

自然銅火煨醋淬九次研末水飛過醋調服一字卽止衛生易簡方

又方

薑黃一兩桂心去麁皮三兩爲末醋湯調服二錢經驗方

又方

水紅花爲末熱酒調服二錢又法男用酒水各半煎服女用醋水各半煎服聖惠方

又方

郁李仁三七枚嚼爛以新汲水或溫湯下須臾疼止却呬薄荷鹽湯數口和衆寶方

心疼或連腰脇

用鹽如雞子大青布裹燒赤納酒中頓服當吐惡物自愈勸懲藥性論

普門醫品

心寒

卷十七 十七

又方

焰消雄黃飛各一錢研細末每點少許入背內男左女右集玄方

切心疼不可忍

玄胡索末三錢溫酒調下卽止本草綱目

又方

晚薑沙一兩滾湯泡過漉淨水服卽止瑞竹堂方

真蛤粉炒香附末等分白湯滓服聖惠方

方

乳香焙三兩真茶四兩為末以臘月鹿血和丸彈
子大每服溫酒化下一丸瑞竹堂經驗方

沒藥散 治全上

沒藥乳香焙各三錢另研川山甲五錢炙木鱉

子兩錢炙去殼為末每服半錢或一錢酒半盞煎

溫服不拘時宣明論

暴寒 十五方

卒急心痛牙關緊閉欲絕

普門醫品

心寒

卷七 十八

老葱白五莖去皮搗搗骨以匙送入咽中灌以麻

油四兩但得下咽即甦少頃虫積皆化黃水下

永不再發瑞竹堂方

又方

蔥花五合吳茱萸三兩水二碗煎碗半去渣分二

服崔元亮方

又方

桑耳燒存性熱酒服二錢集簡方

卒急心痛

醋送一箇烏梅二箇桑七箇杏仁一處研男婦男女

醋送下之不害心寒直到老本草綱目

又方

以芥末熱酒調服日華方

又方

乳香沒藥各焙當歸尾酒洗白芷川芎各半兩羌

青炒去足翅一兩為細末每用半錢先點好茶一

盞次將藥末摻上不得吹攪急細細呷之宣明論

又方

普門醫品

心寒

卷七 十九

用醋浸蒜二三年者食穀類効如神瀟湖集簡方

又方

乾薑末米飲服一錢外臺秘要

又方

布裹椒安疼處用熨斗熨令椒熱即止孫真人方

又方

歌云心頭急疼不可當我有僊人海上方蒲蓄醋

煎通口服管教刻下便安康本草綱目

又方

古香 丁香 爲末。空心酒服一錢。肘後方

又方

薤仁七枚去皮尖研爛。水一合服之。肘後方

又方

五靈脂炒一錢半。乾薑炮五分爲末。熱酒服。立愈。

加玄胡索一錢更良。事林廣記

又方

用鍋底墨研細。熱小便調下二錢。即止。千金方

又方

普門醫品

心寒

卷七 二十一

以車轄內油脂和熱酒服之。開寶本草

又方

用黃蠟燈上燒化。九莢子大。百草霜爲衣。井水下

三九。本草綱目

又方

五倍子生研。每服一錢。鐵杓內炒黑色爲度。以好

酒一鍾。傾入杓內服之立止。郭真人經驗方

又方

猪心一枚。按人年歲入胡椒。同薑白蜜食。經驗方

卒心寒及婦人血氣疼

以米醋磨青木香一盞。極効。本草綱目

一切心腹冷疼及中惡心寒

吳茱萸三兩。酒二升。煎二沸。分二服。楊氏產乳

冷心寒

鴿屎燒存性。熱酒服一錢効。本草綱目

又方

蓼根一握。洗淨。碎剉。浸酒溫飲。斗門方

心腹冷痛氣不和者

普門醫品

心寒

卷七 二十一

山梔子。川烏頭。等分。生研爲末。酒糊丸。梧子大。每

服十五丸。生薑湯下。小腸氣疼。加小茴香。葱酒下

二十九。王氏博濟方

心腹冷氣脇痛

菖蒲一二寸。挺碎。吳茱萸等分。煎湯飲之。凡卒患

心痛。嚼一二寸。熱湯或酒送下。亦効。本草綱目

心寒。小腹疼及膀胱氣疼。手足厥冷。疼不可忍者。

熟附子。鬱金。橘紅。各一兩。爲末。醋糊丸。芡實大。硃

砂爲衣。每服一丸。男子酒下。女人醋湯下。宣明方

又疼

五方

久患心腹疼發即欲死時發時止服此可絕根

蓬莪茂二兩醋煮木香一兩煨為末每服半錢淡

醋湯下萬生家寶方

心脇刺痛纏綿無時

梔子三七枚燒川芎一錢共為末溫水服肘後方

積年心痛不可忍不拘十年五年隨手見効

小蒜濃煮食飽勿着塩兵部手集

又方

普門醫品

心疼

卷七 二十二

大山梔子九粒炒焦水一盞煎七分入生薑汁飲

之止止復發者加玄明粉一錢月溪翁集西

心疼而發熱煩渴者

青黛一錢薑汁調服醫學正傳

積疼

十一方

治因痰涎積聚心腹疼痛日夜不止或乾嘔

用蚌粉一兩以巴豆七粒同炒赤去豆不用以醋

和粉為丸梧子大每服二十九粒酒下臍腹痛茴

香湯下女人血氣虛重便和酒下 孫氏仁存方

食心心痛

陳神麴一塊燒紅淬酒二碗服之摘玄方

又方

紅麴香附乳香等分為末酒調服摘玄方

心腹脹疼氣短欲絕及中惡

桂二兩水一升二合煎八合頓服之肘後方

心腹脹堅痛悶欲死

鹽半盞水一升煎服吐下即愈不吐更服梅師方

氣厥心疼不可忍著

普門醫品

心疼

卷七 二十三

海石海粉亦可香附米醋炒川芎山梔各錢半生

薑汁一小盞共煎煉為佳服即愈經驗方

又方

烏藥水磨濃汁一盞入橘皮二片紫蘇三五葉煎

服集簡方

又方

青木香即馬兜鈴根牙皂角炙各一兩為末糊丸

梧子大每空心湯服五十丸攝生方

又方

大川芎一箇爲末燒酒服之 飛氏集方

養仁承氣湯 治見論

養仁十箇去皮尖官桂甘草炙各一錢大黃二錢半芒消一錢半水二鍾煎一鍾去渣納消再煎沸溫服 仲景方

二陳湯 治見論

半夏陳皮茯苓各二錢甘草一錢生薑五片水二鍾煎一鍾溫服

蟲疼 十方

諸蟲心疼多吐清水

心疾

卷七 二十四

鰻鱺魚淡煮飽食三五度即瘥 外臺方

蛇蟲心疼如刺口吐清水

熟艾一升水三升煎一升服即吐蟲出或取鮮艾

搗汁五更食煎肉一片次飲艾汁蟲即下 肘後方

蟲心痛唇白吐水

薏苡根一片切水七升煮三升服蟲盡出 楊師方

又方

槐木耳燒存性爲末水服瘥許若不止飲熱水一

瘥蟲即出 張文仲傳急方

又方

葱白二寸鉛粉二錢搗丸服之即止葱能通氣粉能殺蟲也 楊氏經驗方

又方

香油一小鍾冷服之効 肘後方

蟲咬心疼面青口中沫出欲死

藟蓄十斤洗剉以水三十碗煎至七八碗瀝去渣煎如膠餒隔宿勿食空心服一盞蟲即下仍常者

普門醫品

心疾

卷七 二十五

汁作飯食小兒多有此病最宜服之 食療本草

又方

七月七日采蒺藜子陰乾搗去刺爲末水調服二錢日三服 外臺秘要

又方

芫花一兩醋炒雄黃一錢爲末每服一字溫酒或湯下 乾坤生意

心痛吐水不下飲食蟲也

雄黃飛二兩醋二升慢火煎成膏蒸餅和搗爲丸

梧子大母服七丸薑湯下

心脾蟲痛不拘男女

五靈脂水淘炒乾攪椰等分爲末水煎石菖蒲調服三錢

附胃腸

胃脾痛徹心背喘促欬唾短氣喉中燥痒

枯樓實一枚薤白半斤白酒五升煎二升分二服

張仲景方

胃脾急痛如錐刺不得俛仰白汗出或至死

胃脾急痛

心經

卷七 二十六

取生韭或根五斤洗渴汁服之金治心痛或以韭

汁和五苓散爲丸茴香湯下治腎氣上冲心疼者

極効

本草綱目

五苓散方見七卷霍亂門

又方

雞心檳榔高良薑各一錢半陳米百粒水一鍾煎五分服

直指方

又方

枳實炒爲末湯調服二錢日三服

肘後方

凡人胃脘般處一點疼者多因氣及寒

或子母相傳

香附米醋浸高良薑酒洗七次各畧炒爲末俱各封貯因寒者良薑二錢香附一錢因氣者香附二錢良薑一錢因氣與寒者等分金以熟米湯入生薑汁一匙食鹽一捻調下不過六七服即愈永不

再發方外奇方

腹痛門

通治 熱痛

寒痛 積滯痛

論丹溪云腹痛有寒有熱有死血食積濕痰宜于

各類求之

腹經

卷七 二十七

戴氏曰寒痛者綿綿痛而無增減者是熱痛者時

作時止者是死血痛者痛有常處不行移者是食

積痛者痛甚欲大便利後痛減者是濕痰痛者凡

痛必小便不利其有或痛或止痛定則能食肚大

青筋嘔吐清水者虫也

與本卷心痛門可參看

若從心下至少腹鞭滿而痛小便利者則是畜血

之證小便不利者則是溺滯之證

丹溪曰食積腹痛宜溫散之如乾薑蒼朮川芎白

直茱萸附子之類不可峻用利藥下之蓋食得寒則凝熱則化也更兼行氣快氣之藥服之無不愈者

腹痛以手按之而痛甚手不可近者皆實也宜大黃芒消之類下之腹痛以手按之痛減者虛也宜芍藥湯清之跌撲損傷而痛是瘀血宜薤白承氣湯兼當歸紅花蘇木下之飲食過傷而痛宜木香檳榔丸下之

腹中鳴有聲乃火擊動其水也宜二陳湯加梔子
普門醫品 腹痛 卷七 二十九

芩連之類

有卒然心腹大痛欲吐不吐欲瀉不瀉唇青厥逆死在頃臾此內因食積外感寒邪為乾霍亂之候急以鹽湯灌之以鴉翎探吐取涎而愈
臍下忽大痛人中黑色者死

通治 七方

腹痛不思飲食冷熱皆宜

山梔子川烏頭各分生研為末酒糊丸梧子大每服二十九生薑湯下小腹痛白芍湯下

治四時腹痛

白芍藥甘草炙各三錢煩渴及一陣痛一陣止者屬熱加黃芩二錢綿綿痛而不止者屬寒加桂皮二錢水二鍾舊三片煎一鍾溫服用藥法象

小腹疼痛不得小便
雄黃為末蜜丸塞陰孔中雌黃亦佳傷寒類要

卒然腹痛
令人騎其腹溺臍中肘後方

芍藥湯 治血虛腹痛

普門醫品

腹痛

卷七 二十九

白芍藥炒三錢甘草炙一錢夏月加黃芩五分惡寒加肉桂一錢冬月再加桂一錢水二盞煎一盞溫服用藥法象

絞腸沙痛 詳見七卷霍亂門

蕎麥麵一撮炒熱水調服本草綱目

婦人腹痛

沒藥末二錢酒服圖經本草

通治 四方

加味黃芩湯 治腹痛大便難小便澀

黃芩炒二錢白芍藥炒山梔仁炒各一錢半川芎

厚朴薑製滑石飛各一錢水二鍾煎一鍾服

加味承氣湯 治臟腑積熱及瘀血停食胸腹脹疼

大黃煨二錢枳實麩炒厚朴薑製當歸尾紅花各

一錢水二鍾煎一鍾去渣入芒消二錢再煎沸服

卒患腹疼煩渴者

山豆根水研半盞入口即定 本草綱目

一陳湯 治見論

方見本卷心疼痛門

普門醫品

腹痛

卷七 三十一

寒痛

九方與四卷寒證門參看

中寒腹痛及脫陽證四肢厥冷不省人事或小腹緊

疼冷汗氣喘腎囊縮入

炒鹽極熱包熨臍下取煖愈冷即易之 林氏方

回陽急救湯 治中寒腹痛口吐涎沫或吐瀉戰慄

面如刀刮及傷寒初起無煩滿身熱便怕寒拳臥四

肢厥冷

人參去蘆白朮炒茯苓去皮陳皮半錢製乾薑肉

桂大附子炮各一錢五味子十粒甘草八分水

二鍾煎一鍾溫服

腹疼先因慾事後感寒氣六脉沉緊小腹絞疼四肢

逆冷嘔吐清水不服此藥無以回陽

人參乾薑炮各一兩生大附子一枚破作八片水

四升煎一升頓服脉出身溫即愈 吳氏方

陰毒腹痛厥逆唇青脉縮六脉欲絕者

用葱一束去根及青留白二寸烘熱安臍上以熨

斗熨之葱壞則易良久氣透手足溫有汗即愈仍

服四逆湯若服而手足不溫者不可治 南陽活人

普門醫品

腹痛

卷七 三十一

四逆湯方見三卷傷寒門

小腹牽疼連陰邪髀間疼痛擊急不可忍

小茴香苗葉搗汁一升服之日三四服以其滓貼

腫疼處冬用根 范氏方

冷氣腹疼

吳茱萸二錢搗爛入酒一鍾先用香油一盃入鍋

煎熟後以茱酒傾入煎滾服之立止 唐瑤經驗方

又方

烏子糞一大抄研末炒極熱酒一大盞和勻澄酒

頓服即愈

又方

燒酒溫飲汗出即止 本草綱目

又方

用本人頭髮三十根燒過酒服即以水調芥子末

封臍肉大如兩即愈 談野翁方

五積散 治外感風寒內傷生冷而腹疼者

方見四卷證門

積滯痛

普門醫品

腹痛

卷三十二

木香檳榔丸 治飲食停滯腹疼

木香檳榔 白皮陳皮莪朮煨黃連炒枳殼炒各一

兩當歸香附子炒黃檗炒大黃生各三兩牽牛四

兩研細末小丸梧子大每服五十九空心薑湯下

備急丸 治腹脹疼大便不通

方見五卷內傷門

養仁承氣湯 治見論

方見本卷心痰門

普門醫品卷之十八

東武王化貞元起父編輯

門人陳斌憲卿父較閱

腰痛門

通治

風寒濕痛

墜閃傷痛

論腰者腎之外候一身所持以轉移闔闔者也諸

脉皆貫于腎絡于腰脊腎氣一虛腰必痛矣轉搖

不能腎將憊矣除墜傷于虛無涉外其風寒濕熱

普門醫品

腰痛

卷十八

戴氏曰日夜悠悠痛而不已者腎虛也日輕夜重

者血虛也遇人陰或久坐而痛者濕也

有腎着證其體重腰冷如冰飲食如故小便自利

腰以下冷痛而重治宜踈濕兼用溫藥

腰痛甚者不宜補氣亦禁寒涼

通治二十方

青娥丸 治腎氣虛弱風冷乘之或血氣相搏腰疼

如折俛仰不利或勞役閃墜傷損及風寒濕證

破故紙酒浸炒杜仲去皮薑十浸炒各半斤為末

胡桃仁二十箇去皮研爛蜜丸梧子大空心溫酒服六十丸婦人淡醋湯下和制局方

指牙法 治一切腰疼

香附子五兩以生薑二兩取自然汁浸一宿炒黃爲末入青鹽二錢擦牙數次其疼即止免坤生意

又方

補核杜仲各二兩炒研每服二錢鹽酒下簡便方

腰痛如刺

八角茴香炒杜仲炒各三錢爲末水一鍾酒半鍾

普門醫品

腰痛

卷八 二

煎七分入水香末五分溫服簡便方

又方

八角茴香炒研每服二錢食前鹽湯下簡便方

腰疼不可俛仰

龍甲炙研末酒服二錢日二服明後方

腰疼不止

絲瓜燒存性爲末每溫酒服二錢第卷雜真

腰疼及遍體作疼殆不可忍

玄胡索當歸桂心等分爲末溫酒服三四錢隨重

頭進以止爲度外臺秘要

腰脊疼

三月三日采菟花一斗一升并華水三斗米五斗麴六升如常釀酒每服十餘杯日三神効千金方

腰膝疼痛或頑麻無力

兔絲子淘牛膝各一兩同入砂器內酒浸一日夜暴乾爲末將原酒煮糊丸梧子大每空心酒服五十丸經驗方

又方

普門醫品

腰痛

卷八 三

猪腰子一枚去筋膜切片以椒鹽淹去腥水入杜仲末三錢荷葉包煨食之空心溫酒下本草權度

又方

天麻半夏細辛各二兩絹袋二箇分勻盛之蒸熱交互熨疼處汗出則愈數日再熨衛生易簡方

腎虛腰疼

破故紙一兩炒爲末溫酒服三錢神妙或加木香一錢經驗方

又方

大茴香炒研以猪腰子批開去膜。搽末于內。濕紙
裝煨熟。空心食之。鹽酒送下。戴元禮要訣

又方

大豆炒二升。酒三升。煮二升。空心頓服。肘後方

又方

杜仲去皮炙黃一斤。分十劑。每夜取一劑。水一升
浸至五更。煎半升去渣。以羊腎四枚去膜切下。再
煮三五沸。如作羹法。和以椒鹽。空腹頓服。元亮方

腎虛腰痛。不能轉側

普門醫品

腰痛

卷八 四

鹿茸灸。兔絲子淘。各一兩。舶茴香半兩。爲末。以羊
腎二對去膜。酒煮爛。搗如泥。和丸梧子大。陰乾。每
服三五十九。空心溫酒下。日三服。本事方

又方

鹿角屑三兩。炒黃研末。空心溫酒服二錢。肘後方

氣滯腰疼

青木香末。乳香。各二錢。酒浸飯上蒸攪勻。空心溫

酒調服。聖惠方

婦人血氣遊走。心腹作疼。及腰疼者

蓬莪朮乾漆各二兩。爲末。酒服二錢。腰痛。核桃酒
下。普濟方

風寒濕痛 八方

風冷傷腎。腰背常痛

杜仲一斤。切炒。酒二升。浸十日。日服三合。或爲末
入補腎脂減半。每旦溫酒服二錢。陶隱居得効方

腰腿風痛。不能履地

皂莢子一千箇。洗以酥油炒香爲末。蜜丸梧子大
每空心以蒺藜子酸棗仁煎湯下三十九。千金方

普門醫品

腰痛

卷八 五

腰脚不隨。寧急冷痛

虎脰骨五六寸。刮去肉膜。塗酥炙黃。擣細。絹袋盛
之。以瓶盛酒一斗。浸之。煨火微溫。七日後。任情飲
之。當微利便効也。本草綱目

又方

虎腰脊骨一具。前兩脚全骨一具。金于石上搗碎。
安鐵床上。武火炙。待脂出。則投無灰酒中。密封。春
夏七日。秋冬三七日。任性日飲三度。連十年以上。
不過三劑。七年以下者。一劑必愈。元亮方

濕氣腰痛

車前草連根。葱白連鬚。各七科。棗七枚。酒煮瓶盛。常服。終身不發。簡便方

腰脚冷疼

草烏去皮臍研末。醋調貼患處。立止。十便良方

腰脊引疼

疾藜子搗末。蜜丸。梧子大。每二十九。食前淡鹽湯下。日三。外臺秘要

卒然腰痛

普門醫品

腰痛

大豆六升。拌濕炒熟。布裹熨之。冷即易之。延年方

閃墜傷痛

八方

白芷散 治一切顛墜閃挫腰痛不可忍

白蒿。苣子炒三兩。白粟米炒一兩。乳香焙。沒藥焙。烏梅肉各半兩。爲末。煉蜜丸。彈子大。每食前嚼一丸。熱酒下。本草綱目

又方

冬瓜皮燒研。食前酒服二錢。玉機微義

閃脚腰痛

續猪腎一枚。批片。以鹽椒淹過。入製甘遂末三錢。

荷葉包煨熟。食前食之。溫酒送下。儒門事親

又方

用神麴煨過。滓酒。食前溫服。極効。本草綱目

又方

蒔蘿作末。食前酒服二錢。永類鈴方

又方

橙核燒存性爲末。酒服三錢。即愈。攝生方

打墜腰疼。瘀血凝滯

普門醫品

腰痛

破故紙炒。茴香炒。肉桂等分爲末。空心熱酒調服。

二錢。直指方

又方

赤電兒燒存性研末。空心酒服二錢。集簡方

脇痛門

論脇痛。有肝火盛。木氣實。有死血。有痰。

丹溪曰。治脇痛。要分人之肥瘠強弱。肥白人氣虛。

發寒熱而脇下痛。用參芪補氣。柴胡黃芩退熱。木

香青皮調氣瘦人發寒熱脇痛多怒者必有瘀血
宜桃仁紅花青皮大黃之類行之

肝盛木氣實肝病木氣鬱皆令脇痛或死血瘀血
惡血停留于肝歸于脇下而痛引少腹其病即自
汗按之痛益甚宜破血利氣

凡脇疼偏左者皆肝經積滯或中風寒或肝膽實
火宜詳實虛而治之偏右疼者屬脾肺為食積為
痰飲兼效而有痰是也若脇下有水聲者飲也

通治 十方

普門醫品

脇痛

卷八 八

脅下疼痛

地膚子為末酒服二錢 奇效神方

又方

棘針鈎一合焙檳榔二錢半水一盞煎五分入好
酒半盞更煎三五沸分二服 經驗方

又方

吳茱萸研末醋調傳之或入醋炒熱熨之或以葱
韭熨之亦効

腰脇引痛不可忍

鳳德花子研併晒乾為末空心酒服三錢急漱口
勿令藥近牙 本草綱目

枳殼散 治脇痛如有物搏

枳殼麩炒二兩半甘草炙七錢半為末每服三錢
葱白湯調服

枳芩散 治左脇刺痛不可忍

枳實麩炒川芎各三錢甘草炙一錢水盞半薑三
片棗一枚煎八分食前溫服二服愈 東垣方

推氣散 治右脇痛甚脹滿不食

普門醫品

脇痛

卷八 九

片薑黃枳殼麩炒桂心各半兩甘草炙三錢為細
末每服二錢薑湯下 和劑局方

寒疝引脇肋心腹皆痛諸藥不效

大烏頭五枚去角四破以白蜜一鍾入水二碗煮
透煑為末別以煉蜜和九梲子大每服二十九食
前冷鹽湯下 崔氏方

又方

小茴香一兩炒枳殼五錢麩炒為末每服二錢食
前鹽湯調服神效 袖珍方

前鹽湯調服神效

芍藥散 治婦人血氣脇痛

白芍藥炒。玄胡索炒。肉桂各一兩。香附子二兩半。醋一升。鹽半兩。同煮上藥乾為極細末。每服二錢。白湯調服。不拘時。

背痛

附項強

論背連腰脊強者。太陽經風寒也。宜散寒。若背脹

而痛。起打稍愈。為痰壅氣滯。宜豁痰散氣。

肩背痛不可迴顧者。太陽經氣鬱而不行也。脊痛

普門醫品

背痛

卷八 十

項強。腰似折。項似拔者。太陽經氣不通也。俱宜通

氣。防風湯

肩背痛如負重。身體沉者。此寒濕也。宜用羌活勝

濕湯。加防已附子

通治 三方

豁痰湯 治肩背疼痛。飲酒有痰者更宜

半夏製。梔子炒。各一錢。陳皮。海桐皮。枳殼。麩炒。各八分。桔梗。赤芍藥炒。蒼朮炒。香附。各七分。白茯苓。去皮六分。川芎。片薑黃。各五分。甘草炙。三分。水二

鍾薑三片。煎八分。食遠熱服。痛甚加朴硝二錢

通氣防風湯 治見論

羌活。獨活。各一錢。藁本。防風。川芎。各八分。蔓荊子。甘草炙。各五分。水鍾半。薑二片。葱白一根。煎七分。食後服 按方

羌活勝濕湯 治見論

羌活。蒼朮炒。白朮炒。白茯苓。各一錢。藁本。防風。各八分。白芷。蔓荊子。各七分。升麻六分。甘草炙。防已。大附子製。各五分。水二鍾。煎八分。食後服

普門醫品

背痛

卷八 十一

附項強

木瓜煎 治項頸強直。不得轉移

宣州木瓜二箇。取蓋去穢。納入沒藥乳香各一兩。

用原蓋縛定。飯上蒸三四次。爛研成膏。每服三錢。

生地黃汁半盞。無灰酒一盞。煖調服。最效

又方

大豆一升。蒸變色。囊裏枕之 千金方

又方

八月後。取荆芥穗作枕。及鋪床。立春去之 千金方

風襲頭項。強痛不得顧視。

穿地作坑。煨赤。以水洒之稍冷。鋪生桃葉於內。臥席上。以頭着坑上。蒸至汗出良久。可避風。千金方

手臂痛門

〔論〕臂痛者。因濕痰橫行經絡也。或睡後手在被外。為寒邪所襲。遂令臂痛。及乳婦以臂枕兒。傷於風寒。而致臂痛。各求其因以治之。

飲酒人熱在上焦。不能清利。日久醞釀生痰留飲。

臂門醫書

臂痛

卷之三

濕邪鬱於項臂。不腫則痛。

薄桂能橫行手臂。領南星蒼朮以成其功。

〔通治〕

十三方

二朮湯 治痰飲雙臂作痛

蒼朮米泔浸炒一錢半。日本製同上。半夏南星各

薑製。黃芩酒炒。香附炒。白茯苓去皮各一錢。陳皮

七分。威靈仙。甘草炙。各五分。生薑三片。水二鍾。煎

一鍾。食遠溫服。

舒經湯 治氣血凝滯。經絡不行。臂痛不可忍。

羌活。白朮炒。當歸。海桐皮。酒洗各一錢。薑黃二錢。甘草炙。赤芍藥炒。各六分。水二鍾。煎一鍾。食遠服。茯苓丸 治痺痛兩臂不能舉。左右時復轉移。由伏痰在內。中腕停滯。脾氣不行。上與氣搏。四肢不用。或兩臂如人抽拽。

白茯苓二兩。半夏製四兩。枳殼麩炒一兩。風化消三錢。為細末。薑汁糊丸。梧子大。每五十丸。薑湯下。烏藥順氣散 治流痰氣滯。臂疼不能舉。最效。

方見二卷中風門

臂門醫書

臂痛

卷之三

豁痰湯 治飲酒人濕痰停滯經絡。作痛。

方見本卷背痛門

風熱臂痛

桑枝一大握。切炒。水三升。煎二升。一日服盡。許叔微云。常病臂疼。諸藥不効。服此數劑。尋愈。本事方

當歸三兩。切。酒浸三日。溫飲之。飲盡再浸。以瘥為度。事林廣記

又方

虎頭骨炙黃搗碎新為藥切各二兩羚羊角屑一兩以無灰酒浸之養至七日秋冬倍之每日空腹飲一杯若要速服即以銀器盛於火爐中暖養二三日即可服也 兵部手集

手足腫疼欲斷

蒼耳搗汁漬之并以滓敷之立效春用苗冬用子千金方

天行風毒手足腫痛欲斷

掘地作坑深三尺燒熱灌以醇酒着履坐於上以

普門醫品

附漏

卷八 上內

衣雍之勿令泄氣類要方

傷寒熱毒攻手足痛欲脫者

取羊尿煮汁漬之愈乃止 外臺方

又方

以熱水泡馬屎取汁漬之 外臺方

又方

用猪膏和羊尿塗之 外臺方

痛風門

附鶴膝風

論痛風者遍身骨節走注疼痛也故曰歷節風其痛如虎噬故又謂之白虎風

病源曰是氣血虛由飲酒奏理開汗出當風所致或因調護不謹以致風寒襲之邪氣偏歷關節與氣血相搏而痛非常

歷節風因風寒濕襲於關節者多亦或有濕痰流注凡痛楚夜甚而晝稍輕者為風寒勝也無分晝夜皆劇者為濕痰也濕勝者則惡飲食而時作嘔吐也

普門醫品

痛風

卷八 十五

通治

二十七方 與本卷痺證門參看

歷節風痛

獨活羌活松節等分用酒煮二三沸每日空心飲一二杯 外臺秘要

歷節諸風骨節疼痛日夜走注不止

沒藥半兩虎脰骨酥炙三兩為末每服二錢溫酒調下 圖經本草

又方

麒麟竭硫黃末各一兩每溫酒服一錢 聖惠方

又方

三年陳米醋五升煎五沸切葱白三升於內再煎一沸漉出以布染乘熱裹之痛止乃已

外臺秘要

又方

炭灰五升蚯蚓泥一升研細紅花七把和炒以醋拌之用故布包作二包更互熨痛處

聖惠方

又方

松葉搗汁一升入酒和煎每服一合日三

千金方

歷節諸風百節酸痛不可忍

普門醫品

痛風

卷六 七

松脂三十斤鍊五十遍以煉淨酥油三升攪令極稠每食前酒服二錢日三服數食麪粥爲佳忌腥

冷酸物果子一百日

外臺秘要

又方

虎頭骨一具塗酸炙黃槌碎絹袋盛置二斗清酒中浸五宿隨性飲之

聖惠方

烏頭湯

治歷節風痛不可屈伸及治脚氣掌痛

川烏一枚用蜜四合煮二合去川烏用蜜酥黃白

芍藥炒甘草炙黃耆酒各等分水二鍾入蜜一

合煎八分去渣空心服

又方

用羊蹄根於生鐵上以好醋磨旋刮取汁塗患處即愈如不愈入硫黃末塗之

聖惠方

骨節疼痛

用少壯人於痛處隔單衣更互呵之久久經絡通透自愈

本草綱目

又方

鹿角炒存性爲末酒服二錢

普門醫品

痛風

卷六 十七

又方

虎骨酥炙一兩通草一兩水二碗煎一碗空心服覆臥汗出爲効切忌熱食損齒小兒不可與食

恐齒不生

食療本草

桃仁丸

治一切風毒遍身痛疼

生草烏五靈脂炒各三兩桃仁霜一兩研細酒糊丸梧子大青黛爲衣食後溫酒下十五丸

宣明方

筋骨疼痛不拘風濕氣楊梅毒及女人月家病先用

此藥止疼然後調理

乾馬齒一斤濕馬齒二斤五加皮半斤茶木
四兩春碎以水煎湯洗浴急用葱薑搗爛烘熱湯
三碗服之暖處取汗立時痛止 海上名方

風毒骨節疼膝攣

豆豉一升九蒸九曝以酒五升浸一宿空心隨意
溫飲之 食醫心鏡

骨髓風毒疼痛不可運動

火麻仁水浸取沉者一升曝乾於砂鍋中旋旋慢
炒香熟入石臼內搗萬餘杵如粉分爲十劑每劑

普門醫品

痛風

卷八

用無灰酒一大碗和勻煎至減半濾去滓空腹溫
服四五帖見效 篋中方

風濕走痛

牛皮膠一兩薑汁半盞同化成膏攤紙上熱貼之
冷即易甚效或加乳香沒藥各一錢 普濟方

歷節腫痛風熱所搏手指赤腫麻木甚則肩背足膝
赤皆腫痛或大便秘

半旁子三兩新豆豉羌活各一兩爲末每服二錢

白湯下 本事方

歷節風及風痺半身不遂肉理枯虛生蟲遊走痒痛

用真川椒紅色者去合口及子以草紙二層隔炒
出汗取放地上砂盆蓋定以灰密遮四傍約一時
許春去黃殼爲細末以酒糊爲丸梧子大每服四
十九上部痛用桂枝煎湯下下部疼用鹽湯下腰
疼用茴香湯下 三因方

通天再造散 治歷節風痛有蟲

生大黃一兩皂角刺一兩半爲末每二錢臨夜冷
酒調下當渴蟲越三日又進一服候蟲盡乃已

普門醫品

痛風

卷八

一粒金丹 治腰膝走注痛如虎咬

草烏五靈脂好墨當歸酒洗各一兩白膠香半斤
木鼈子去殼地龍去土各二兩乳香沒藥各五錢
麝香五分各爲末同研勻米粉糊丸梧子大每服
三十丸溫酒下微汗愈 醫鑑

手足冷痛如虎咬者

樟木屑一斗急流水一石煎極滾泡之乘熱安手
足於桶上熏之以衣物隔住勿令藥氣入口其效
甚捷 醫學正傳

筋骨疼痛以患楊梅瘡服輕粉留毒年久不愈者

葳靈仙二斤浸酒三十斤封煮一炷香出火毒逐日飲之以愈為度 經驗方

又方

用野薔薇根白皮水洗三斤酒十斤煮一炷香每日任飲以愈為度 本草綱目

又方

赤雹子炒開口為末酒服一錢日二服 集簡方

凡人身上忽有一處如打撲之狀不可忍走注不定

普門醫品

痛風

卷之三十

靜時其處冷如水雪皆暴寒傷之也

以白酒煮楊柳白皮暖熨之有赤點處砭去血妙凡諸卒腫急病熨之皆愈 姚僧坦集驗方

附鶴膝風

論肘膝腫痛臂脛細小名曰鶴膝風以其象鶴膝之形而名之也或止兩膝腫大皮屑拘攣不能屈伸脛腿枯細俗謂之鼓槌風皆風寒濕之流注而為病也

通治 四方

鶴膝風病

酒糟四兩肥皂一箇去子芒硝五味子沙糖各一兩薑汁半碗研勻日日塗之入燒酒尤佳

膝風作疼

草烏細辛防風等分為末裝入襪中及護膝內能除風健步 扶壽方

加味小續命湯 治鶴膝風行履不得

防風桂心黃芩杏仁去皮尖炒白芍藥酒炒甘草炙川芎麻黃去節人參去蘆各一錢四分防已二

普門醫品

痛風

卷之三十

錢附子炮七分草薺川練子獨活木瓜各八分水二鍾煎一鍾碗中先放麝香少許將藥傾入和勻服十貼後見效 和劑局方

大防風湯 治寒濕冷氣兩膝腫疼不能屈伸

防風羌活白朮炒人參去蘆熟地黃當歸酒洗白芍藥酒炒黃耆酒炙牛膝酒洗川芎酒洗各一錢甘草炙七分附子製五分杜仲薑炒錢半水二鍾薑五片棗一枚煎八分溫服 和劑局方

痺證門

附痿證

論經云風寒濕三氣雜至合而為痺其風勝者為

行痺謂則身走痛不寒也寒氣勝者為痛痺謂所

發之處痛不可忍也濕氣勝者為著痺謂或痛或

麻只在一處留而不去也

岐伯曰痛者寒氣多也有寒故痛也其不痛不仁

者病久入深榮衛之行清經絡時疎故不痛皮膚

不榮故不仁其寒者陽氣少陰氣多熱者陽氣多

普門醫品

痺證

卷之三

陰氣少熱多汗濡者此逢濕甚也痺之為病寒多

則痛風多則行濕多則著在骨則重而不舉在筋

則屈而不伸在肉則不仁在脉則血凝而不流在

皮則寒此五者則不痛也凡痺逢寒則急逢熱則

緩

痺之為證有項背拘急肌肉不仁與風證相似又

有腰腿重著四體不舉與痿證相似俗多混同出

治此千古之惑也不知風則陽受之痺為風寒濕

所感則陰受之為病多重著沉痛痿因血少氣虛

火盛剋金肺葉焦枯宗筋不潤肝木乘勝脾土受

傷精血虛耗故筋骨痿而不用治宜潤燥養血滋

陰若痺則氣血凝滯留而不行或疼痛麻木不仁

治宜行氣勝濕為主三證大畧雖亦相似施治迥

然不同痿證見下

通治

十七方○本卷痿風門下卷脚氣門參着

五痺湯 治風寒濕三氣客留肌膚手足痛麻木不仁

羌活白朮炒防已酒浸片薑黃各一錢甘草炙七

分水盞半薑五片煎八分食前服和劑局方

普門醫品

痺證

卷之三

蠲痺湯 治手足冷痺腰腿沉痛項背拘急

當歸酒浸赤芍藥炒黃耆蜜炙片薑黃羌活各二

錢甘草炙五分水盞半薑五片紅棗一枚煎八分

不拘時服一方加防風治生風方

茯苓湯 治痛痺四肢疼痛拘攣浮腫

赤茯苓去皮糸白皮炒各二兩防風官桂羌活麻

黃去節各一兩半附子製甘草炙各五錢為末每

服五錢水一碗棗二枚煎七分去滓溫服以薑湯

投之汗出即效宜明論方

風濕冷痺 風濕俱疼

諸瘡葉火烘熟厚鋪床上趁熱眠於上冷即易之

月取根杆碎炒熟用 外臺秘要

片風冷痺證及因水濕所致者渾身上下強直不能

屈伸痛不可忍

用五積散加穿山甲七片須看病在左右上下手

足或臂或脇臆痛處取甲炮焦全蝎十個炒熟葱

頭三個薑五片水二鍾煎一鍾入酒一小盞再煎

沸熱服取汗通風甚良 德生堂經驗方 五積散方

普門醫品

痺證

卷八 五

見四卷寒證門

風濕濕痺筋節痛手足不舉

全蝎七箇瓦炒入麝香一字研勻酒三盞空心調

服如覺已透即止未透再服 直指方

風痺厥痛

天仙子三錢炒草烏頭炮甘草炙各半兩五靈脂

一兩為末糊丸梧子大以螺青為衣男子薑黃湯

下女子芫花湯下 聖濟錄

手足麻痺時發疼痛不可忍及瘡癤等證

黃靈仙炒五兩生川烏五靈脂各四兩為末醋糊

丸梧子大每服七丸鹽湯下忌茶 普濟方

海桐皮酒 治風痺腰膝痛不可忍

海桐皮薏苡仁炒各二兩牛膝酒浸川芎酒洗羌

活地骨皮五加皮各一兩甘草炙半兩生地黃十

兩并洗淨細剉以絹袋盛入無灰酒二斗浸之冬

二七日夏一七日取飲每空心正午臨臥各飲一

盞常令微醺此方不得增減忌煎炒毒物 劉禹錫

傳信方

普門醫品

痺證

卷八 五

蒸痺法 治風濕痺證腰脚疼痛不止

用荆葉不拘多少蒸熟置大甕中其下着火溫之

置病人於甕中以葉擁護須臾當汗出蒸時旋旋

喫飯覺倦乃止以被裹之避風仍以葱豉酒及豆

淋酒飲之以愈為度 海上集驗方

烏沈湯 治一切邪氣冷風麻痺膀胱腎間冷氣攻

衝背脊俛仰不得及癢癢刺痛中惡心腹痛婦人血

氣疼

天台烏藥五兩沉香二兩人參三錢甘草四錢為

木勿服一錢遠湯入鹽末空心熱服

雷火神針法 治風寒痺痛附骨疽疔在筋骨隱痛者針之火氣直達疼處即效

蒸斷艾末一兩孔香沒藥川山甲硫黃雄黃草烏頭川烏頭桃樹皮末各一錢磨香五分爲末以厚紙鋪藥艾於內厚捲如指大長三四寸收貯瓶內埋地中七七取出用時於燈上點着吹滅隔紙十層藥熱針於患處熱氣直入病處效極速並忌冷水

普門醫品

痺證

卷之三

活絡丹 治痺痛諸藥不効者

白朮炒當歸酒浸羌活獨活川芎酒洗各一錢甘草炙五分水盞半薑五片煎七分不拘時服

防風湯 治行痺上下左右行走無定

防風甘草炙當歸酒浸赤茯苓去皮杏仁去皮炒熟桂各一兩黃芩秦艽葛根各三錢薑五片雨去節爲末每服五錢酒水各一盞棗二枚薑五片煎至一盞去渣溫服

大豆藥散

治周痺渾身疼痛

大豆藥散一斤乾炒香熟爲末每服半錢空心溫酒調下加至一錢日三服

宜明方

茯苓川芎湯 治著痺留注不去四肢痛麻拘攣浮腫

赤茯苓桑白皮炒防風官桂川芎酒洗麻黃去節芍藥炒當歸酒洗甘草炙各等分爲末每服三錢水二盞棗三枚煎至一盞空心溫服如欲出汗以粥投之

宜明方

熨法 治寒痺留不去時疼而皮不仁

普門醫品

痺證

卷之三

川椒乾薑桂心各一斤以麝威醇酒二十斤漬之綿絮一斤細白布四丈并納酒中以馬糞火烘之封固勿令泄氣五日五夜出布絮曝乾復漬以盡其汁每漬必擣去其汁令乾乃出曬之將布縫作袋長三尺以綿及藥淨裝入共作七袋以炭火炙熱熨疼處或先以針刺過後熨更佳七袋更炙更熨三十遍而止汗出以袋拭之亦三十遍而止房內謹密不見風自愈

宜明方

附瘻瘻

因肺熱葉焦五臟因受之發為痿痺
肝氣熱則筋痿脾氣熱則肉痿腎

氣熱則骨痿
治痿之法獨取陽明陽明者五臟六腑之海主潤
宗筋宗筋主束骨而利機關也陽明熱則宗筋縱
帶脈不引故足痿不用也

原病式曰痿病皆屬肺金不足痿弱不能收持由
肺金本燥燥則血液衰少不能榮養百骸故也

張子和云痿因肺弱相傳四臟人見其所患累與

普門醫品

痺痿

卷二

風痺脚氣相似便作風寒濕痺脚氣治之用燥熱
之藥鍼灸燔灼不思痿為燥熱而成若作風寒治
是殺之也

丹溪曰痿證切不可用發散之劑痿為氣血虛王
於補養其氣以實脾土則四肢運用而筋有所
滋則肺清養其血以潤燥則宗筋束骨而利機關
何痿病之有斷不可作風治而用風藥凡人覺足
常熱者後必痿也多年不起者有之

通治 五方

加味四物湯 治諸痿四肢軟弱不能舉動

熟地黃三錢白芍藥酒炒川芎各八分當歸身酒
洗麥門冬去心蒼朮炒黃蘗音各一錢五味子九
粒人參黃連炒各五分知母三分杜仲炒八分牛
膝酒洗六分足不軟者不用水一鍾煎一鍾空心
溫服酒糊丸亦可醫學正傳

健步丸 治膝軟無力屈伸腰腿沉重足不能行

防已酒浸一兩防風澤瀉各三錢川烏炮去皮苦
參酒浸各一錢肉桂五分滑石炒瓜蒌根酒製柴

普門醫品

痺證

卷二

胡羌活甘草炙各半兩為末酒糊丸梧子大每服
七十九食前溫酒送下東垣方

鹿角膠丸 治血氣俱虛兩足痿弱不能行動久臥

床褥

鹿角膠一斤鹿角霜熟地黃各半斤牛膝酒洗白
茯苓去皮兔絲子酒煮人參各二兩當歸身酒洗
四兩白朮炒杜仲炒各二兩虎脰骨酥炙龜板酥
炙各一兩為細末另將鹿角膠用無灰酒二文溶
化為丸梧子大每服百丸空心鹽湯下

金剛丸 治腎損骨痿不能起床宜服此益精

草薢酒製杜仲薑炒肉苁蓉酒浸芎藭子酒煮各

四兩爲細末酒煮腰子一對取汁和丸梧子大每

服七十丸空心溫酒下

參歸養榮湯 治痿證

人參去蘆當歸酒洗熟地黃白朮炒茯苓去皮白

芍藥酒炒陳皮黃芩酒炒知母酒炒牛膝酒洗杜

仲薑炒破故布酒炒各一錢甘草炙五分水二鍾

煎一鍾空心溫服肥人氣虛有痰加半夏去白芍

普門醫品

痺證

卷之三

瘦人血虛有火倍當歸熟地黃

普門醫品卷之十九

東武王化貞元起父編輯

門人陳 斌憲卿父較閱

脚氣門

乾濕脚氣 脚氣冲心 脚上諸病

論巢氏病源云凡脚氣病皆因感風毒所致初得

此病多不即覺飲食嬉戲氣力如故當熟察之其

狀自膝至脚或痺或隱隱如蟲所緣或脚膝及脛

指灑灑覺寒或脚屈弱不能行或微腫或酷冷或

普門醫品

脚氣

卷一

疼痛或緩縱不隨或變急或惡聞食氣或有物如

指發於端內徑上冲心者或壯熱頭疼增寒外証

與傷寒相類但卒然脚痛爲異耳若治之緩便上

入腹胸脇滿氣攻心便殺人不可不早治也

楊大受云脚氣爲壅疾當用宣通之劑使氣不得

成壅也如羌活導滯湯之類蒼白朮南星以去濕

羌獨活木瓜檳榔以行氣佐以木通牛膝引經當

歸生地黃和血此必用之藥

陳無擇曰脚氣不專主于一氣亦不專在一經凡

自汗走注者爲風勝無汗急掣痛者爲寒勝
滿重者者爲濕勝煩渴燥熱者爲熱勝四氣兼
者但推其多者爲勝分表裏以施治也

腫者名濕脚氣宜利濕疎風不腫者名乾脚氣宜
養血潤燥

乾濕脚氣 三十八方 〇十八卷痺證門可參着

羌活導滯湯 治脚氣初發一身盡疼或肢節腫疼
便溺阻隔先以此藥導之

羌活獨活漢防已當歸酒洗大黃酒蒸各一錢枳

實門醫品 脚氣 卷九 二

實麴炒五分水盞半煎七分溫服 東垣方

脚氣掣痛初發

取土烏藥不犯鐵器布揩去土磁瓦刮好酒浸

一宿次早空心溫服酒湯 二次即愈入麴少許

尤佳痛入腹者以烏藥同雞子十尾器中水煮一

日取雞子切食以湯送下甚効 永類方

一切脚氣疼痛

鹽三升蒸熱分裏近壁以脚踏之令脚心熱夜夜

用之或入槐白皮鹽內同蒸尤良每夜用熱鹽擦

膝足及足甲常令鹽氣透入 金瘡本草

新舊脚氣

血竭乳香煨燥等分同研以木瓜一個剝孔入藥
在內以麴厚裏砂鍋煮爛連麴搗丸梧子大每溫
酒服三十丸忌生冷 奇効方

又方

用荆條于罈中燒烟熏湧泉穴及痛處使汗出則
愈 永類方

脚氣腫痛

實門醫品 脚氣 卷九 三

木鼈子仁每個破作兩片麴炒過切碎再炒去油

盡爲度每兩入肉桂半兩爲末熱酒調服二錢令

醉得汗愈 夢授秘方

又方

樟腦二兩烏頭三兩爲末醋糊丸彈子大每置一

丸按扁於足心踏之以微火烘之衣被圍覆汗出

如涎爲効 醫林集要方

又方

皂角赤小豆爲末酒醋調貼腫處 永類方

又方

桃花陰乾為末。每溫酒細呷二錢。一宿即消。外臺

秘要

又方

木瓜切片。囊盛踏之。各醫錄

又方

貓兒眼睛草。驚風藤。蜂房等分。每用一兩水五碗煎三碗。熏洗之。衛生易簡方

又方

普門醫品

脚氣

卷九 四

甘遂半兩。木鼈子仁四箇。為末。用猪腰子一箇去皮膜切片。以藥四錢摻在內。濕紙包裹煨熟。空心食之。米飲下。大便行後。喫白粥二三日。本事方

二末散 治全上

蒼朮。白朮各用米泔浸。去皮切炒。牛膝酒洗各三錢。黃酒一鍾水二鍾。煎至一鍾。空心服出汗愈。脚氣腫痛煩渴。

四月桑茂時。采葉陰乾收好。十月霜後。葉落四分之三。尚在一分。名神仙葉。採取陰乾。與前葉為末。

丸散任服。或煎水代茶。亦可煎水淋洗。

又方

大麻仁炒香。研水取汁三升。入赤小豆半升。煮熟。空心食豆飲汁。外臺秘方

脚氣腫痛成瘡

水蓼煮汁漬瘡之。根莖亦妙。唐本草

脚氣浮腫。心腹滿。大小便不通。氣急喘息。

郁李仁一兩。去皮搗爛。水研絞汁。薏苡仁搗成糝。三合。同煮粥食之。韋宙獨行方

普門醫品

脚氣

卷九 五

脚膝浮腫

荷葉心。藁本等分。煎湯淋洗之。永類方

又方

桑條二兩炒香。以水一升煎二合。每日空心服之。聖濟總錄

脚氣骨節腫痛。服此進飲食。健氣力。不忌事。

五加皮去木。遠志去心。各四兩。俱酒浸。春秋三日。夏二日。冬四日。日乾為末。以酒浸糊為丸。梧子大。每服四五十丸。空心溫酒下。瑞竹堂方

脚跟腫痛不能着地

用黃牛尿入鹽炒熱王水輔惠濟方

傷濕脚腫

蔥草葉煮湯漬之日三五次極妙幸宙御行方

脚氣腫久不瘥者

生黑附子一箇去皮諸藥水薑汁調如膏塗之

藥乾再塗腫消為度前人所傳方

脚氣作疼

蓖麻子仁七粒研爛同蘇合香丸貼足心即止外

普門醫品

脚氣

卷九

聖秘要

又方

無名異為末化牛皮膠調塗之頻換易簡方

脚氣走痛

蘿蔔煎湯洗之仍以鹽酒晒乾為末裝襪內聖濟

總錄

脚氣筋骨引痛

金銀花為末空心熱酒調下二錢衛生易簡方

又方

戴靈仙一斤洗晒乾酒浸七日為末麪糊丸梧子

天空心以淡藥酒下每服二十九丸常服本草綱目

脚筋攣痛

木瓜數枚酒水各半升煮爛搗膏乘熱貼於痛處

以帛裹之冷即換日三五度其藥本草

腰脚沉重疼痛

葳靈仙末蜜丸梧子大溫酒下八十九粒惡物如

膠膠即是風毒積滯未利再服一百丸利後食粥

補之仍調養一月集驗方

普門醫品

脚氣

卷九

腰脚冷痛

草烏頭三箇去皮臍研末醋調貼之十便良方

風濕脚氣

鍼砂川烏頭為末和勻炒熱帛包熨之摘玄方

風濕膝痛脚氣虛汗少力陰間常濕

用枯礬末按沸湯淋洗疼處脚氣冲心者用生白

礬煎湯乘熱洗御藥院方

脚氣濕毒兩脛生瘡

穠穠中生野苧葉夏日採取晒乾為末每以五錢

入輕粉五分。桐油調作隔紙膏。周圍縫定。以茶洗淨。縛上黃水出。五六日愈。簡便方

脚氣成滿。跟有一孔深半寸許。其痛異常。

用人中白煨水出。滴入瘡口。證治要訣

脚底木硬

牛皮膠。薑汁化開。調南星末敷足底。以布裹之。

脚軟疼

杜仲一味細切薑製。每一兩酒半碗。水半碗煎六

分服之。一少年新娶後得脚軟病疼甚。醫作脚氣

普門醫品

脚氣

卷九 八

治不効。或曰此腎虛非脚氣也。用此三日能行。又

三日全愈。龐元英談數

腰脚痺軟。行步不穩者

草薢二兩四錢。杜仲八錢。搗末。每旦溫酒服三錢

忌牛肉。廣利方

脚氣冲心

脚氣入腹脹滿喘急

葳靈仙爲末。每三錢酒下。痛減藥亦減。簡便方

脚氣冲心。或心下結硬腹中虛冷

陳皮一斤。杏仁去皮尖五兩同炒爲末。蜜搗和丸。

梧子大。每日食前米飲下三十丸。食療本草

脚氣上攻結成腫核。及一切腫毒

斗蓮木水調敷腫處。再濃煎甘草汁空心服之。其

腫卽消。百一選方

脚氣冲心。煩悶不識人

大豆一升。水三升濃煮汁服。未定再服。廣利方

又方

白檳榔一兩二錢爲末。分二服。空心溫童便調下。

普門醫品

脚氣

卷九 九

或入薑汁更妙。廣利方

又方

吳茱萸。生薑。搗汁飲甚良。食療本草

杉木湯。治脚氣上攻。胸膈痞絕。搗搗上視。脇有塊

大如石。且歎困不知人。服此氣通塊散

杉木節一升。橘葉一升。如無葉用枝。大腹檳榔七

枚搗碎。童子小便三大碗。共煎一碗半。分作二服

若一服卽下利通快。便止後服。柳柳州校方

附脚上諸病二十九方

足趾雞眼

剔去皮。以燂雞湯洗之。則不生。簡伊方

又方

地骨皮。同紅花研細敷之。次日即愈。問濟亭宣

又方

先挑破。取黑白蝨各一枚。置於上縛之。數日自愈。
便民圖纂

足上雞眼肉刺

枯礬。黃丹。朴硝。等分爲末。擦二三次。愈。多能鄙事

普門醫品

脚氣

卷九 十

足趾肉刺

無食子三枚。肥皂莢一挺。燒存性。爲末。醋和敷之。
奇効方

又方

先以湯浸。刮去一層。用黑木耳炒研貼之。自消不痛。
近効方

又方

李葉。棗葉。搗汁貼之。
千金方

陷甲入肉痛苦

蛇蛻一具。燒灰。雄黃一彈丸。同研末。先以溫水洗瘡。針破貼之。
初虞世方

又方

濃煎陳皮湯。浸良久。如甲肉自離。輕手剪去。以虎骨末傅之。即安。
醫林摘要

又方

胡桃皮燒灰貼。
本草綱目

嵌甲入肉作瘡。不便靴履

白礬炒灰敷之。細細脩去甲角。旬日愈。
肘後方

普門醫品

脚氣

卷九 十

又方

知母燒存性。研摻之。
多能鄙事

又方

血竭末敷之。
醫林集要

脚極濕爛

茶葉嚼爛敷之。效。
攝生方

又方

好黃丹炒。入花蘆石末調摻之。
譚野翁試效方

又方

用蚌蛤粉乾搽愈。一膏域神方

又方

荊芥葉搗傳之。簡便方

又方

滑石一兩。石膏半兩。枯礬少許。研搽之。集簡方

腳縫癢痒成瘡。有竅出血不止

以多年尿桶燒灰傳之

脚汗濕臭

楊花着鞋底及襪內穿之。本草綱目

普門醫品

脚氣

卷九 十二

又方

白礬燒枯。研爲細末。先將脚洗淨拭乾。以末遍擦之。指縫及足心更多擦。用脚帶纏緊。過一夜解去。數日更作一次。即除根。經驗方

脚跟皸裂

用頭髮一大握。桐油一碗。於砂鍋內熬滾。候髮溶化。去火放冷。用磁器收貯。勿令灰入。每用百沸湯泡洗皸裂拭乾。以油敷之即愈。或加米粉炒研調敷。亦妙。丹溪方

又方

五倍子爲末。用牛骨髓調敷。醫方大成

遠行脚趺成泡

水調生麯塗之。一夜即平。海上方

又方

水調半夏末塗之。集簡方

遠行脚腫

草烏細辛。防風等分爲末。鋪鞋底內如草鞋。以水拌濕布襯踏之。可行千里。經驗方

普門醫品

脚氣

卷九 十三

行路足腫。或被石墊傷

草鞋浸尿缸內半日。以磚一塊燒紅。置鞋於上。將足踏之。令熱氣入皮內即消。救急方

熱毒足腫作疼欲脫者

苦參煮酒漬之。姚僧坦集驗方

脫骨湯 女人紮足。用此十餘次。軟若束綿

杏仁一錢。桑白皮四錢。水五碗新瓶煎三碗。入朴硝五錢。乳香一錢。封口煎化。置足於上。先熏後洗。三日一作。或用蕎麥皮燒灰淋湯浸洗。間日作之。

數大即軟 關事宜

諸疝門

論靈樞經曰疝癰者陰連小腹急痛也

巢氏病原曰疝者痛也或少腹痛不得大小便或手足厥冷繞臍痛自汗或冷氣逆上捨心令心痛或裏急而腹痛或有形如瓜有聲似蛙或睪丸偏墜或水硬諸候非一故曰諸疝也

原病式曰癰疝少腹控卵腫急絞痛也寒拘縮故

普門醫品

諸疝

卷

五

也寒極而土化制之故腫滿也經言丈夫癰疝謂陰氣連小腹急痛也婦人少腹腫皆足厥陰之脉也寒氣聚而爲疝與腎經無干丹溪曰疝痛者睪丸連小腹急痛也或有形或無形或有聲或無聲自素問以下皆以爲寒蓋經絡得寒收引不行所以作痛世有得寒而無疝者必有說以通之也亦有踢水涉水不病疝者以其素無熱也因而思之疝病起於濕熱遏鬱既久又感外寒濕熱收鬱而作疼若只作寒論恐有未備

臍傍有氣如梗直上釣痛者小腸氣也臍下近囊手按作響而疼者膀胱氣也小腹下氣上奔心而痛者腎氣也腸中走氣作疼者虛腸氣也陰子腫硬而不痛者木腎也偏大偏小者偏墜也總皆疝氣之類也

凡治疝多用熱藥而獲效者內經從治之法耳須用寒涼藥監制之不可純用大熱之劑世用烏頭梔子作湯服之甚效是亦以烏頭疎通寒邪梔子利其濕熱亦通之之法

普門醫品

諸疝

卷

五

通治五十五方

卒得疝氣小腹及陰中相引痛如絞汗出欲死者

沙參末空心熱酒服二錢立瘥丹參亦可 肘後方

疝氣疼痛危急

地膚子 卽落帚 炒研空心酒下二錢 簡便方

又方

玄胡索鹽炒全蠍去毒生用等分爲末每服一錢

空心鹽湯下 直指方

棟實丸 治癰疝腫疼不可忍及偏墜

川棟子肉五兩分五分。一兩用破故紙二錢炒黃色。一兩用小茴香三錢。食鹽半錢同炒。一兩用萊菔子一錢同炒。一兩用牽牛子三錢同炒。一兩用斑蝥七枚去頭足同炒。揀去食鹽萊菔牽牛斑蝥。只留破故紙茴香同研爲末。以酒打麪糊丸。梧子大。每空心酒下五十丸。淡寮方

外腎脹大。麻痛木疼。及奔豚疝氣。

川棟子四十九箇取肉。分七處。一分用小茴香五錢同炒。一分用破故紙二錢半同炒。一分用黑牽

普門醫品

諸痛

卷九 七

牛二錢半同炒。一分用食鹽二錢同炒。一分用蘿蔔子二錢半同炒。一分用巴豆十四粒同炒。一分用斑蝥十四箇去頭足同炒。揀去蘿蔔子巴豆斑蝥三味不用。外入青木香五錢。南木香。官桂。各二錢半。爲末。酒煮麪糊丸。梧子大。每服三十丸。食前鹽湯下。日三服。直指方

癰疽脹疼及小腸氣

香附末二錢。以海藻一錢煎酒空心調下。

漢湖方

陰癰腫痛

荆芥穗尾焙爲末。空心酒服二錢。即消。壽域神方

又方

葱白乳香搗塗。即時痛止。腫消。本草綱目

又方

煨葱入鹽杵如泥塗之。本草綱目

又方

小蒜韭根各一升。楊柳根二升。酒五升。煎沸乘熱

熏之。永類方

陰腫疼痛。諸藥不能治者

普門醫品

諸痛

卷九 七

馬鞭草搗會之。集驗方

癰腫

高麗子一合搗末。水一盞煎五沸。溫服。本草綱目

又方

荔枝核炒黑色。大茴香炒等分。爲末。每服一錢。空

心溫酒下。孫天方

又方

荔枝核。青橘皮。茴香等分。各炒研。食前酒服二錢。

日三服。本草綱目

又方

散攪核。荔枝核。山楂_音核等分燒存性研末。每服

二錢。空心茴香酒調下。_{本草綱目}

陰腫如斗

生蔓菁根搗敷。_{奇驗}

又方

雄黃白礬各二兩甘草一尺剉水五升煮二升。浸

之。_{引後方}

又方

普門醫品

諸病

卷九 大

蛇床子為末。雞子黃調敷之。_{水類方}

癰疽疼痛。敗精惡血。結在陰囊所致

阿魏二兩。醋和蕎麥麩裏煨。大檳榔二枚鑽孔。溶

乳香填滿。亦以蕎麥煨。入茴香末五錢。赤芍藥末

一兩。糊丸梧子大。每食前酒下三十丸。_{危氏方}

超越舉重。卒得陰癰。及小兒狐疝腫痛

地膚子五錢。白朮二錢半。桂心五分。為末。米飲。或

酒空心調服三錢。忌生葱桃李。_{必効方}

陰疝。睪丸縮入腹。急痛欲死

狼毒二兩防風附子炮。各一兩煉蜜丸梧子大。每

服三丸。日夜三服。白湯下。_{肘後方}

寒疝疼痛

吳茱萸一兩。生薑半兩。酒一升煎八分服。_{肘後方}

又方

川松子一歲一粒燒研。空心酒服。_{本草綱目}

水腎疝氣

楮葉雄黃等分為末。酒糊丸梧子大。每空心鹽酒

下五十丸。_{醫學集成}

普門醫品

諸病

卷九 九

遠年近日小腸疝氣偏墜掣疼。臍下撮疼。以致悶亂

及外腎腫硬。陰間濕痒成瘡

吳茱萸去梗一斤。分作四分。四兩酒浸。四兩醋浸。

四兩湯浸。四兩童子小便浸。各一宿。同焙乾。澤瀉

二兩。為末。酒糊丸梧子大。每服五十丸。空心鹽湯

下。酒亦可。_{和劑局方}

小腸疝氣

烏藥一兩。升麻八錢。水二鍾煎一鍾。露一宿。空心

熱服。_{孫存仁集效方}

又方

地膽去翅足頭微炒。硃砂各半兩。滑石飛一兩。爲末。每服二錢。空心醋調服。宣明方

又方

全蠍焙爲末。每發時用一錢。麝香半字。溫酒調服。少頃再服。神效。本草綱目

又方

青木香四兩。酒三斤煮浸。日飲三次。孫氏集效方

又方

普門醫品

諸痛

卷九 下

又方

胡蘆巴炒研末。每服二錢。空心茴香酒下。直指方

木賊細剉微炒爲末。沸湯點服二錢。緩服取效。本草衍義

又方

蕎麥仁炒去尖。葫蘆巴酒浸曬乾。各四兩。小茴香炒一兩。爲末。酒糊丸梧子大。每空心鹽酒下五十丸。兩月大便出白膿。即去根。集效方

又方

大棗一枚去核。用斑蝥一枚去頭翅入棗內。烘熟

去殼。以桂心畢澄茄煎湯送下。直指方

小腸氣痛遠勝心

連帶老絲瓜燒存性研末。每服三錢。食前熱酒調下。甚者不過二三服。即消。本草綱目

小腸氣痛不可忍

大茴香。荔枝核炒黑。等分研末。每一錢溫酒調下。仍以小茴香炒熱布包更互熨之。集效方

又方

普門醫品

諸痛

卷九 下

蓬莪茂以濕紙厚包灰火內煨透。乘熱搗末。空心

葱酒服一錢。護命方

疝氣膀胱小腸等氣

金鈴子一百箇。溫湯浸過去皮。巴豆一百箇微敲破。以麯二升同於砂鍋內炒至金鈴赤色爲度。放

冷取出。去核爲末。巴麯不用。每服三錢。空心熱酒

或醋湯調服。或入鹽炒茴香半兩。經驗方

又方

茴香。晚蠶沙。各鹽炒等分爲末。煉蜜丸。彈子大。每

服一丸白湯下仙方也或溫酒嚼下本事方

偏墜作疼

大黃末一合醋調塗之乾則易楊簡方

又方

茸遂炮茴香炒等分爲末酒服二錢儒門事親

又方

白附子一箇爲末津調填臍內以艾灸三壯或五壯自愈楊起簡便方

又方

普濟醫品

諸痛

卷九 三

芙蓉葉黃檗各三錢爲末以木鼈子仁一箇磨醋調塗陰囊其疼自止簡便方

又方

八角茴香小茴香各三錢乳香一錢空心熱水服取汗直指方

又方

大茴香小茴香各一兩爲末用牙猪尿胞一箇連尿入二末於內繫定罐內以酒煮爛控乾連胞搗九梧子大每五十九空心白湯下筆峯雜興方

又方

山植肉茴香炒各一兩爲末糊丸梧子大每服一百丸空心白湯下衛生易簡方

霹靂酒治疝氣偏墜及婦人崩中下血胎產不下

以鐵器燒赤淬酒空心飲之聖惠方

偏墜痛極

用綿袋包暖陰囊取天花粉五錢以醇酒一盃浸之自卯至午微煎滾露一宿次早低凳坐定兩手按膝飲下卽愈未下再服本草蒙筌

普濟醫品

諸痛

卷九 三

又方

猪脬一枚洗入小茴香大茴香破故紙川棟子各一兩于內加入青鹽一塊薄鹽清黃熟空心以脬食之酒下其藥焙搗爲丸服本草綱目

又方

青娘子紅娘子各十枚白麴拌炒黃色去前二物只以麴用熱湯調服一錢談野翁方

偏墜腫疼

蘇木二兩好酒一壺煮熟頻飲立效集簡方

又方

桂皮研末。水調塗上。梅師方

卵瘡偏墜

用雙蒂茄子懸於房門上。出入眼視之。茄蒂所患亦焉。茄乾亦乾矣。一人用雙蒂懸門上。每日抱兒視二三次。針針于上。十餘日即消。保壽堂方

又方

絲瓜初結者。留架上。待瓜結。葉落取下。燒存性。為末。煉蜜調成膏。每晚好酒服一匙。如在左。左睡。

普門醫品

諸病

卷九 三

在右右睡。即愈。保壽堂方

又方

絲瓜葉燒存性三錢。雞子殼燒灰二錢。溫酒調服。

余居士選奇方

癰疽偏墜。氣脹不能動者

牡丹皮。防風。等分為末。空心酒服。千金方

前陰諸證門

論前陰十證。有陰縱者。挺長不收。傷於熱也。○有

陰縮者。縮入腹內。傷於寒也。○有陰痿。謂痿而不

起。陰器不用。皆耗散太過。傷於肝筋所致也。○有

陰腫。或堅而痛。皆是濕熱積注而然。亦有房事過

多所致。○有陰痛。男子陰頭痛。女人陰中痛。○有

陰癢。外腎生瘡。癢痒不禁。婦人則陰中癢也。皆濕

熱之病。○有陰濕。謂陰間津濕。○有陰寒。男子陰

囊冷。婦人陰中冷也。○有陰臊。肝火下流。○有陰

吹。胃氣下泄也。以上諸證。皆肝經濕熱。酒色過度

之人。宜各以其類而治之。

普門醫品

前陰

卷九 三

陰腫 六方

陰腫作痒

桃仁炒香為末。酒服二錢。日二服。仍搗傳。千金方

陰腫作疼

馬齒莧搗敷之。三類方

又方

乳香。黃白。等分搗敷。

又方

嫩柳二十枝。各長二尺者。細封水。煮極熱。以故帛

裏包種處仍用熱湯洗之

又方

雞翎燒存性蛇床子末等分傳之

時疫陰囊及莖皆熱腫

羊屎黃蘗煮汁洗之

陰癢

陰囊濕痒

麩炭末紫蘇末勻撲之

又方

普門醫品

前陰

卷九 子六

龍骨牡蠣各煨等分爲粉撲之

醫宗三法

又方

槐樹北面不見日枝煎水熱洗水冷再熱

必效方

又方

烏賊骨蒲黃等分爲末撲之

醫宗三法

陰囊濕痒欲潰裂者

松香爲末紙卷作筒每根入花椒三粒浸燈盞內

三宿取點燒淋下油擦之先以米泔洗過簡便方

又方

甘草煎湯日洗三五度

古今錄驗

又方

枯礬研細撲之或泡湯澆洗

御藥院方

又方

爐甘石煨一錢真蚌粉半錢研細撲之

直指方

又方

滑石飛一兩石膏煨半兩枯礬二錢研細摻之

集

簡方

又方

普門醫品

前陰

卷九 子七

吳茱萸煎湯頻洗取效

外臺秘方

又方

川椒杏仁研膏塗掌心合陰囊而臥甚效

直指方

玉莖濕痒

肥皂莢一箇燒存性研香油調搽自愈

攝生方

陰瘡

七方

外腎生瘡

綠豆粉蚯蚓糞等分研塗之

本草綱目

又方

黃芩、黃連等分煎湯洗之。仍以黃芩、黃連作末。

又方

抽出雞卵殼、黃連、輕粉等分爲細末。用煉過香油。

調塗 醫林正宗

陰上粟瘡

取停水濕處乾卷皮爲末。水調敷之。 外臺秘要

囊瘡癢痛

紅椒七粒、葱頭七箇煎水洗之。三日見效。 經驗方

普門醫品

前陰

卷九 二天

又方

細茶爲末。以甘草湯洗後敷之。 經驗方

陰囊濕瘡出水不瘥

五倍子、臘茶各五錢、輕粉少許研末。先以葱椒湯

洗過。香油調搽。以愈爲度。 聖惠方

〔陰瘻〕 六方

陰瘻不起

雀卵、天雄製、兔絲子製等分爲末。丸梧子大。空心

酒下十五丸。 玉註方

腎虛陰瘻瘻少力

黃芩、腎一對切片、枸杞半斤。以鼓汁一盞同椒鹽

又方

雄雞肝三具、兔絲子一升製爲末。雀卵和丸小

豆大。每服百丸。空心酒下。 千金方

又方

蜂房灰。夜敷陰上。卽熱起。 千金方

又方

普門醫品

前陰

卷九 二天

蜂房燒研。新汲井水服二錢。可御十女。 嶠嶠神書

陰瘻陰汗

陽起石煨爲末。每服二錢。空心鹽酒下。 普濟方

〔不瘻〕 二方

玉莖強硬不瘻。精流不止。痛如鍼刺。病名強中。乃腎

滯漏疾也。

韭子、破故紙各一兩炒爲末。每服三錢。食前白水

調下。日三服。 經驗方

又方

用無病婦人乳三酒杯將磁碟晒極熱置乳於中。

入麝香木少許水香末一分調勻食前服服後飲

濃茶半盞陽即敗

集簡方

陰莖忽然腫疼

鮮螺螄搗爛細布濾汁雞翎刷上即愈

經驗方

普門醫品

前陰

卷九

普門醫品卷之二十

東武王化貞元起父編輯

門人陳斌憲卿父較閱

癲狂門

附癰證

論癲狂病俗名心風蓋謂心神壞亂而有風邪故

也丹溪云癲屬陰狂屬陽顛多喜狂多怒又曰大

槩是熱癲者神不守舍狂者如有所見

癲者喜笑不常顛倒錯亂之謂也狂者自高自智

普門醫品

癲狂

卷十

言語不擇善惡不避親疎之謂也

古方每以癲癰並治乃大悞也蓋癲為心病而屬

實者多癰為五臟兼病而屬虛者多癰則妄動失

常癰必吐沫卒倒二病狀亦不同

凡登高棄衣引重致遠者為癰乃痰火亢熾之甚

治宜降下之劑滾痰丸之屬

自高辨智妄語狂言神明失守為狂治宜鎮心安

神清上之劑牛黃朱砂丸之屬

通治

十四方

來甦膏 治遠年近日一切心風卒倒中風及破傷風口閉牙噤金治

皂莢肥大不蛀者去皮子一斤切碎用酸漿水二大碗春浸三日夏浸二日秋冬七日採取淨汁去渣入砂鍋內文武火熬以槐柳枝攪熬如膏取出攤在紙上陰乾用時取手大一塊溫漿水化盞內扶病人坐定用竹筒吹藥水入病人左右鼻內良久涎出效欲要涎止以溫鹽湯服一二口便止忌雞魚蒜麪等物

普門醫品

癲狂

卷二

朱砂丸 治癲狂及風癩中惡卒倒

朱砂飛附子炮去皮臍雄黃明透者飛各一兩麝香五分巴豆仁二十粒去膜心油研勻煉蜜和搗丸麻子大每服三丸不拘時粥飲下如不利更加三丸至七丸以利爲度

抱膽丸 治男女癲狂風癩及婦人產後驚氣入心

朱砂飛二兩黑鉛一兩半水銀乳香各一兩先將鉛入銚內鎔開下水銀結成砂子次下乳香朱砂乘熱用柳木槌搗勻丸如雞頭子大每服一九空

心井華水吞下得睡切莫驚動覺來卽安再進一丸可除根屢驗

朱雄丸 治驚憂失志痰迷心竅以致叫呼奔走

辰砂飛雄黃飛各二錢半白附子一錢各研末猪心血和丸金箔爲衣每三丸人參菖蒲煎湯下失心癲狂

鬱金七兩明礬三兩爲末酒糊丸梧子大每五十丸白湯下有婦人顛狂十年至人授此方初服心胸間覺有物脫去神氣洒然再服而甦

普門醫品

癲狂

卷三

又方

九節菖蒲不間雞犬聲者去毛木白搗末豬心一箇批開砂確煮湯調每服三錢

風痰迷心癲癩狂邪

甘遂二錢爲末猪心取血和藥入猪心內縛定紙裹煨熟取末入辰砂末一錢分作四丸每服一丸將猪心煎湯調服下惡物爲效不效再服

又方

葇若子半升爲末以酒一升漬數日絞去滓煎令

可丸如綠豆大每服三九日三服當見面急頭中
如有蟲行額及手足有如赤豆是瘥候也未效再
服

陳延之小品方

又方

芽茶梔子仁各一兩煎濃汁一碗服良久探吐即
愈

摘玄方

凡發狂欲走或自高貴稱神或悲泣呻吟此為邪祟

以蠶紙燒灰酒水任下二錢亦治風癲

別後方

顛狂邪妄自賢自聖行走不休

普門醫品

癲狂

卷下 四

白雄雞一隻煮以五味作羹粥食之

心經

又方

瓜蒂末井水服一錢取吐愈如欲止吐以麝香少
許點湯飲之

又方

用銅針一具拭潤以黃丹消石各一錢末研勻擦
在肝內用線縛定水一升煮熱細嚼以原汁送下

聖惠方

滾痰丸 治見論

方見六卷痰飲門

附證

凡卒然暈倒身軟咬牙吐涎法不省人事即
醒者是癇病也或一月一發或兩月一發或月三
四發百牛牛癇馬癇大癲各以其聲而名
之皆為風熱痰所致治宜追風祛痰

五癇丸

治諸風癇取痰如神

大皂角半斤去皮子以蜜四兩塗上慢火炙透

普門醫品

癲狂

卷下 五

碎以熱水浸一時接取汁慢火熬成膏入麝香少
許攤在夾綿紙上曬乾剪作紙花每用三四片入
淡漿水一小盞洗淨以筒吹入鼻內待痰涎流盡
吃脂麻餅一箇涎盡即愈

普濟方

久近風癲

凌霄花或根葉為末每服三錢溫酒下服畢解髮
不住手梳口噙冷水溫則吐去再噙再梳至二十
日乃止如此四十九日絕根百無所忌

普濟方

風癲

皂莢燒存性。蒼耳根莖葉日乾。各四兩。蜜陀僧一兩。爲末。薑汁糊丸。如梧子大。硃砂爲衣。每服四十丸。漿湯下。日二服。稍退熱服。赤類方

風癰痰涎壅盛。欬急中等證。不拘大人小兒。此藥不大吐逆。只出涎水。

瓜蒂爲末。壯年服一字。老少服半字。早晨井華水下。食頃含沙糖一塊。良久涎如水出。年深者出墨涎及痰塊。涎盡食粥一兩日。如吐多困甚。卽以麝香泡湯一盞飲之。卽止。經發後方

普門醫品

癰證

卷十六

虎睛丸 治癰疾發作。涎潮搐搦時作謔語。

虎睛一對微炒。犀角屑。大黃。遠志製。各一兩。卮子。

仁半兩爲末。煉蜜丸。綠豆大。每溫酒服二十九。本草綱目

風癰反目抽搐吐沫者

黑鉛七錢。水銀三錢。結爲砂。南星一兩。炮爲末。糯米飯丸。綠豆大。一歲一丸。乳汁下。普濟方

又方

南星九蒸九曬爲末。薑汁麴糊丸。梧子大。每二十

丸。石菖蒲。麥門冬湯下。人參湯亦好。衛生寶鑑

又方

天南星煨爲末。一兩。硃砂飛一錢。猪心血。九梧子大。每防風湯化下。十九。小兒二丸。普濟方

暗風癰疾

用臘月烏鴉大嘴者一箇。鹽泥固濟。瓶中煨過。放冷。取出爲末。入硃砂飛過半兩。研勻。每服一錢酒下。日三服。不過十日愈。保幼大全

風癰有痰。不時舉發

普門醫品

癰證

卷十七

山慈姑根似小蒜者一枚。研如泥。日正中時以茶調下。卽卧日中。良久吐出雞子大物。永不發。如不吐。以熱茶投之。奇效良方

南人正二月食芹菜。誤食蛟龍精。病發似癰。面色青黃。名蛟龍癰病。

用寒食餠糖。以水化服五合。日三次。吐蛟龍出。有兩頭可驗。平日有吐虵病者勿服。金匱要畧

邪祟尸疰門

附癰魅

論病有心虛驚惕如醉如癡如有邪鬼所附或登高而歌棄衣而走皆痰火所爲實非妖邪之所迷也然古有禁咒一科及龍樹咒法皆移精變氣之術亦可解疑釋惑以使心神之歸正耳

俗云衝惡者衝斥邪惡鬼祟而爲病也病此者未有不因氣血先虧而致者氣血者心之神也神既衰乏邪因而入理或有之

世間自有一種鬼物爲祟深山狐狸每能作怪多年雞犬亦有成妖誤認痰火爲邪祟者非也謂邪

普門醫品

邪祟尸症

卷十

祟盡由痰火者亦非也但邪祟侵人必由氣血之虛則定論耳

尸症一病精神恍惚妄言妄見歌哭啼哭如鬼所憑多因悲憂寒熱變動則發或卒患心腹脹滿吐利不息或不得吐利如乾霍亂狀由人精神不全心志多恐遂爲鬼邪所附沉沉嘿嘿謔語妄言誹謗罵詈訐人陰事或言未然禍福毫髮不爽或知人心間事登高涉險如履平地或悲泣呻吟不欲見人如醉如狂皆爲尸症亦爲鬼症

通治

八赤母丸 治一切邪祟鬼症服此即愈

雄黃朱砂各飛礬石煅附子炮藜蘆桂丹皮巴豆去油膜各一兩蜈蚣一條炙爲末煉蜜丸如小豆大每服五七丸不拘時涼水送下

秦承祖灸鬼法 治一切驚狂謔妄踰垣上屋罵詈不避親疎等證

以病人兩大拇指用細麻繩縛定以艾二炷置於縫中甲際及兩指角上下共四處着火艾本兩炷

普門醫品

邪祟尸症

卷十

以在兩縫中則爲四處火着也一處不着則無効不得燒甲灸七壯神驗

卒中邪魔

雄黃飛過少許吹鼻

集驗方

尸症或見尸或聞哭聲即發者

取死人席長三寸濶五寸水二碗煎一碗服之此即昔人用死人枕之義

謝上泰刪繁方

家有邪氣

雄黃三錢水一盃以東南杓枝呪酒滿屋則紀跡

勿令婦人見知 集簡方

女人病邪。與邪物交通。獨言獨笑。悲哭恍惚者。

雄黃一兩。松脂二兩。溶化以虎爪攪之。先如彈子

大。夜燒於籠中。令女坐其上。以被蒙之。露頭在外。

不過三劑。自斷。仍以雄黃人參防風五味子等分

爲末。每旦井水服方寸七愈。 肘後方

妖魅。猶鬼。病人不肯言鬼。

鹿角屑搗末。水服一錢。即言實也。 錄驗

猶鬼病。歌哭不自由者。

普門醫品

邪祟尸症

卷十

臘月死。猶頭。燒灰水服一錢。日二。 千金方

辟邪丹 治衝惡怪疾。及山谷間妖狐野鬼。魔人爲

患。無法可除者。

人參茯苓蓮志鬼箭九節菖蒲白朮蒼朮當歸各

一兩。菴奴焙乾五錢。雄黃辰砂各三錢。牛黃一錢。

或加麝一錢。各爲細末。稱足。研勻。酒調米粉打糊。

爲丸。龍眼大。金箔爲衣。臨卧木香湯化下一丸。諸

邪不敢近。更以絳紗囊盛五七丸。懸床帳卧處。尤

妙。 龔雲林方

獺肝丸 治九十腫蠱症。傳尸。骨蒸。伏連。殭殍。諸鬼

毒病。大略使人寒熱。沉沉黑黑。不知病之所由。而無

一處不惡。積月累年。淹滯至死。死後傳人。或至城門

覺有此候。宜急治之。

獺肝一具。陰乾爲末。水服二錢。日三。以瘥爲度。 本草綱目

草綱目

忍冬煎 治一切飛尸。鬼症。邪祟等證。

忍冬藤葉一斤。煮濃汁。日服二三杯。即除。 醫統

尸症中惡。腹痛不可忍。

普門醫品

邪祟尸症

卷十

阿魏末。熱酒服二錢。立止。 本草綱目

尸症及鬼擊。心痛腹脹。大便不通。

巴豆二枚。去皮心。炒黃杏仁二枚。綿包槌碎。熱湯

一合。捻取白汁服之。即愈。老少者酌用。 外臺方

衝惡吐瀉

海桐皮煮汁服之。 聖濟總錄

鬼擊成病。卒然着人如刀刺狀。胸脇腹內疼不可近。

或吐血。衄血。下血。一名鬼排。

以醇酒吹入兩鼻內。即愈。 肘後方

鬼打及強鬼排突人成病者

鐵椎柄燒灰加堯奴鬼箭等分作丸服之或只以

腰刀鞘木二三寸燒灰酒服亦可裁器本草

又方

雄黃研細飛過酒服一刀圭日三服千金方

鬼擊身青作腫

金銀花一兩水煎飲之李樓怪病奇方

附麗魅五方

夜寐鬼麗

普門醫品

楊葉月注

卷十二

以赤褐一尺枕之即安新後方

又方

雄黃帶頭上及繫左腋下終身不麗張文仲方

又方

以犀角爲枕本草綱目

又方

卧時以鞋一仰一覆則無麗及惡夢起后雜忌

又方

堯仁炒去皮尖三七枚以小便研服之千金方

卒中暴死門

論卒中者卒然而倒不省人事全如死屍但氣不絕脉動如故暴死者魔魅暴絕屍厥之類

凡卒中惡氣鬼邪或因暮夜入廁或出郊野或避空室或人所不至之地忽然見鬼物鼻口吸着惡氣卒然仆倒四肢厥冷兩手握拳口鼻出清血與屍骸同但腹不鳴心脇俱暖切勿移動即令人圍繞燒火打鑼焚焚麝香或安息乳香蒼朮之類仍

普門醫品

卒中暴死

卷十二

灌犀角散候醒方可移動

夜寐不寤者爲魔死切勿用火照但以齒咬其足

跟及拇指甲際仍審其面則醒

凡暴卒傷陽暴怒傷陰憂愁失意及驚怖皆能令人卒倒厥逆如中風狀俱宜先用蘇和丸灌之使

甦然後因病下藥

通治二十四方

破棺散

治卒中惡諸暴絕及石木所壓溺水自縊一切橫死但心口溫者並皆治之

半夏大者泡七次爲末以大豆許吹入鼻中得嚏即活

卒死

急取葱心針入鼻中四寸許男左女右針耳中亦可鼻目血出即活如無血出不可治崔氏纂要

又方

以韭汁或薤汁灌入鼻中便省冬月用韭根

又方

斷活猪尾取血飲并縛猪枕之即活肘後方

普門醫品

卒中暴死

卷十 十四

又方

雄狐膽溫水研灌入喉即活浪急治之移時則無及矣續傳信方

又方

雞冠血和硃砂爲丸小豆大納耳鼻中各一九肘後方

卒死及魘死

雞冠血塗面上乾則再上仍滴入鼻中并以灰管死人一周肘後方

卒死渾身壯熱者

白礬半斤水一斗煮湯浸脚及踝即甦肘後方

驚怖卒死

溫酒灌之即醒本草綱目

吐利卒死及腹皮忽然青赤不能喘息

急用女青末納口中以酒灌下子母秘錄

白微湯治平居無疾苦忽如死人身不動搖目閉

而口噤或眩暈移時方寤此名血厥亦名鬱冒或因

大汗失血之後陽氣獨上塞而不行故身如死氣過

普門醫品

卒中暴死

卷十 十五

血還陰陽復通故移時方寤婦人尤多此證

白微當歸酒洗各一兩人參去蘆半兩甘草炙二

錢每服五錢水二盞煎一盞不拘時溫服本事方

中惡卒倒

艾灸臍中百壯仍以皂角末吹鼻或韭汁灌耳或

持解菖蒲根汁灌之如倉卒無藥急於人中穴及

縛兩大拇指離甲一韭葉許騎縫灸三五壯即甦

朱砂丸治同上

方見本卷癲狂門

犀角散 治見論

犀角五錢麝香硃砂各二錢為末水調服二錢即效華陀方

鬼擊卒死

烏雞冠血瀝口中令嚥仍破此雞枵心下冷乃棄之道傍肘後方

又方

吹醋少許入鼻中千金方

又方

普門醫品

卒中暴死

卷十 十六

烏雄雞血塗心下即甦風俗方

卒死而股間暖脉猶動耳月中如微語聲名為尸厥

卧忽不寤名為魔死

勿以火照但痛齧其踵及大拇指甲際嚼其面即甦仍以菖蒲末吹鼻中桂皮末納舌下并以菖蒲根汁灌之即活肘後方

尸厥

用白馬前脚夜眼二枚白馬尾十四根合燒醋丸如小豆大滾湯灌下二丸須臾再服即甦肘後方

又方

令人尿其面上即甦此扁鵲法也肘後方

夜卧魔死

勿用火照急取梁上塵納鼻中即活環碎錄

又方

馬蘭根一握杵爛以水絞汁徐徐灌之外臺秘要

又方

以青牛蹄或馬蹄臨人頭上即活肘後方

又方

普門醫品

卒中暴死

卷十 十七

皂莢末吹鼻即甦千金方

五絕門

論五絕者一曰自縊死二曰溺水死三曰墻壓死四曰鬼魔死五曰產乳死氣已絕而心頭微溫者皆可救

凡自縊死者在日間雖已冷尚可治若夜間死者不可治以陰氣盛故也但心下溫者雖一日以上猶可治當徐徐抱解不得割斷繩則無救矣宜以

膝蓋。或用手厚裝衣物。緊頂殺道。抱起解繩放下。揉其項痕。不可放手。致其泄氣。以衣被卧之。一人以脚踏其兩肩。手挽其髮。常令弦急。勿使縱緩。一人以管吹其兩耳。一人以手按胸上。摩勒不已。二人將臂脛屈伸不已。若已僵直。但漸漸屈之。并按其腹。如此少頃。覺氣從口出。呼吸眼開。仍按不置。以溫粥飲灌之。

溺水死者。放大板或大瓮上卧。將後脚墊起高二磚。却用鹽擦臍中。待其水自流出。不可倒控。急解

普門醫品

五絕

卷十 十八

去衣帶。用艾灸臍中。即活。

卒墮壓撲打死者。心頭尚溫。將本人如僧打坐。令一人將其頭扶住。用半夏末吹入鼻中。如活。却以生薑汁清油。攪勻灌之。

卒魘死。不得近前急喚。但痛嚙其腳跟及大拇指甲際。而唾其面。則活。如不省。少移動。卧處以皂角末吹鼻中。得嚏則活。元有燈則存。無燈則不可點。燈若以火急照之。則不可救。

冬月墮水凍死。口不能言。只有微氣者。不可用火。

烘。只用布袋盛熱灰。放在心頭。冷即換熱者。待服開。或溫酒。或薑湯灌之。

送治 十七方

五絕。心頭溫者皆可治。

以半夏末吹大豆許入鼻中。即活。子母秘錄

破棺散 治同上

方見本卷卒中暴死門

縊死。繩須解開。切不可割斷。

葱心刺耳鼻中三四寸許。有血出。即活。本草綱目

普門醫品

五絕

卷十 十九

又方

皂莢末吹鼻中。外一方

又方

絞藍汁灌之。千金方

又方

雞矢白。如棗大。酒半盞和灌口鼻。肘後方

又方

刺雞冠血。滴口中。即活。男用雌。女用雄。肘後方

又方

用雞血塗喉下 千金方

溺死一夕者尚可活切不可倒控

紙裹皂莢末納穀道須臾水出即活 外臺秘要

又方

以大甃卧之後足放高用鹽填臍中待水自流出切勿倒提出水 救急方

又方

用灶下灰一石埋之從頭至足惟露七孔良久甦

又方

普門醫品

五絕

卷千 二十一

布裹石灰納下部水出盡即活 千金方

墮水凍死只有微氣者切不可用火烘

以布袋盛熱灰放心頭冷即換熱者待眼開以溫酒灌之 普濟方

凡人壓撲已死但有氣者用此即活

抱雞卵已成形未出者一隻用黃泥固濟火煨存性研末熱酒調服更多飲酒被蓋出汗睡一覺即

愈神效 陳氏經驗方

從高墜下血冲心欲絕

用淡豆豉一盞水煎去滓服若氣絕不能言用藥

不及舉開口以熱小便灌之妙

夜卧魘死切不可用燈照

用飛過雄黃末吹鼻孔即活 經驗方

餘方見本卷卒中暴死門

婦人難產及逆產口噤垂死者

冬葵子一合搗破水二盞煮一盞頃服即甦而產

或以冬葵子炒黃為末酒服二錢亦妙 靈寶方

一餘方見三十七卷產後諸證門

普門醫品

五絕

卷千 二十一

奇病門

論奇病即怪證之謂經所不載而醫所未見也顧

瘡有人面蟲作應聲耳鳴龍躍瘰癧裂出紀傳所

列豈盡空言六合之外聖人存而不論蓋以不見

為奇非以無為奇也夏子金作奇疾方不為無用

今摘其近理者書之

通治 四十二方

有人自覺本形作兩人金行金卧不辨真假者離魂

病也

辰砂飛人參去蘆茯苓濃煎日飲真者氣爽假者自化也

有人卧則覺身外有身一樣無別但不語蓋人卧則魂歸於肝此由肝虛邪襲魂不歸舍亦名離魂病

人參去蘆龍腦即薄荷赤茯苓各一錢水一盞煎

半盞調飛過硃砂末一錢睡時服一夜一服

應聲蟲病腹中有物作聲隨人言語

用藍葉絞汁一盞分四次服

普門醫品

奇病

卷三 廿

凡人口中白珠渾黑視物如常毛髮堅直如鐵條能飲食而不語如醉名曰血漬

以五靈脂為末湯服二錢即愈

玉莖不萎精滑無欲時痛如刺捏之則脆名為腎漏

用破故紙韭子各一兩為末每用三錢水二盞煎

六分服日三次愈

有飲油五升以來方快者不爾則病此是髮入於胃

氣血聚之化為蟲也

雄黃為末飛半雨水調服之蟲自出

人身內有蟲如蟹走作聲如兒啼蓋筋所化

雄黃飛雷丸為末各一兩摻猪肉上炙熟喫盡愈

熱毒怪病目赤鼻脹大喘渾身出斑毛髮如鐵乃因

中熱毒氣結於下焦

滑石飛白礬為末各一兩作一服水三盞煎減半

不住飲之

腹中如石臍中水出旋變作蟲行透匝身爬搔不盡

用蒼朮濃煎湯浴之仍以蒼朮末入麝香少許水

調服

普門醫品

奇病

卷三 廿二

臨卧渾身虱出約至五升隨至血肉俱壞每宿漸多

痛痒不可言狀惟喫水卧床晝夜號哭舌尖出血不

止身齒俱黑唇動鼻開

但飲鹽醋湯十數日即安

因艾炙火瘡痂退落瘡內鮮肉作片子飛如蝶狀騰

空飛去痛不可言是血肉俱熱怪病也

朴硝大黃煨各半兩為末水調下微利即愈

人睛忽垂至鼻如黑角痛不可忍或時時大便血出

名曰肝脹

用羌活煎汁服數盞自愈

婦人產後兩乳忽長細如腸垂過小肚痛不可忍危在須臾名曰乳懸

芎藭當歸各一斤以半斤咀片於瓦石器內用水濃煎不拘多少頻服其餘剉塊於病人床下燒之令將口鼻吸用盡未愈再作一料仍以草麻子一粒研貼其頂心

兩足心凸腫上生黑豆瘡硬如釘脛有碎孔髓流出身發寒顫惟思飲酒此是肝腎冷熱相吞

普門醫品

奇病

卷千廿四

用川烏頭炮研傅之仍以韭子煎湯服之

人徧身忽然肉出如錐既癢且痛不能飲食名血瘰不速治必潰膿血

以赤皮葱燒灰淋洗飲豉湯數盞自愈

有人手足忽倒生肉刺如錐痛不可忍

但食葵菜即愈

有人毛竅血出不止皮脹如鼓須臾口鼻口脹合此名脉溢

生薑自然汁和水各半盞服即安

手十指節斷壞惟有筋連節內蟲出如燈心長數尺遍身綠毛名曰血餘

以茯苓胡黃連煎湯飲之愈

人頂生瘡五色如櫻桃狀破則自頂分裂連皮剝脫至足名曰肉人

常飲牛乳自消

口內肉毯有根如線五寸餘如釵股吐出乃能食物捻之則痛徹心

麝香一錢研水服之日三服自消

普門醫品

奇病

卷千廿五

凡口鼻出腥臭水以碗盛之狀如鐵色蝦魚走躍捉之即化為水此肉壞也

但多食雞臍即愈

瘡如蛇頭突出數寸

用雄黃塗之即消

人面瘡多在股上形似人面有口眼傅藥上即食之與之飲食皆食之

用貝母末塞入瘡口數次即痊

有患胸前潰竅血液常流二十年餘治之不效

鹿茸酥炙。附子炮等分。鹽花減半。棗肉爲丸。綠豆大。每酒下三十丸。

一人傷寒。舌出寸餘。連日不收。

用梅花冰片搽舌上。應手而收。重者用三錢方愈。婦人產後。舌出不能收。

以硃砂傳其舌。令作產兒之狀。用人扶住。壁外潛將瓦器崩墮。婦聞响声而驚。舌卽收。

一婦人舌腫大滿口。諸藥罔效。

以銚針砭之。血出腫減。三日方平。

普門醫品

奇病

卷三 共

一婦女眼中血出如射。或沿鼻流下。月經不行。乃陰虛相火之病。

用當歸。生地黃。各酒洗。白芍藥。酒炒。黃連。黃檗。知母。條芩。各炒。側柏葉。木通。柴胡。莢仁。去皮尖。紅花。各一錢。水二鍾煎一鍾。食前服。

一人田間收稻。忽然遍身痒。入骨髓。此痰氣也。

用食鹽九錢。泡湯三碗。每進一碗。探而吐之。三進三探。則不痒矣。

胸間潰竅。有膿血。與口中所咳。相應而出。

以參芪當歸。加退熱排膿藥。卽愈。

產婦腹中痒。

用箭幹及鏃。安所卧床席下。勿令婦人知。

一小兒七歲。聞雷卽昏倒。不知人事。此氣怯也。

人參去蘆。當歸酒洗。麥門冬去心。各二兩。五味子五錢。水一斗。煎汁五升。再以水五升。煎滓取汁二升。合煎成膏。每服二匙。白湯化下。服盡一斤。自後聞雷自若矣。

身面生瘡。似貓兒眼。有光采。無膿血。但痛痒不長。飲

普門醫品

奇病

卷三 共

食減。少名曰寒瘡。

多喫雞魚。慈韭自愈。

瘡瘡如眼。上高下深。顆顆累累。如瞽眼。其中帶毒。頭上各露一舌。毒孔透裏。

用生井蛙皮。燒存性。爲末。蜜水調傳之。直搗於

眼中。視物皆倒植。左關脉浮促。此因傷酒大吐。上焦反復。倒其膽腑故也。法當復吐。以正其膽。

以藜蘆瓜蒂爲粗末。水煎。平旦頻服。以吐爲度。中畢。視物如常。本草綱目。

鎮驚朱砂丸 治右脇有聲如玻璃常欲手按之否
則聲聲相接此因驚氣入於臟而致

朱砂雄黃各飛過附子炮去皮臍各一兩麝香一
分已豆仁二十粒去油共研勻煉蜜搗丸麻子大
每服三九不拘時以車前草煎湯下如不利更加
三九至七九以利為度 趙鼎方

頭皮內時有蛆出

以刀割破絲瓜葉搗汁擦之蛆出愈 小山怪證方
女人月經流出皆作禽獸之形欲求傷人

普門醫品

奇病

卷下 廿八

先將綿塞陰戶乃頓服浸藥末一兩白湯調下即
愈危氏方

一婦產後用力垂出肉線長三四尺觸之痛引心腹
用羌薑連皮三斤搗爛入麻油二斤拌勻炒乾先
以熟絹五尺折作方結令人輕輕壓起肉線使之
屈曲作三團納入產戶乃以絹袋盛薑就近薰之
冷則更換重一日夜縮入大半二日盡入但不可
使線斷斷則不可治矣 魏夫人秘傳方

飛絲纏陰腫痛欲絕

以鹿雲仙搗汁浸洗一入病此得効 李樸方
牙齒日長漸至難食名髓溢病

白木煎湯時常漱服即愈 諸急良方

一女年十四歲中軟處生物如黃豆大半在肉中紅
紫色痛甚諸藥不效

以水銀四兩白紙二張擦熟煎水銀擦之三日自
落而愈 李樸方

渾身燎泡如棠梨狀每破出水內有石一片如指甲
其泡復生抽盡肌肉則愈

普門醫品

奇病

卷下 廿九

荊芥三稜蓬義茂各二兩為末分三服酒調連服
即愈 危氏得効方

明諸城王化鼻膏乾文原編

廣德後學即廷模真書

姓男 文海全錄

髮門

染烏 拔白

滋長 脩沐

論巢氏病源曰足少陽膽之經其榮在鬚足少陰腎之經其華在髮若血氣衰弱經脉虛竭不能榮潤故鬚髮禿落

氣血盛則鬚髮美氣血衰則鬚髮白必然之理也

普門醫品

卷二十一

髮門

一

娛暉堂

人年三十後常服補腎滋陰之藥必然有驗若用藥於既衰之後豈能及乎

染烏 二十一 方

二青膏 染鬚髮極驗

生胡荽皮生酸石榴皮生柿蒂子皮先將石榴剉去子入丁香裴蒲共稱過分而然後將胡荽皮柿蒂皮秤等分晒乾全為細末用牛乳和勻盛於錫瓶中封口埋馬糞內十日取出將白線一條扯緊點藥於中試之如走至兩頭皆黑者藥印中如不

然再埋馬糞中數日即照此法染鬚髮神効

旱蓮膏 黑鬚髮補精血

旱蓮草六七月采解者不拘多少砂鍋水煮數滾撈出扭乾將汁澄清用文武火熬成膏煉蜜入內滴水成珠為度用磁器盛夜放天井內露之每夜攪三四次如此七夜方足收磁瓶中好酒調服一匙蚤晚各一服極驗

又方

胡粉石灰風化七日等分醋和塗之以油紙包然

普門醫品

卷二十一

二

令溫暖候乾洗去油潤之黑如漆也 博物志

又方

五倍子一斤研碎銅鍋炒之勿令成塊如有烟起即提下攪之從容上火慢炒直待色黑為度以濕青布包札足踏成餅用每用五倍子一兩紅銅末酒炒青鹽生白礬各六分訶子肉沒石子各四分礬砂一分為末烏梅酸榴皮煎湯調勻碗盛重湯煮四五十沸先以皂莢水洗淨鬚髮後以眉捫刷藥於上一時洗去再上包佳次日洗去以核菴

油潤之。半月一染。甚妙。杏林摘要

又方

三月三日。取蚬斗一合。陰乾。候桑椹熟時。取汁一升。浸埋東壁下。百日取出。其色如漆。以塗髭髮。永不白。幽岐神書

又方

上好金墨。打碎如指頂大。初伏時。將蓖麻長大者。刀破其根。納墨二三塊。用土封固。候立冬後。其葉落。方取暴出。研以搽。黑而光亮。且不落也。甚妙。

普門醫品

又方

酸石榴結成時。就東南枝上。揀大者一個。向上開一孔。納水銀半兩。以原皮蓋之。麻紮定。牛屎封護。待經霜摘下。傾出。越內水。以魚脬籠指蘸水熬。久又自黑。普濟方

又方

胡荽青皮一秤。旱蓮草十斤。切以甕盛之。入水五斗。浸一月。去滓。燉至五升。入荳蔻子油一斗。以火煎取五升。收之。凡用先以炭灰汁洗。用酒塗之。拂

葉包住。外用絹裹。一夜洗去。七日即黑。總錄

猿猴上樹方

取臘月黑牯牛膽一箇。燉槐子炒。五倍子炒。烟盡。各一兩。酸石榴皮焙五錢。白礬一錢。共為細末。裝膽內。懸風處陰乾。半月取下。用鉛礮一箇。將藥去膽皮。傾入礮內。再加核荑油一小盞。奈烟三錢。射香一分。攪勻。密封礮口。重湯煮一炷香。取起。將鬚用皂莢湯洗淨。以指脬皮或油紙包指。蘸藥擦鬚。下半節自然上行。其黑如漆。

普門醫品

又方

大水蛭七枚。為末。水銀一兩。以銀三兩作小盒盛之。用蚯蚓泥固濟。半指厚。深埋馬糞中。四十九日。取出。化為黑油。以魚脬籠指。每蘸少許。擦鬚髮上。其油自然倒行至根。變黑色也。普濟方

烏鬚倒捲簾方

用大馬蜢二三十條。竹筒裝之。夜置露處。使有濕氣。餓過七日。以雞冠血磨京墨。與食四五次。收起。陰乾。將猪脰骨打斷。放蜢入內。仍合定。鐵線纏住。

鹽泥塗待乾放地上慢火煨五寸香將火退遠三寸又五寸香又將火退遠三寸又五寸香取出爲末猪胆皮包指陰擦齒即白也。普濟方

擦牙烏方 若先明而擦者永不白

青鹽一斤嫩楓枝葉三斤黑鉛四兩沒石子尖者七錢將黑鉛青鹽楓枝入鍋同炒成灰提起聽用將沒石子研細水和入磁器盛之每日早晚以藥擦牙漱水吐掌內擦齒又久自然潤黑

又方

黑鉛銷化以不蛀皂角寸切投入炒成炭入鹽少許研勻日用揩牙摘去白髭永不冉白亦能固齒。普濟方

又方

麻枳八兩鹽花三兩生地黃十斤取汁同入鍋熬乾鐵蓋蓋之鹽泥泥之煨赤取研末日三次揩牙畢飲薑茶數口先從眉起一月皆黑。養老方

又方

七月取旱蓮草連根一斤用無灰酒洗淨青鹽四

兩淹二宿同汁入油鍋中炒存性研末日用擦牙連津嚥之。攝生妙用方

又方

旱蓮草取汁同鹽煉乾研末擦牙。本草綱目

頭髮黃赤

栢葉曬乾研末一斤猪膏一斤和丸彈子大每以布裹一九納泔汁中化開沐之一月黑潤。聖惠方

又方

梧白皮燒存性研和乳汁塗之。本草綱目

普門醫品

髮髮

卷三 六

又方

以熊脂塗髮梳散入床底伏地一食頃即出便盡黑用脂不過一升効。千金方

又方

以薑菜油常搽之即黑。藏書本草

又方

用蓖麻子仁香油煎焦去渣三日後頻刷之即黑。摘玄方

援白 五方

髮白換黑方

老生薑皮一升。於常用油鍋內。不須洗刷。固濟勿令通氣。令精細人守之。文火煎。不得太急。自旦至夜。即成。研為細末。拔白後。先以簪點麻子大入孔中。或先點鬚下。然後拔之。以指撚入。三日後當生黑者。神效。圖經本草

又方

七月七日。取百合熟搗。用新瓷瓶盛之。密封陰乾百日。每拔去白者。搽之。即生黑者。便民圖纂

普門醫品

髮

卷五 七

又方

丁香末。薑汁。調塗於拔去孔中。即生黑者。甚驗。醫本

又方

拔白後。以梧子搗汁塗孔中。即生黑者。本草綱目

年少髮白

拔去白髮。以白蜜塗毛孔中。仍取梧子搗汁塗上。必生黑者。梅師方

滋長 十九方

病後髮落

胡孫薑。同野薔薇嫩枝煎汁刷之。本草綱目

髮落墮落

桑白皮剉二升。以水浸煮五六沸。去渣頻沐。自不落也。聖惠方

髮眉墮落

牛夏苗莖搗取汁。煉一二沸。塗之。即生。雷斅方

髮落不生

先將頭皮用米泔入醋洗淨。生葱搗令熱。以臘猪

普門醫品

髮

卷五 八

脂入生鐵煮三沸。塗之。即生。千金翼方

又方

桐葉同麻子仁。米泔煮五六沸。去渣日日洗之。則長。肘後方

又方

番柳葉陰乾為末。用薑汁於鐵器中調。夜夜摩之。聖惠方

又方

石灰三升水拌炒焦。酒三升浸之。每服半鍾。常令

酒氣相接其髮自生 千金方

又方

胡麻油常塗之 普濟方

又方

側柏葉陰乾作末和麻油塗之 梅師方

髮不長

桑葉麻葉煮泔水沐之七次可長數尺 千金方

令髮長黑

蔓荊子末熊脂等分醋調塗之 聖惠方

普門醫品

鬚髮

卷五 九

赤禿無髮

牛角羊角燒灰等分猪脂調敷 聖惠方

瘡癰疤上不生髭髮

先以竹刀刮損用葛苳子胡孫蓴等分爲末頻擦

之 摘玄方

白禿無髮

麻子炒焦研末猪脂和塗髮生爲度更以麻子汁

煮粥食之 普濟方

又方

以甜瓜葉搗汁塗之十餘次即生 新羅本草

又方

花椒研末猪脂調敷 普濟方

婦人禿鬢

川椒四兩酒浸密室內日用搽之即長 聖惠方

令髮不落

梔子三個胡荽二個側柏葉一兩搗浸雪水梳頭

髮永不落 聖惠方

髮稿

普門醫品

鬚髮

卷五 十

桑根白皮柏葉各一斤煎汁沐之即潤 聖惠方

猪泔 八方

頭髮垢腫

雞子白塗之少頃洗去光澤不燥 瀕湖方

又方

百藥煎爲末乾擦髮上一夜篋之 普濟方

頭風多白屑

零陵香白芷等分煎汁冷入雞子白攪勻傳數十

次終身不生用零陵浸油飾髮香澤異常且不起

肩聖惠方

醒頭去屑方

三柰、甘松、零陵各一錢、樟腦二分、滑石半兩、爲末、夜搽旦篋去。水雲錄

又方

羊蹄根、柞爛同、羊膽汁塗之、永除。聖惠方

又方

桑木燒灰、淋汁、沐之、神妙。聖惠方

頭多白屑及蟻虱

普門醫品

類聚

卷五十一

藜蘆末、搽之、直指方

又方

藁本、香白芷爲末、夜擦上、旦篋去。本草綱目

面病門

瘡腫 癰痕 斑皰 點黤 塗飾 廔瘰

〔論〕靈樞經曰：頭面者，諸陽之會也。蓋手足六陽之經皆上至頭而陽明一經尤環絡面部。胃熱則面熱，胃寒則面寒。若胃中風熱上攻，令人面腫，或面鼻色紫，風刺癰疹。

面腫與面浮不同，宜分別腫則爲實，因風火上

炎，紅腫而熱，或按之痛，此邪有餘，當用防風通聖

散。面浮則爲虛，因脾傷勞役，飲食失節，脾氣輸散

不常，肺氣傳布失度，故面虛浮，眼下如卧蠶，或氣

喘，皆其候也。此正氣不足，宜實脾。

有黥黥者，黑紫小點，俗稱雀斑。有面皰，音皰者，或

赤或白或黑，氣色斑駁不一，皆肺胃積熱，毒氣所

發。

瘡腫 十方

普門醫品

面病

卷五十一

梔子荊芥湯 治面上生瘡及腫

梔子炒、荊芥、黃芩酒炒、川芎酒浸、白芷、芍藥酒

炒、桔梗、生地、黃酒洗、升麻、枳殼、麩炒、大黃煨，各一

錢、甘草五分、水二盞、煎八分、食後服。

防風通聖散 治風火上炎、面目皆腫者

防風、川芎、當歸酒浸、白芍藥酒炒、連翹、薄荷、麻黃

去節、各六分、石膏煨、桔梗、黃芩酒炒、甘草炙，各一

錢、白朮、梔子仁、各炒、荊芥穗、各四分、滑石飛、二錢

四分、生薑三片、葱白三莖、豆豉一撮、水二鍾、煎一

鍾溫服如大便結者仍入芒硝大黃各四分調服
一服立愈和劑局方

肺風面瘡或起白屑或生赤癩

蓖麻仁四十九粒白果去皮膠棗去皮核各三粒
瓦松去梗三錢肥皂一箇去皮弦搗丸洗面用之
妙扶膏方

硫黃膏 治面部生瘡或粉刺及赤鼻

生硫黃白芷天花粉輕粉各五分芫青七箇去翅
足炒全蠍一枚炙蟬退五枚爲細末用麻油黃蠟

普門醫品

面病

卷一 十三

約量多少溶化離火方入藥末和成膏臨卧時洗

面淨以少許塗面近眼處勿塗數日即愈風刺一
夕見效

面暴生瘡

生杏仁去皮搗爛以雞子清調如糊洗面塗之旦
以水洗去數次愈食療本草

又方

曼陀羅花晒乾研末少許貼上衛生易簡方

兩頰赤痒其狀如癰名曰面風

以杏仁頻頻搗之內服消風散證治要訣

附消風散方

陳皮厚朴薑製各半兩藿香羌活人參去蘆甘草
各一兩白茯苓荆芥穗防風川芎白僵蠶炒蟬蛻
各二兩爲末每服三錢茶清調下醫統

婦人面瘡名粉花瘡

以定粉五錢菜子油調泥盥內用艾燒烟熏之候
烟盡覆地上一夜取出調搽即愈永無瘡痕談壁
翁試驗方

普門醫品

面病

卷一 十四

抓破面皮

生薑自然汁調輕粉末擦之更無形跡救急方

又方

香油調官粉敷之一夕愈集簡方

癰瘡七方

滅諸癰瘡

蒺藜子山梔子等分爲末醋和夜塗旦洗救急方

又方

熟雞子黃五箇炒黑拭塗日三次久自滅經驗方

又方

先以布拭赤。用禹餘糧半夏等分爲末。雞子黃和傳。勿見風日一月。十年者亦減。聖濟方

又方

春夏用大麥麩。秋冬用小麥麩。炒研如粉。和酥敷之。總錄

又方

鷹屎二兩。僵蠶一兩半。炒爲末。蜜和敷之。聖惠方

又方

普門醫品

面病

卷上 十五

鷹屎白附子各一兩爲末。醋和敷。日三五次。總錄

又方

大鼠一枚。以臘猪脂四兩煎至消盡。濾淨。日塗三五次。先以布拭赤。避風。普濟方

斑施十二方

面生白駁

用敝帚。敝炊帚。敝帛履底。敝甕帶。蟬蛻。蛇皮等分。以月食時合燒爲末。以醇醋和塗之。忌食發風之

物。古今錄驗

又方

鰻鱺魚炙取油塗之。卽時色轉。五七次瘡。宗奭方

面皰

鷹屎白一分。胡粉一分。蜜和敷之。外臺方

又方

李仁去皮細研。以雞子白和如餡塗之。旦以漿水洗去。後塗胡粉。五六日效。忌風。崔元亮海上方

又方

菴花冬瓜仁研末等分。蜜調敷之。聖惠方

普門醫品

面病

卷上 十六

又方

雲母粉杏仁等分爲末。黃牛乳拌和。器盛。略蒸。夜塗旦洗。聖濟錄

又方

皂角子杏仁等分研勻。夜以津和塗之。聖惠方

又方

棗子肉皮搗爛。入白麴和。日用洗面。去垢及黥甚良。集簡方

面上肝皰

鹿角尖磨濃汁厚塗之效 本草綱目

面上紫塊如錢大或滿面俱有

半蹄根四兩取汁穿山甲十片燒存性川椒末五

錢生薑四兩取汁和研生絹包擦如乾入醋潤濕

連擦數次即愈 積德堂方

面上黑氣

半夏焙研米醋調敷不可見風不計遍數從早至

晚如此三日皂角湯洗下面瑩如玉 摘玄方

面色黧黑皮膚粗醜

普門醫品 面病 卷五 十七

殺羊脛骨為末雞子白調敷以白梁米泔洗之一

二日如換神效 肘後方

點點 九方

面生點點如雀卵之狀

醋漬白朮日用拭之極效 肘後方

又方

雞子一枚去黃硃砂末一兩入雞子內封固入伏

雌下拋至雞出取研塗面即去不過五度面白如

玉此陳朝張貴妃常用方 外臺秘要

又方

嫩櫻桃枝同紫萍牙皂白梅肉研和日用洗面 本草綱目

草綱目

又方

蓖麻子仁蜜陀僧硫黃各一錢為末用羊髓和勻

夜夜敷之 摘玄方

又方

黑牽牛末雞子清調夜敷旦洗 摘玄方

面點及粉刺

普門醫品 面病 卷五 十八

用浮萍日授食之并飲汁少許 外臺方

又方

浮萍四兩防己一兩煎濃汁洗仍以浮萍於斑點

上熱擦日三五次 普濟方

粉澤面點

白僵蠶黑牽牛各細研等分日用擦之 十門方

面上非癰點點

土瓜根搗末漿水和勻每晚別以漿水洗面塗藥

旦起洗之百日光彩射人夫妻不相識 肘後方

塗飾八方

太真紅玉膏 潤肌膚美容顏并治黥黥

輕粉滑石杏仁去皮等分爲末蒸過待冷入冰片

麝香少許以雞子清調勻洗面畢傳之旬日顏色

如紅玉閩閩事宜

塗面駐顏

雞子一枚開孔去黃留白入金華臘脂及硃砂少

許紙封與雞抱之俟別卵抱出研塗面洗之不落

半年尚紅也普濟方

普門醫品

面病

九

又方

朱砂二錢乾胭脂川芎各一錢官粉三錢烏梅五

箇去核樟腦五錢爲細末臨卧津唾調搽面上次

早溫水洗去不滿一月面如童顏真寒林方

又方

猪脂五具蕪菁十二兩杏仁去皮土瓜根各一兩

醇酒浸之夜塗旦洗老者少少者白神驗用後方

又方

李花梨花櫻桃花白葵花白蓮花紅蓮花旋覆花

秦椒各六兩莢花木瓜花沉香青木香鍾乳粉各

三兩珍珠玉屑各二兩大豆末七合爲細末瓶收

每日盥洗用之百日光瑩如玉普濟方

面黑令白

天門冬曝乾同蜜搗作丸日用洗面聖濟總錄

又方

冬瓜一箇竹刀去皮切片酒升半水一升煮爛濾

去渣熬膏瓶收每夜塗之或以瓜瓢洗面澡身去

黥黥令人悅澤以其子仁作面脂更佳聖濟總錄

普門醫品

面病

卷五 二十

又方

白楊皮十兩莢花一兩白瓜子仁三兩爲末每服

二錢日三服五十日面及手足皆白聖濟總錄

癰瘡一方

戒除癰瘡

蔓菁子山梔子等分爲末醋和夜塗旦洗救急方

又方

用人精和鷹屎白塗之數日落千金方

又方

七月七日午時取瓜葉七枚直入北堂中向南立
逐枚拭壓即滅去 萬畢術方

又方

斑蝥三箇以糯米五錢炒黃去米入蒜一瓣硃少
許搗爛點之自落 本草綱目

又方

蔓菁子研入面脂中夜夜塗之亦去面皺 聖惠方

又方

胡荽煎湯日日洗之即去 小說

普門醫品

面病

卷二 廿一

點疣痣法

石灰一兩桑灰淋汁熬成膏刺破點之 普濟方

又方

麥稽灰淋汁入石鹼礦灰等分煎乾爲末以針刺
破水調敷之三日即去須新合者方效 聖濟錄

又方

礦灰水調如泥一碗用糯米全者水泡透半搗灰
中半在灰外經宿米色變如水晶先以針微擦動
點少許于上經半日汁出則去藥不得着水二日

而愈 集玄方

又方

藜蘆灰五兩水一大碗淋汁銅器中重湯煮成黑
膏以針微刺破點之不過三次 聖惠方

普門醫品

面病

卷二 廿二

東武王化貞元起父編輯

門人陳 賦憲卿父較閱

耳病門

聾閉 腫疼 聾耳
耳瘡 耳鳴 諸蟲入耳

論內經曰。腎開竅于耳。耳為腎之外候。故耳聾耳鳴。皆腎虛也。耳腫痛者。腎經風熱也。丹溪曰。耳聾而鳴者。屬熱。少陽厥陰熱多。有氣閉者。亦是熱。又曰。耳聾耳鳴。皆是血虛火動。

普門醫品

耳病

卷二十二

王節齋云。耳鳴證或聲如蟬。久則秘塞。世人多作腎虛治。不効。殊不知此是痰火上升。鬱於耳中而鳴。鬱甚則雍閉矣。遇此證當審平昔飲酒厚味上焦素有痰火。只作清痰降火治之。多有先有痰火。又兼惱怒得者最多。怒則氣上。少陽之火客於耳故也。若腎虛而鳴者。其鳴不甚。聾耳初起。內覺疼痛。後則濃水時流。屢發不止。俗名耳底。

凡大病之後而耳聾者。多是氣虛。老人耳漸重聽。

亦是氣虛。亦有痰。不宜峻補。

聾閉 二十四方

諸般耳聾

細辛末。溶黃蠟丸如鼠屎大。綿裹一丸塞之。二次愈。與氏集驗方。

又方

吸鉄石半錢。入病耳內。鉄沙末入不病耳內。自通。直指方。

又方

普門醫品

耳病

卷二十二

斑蝥二枚炒。巴豆二枚去皮心。杵為丸棗核大。綿裹塞之。聖惠方。

又方

芫青。巴豆仁。蓖麻仁。各一枚。研為末。丸棗核大。以綿裹塞之。聖惠方。

又方

螻蛄五錢。川山甲炮二錢。麝香少許。為末。葱汁和。丸塞之。普濟方。

又方

用龜尿點舌下 藏器本草

灸法治聾

濕土瓜根削半寸。塞耳內。以艾灸七壯。每旬一灸。愈乃止。 聖濟方

薰法治聾

蠶蛻紙卷作撚。入麝香半錢。筆筒內燒薰之。三次。即愈。 本草綱目

耳卒聾閉

硫黃雄黃等分研末。綿裹塞耳。數日即效。 千金方

普門醫品

耳病

卷三 三

又方

香附子瓦炒研末。蘿蔔子煎湯。早晚各服二錢。忌鐵器。 衛生易簡方

又方

耳遂二塊。綿裹塞耳內。口嚼甘草。自通。 永類方

又方

蓖麻仁五十箇。大棗肉十五箇。共研爛。用乳汁和。九作錠。綿裹一枚塞之。覺耳中熱爲度。一日一易。二十日好。 千金方

又方

真慈石能吸鐵者。豆大一塊。穿山甲一片。燒存性。研。共用綿裹塞耳內。口含生鐵一塊。覺耳中如風雨聲。即通。 濟生方

又方

菖蒲根一寸。巴豆一粒去心。同搗作七丸。綿裹。九塞耳。一日一換。或以生菖蒲汁滴之。 肘後方

又方

芥子末。人乳和。綿裹塞之。 外臺秘要

普門醫品

耳病

卷三 四

又方

鍊松脂三兩。巴豆一兩。和搗成丸。薄綿裹塞。一日二度。 梅師方

又方

大附子醋炙。削尖塞之。 千金方

又方

巴豆一粒。紙裹。針刺孔。使通氣。塞鼻中。 經驗方

又方

以鼠膽汁滴之。如雷鳴時即通。 本事方

耳內有塞成聾

香油日滴三五次塞出即愈 總錄方

多年耳聾重者三兩次初起者一度便效

用鹽前脚脛骨打破向口中漚出髓以瓷盒盛收每用綿點少許入耳內側卧候藥行不可多用以白色者為上黃色者不用

又方

針砂一合水二合浸十日取清水少許和鹽骨髓攪勻滴少許入耳以新磚一箇燒赤浸醋鋪慈石

普門醫品

耳病

卷五

末一兩在磚上枕之至晚如此三度即通 普濟方

腎虛耳聾十年者二服可愈

小蠶四十九箇生薑如蠶大四十九片同炒薑乾為度研末溫酒服其半一二更時再進一服至醉不妨次日耳中如笙簧聲即效 普濟方

多年老聾

用活鼠一枚以湯浸死取膽真紅色者是也用川烏頭一箇炮去皮華陰細辛二錢膽礬半錢為末以膽和勻再焙乾研細入勝香半字用鷄翎管吹

入耳中口含茶水日二次十日見效 衛生家寶方

腫疼 九方

耳卒腫疼

牛旁根搗熬膏內外塗之仍水調服之 聖濟總錄

耳中卒痛

磨刀鐵漿滴入即愈 活人心統

又方

鹽五升蒸熟以耳枕之冷復易之 肘後方

又方

普門醫品

耳病

卷五

鬱金末一錢水調傾入耳內急傾出之 聖濟總錄

耳卒腫

棟實搗爛綿裹塞之頻換 聖惠方

耳忽大痛如有蟲在內奔走或血水流出或乾疼不可忍者可忍

蛇蛻燒存性研細鷄翎管吹之立愈 醫方摘要

又方

以黃鱔魚血滴入數點即愈 本草綱目

黍粘子湯治耳疼不可忍

黍粘子。蘇木。生甘草。昆布。龍膽草。連翹。蒲黃。黃芩。

當歸稍。各五分。紅花少許。桔梗一錢半。生地黃。紫

胡黃耆。各四分。黃連三分。薏仁三枚。去皮另研。水

二鍾煎一鍾。食後稍熱服。忌寒藥利大便。丹溪方

又方

穿山甲二片。土狗二箇。

即螻蛄

同炒焦黃爲末。每

吹一字入耳。亦治耳聾。

普濟方

聾耳

十六方

五般聾耳出膿血水

醫門醫品

耳病

卷三 七

人牙燒存性。麝香少許。爲末吹之。

普濟方

又方

海螵蛸半錢。麝香一字。爲末。以綿杖繳淨。吹入耳

中。澹寮方

又方

穿山甲燒存性。麝香少許。研末吹之。

鮑氏小兒方

又方

蟬蛻半兩。燒存性。麝香半錢。爲末。綿裹塞之。追出

惡物效。海上方

又方

乾胭脂。枯白礬。等分。研勻。先用綿杖子繳去膿。另

用淨綿杖引藥入耳。經驗方

又方

竹蛀蟲末。臘脂。坯子。等分。麝香少許。爲末吹之。朱氏集驗方

又方

故綿燒灰。綿。之。聖惠方

又方

醫門醫品

耳病

卷三 八

五倍子炒。爲末吹之。

普濟方

又方

杏仁炒黑。搗膏。綿裹納入。日三四易之。梅師方

又方

蘆茸石煨。白礬。各二錢。乾臘脂半錢。麝香少許。

爲末。繳淨吹之。普濟方

又方

用釜下墨吹滿耳。深入無苦。卽自出。附後方

耳底疼痛

桑螵蛸一箇燒存性。麝香一字。研末。每用半字。入神効。有膿先以綿槌繳淨。經驗方

又方

蟬稍七枚去毒焙。入麝三分研勻。挑少許入耳中。日夜三四次以愈爲度。楊氏家傳方

耳出臭膿不止

雄黃。雌黃。硫黃等分爲末。吹之。聖濟方

耳中出血

蒲黃炒黑。研末。摻入。簡便方

普門醫品

耳病

卷九

又方

枯礬一兩。黃丹炒一錢。爲末。日吹之。聖濟方

耳瘡

入方

月蝕瘡

蚯蚓糞燒過。研細。猪脂和傅。子母秘錄

又方

棗去核。包皂礬煨研。香油調敷之。摘玄方

月蝕瘡久治不瘥

月望夜取兔屎納蝦蟇口中。同燒。末敷之。肘後方

耳瘡腫痛

五倍子爲末。冷水調塗。濕則乾摻之。海上名方

耳中惡瘡

雞矢白炒。研敷之。聖惠方

耳上濕瘡

牆頭苔。井中苔。各乾爲末。等分。燈臺內油和塗之。聖濟錄

耳內外惡瘡。及頭瘡。肥瘡。癰瘡。

黃藥音陌半兩。乾馬齒莧一兩。爲末敷之。聖惠方

普門醫品

耳病

卷九

聾耳出水成瘡

蚯蚓糞爲末。傅之。并吹入。千金方

耳

通方

腎虛耳內如風水鐘鼓聲

穿山甲一大片。以蛤粉炒赤。蟬稍七箇。麝香少許。爲末。以麻油化蠟和作挺子。綿裹塞之。醫生方

又方

川椒紅一兩。巴豆。菖蒲。各五錢。同礪細。以松脂黃

蠟和爲挺。納耳中。一日一換。神驗。本草綱目

耳鳴晝夜不止

烏頭燒作灰。菖蒲等分。為末。綿裹塞之。楊氏產乳

耳鳴如雷

骨碎補。削作細條。火煨。乘熱塞之。圖經本草

諸蟲入耳十六方

驅蟲方

以紙塞耳。鼻留蟲出入之耳。不塞。閉口無言。少頃

蟲即出。集玄方

又方

普門醫品

耳病

卷五十二

以車轄脂塗耳門。自出。梅師方

又方

以貓尿滴之。自出。凡取貓尿。用生薑擦貓鼻。即溺

仙門事紀

又方

人乳滴之。即出。聖惠方

又方

菖蒲搗汁滴入。自出。聖濟總錄

又方

雞冠血滴入。即出。勝金方

又方

用生油調雞心血。滴之。綱錄

又方

菰葉。按熟。塞之。或搗汁滴之。或枕之。自出。梅師方

又方

雄黃為末。作餅。燒煙薰之。即出。十便良方

又方

膽礬為末。和醋灌之。自出。千金方

普門醫品

耳病

卷五十二

又方

百部炒研。生油調一字。傳耳門上。聖濟錄

又方

以醋滴入。起行。即出。錢氏藥中方

又方

薑汁少許。滴之。易簡方

諸蟲入耳鼻中

將古鏡。獻之。即出。日華本草

蚰蜒入耳

胡麻粉糊作袋枕之

又方

小赤豆淨搗汁滴之未出再滴

兵部手集

又方

香油煎餅枕卧須臾自出

劉禹錫傳信方

又方

濕生蟲研爛塗耳邊自出或攤紙上捲筒安入耳

中亦出 衛生寶鑑

又方

管門醫品

耳病

卷二 十一

地龍入葱內化水點入則蚰蜒亦化為水

聖惠方

又方

用牛乳灌入即出若入腹則飲二升即化為水

廣

利方

蜈蚣入耳

炙猪肪掩耳自出

梅師方

又方

雞肉炙香塞耳自出

總錄

蚤虱入耳

菖蒲末炒熱袋盛枕之

蛆蟲入耳

杏仁搗泥取油滴入非出則死

扶壽精方

飛蟲入耳

生半夏為末麻油調塗耳門外

本事方

蟻入耳中

穿山甲燒研水調灌入即出

肘後方

鼻病門

鼻塞 鼻淵 鼻瘡 癰肉 赤皴 鼻衄

普門醫品

鼻病

卷二 十四

論巢氏病源曰肺開竅於鼻熱乘於血則氣亦熱也血氣俱熱血隨氣發出於鼻為鼻衄甚則大衄而口耳皆出血也肺邪壅滯則鼻氣不得宣調故不知香臭而為鼽音謂聲不清而塞也為鼽音謂涕不出而塞也或謂謂頭眩作疼鼻流清涕如淵也或生瘡或生瘰癧或流涕不止皆肺之為也鼻病總屬于火衄者火之發也鼽者火之鬱也聞香臭者積熱也生瘡者血熱也鼻淵者膽移熱於腦也鼻癰者痰火所為也鼻痒者熱則生風也

鼻塞

防風通聖散 治肺經風熱壅塞鼻滯不通不聞香臭或流涕皆可服

防風川芎當歸酒洗白芍藥酒炒連翹薄荷麻黃去節各六分石膏煅桔梗黃芩酒炒甘草炙各一錢白木炒梔子炒荆芥各四分滑石飛二錢四分芒硝大黃各四分生薑三片水二鍾煎一鍾溫服肺實鼻塞不知香臭

白微貝母去心欬冬花各一兩百部二兩為末每服一錢食後米飲下 普濟方

鼻塞不聞香臭 服一錢食後米飲下 普濟方

蓖麻子仁三箇大棗去皮一枚搗勻綿裹塞之。日一易三十日即通 聖濟錄

又方

苦壺盧子為末醇酒浸之及一日冬七日日用少許點入 聖惠方

鼽鼻不聞香臭

乾薑末蜜調塞鼻中 廣利方

又方

旱澄茄半兩薄荷葉三錢荆芥穗一錢半為末蜜丸芡子大時時含嚥 御藥院方

又方

瓜蒂細辛各一錢為末麝香一字研勻每用少許吹之 好古方

又方

麻鞋燒灰吹之立通 經驗方

又方

普門醫品

鼻病

卷三 十六

皂角末吹之千金方

鼽鼻作臭

用雞腎一對與脖前肉等分入豉七粒新瓦焙乾研以雞子清和作餅安鼻前引蟲出忌陰人雞犬見十便良方

食物入鼻悶疼不出

用牛脂如棗大一塊納鼻中吸入脂消則物隨出也 外臺方

鼻淵 七方

鼻淵流涕

蒼耳子炒研爲末。每白湯點服二錢。龍治要訣

又方

用葦菱末吹之效。衛生易簡方

又方

生附子末葱涎和如泥。會湧泉穴。普濟方

又方

藕節苦蕒等分焙研末。每服二錢米飲下。普濟方

又方

普門醫品

鼻病

卷五 十七

貝子燒研。每用二錢。生酒調服。本草綱目

腦漏鼻常流膿

破瓢白雞冠花白螺螄殼各燒存性等分。血竭麝

香各五分爲末。以好酒拌濕。熟艾同藥搓揉成餅。

貼頂門上。以熨斗熨之。以愈爲度。孫氏集要方

鼻中時常流臭黃水。腦痛名控腦砂。有蟲食腦中也。

用絲瓜藤近根者三五尺。燒存性。每服一錢。溫酒

下。以愈爲度。醫學正傳

鼻瘡 十方

鼻內生瘡

蜜陀僧香白芷等分爲末。蠟燭油調搽之。簡便方

又方

玄參爲末敷之。或以水浸軟塞之。衛生易簡方

又方

生大黃杏仁搗勻。猪脂和塗。本草綱目

又方

杏仁研末。乳汁和敷。千金方

又方

普門醫品

鼻病

卷五 十八

以莢葉嫩心杆爛塞之效。簡便方

又方

黃檗音栢檳榔末猪脂和敷。普濟方

又方

牛骨狗骨等分燒灰。臘猪脂和敷。千金方

鼻生疥瘡

紫荊花陰乾爲末。貼之。衛生易簡方

又方

杏仁燒壓取油敷之。千金方

鼻瘡鼻空鼻淵鼻鼽及痘後鼻瘡不愈

辛夷花苞焙乾研末入麝香少許葱白蘸入數次
甚良 本草綱目

〔瘰肉〕十二方

鼻中瘰肉

枯白礬爲末猪脂和綿裹塞之數日瘰肉隨藥出
千金方

又方

硃砂點之卽落 白飛霞方

普門醫品

鼻病

卷三十九

又方

明礬一兩蓖麻仁七箇鹽梅肉五個麝香一字并
丸綿裹塞之卽化爲水 本草綱目

又方

細辛末時時吹之 聖惠方

又方

苦壺廬子苦丁香等分入麝香少許爲末紙捻點
之 聖惠方

又方

瓜蒂末白礬末各半錢綿裹塞之或以猪脂

挺子塞之日一換 聖惠方

又方

細辛白芷等分爲末以地膽汁和成膏每用少許
點之以消爲度 聖惠方

又方

狗頭燒灰二錢苦丁香半錢研末吹入卽化爲水
或加硃砂少許尤妙 朱氏集驗方

又方

普門醫品

鼻病

卷三十九

蛭皮炙爲末綿裹塞之日三易愈 千金方

鼻生瘰肉不聞香臭多年者

用當道蕤藜經車轆者一握水一大盞煮取半盞

仰臥滿口含水以汁數匙灌鼻中不通再灌俟嚏

出瘰肉如蠶蛹狀卽愈 聖惠方

鼻中瘰肉垂下

用片腦點之自入 集簡方

又方

蠅螂十枚納青竹筒中油紙密封置廁坑內四十

九日取臘乾入麝香少許爲末塗之當化爲水也
聖惠方

赤鼓 十方

鼻鼓赤炮及面上點點癰癤

蜜陀僧二兩細研入乳調夜塗旦洗
聖惠方

酒鼓赤鼻

凌霄花山梔子等分爲末每茶服二錢日三服數

日除根
百一選方

又方

普門醫品

鼻病

卷五 二十一

生硫黃半兩杏仁二錢去皮輕粉一錢夜夜擦之

本草綱目

又方

枇杷葉梔子仁等分爲末每服二錢溫酒調下日

三服
本事方

又方

舶上硫黃雞心檳榔等分片腦少許爲末絹包口

日擦之
瑞竹堂方

又方

沒石子有孔者水磨成膏夜夜塗之
角月得方

又方

凌霄花半兩硫黃一兩胡荽四箇輕粉一錢研膏

生絹包擦
本草綱目

又方

桐油入黃丹雄黃研敷
摘玄方

又方

橘核炒研每服一錢胡荽肉一箇搗酒服以愈爲

度
冠宗藥方

普門醫品

鼻病

卷五 二十一

鼻鼓膿血

正月取鼠頭燒灰以臘猪脂調敷
外臺方

鼻衄

八方○餘見十四卷失血門

鼻中出血

血竭蒲黃等分爲末吹之
醫林集效

鼻衄不止

牛耳中垢車前子末等分和勻塞之良
總錄

又方

山梔子燒灰吹鼻用有效
黎居士易簡方

又方

葛師搗汁飲并滴鼻中 本草綱目

鼻衄不止頭疼心煩及病後常衄小勞即作

石膏牡蠣各煅等分爲末每服二錢新汲水調服

仍滴鼻 普濟方

鼻衄不止眩目欲死

青箱子搗汁滴入鼻中即止 本草綱目

二花散 治同上

酸石榴花黃蜀葵花各等分每服一錢水一鍾煎

普門醫品

鼻衄

卷三十三

六分溫服 經驗方

九竅出血皆可用

墻頭苔莎可以塞車前草汁可以滴火燒蓮房用

水調鍋底黑煤可以吃石榴花片可以塞生蘿蔔

汁可以滴火煨龍骨可以吹水煎茅花可以吃

普門醫品卷之二十三

東武王化貞元起父編輯

門人陳 斌憲卿父較閱

眼目門

腫疼 翳膜 赤爛 流淚 昏暗

雀瞽 青盲 瞋傷 雜證

論眼有五輪八廓病有七十二候非專門世業不能精其理非妙手巧心不能專其用故曰眼不治不瞽言治者之難其人也今所集皆證之明白易見與方之可通用者耳

普門醫品

眼目

卷三十一

點藥莫要于冰片而冰片辛熱以其性竄急借以拔出火邪耳古方用燒酒洗目或用乾薑汁點眼者皆是此意蓋火眼係火邪客于目從內出外若外用寒涼以阻逆則鬱火內攻反不得散故點藥用辛熱洗眼用熱湯是火鬱發之從治法也今人不知冰片爲劫藥反以爲寒常用點眼久久積熱耗血反致昏朦不可不知
目病腫痛兩脣如奩合而爲一痛不可忍者宜用防風通聖散下之立愈

暴赤眼腫

黃丹、蜂蜜調貼兩太陽穴立效。明目經驗方

又方

耳草水研明礬敷眼胞上或用枯礬頻擦眉心亦效。集簡方

又方

煇硝為末臥時點目眦至旦鹽水洗去。聖惠方

又方

普門醫品

眼目

卷三 二

用苦竹兩頭留節一頭開小孔入切碎黃連五錢

在內油紙封固以繩繫石沉于井中一夜次日取

竹節內水加片腦少許洗眼即愈。本草綱目

又方

決明子炒研茶調敷兩太陽穴乾則易之一夜即

愈。醫方摘要

又方

車前草自然汁調朴硝末臥時塗眼胞上次日洗

去。聖濟總錄

又方

用古錢刮並取汁以錢唇點之即有熱淚出今日

點明日愈勿疑。冠宗藥方

暴風客熱目赤腫疼

生薑搗汁陰乾取粉入銅青木等分每以少許沸

湯泡澄清溫洗淚出即愈。冠宗藥方

又方

五月取老黃瓜一條上開小孔去瓢入芒硝令滿

懸陰處待硝透出刮下點眼甚效。毒域神方

普門醫品

眼目

卷三 三

又方

好梨一枚搗汁黃連細末三錢膩粉一字和勻綿

裹浸梨汁中日點之。聖惠方

暴赤眼痛礫澁難禁

嫩楮枝去葉放地上火燒以罌蓋之一日取灰泡

湯澄清溫洗。聖惠方

又方

桑葉為末紙卷燒烟熏鼻取效。普濟方

又方

耳癰汁二合黃連半兩入銅器內慢火煎濃去渣

點之 普濟方

熱毒攻眼赤痛浮腫

黑豆一升分作十袋沸湯中蒸過更互熨之三遍

即愈 普濟方

目赤腫疼浸淫生瘡

瞿麥炒黃為末以鷄涎調塗背頭即開或搗汁塗

之 普集方

治目珠痛至夜更甚連眉稜骨及頭半邊腫疼用苦

普門醫品

眼目

卷三十四

寒藥點之反甚者神効

夏枯草香附子炒各二兩甘草四錢為末每用錢

半清茶調服下咽則疼減四五服全愈 樓全善方

天行赤目暴腫

地骨皮三兩水二大碗煎一碗入鹽少許頻洗 謝

道人方

又方

以人乳浸黃連蒸熱洗之 聖惠方

又方

燒黃荊取汁點之 用後方

又方

猪膽汁研銅綠食鹽點之 唐濟方

又方

自己小便去頭尾乘熱抹洗閉目少頃愈 普濟方

清涼膏 治同上

芙蓉葉為末水和貼太陽穴 鴻飛集

時行赤目

黃檗去粗皮為末水和作塊濕紙包裹黃泥固

普門醫品

眼目

卷三十五

煨乾每用一彈子大紗絹包之浸水一盞飯上蒸

熟乘熱熏洗極效 眼科龍木論

又方

薺菜根梓汁滴之 聖惠方

又方

乾薑末水調貼足心甚妙 普濟方

又方

鮮龍膽草搗汁黃連泡汁和勻點之 危氏得効方

赤目

以訶子一枚密磨注目中徐氏醫集

赤眼十分重者

以三七磨汁。金四圍甚妙瀕湖集簡方

防風通聖散 治見論

方見二十二卷鼻病門

翳膜 三十一方

撥雲膏 去眼中翳膜最捷

麝仁一兩去油。白礬砂一錢。麝香二分研勻收貯。

每用少許點之。妙不可言。薛氏醫案

翳門醫品

眼目

卷五 六

一切眼病風癢生翳

宜黃連末。麝仁去皮研膏。等分。和勻。取無蛭乾。畫

一枚。切去頂。剝去核。以二物填滿。以原頂合住。用

少綿裹之。用茶一碗。于銀器中。文武火煎。收半小

盅。以綿濾過。確收點眼。極効。劉禹錫傳信方

一切眼翳

三月間收栳葉。晒乾為末。入麝香少許。每以黍米

大注背內。其翳自去。聖惠方

又方

燕薹膠。即蘭菊葉。以水浸過。吹氣取汁。滴入目

中。去熱翳赤白障。拾遺本草

又方

薺菜和根草葉。洗淨焙乾為細末。每夜卧時先洗

眼。挑末米許。安兩大畔頭。澁痛忍之。久久膜自落

也。聖濟總錄

嚙鼻法 治眼內生翳。極効。但以多嚙為妙

鷺不食草。一名石胡荽。晒乾二錢。青黛。川芎。各一

錢。為細末。噙水一口。每以米許嚙入鼻內。泪出為

翳門醫品

眼目

卷五 七

度。一切雲翳攀睛。及赤腫隱澁。淚汨疼痛。鼻塞腦

酸俱効。倪氏啓微集

內外障翳

玄精石煨。石決明煨。各一兩。麝仁。黃連。各二兩。羊

子肝七個。竹刀切。晒乾為末。粟米飯丸。梧子大。每卧

時茶服二三十丸。服至七日後。以熱手烙頂心。以

助藥力。一月見効。朱氏集驗方

又方

夜明砂末。入新肝內。札緊。煮食飲汁効。血指方

又方

五靈脂洗淨等分爲末。熟豬肝日煎食。經驗方

又方

豬脬子五錢。袋仁五分。青鹽一錢。共搗千下。令如泥。每點少許。取下翳膜爲効。孫氏集效方

又方

刀刮瓜甲細末。人乳調點之。集簡方

內障

熟地黃。麥門冬去心。車前子。等分爲末。煉蜜丸梧

子大臨卧白湯下三四丸

徐氏醫按

卷五 八

一切障翳赤腫

用黃連切片。井水熬成膏。入青魚膽汁和勻。入片

腦少許。瓶收密封。每日點之。甚效。張氏簡易方

內外障翳或三五個月不愈者一點復明

煇硝一兩。銅器鎔化。入飛過黃丹二分。片腦二分。

罐內收之。每點少許。其效如神。張三才方

目花翳疼

貝子一兩。燒研如粉。入龍腦少許點之。有瘀肉加

珍珠方

眼赤疼如雞啄。生浮翳者

石決明煨木賊焙。等分爲末。每服三錢。水一鍾。薑

三片棗二枚煎半鍾連渣服之。日再。經驗方

赤目障翳

每以熊膽少許化開。入冰片少許。銅器點之。絕奇。

或淚痒。加生薑粉此須。齊東野語

又方

枸杞子搗汁。日點三五次。神驗。肘後方

普門醫品

眼目

卷五 九

赤翳攀睛血貫瞳人

海螵蛸一錢。辰砂乳細水飛半錢。以黃蠟少許化

和成劑收之。臨時火烘。取黍米大。搽入大眥中。晒

至天明溫水洗下。未退更用一次。即效。海上方

目中障翳及赤脉

蜜蒙花製黃蘗音根各一兩爲末。水丸。梧子大。每

卧時湯服二十九。聖濟方

赤眼雲翳攀睛

菖蒲自然汁。文武火熬成膏。日點之効。聖濟錄

目生赤膜

龍腦雄雀屎各八分為末以人乳汁調成膏日

點之無有不驗

石連光明散 治一切目疾痛痒移淚赤腫翳膜

爐甘石半斤脂粉頭色者半斤桑葉大微赤研末

用黃連四兩切豆大煎水浸石一日澄取粉晒乾

用官粉二定煎黃連渣浸過去水炒乾雄黃研末

水飛各用羅收每用耳石定粉各三分雄黃一分

片腦半分研勻點眼甚妙

赤障翳腫

用青柏子熬水洗之

本草綱目

弩肉血翳

秋間取小柄壺盧或小藥壺陰乾於緊小處鋸

斷內挖一小孔如眼孔大遇有此病將眼皮上下

用手撐開將壺盧孔合定初雖甚疼苦然瘀肉血

皆漸下不傷睛也

病後目生翳障

白菊花煇蛻等分為散每三錢入蜜水許水一

煎半匙服大人小兒皆宜屢驗

傷寒熱毒攻眼生白翳

用烏賊魚骨一兩去甲為末入龍腦少許點之口

三聖惠方

睛上生翳不問久新

鯉魚長一尺以上者取胆滴汁鏡上陰乾竹刀刮

下每點少許

目生弩肉或痒或痛漸掩睛人

杏仁去皮二錢半膩粉半錢研勻以綿裹於筋頭

赤障翳腫

點之

又方

生杏仁七枚去皮細嚼吐于掌中乘熱以綿裹筋

頭點弩肉上不過四五度愈

弩肉攀睛

浮萍少許研爛入片腦少許貼眼上

赤爛

一切赤眼爛弦

爐甘石煇朴硝各一錢為末煎湯洗

又方

銅青研細水調塗盤底艾火薰乾刮下塗爛處解
生易簡方

又方

用金環脚燒紅掠上下臉內日數次甚妙集簡方

二百味草花膏 治爛弦風赤流汨腫疼

羯羊膽一枚入蜜五錢碗盛蒸稠如膏瓶收每用

少許點一日淚止二日腫消三日痛定吳堅志

碧雲膏 治同上

普門醫品

眼目

卷三十三

臘月取羯羊膽十數枚以蜜裝滿紙套住懸簷下

待霜出掃下點之神効張三丰真人方

爛弦風眼浸淫多淚

爐甘石四兩火煨童尿淬七次細研每用椒湯洗

臨卧點三四次明蚤以茶湯洗去劉長春方

風眼赤爛

膽礬三錢燒研泡湯日洗明日經驗方

又方

明淨皮硝一盞水二盞煎化露一夜濾淨澄清朝

夕洗之三日即消雖半世者亦愈并治時行赤腫
經驗方

又方

枯礬一兩銅青三錢研末湯泡澄清點洗永類方

又方

皂礬火煨地上去火毒研細泡湯澄清點洗并治

拳毛倒睫永類方

又方

生薑汁浸薄荷一宿晒乾爲末每用一錢沸湯泡

普門醫品

眼目

卷三十三

洗明日經驗方

海眼赤爛

白藥子一兩甘草半兩爲末猪肝一具批開摻末

五錢煮熟食之直指方

又方

覆盆子葉搗爛取汁以皂紗蒙眼滴汁漬下弦轉

盼間赤蟲如絲從紗上出數日下弦乾復如法滴

上弦又取蟲出而愈藏器方

胎風赤爛昏暗

以礞盛黃土按實入蜜虎數枚于內勿令損傷以紙封口穿數孔出氣候有糞數粒去糞上一點黑者只取一頭白者唾津研成膏塗眼睫周圍不得揩拭來早以溫漿水洗三次甚効聖濟總錄

神効驅風散 治風毒攻眼腫脹流痛不可忍上下

臉赤爛或浮翳瘀肉

五倍子一兩蔓荊子一兩半爲末每用二錢水二

盞銅石器內煎沸去滓乘熱洗淨再煎濟方

目痒不住手擦日久赤爛拳毛入內

普門醫品

眼目

卷三十五

木驚子仁搗爛以軟帛包裹左患塞右鼻右患塞

左鼻其毛自順孫天仁集効方

血風赤眼女人多患此

烏賊魚骨二錢銅綠一錢爲末每用一錢熱湯泡

洗楊氏家藏方

又方

用五倍子內乾蟲同爐并石研細點之本草綱目

又方

雞冠血點之日三五度聖惠方

流淚九方

肝虛冷淚不止

夏枯草半兩香附子一兩爲末每服一錢茶調下簡要濟衆方

冷淚目昏

乾薑粉一字泡湯點洗之聖濟總錄

又方

木耳燒存性水賊等分爲末每服二錢以清米泔

煎服惠濟方

普門醫品

眼目

卷三十五

又方

臘月不落桑葉煎湯日日溫洗或入芒硝集簡方

又方

枸杞子二升袋盛酒一斗浸念一日飲之龍木論

目昏冷淚浸淫不止及青盲內障

覆盆子曝乾搗極細以薄綿裹之用人乳浸約人

行十里許取汁點目中即仰卧不過三四日視物

如少年禁酒麪油物崔元亮集驗方

眼熱流淚

五倍子。蔓荊子。煎湯洗。後用雄雞膽點之。極效方

痒眼流淚

烏賊魚骨。牡蠣。等分爲末。糊丸。梔子大。每用一九。

同猪肝一葉。米泔煮熟食。經驗方

春雪膏 治迎風流淚

方見本門昏暗條

昏暗十九方

目瞳寬大。漸昏如霧中。覺空中生花。視物成二體。久

則光不收。成內障。或神水淡白淡綠

普門醫品

眼目

卷三 十六

真慈石火。煅醋淬七次。二兩。硃砂飛一兩。神麴生

用三兩。爲末。另以神麴末一兩。煮糊加蜜。丸。梧子

大。每服二十九。空心飯湯下。原機啓微錄

補虛明目散 治肝腎俱虛。眼昏黑花。或流淚生翳。

車前子炒。熟地黃焙。各三兩。兔絲子酒浸蒸五兩。

爲末。蜜丸。梧子大。每酒服三十九。日二。和劑局方

又方

空青二錢。麴仁去皮一兩。片腦一錢。細研日點之。

聖濟錄

男女肝經不足。風熱上攻。目昏暗。羞明及障翳。

黃連末一兩。羊子肝一具。去膜搗爛。和丸。梧子大。

每食後熱水下四十九。劉禹錫傳信方

補肝散 治同上

七月七日收蒺藜子。陰乾搗去刺。爲末。食後水下

二錢。日二服。有失明三十年服此復明。外臺秘要

又方

決明子。蔓青子。等分。酒煮曝乾。爲末。飯後水服二

錢。仍每旦和吞數十粒。百日後夜見物光。聖惠方

普門醫品

眼目

卷三 十七

又方

蔓青子二升。米醋煮熟。晒乾研細末。以井華水服

二錢。日三服。至一斗。能夜視物。且令人肥。千金方

春雪膏 治肝虛風熱上攻。眼目昏暗。痒痛。隱澹羞

明。不能遠視。迎風有淚。多見黑花

麴仁去皮壓去油一兩。片腦一錢。研勻。生蜜三錢

和收。確盛點眼。和劑局方

明目地骨酒 治眼目昏花。金壯筋骨。補精髓

枸杞根。生地黃。牛菊花。各一斤。搗碎。以沙鍋陸續

煎汁五六斗共熬至三斗炊糯米五斗細麴打
釀酒待熟澄清日飲三盃忌鐵器聖濟總錄
肝虛目暗茫茫不見

白蜜二匙鯉魚膽一枚銅器中煎減半絹濾過調
浙珠末一錢瓶盛頻點金治青盲內障聖惠方

眼中見禽蟲飛走紛紛不已者肝膽病也

桐花酸棗仁炒玄明粉卷活各一兩爲末每服二
錢水煎和滓服日三經驗方

目昏難視

普門醫品

眼目

卷三 十八

楮桃荆芥穗等分爲末煉蜜九彈子大食後嚼一
九薄荷湯送下日三服衛生易簡方

洞視千里法 明目去翳大益老眼且能堅齒

食鹽以百沸湯泡濾清汁於銀石器內熬取雪白
鹽花磁器盛每蚤揩牙漱水以大指甲點水洗目
閉坐良久乃洗面甚妙永類鈴方

雙美丸 治眼目昏花

甘菊花一斤花椒去目六兩爲末新地黃汁爲丸
梧子大每服五十丸臨卧茶清下瑞竹堂方

目病失明

用青殺羊肝一具去膜切片入新瓦內炕乾同炭
明子半升蓼子一合炒爲末以白蜜漿服二錢日
三服不過三劑復明一年能夜視字食療本草
目忽不見

令人漱口爭嚼母薑一口吐去以舌舐之日五六
次以明爲度聖濟總錄

積年失明

決明子二升爲末每食後米飲服二錢外臺秘要

普門醫品

眼目

卷三 十九

觀音洗眼方按期洗之一年目如童子

正月初三日二月初八日三月初四日四月初四
日五月初五日六月初四日七月初三日八月初
一日九月十三日十月十三日十一月十六日十
二月初五日每用苦硝六錢水一盞煎六分澄清
洗聖惠方

明目固齒烏鬚方

黑鉛半斤鎔化入桑條灰柳木攪成砂研末蚤晚
揩牙以水漱口洗目神効勝金方

雀目夜視不見

雀目夜視不見

芥子炒焦爲末。用羊肝一具。分作八服。每用芥末

三錢。捻肝上。鐸裹煮熟。冷食。以汁送下。聖濟總錄

又方

決明子一升。地膚子五兩。爲末。米飲九梧子大。每

米飲下三十丸。普濟方

又方

黃蠟鎔成汁。取出。入真蛤粉相和得所。每用刀切

普門醫品

眼目

卷五 二十

下二錢。以猪肝二兩。劈開。摻藥在內。麻繩扎定。水

一碗。銚內煮熟。取出。乘熱蒸眼。至溫。并肝食之。日

二次。以效爲度。集驗方

又方

海螵蛸半斤。去甲爲末。化黃蠟三兩。和捏作餅。如

錢大。每服一枚。以猪肝二兩。竹刀批開。裹藥扎定。

米泔水各半碗。煮熟食之。以汁送下。楊氏家藏方

雀目久治不效

石膏煨末。每服一錢。猪肝二兩。薄批。摻藥在上。纏

定沙鐵者。食之一日。一服。明。方

青膏

青膏內。除但。瞳子不壞者。十得九愈。

蔓青子六升。蒸令氣過。同甑取下。以釜中熱湯淋

之。曬乾。再蒸。再淋。如是三遍。杵爲末。食後清酒調

服二錢。日再服。崔元亮海上方

又方

雄鼠膽。鯉魚膽。各二枚。和勻。滴之。立效。聖惠方

又方

普門醫品

眼目

卷五 二十一

桑灰。童便。和。九龍眼大。每一丸。泡湯澄澆。龍目論

十年青膏

取白大生子。目未開時。乳頻頻點之。狗子目。開即

痊。藏器本草

又方

夜明砂。用糯米炒。米黃去。米取砂。稻葉炙。各等分

爲末。牛膽汁。和。九梧子大。每夜卧時。竹葉湯下。二

十九。至五更。米飲下。二十九。瘥乃止。聖惠方

又方

白羊子肝一具。青連一兩。熟地黃二兩。同搗。
子大。食遠茶。服七十九日。三服。傳信方

洗青育方

正月八。二月八。三月六。四月四。五月五。六月二。七
月七。八月二。九月十二。十月十七。十一月二十
六。十二月三十日。每用桑葉灰一合。照依日期煎
湯沃之。於磁器中。澄取極清。熱洗之。如冷。即重
湯。須熱。不住手洗。久久。視物如鷹鵠也。醫統

眼傷方

青門醫品

眼目

卷五 五

雜物瞤目不出

用東牆上馬齒莧。燒灰研細。點少許于背頭。即出。
聖惠方

又方

鹽沙揀淨。空心以新汲水。吞十枚。勿嚼破。聖惠方

又方

新桑根皮洗淨。搥爛。入眼擦之。其瞤立出。聖惠方

又方

以雞肝血滴少許。即出。聖惠方

又方

以酥少許。隨左右納鼻中。仰卧垂頭少頃。令流入
目中。物與淚同出。聖濟總錄

塵沙瞤目不出

鹽鼓各一撮。置水中。注目視之。立出。孫真方

又方

生藕洗搗。綿裹滴汁入目中。即出。普濟方

又方

雞膽汁點之。醫說

青門醫品

眼目

卷五 五

又方

取生雞卵一枚。以其背于眼上影之。自出。肘後方
塵物入目不出。及翳膜赤痛。淚

以蘭香子。即羅勒子三五顆。安目中。少頃。當濕服

與物俱出。嘉祐本草

麥芒入目

大麥煮汁洗之。即出。孫真方

又方

以布覆眼上。持蠟燭從布摩之。芒着布出。千金方

飛絲入目

白菜或蔓菁葉。揉爛絹帕包。滴汁二三點入目。即出芥菜子汁點之。亦妙。普濟方

又方

石菖蒲搗碎。左目塞右鼻。右目塞左鼻。百發百中。危氏得效方

又方

磨濃墨汁點之。即出。千金方

又方

普門醫品

眼目

卷三 二十四

柘漿點之。以綿蘸水洗去。醫學綱目

又方

刮瓜甲末。唾津點之。其絲自聚拔出。危氏得效方

損目破睛

牛口涎日點二次。避風。黑睛破者亦愈。肘後方

瞋目其物不出。生翳膜者。

瞿麥。乾薑炮為末。井華水服二錢。日二服。聖惠方

目為物傷

羊膽。鯉魚膽。各二枚。雞膽三枚。和勻點。聖惠方

傷目青腫

羊肉煮熟。乘熱熨之。聖惠方

雜證 十三方

睫毛倒入

石斛。川芎。等分為末。口含水。隨左右啗鼻。日三次。袖珍方

又方

無名異末。紙捲作燃。點火吹滅。薰之。甚妙。保命集

又方

普門醫品

眼目

卷五 二十五

以臘月蟄蠅乾研為末。鼻頻嗅之。即愈。本草綱目

又方

蝟刺。蛋針。白芷。青黛。等分為末。口含冷水。隨左右

啗鼻中。瑞竹堂方

羞明怕日

石夾明。即鯉魚殼。川鹽煮。研末水飛。甘草各一錢。

水煎冷服。明目集驗方

睛上生瘡

秦皮一兩。以清水于白碗內浸半日。視碧色取用。

仰以筋頭纏綿。仰臥點令滿眼。微疼勿畏。良久去熱汁。日點十次。不過兩日愈。外臺秘要

偷針眼

獨生莖蒲根同鹽研敷。薛城神方

又方

布鍼一個對井睨視。已而折為兩段投井中。勿令人見。張杲醫黃

眼生珠管

黃丹飛炒半兩。鯉魚膽汁和如膏。日點三五次。聖

普門醫品

眼目

卷三 二十七

患方

眼睛突出一二寸者

以新汲水漬睛。數易之。自入。梅師方

眼中漏膿

龍膽草。當歸等分為末。每服二錢。溫水下。鴻飛集

目生赤脉

玄精石一兩。甘草半兩。為末。每服一錢。竹葉煎湯

調下。總微錄

一切目疾

以木賊草。擦取瓜甲末。同飛過碌砂末等分研勻。以露水搜丸。芥子大。每以一粒點入口內。聖惠方

辟瘴法 能令合家不害眼

元旦五更。澆水七杓。入烟筒內。合家大小。永不害眼。經驗方

普門醫品

眼目

卷三 二十七

東武王化貞元起父編輯

門人陳斌憲卿父較閱

口舌門

口瘡 口氣 舌腫脹 舌出血 失音附

論胃熱則口臭脾熱則口甜心熱則口燥膽熱則口苦肺熱則口腥肝熱則口酸肺虛則口辛腎熱則口鹹胃虛則口淡

口瘡者乃脾氣凝滯風熱加之則發口瘡腫痛留

普門醫品

口舌

卷四 一

連甚則糜爛其皮如脫又甚則為疳瘡或痛或不痛浸淫潰蝕久而穿腮透頰紅者易治白者難愈黑色者所謂走馬疳也與牙疳門參看

酒色過度之人服涼藥久而不愈者乃中氣不足

虛火泛上無制用理中湯甚者加附子仍用附子

末津調貼足湧泉穴立愈口舌生瘡久不愈者由

下虛上壅不宜多用涼藥宜用白礬泡湯頻頻洗

足

脾胃受邪唇為之病風則動寒則緊燥則乾熱則

裂氣鬱則生瘡血少則色白唇緊口撮飲食難進名曰嗜唇不急治則死

心開竅於舌心脈絡舌本肝脈絡舌本脾脈絡舌旁舌上生瘡由三經鬱熱所致

心經熱則舌下生肉如小舌名重舌或腫滿不得息心熱則舌裂而瘡肝熱則舌本而硬脾熱則

舌滑而胎肺熱則舌強熱甚則燥如鋸舌卷囊縮者不治厥陰絕也

口瘡

三十七方○後附唇證

普門醫品

口舌

卷四 二

一切口瘡

雞內金燒灰傳之立効活幼新書

口瘡腫疼

細辛煮濃汁熱含令吐即瘥聖惠方

又方

蘿蔔自然汁頻漱去涎瀨湖集簡方

又方

以米醋浸黃檗音合之孟說方

又方

石膏煨三錢。硃砂二錢。片腦半字。爲末。摻之。津

又方

以朴硝含之。孫貴人方

口舌生瘡

密陀僧五倍子。等分爲末。水漱過貼之。儒門事

又方

溺桶泥。音印即溺器中白津也七分。枯礬三分。研

勻。傳之。有涎拭去。數次愈。集簡方

又方

黃礬。音細辛等分爲末。摻之。冠氏衍義

又方

黃礬。密炙。青黛。各五分。爲末。入龍腦一字。摻之。冠氏衍義

氏衍義

絳雪。治口舌生瘡及咽喉腫痛

辰砂二錢。寒水石。馬牙硝。各一錢。蓬砂七分。冰片

一字。研細。傳之。嚥汁。咽痛吹入。本草綱目

久患口瘡不愈

生附子爲末。少麴醋調。貼足心。男左女右。日再

又方

黃丹飛炒。白礬。等分研。搽之。張子和方

又方

天門冬。麥門冬。金去心。玄參。等分爲末。煉蜜。龍

子大。每噙一丸。外科精義

又方

吳茱萸末。醋調塗足心。一夕愈。集簡方

口舌糜爛

取薔薇根。辟風。打去土。煮濃汁。溫含。冷吐。秋夏用

枝葉亦佳。口瘡久不愈。二三年者。並効。千金方

又方

大黃。枯礬。等分。爲末。摻之。吐涎。聖惠方

又方

黃連。升麻。爲末。綿裹含嚥之。本事方

又方

細辛。黃連。等分。爲末。摻之。涎止去。甚効。三因方

趕筵散 治同上

黃連乾薑各一錢炒黑為末摻之 本草綱目

口舌糜爛心胃壅熱水穀不下所謂膀胱移熱於小腸上為口糜也

柴胡地骨皮各三錢水煎服之 蘭室秘藏

口中疳瘡

欬冬花黃連等分為細末用唾津調成餅子先以

蛇床子煎湯漱口乃研餅子敷之少頃津生其瘡

立消 楊誠經驗方

普門醫品

口舌

卷五

如神散 治一切口疳不拘紅白

雀甕

即蛇判龜磔形如雀卵者

每箇用珍珠二粒

裁揭指頂許棘針一個俱裝入內以鐵箸夾於炭

火上燒存性研細先用米泔漱口後敷藥二三次

愈神驗紅瘡用紅荷口瘡用白荷 丘月林方

口鼻疳蝕

五倍子燒存性研末敷之 普濟方

又方

銅青枯礬等分研敷之 本草綱目

又方

以藍澱敷之令遍日十度夜四度 千金翼方

口疳臭爛

黃檗 音 五錢銅綠二錢為末摻之嗽去涎 三因方

又方

蠶繭五箇包硼砂瓦上焙焦為末抹之 本草綱目

口中生蕈

用醋漱口以茄母燒灰 即老茄可作種者 飛鹽等

分米醋調稀時時搽之 摘玄方

普門醫品

口舌

卷六

唇燥生瘡

青皮燒研猪脂調塗 本草綱目

口唇燥裂

用橄欖仁同猪脂研爛敷之 開寶本草

又方

桃仁搗和猪脂敷之 海上方

唇緊燥裂

猪脂浸酒搽之 葉氏摘玄方

唇緊作痛

五倍子。訶子。等分爲末。搽之。端効方

唇腫黑疼。不可忍。

用古文錢。於石上磨猪油塗之。數次愈。活幼新書

又方

无松。生薑。入鹽少許。搗塗。潤玄方

補缺唇法

用小竹箸二枝。分夾左右。先川麻藥擦唇。次用

刀割去唇上舊皮。乘熱捏合。將竹夾縛緊。又用小

繡針二個。上下管定。以絲線縛住。用松香一兩。明

香膏品

口舌

聖書 七

藥四分。研細。裏外敷之。七日即好。食稀粥一月。不

得言笑。繡針須先用肉煮過。陳華溪傳

口氣 六方

口中臭氣

香薷一把。煎汁含之。千金方

清芬散 香口去臭

益智仁。甜瓜仁。各五錢。甘草一錢。研粉。舐之。經驗

良方

又方

藥名洗淨。煎湯。時時呷嗽。端効方

又方

水煮川芎含之。廣濟方

生香膏 治口熱氣臭

乾甜瓜仁。細研。煉蜜和成膏。空心含化。或傳齒上

尤妙。或爲丸。如芡子大。不時含化。亦妙。經驗方

又方

細辛一兩。煮取濃汁。熱漱。冷即吐之。治口臭及

齒腫痛。立効。聖惠方

香膏品

口舌

聖書 八

舌腫脹 十九方

舌忽腫起。逡巡塞滿。殺人甚急。或腫如猪胞。或硬如

木石。但看舌下有蟲形如螻蛄。或如臥蠶。仔細看有

小白頭

燒鐵釘烙其頭。即消。急用鍋底墨醋調厚敷其上

或以井水調。加鹽和成膏。傳之。脫去更傳。甚者

夾去血方好。血去更傳之。立愈。醫統

舌腫滿口不能出聲

蒲黃頻擦之。即愈。或加乾薑末。等分擦之。本事方

舌脹出口

以蓖麻仁四十粒。研油塗紙上作燃。燒煙薰之以愈為度。經驗良方

重舌小舌腫大塞口

半夏煎醋。含漱之。本草綱目

舌下生肉。大如指頭。或如棗核。皆為重舌。

鋪鐵鎖燒紅。打下鋪研末。水調一錢。噴嚥。生生齋

又方

皂礬二錢。鐵上燒紅。研摻。積德堂方

醫門醫品

口舌

卷四 九

又方

蒲黃末敷之。不過三上。千金方

又方

蜂房炙研。酒和敷之。日三四次。聖惠方

重舌塞痛

地龍蟲和薄荷研爛。帛包捻少汁於腫處。鮑氏方

又方

五靈脂一兩。淘淨為末。煎米醋漱之。經驗良方

水舌腫滿不治殺人

用蚯蚓一條。以鹽化水塗之。聖惠方

又方

烏蛇膽一枚。焙乾為末。傅舌上。有涎吐去。聖惠方

又方

赤芍藥。甘草各一錢。水煎熱服。聖濟總錄

木舌重強

蓬砂末。生薑片蘸擦。少時即消。普濟方

又方

白礬。桂心等分為末。安舌下。聖惠方

醫門醫品

口舌

卷四 十

又方

以米醋浸朴硝。時時含漱。普濟方

舌胎語塞

薄荷。生薑自然汁和白蜜擦之。醫學集成

又方

用青布蘸井水拭舌。以薑片頻擦之。即去。陶華方

傷寒舌出過寸者

片腦半分。為末。摻之。隨手而愈。夷堅志

舌出血

十八方

舌上出血如簪孔或如針孔者

香薷煎汁服之 肘後方

又方

豆豉一兩水一碗煎服日三服 葛氏方

又方

槐花研末敷之即止 朱氏集驗方

又方

巴豆一枚亂髮雞子大一塊燒研酒服之 聖惠方

舌硬出血不止

醫門醫品

口舌

卷四 上

小薊搗汁和酒服乾者為末冷水服 普濟方

又方

木賊煎水漱之即止 聖惠方

又方

用蓖麻子油紙作撚燒煙熏鼻中自止 摘玄方

舌腫出血如泉

烏賊骨蒲黃等分炒為末每少許塗之 簡便方

附失音

論言出於心舌為心之苗心病舌不能轉則語音

不出有中風失音勞瘵失音有咳嗽失音各求其
證若無故而失音者或由驚氣或係暗風今附
方於此

通治 五方

驚氣入心絡瘖不能言語者

密陀僧末茶調服二錢神効 夷堅志

又方

蘿蔔生搗汁入薑汁同服 普濟方

暗風失音

醫門醫品

口舌

卷四

生梨搗汁一盞飲之日再服 食療本草

又方

槐花子新瓦炒熟置懷袖中隨處取一二粒口

咀嚼之使喉中常有氣味久之聲自出 徐氏醫

又方

人乳竹瀝各二合溫服 摘玄方

牙齒門

疼痛 疳蝕 齦腫 齦音齒牙
根肉也
牙宜 取牙 固齒

論經曰齒者腎之標腎之餘也腎衰則齒豁

則齒堅。

齒屬腎。上牙床屬胃。下牙床屬大腸。齒痛皆二經火旺之故。蓋腸胃日受肥甘膏粱之味。致濕熱上攻。牙床不清。而為腫為痛。或出血。或生蟲。致齒不安而動搖。甚則臭黑脫落。宜瀉陽明之濕熱。則牙床清而齒自安矣。

聖惠方云。齒痛因於熱者。怕冷水。宜用牙硝大青荊芥等治之。冷者怕熱湯。宜用乾薑草撥等治之。不怕冷熱為風牙。以皂角僵蠶蜂房草烏治之。有

普門醫品

牙齒

齒痛

孔者為蛀牙。宜用雄黃石灰治之。用藥後須以溫水漱之一說。怕熱者屬熱。怕冷者屬冷。

金丹大全書云。今人脩養。漱齒每以蚤屎。是倒置也。一日飲食之毒。積於齒縫中。當於夜下洗刷。使垢穢無餘。齒自不壞。故曰晨漱不若夜漱。此善於養齒者。

牙床腐爛。一時脫落不救。謂之走馬牙疳。言其速也。此蓋熱毒積久。發於一時。如火鬱於竈。一發而焰炎燎起。莫之能禦。病此者十無一生。惟初發之

時急以疳藥搽之。內瀉其火。庶幾可救。

牙痛 七十七方

一切牙疼。不問寒熱風蟲。凡效。

良薑草烏川椒。分爲細末。酒糊爲丸。如梧子大。捏作餅。干乾收。每用一餅。綿裹咬。

患處有涎流去。即愈。徐氏醫統

又方

用皺面草。即大名精湯泡。蘸湯挹。疼處即定。或用

其子。即鶴虱一枚。擢置齒中。極効。或以鶴虱煎茶。

普門醫品

牙齒

齒痛

醋漱之。亦良。本草綱目

又方

軟石膏火煨研細。淡酒飛過一兩。防風荊芥。白花

細辛。各五分。爲末。日用擦牙。甚効。保壽堂方

又方

皂角一挺。去子入鹽滿殼。仍加白礬少許。黃泥

濟。燒研擦之。東垣方

又方

青荷葉。剪取中心蒂七個。以濃米醋一盞。煎半

去渣熬成膏時時抹之効 唐氏經驗方

又方

片腦硃砂各末少許搯之立止 集簡方

又方

秋茄花陰乾旋燒研塗疼處立止 海上名方

又方

山慈姑根煎湯漱吐 孫天仁集効方

又方

槐枝燒熱烙之 聖惠方

香附藥品

牙齒

卷四十五

又方

胡椒九粒綠豆十一粒布裏搥碎以綿包作一丸

患處咬定涎吐去立愈 韓氏醫通

又方

雞矢白燒末綿裹咬痛處立愈 經驗方

又方

瓜蒂七枚炒研麝香少許和勻綿裹咬定流涎

濟總錄

又方

三奈一錢細裏煨熟入麝香二字為末隨齒疼左右

嚼一字入鼻內口含溫水漱去神効 普濟方

又方

牛膝煎酒含漱或燒灰敷之 千金方

牙痛頰腫

桃白皮柳白皮槐白皮等分煎酒熱漱冷則吐之

即愈 聖惠方

牙痛日久腎虛也

破故帛二兩青鹽半兩炒研常擦之 御藥院方

香附藥品

牙齒

卷四十六

又方

骨碎補二兩銅刀細剉瓦鍋慢火炒乾為末如當

指齒良久吐之嚥下亦可不獨治牙疼即搖動將

落者擦之立住 本草綱目

加味清胃散 治陽明熱盛齒痛

牡丹皮升麻各一錢當歸酒浸生地黃黃連各錢

半石膏煨三錢細辛八分水二鍾煎一鍾食後稍

熱漱嚥 丹溪方

又方

白芷吳茱萸等分煎水漱之醫林集方

又方

零陵香一握煎水含漱之普濟方

又方

牛旁子炒煎水含漱吐之延年方

風熱牙疼常用甚效并治口氣

用好大黃瓶內燒存性爲末蚤晚揩牙溫水漱去

都下一人專貨此藥其門如市千金家藏方

又方

牙門藥品

牙齒

卷五 七

屋避即瓦上青苔

洗淨煎湯澄清入鹽一撮漱

即止肘後方

又方

百藥煎泡湯噙之聖濟總錄

風熱牙痛不可忍百藥不効用此即止

絲瓜一個燒存性研末頻擦涎盡即愈腮腫以水

調貼之嚴月軒家傳方

又方

蟾酥一片水浸透入麝香少許研勻以粟米大一

粒綿裹咬定吐涎即愈以胡椒代麝亦可聖惠方

風熱牙痛頭面齒眼俱腫

牛旁根一斤搗汁入鹽花一錢砂礪熬成膏每

塗齒齦下重者不過三次聖惠方

又方

細子濃煎湯乘熱噙漱吐去勿嚥本草綱目

胃火牙疼

含水一口以紙擦蘸大黃末隨左右啗鼻止

門爭說

牙門藥品

牙齒

卷五 八

腸胃積熱牙疼諸藥不効

石膏煨三錢大黃煨二錢黃連一錢半甘草一錢

水二鍾煎一鍾空心溫服下之即愈未利再服

濕熱牙疼

羊脛骨灰二錢白芷當歸猪牙皂角青鹽各一錢

爲末擦之東垣方

冷牙痛不可忍

芫花末擦之冷熱疼定以溫水漱之立効水類方

又方

附子尖天雄尖全蠍各七箇生研末點之

又方

獨頭蒜煨熱熨痛處轉易亦治蟲疼外臺秘要

又方

乾薑炮川椒等分爲末擦之御藥院方

又方

用老生薑瓦上焙研末入枯礬末同擦之有人日

夜呻吟用此而愈普濟方

又方

牙痛

牙齒

卷四十九

絲瓜簾一握川椒一撮燈心一把水煎濃汁漱之

其痛立止衛生堂方

又方

紅豆蔻爲末隨左右以少許嚙鼻中并擦牙吐涎

即愈衛生家寶方

又方

五倍子一錢黃丹花椒各五分爲末摻之有涎吐

去仍以五倍末冷水調塗頰外甚効本草綱目

又方

先以鹽湯漱之後用貝薑二寸全蠍一箇爲末

之水流出口愈百一選方

風牙痛

松葉一握鹽一合酒碗半煎漱聖惠方

又方

黑豆煮酒頻頻漱之周密浩然齋抄

又方

蛇床子煎湯乘熱漱之數次立止集簡方

又方

牙痛

牙齒

卷四十九

茄蒂燒灰存性加細辛末等分擦之仁存方

又方

全蠍三箇蜂房二錢炒研擦之直指方

風牙疼腫連頭面

用露蜂房燒存性研末酒調漱之十便良方

又方

草蜂房一枚鹽實孔內燒過研末擦之鹽湯漱之

或包一塊咬之袖珍方

又方

白直僵蠶炒蠶蛻紙燒等分爲末擦之良久以

湯漱口 直指方

蟲蛻疼痛

雄黃末和棗肉丸塞孔中 類要

又方

貓兒眼草一握研爛湯泡取汁含漱吐去涎 衛生易簡方

又方

骨碎補乳香等分爲末糊丸塞孔中 聖濟總錄

牙痛

牙痛

參西 王

又方

露蜂房煎湯漱口後用茄科燒灰敷之 海上名方

又方

蕪荑仁安蛀孔中及縫中甚効 危氏得効方

又方

枸杞根白皮醋煎漱之蟲即出愈 用後方

又方

用壁上白蟻窠四五個剝去上層黑者以鐵刀燒出汗將窠擦汗丸之納入牙中甚効 普濟方

又方

用壁錢包胡椒末塞耳左痛塞右右痛塞左 本草綱目

熏蟲牙法

用瓦片煨紅安韭子十餘粒清油數點待煙起以筒吸引至痛處良久以溫水漱吐有小蟲出爲効未効再薰以愈爲度 救急易方

牙有蟲孔

以松脂塞之須臾蟲從脂出 梅師方

牙痛

牙痛

參西 王

又方

皂莢末塗齒上有涎吐之或以皂莢子末糊丸如彈子大綿裹醋煮熱更互頻熨之 外臺秘要方

齲齒黑臭

丁香煮汁含之金治口舌生瘡 外臺秘要

齒齲有蟲積年不瘥從少至老者

用雀麥一把苦瓠葉三十枚洗淨取麥剪長二寸以瓠葉作五包包之廣一寸厚五分以二年醋漬之至日中以兩包火中炮令熱細口內熨齒外令

更易之取包置水中解視即有蟲長三分老者

風蟲牙疼

川椒炒取紅殼研末水和白麴丸皂子大焙熱咬之數度愈 聖濟總錄

又方

燒酒浸花椒頻頻漱之 本草綱目

又方

杏仁或桃仁針刺於燈上燒烟乘熱搭病牙上連

牙齒

聖濟

作七次絕不疼病牙即斷落 普濟方

又方

橡斗五箇皂莢一條各入鹽填滿泥固煨之冷定取研末日擦三五次用荆芥湯漱之良 經驗良方

又方

馬蜂窩白蔞藥花椒艾葉葱頭荆芥細辛白芷等分剉碎醋煎噙嗽良久吐出再噙 普濟方

又方

荔枝開孔入鹽燒存性研末擦牙即止 普濟方

又方

天仙子一撮入小口瓶內燒煙竹筒引烟入蟲孔內薰之即愈永不發 瑞竹堂方

又方

葇若子入瓶內以熱湯淋下含瓶口令氣薰之冷更作盡三合乃止有涎吐去甚効 普濟方

又方

葇若子納孔中蜜蠟封之甚効 備急方

又方

普濟

牙齒

聖濟

葇若末楷擦仍前蒼耳湯漱去涎或以葇若末和椒末等分蠟丸麻子大塞牙孔中 聖濟總錄

又方

乳香一錢焙巴豆三粒去殼俱爲末黃蠟溶化丸麻子大用一九塞孔中 經驗方

又方

乳香川椒末等分化蠟和九塞孔中 集驗方

風蟲牙疼不可忍者

乳香一塊嚼嚙汁立瘥 楊師方

又方

蒼耳子五升。水一斗。煮取五升。熱含漱。冷即吐之。再含。不過一劑愈。葦葉亦可 千金翼方

風蟲牙痛上連頭腦

補骨脂炒半兩。乳香二錢半。為末。擦之。或為丸塞

孔內。傳信適用方

又方

三奈為末。鋪紙上。捲作筒。燒燈吹滅。乘熱和藥吹入鼻內。即止。存仁方

牙齦腫痛

牙齦

卷五 三

海蝕二十九方

如神散 治一切牙床生疳。不問紅白

方見本卷口舌門

又方

用褐子不拘紅黑。燒存性。白礬各一錢。尿桶白堊

一錢半。燒過。同研搽神効。並治鼻疳。簡便方

牙床疳腫臭爛

桔梗茴香等分。燒研敷之。衛生易簡方

又方

孩兒茶。研砂等分為末。搽之。本草綱目

又方

百藥煎。五倍子。青鹽煨。各一錢半。銅錄一錢。為末。日搽二三次。普濟方

又方

大蜘蛛一個。以濕紙重裹。荷葉包之。灰火煨焦。為末。入麝少許。研敷。永濟方

牙疳膿血淋漓

輕粉一錢。黃連一兩。研末。搽之。愈。普濟方

牙齦腫痛

牙齦

卷五 三

牙疳腐爛。氣臭血出。不拘老幼

鉛白霜。銅綠。各二錢。白礬豆許。為末。擦之。宜明方

又方

用橄欖殼研。入麝香少許。敷之。聖惠方

又方

鍋蓋上黑垢。雞腔脂。黃皮。蘇蘭。各燒存性。枯礬等分為末。米泔漱淨後。頻敷之。本草綱目

又方

蜘蛛蛻殼為末。入乾麝脂。麝香少許。傳之。血指方

疳蝕頰穿牙落

抱退雞子軟白皮包活土狗一個入大蝦蟆口內

草縛泥固煨過取研末貼之以愈為度 普濟方

走馬牙疳

尿澄入磁瓶內鹽泥固濟煨紅研末入麝香少許

貼之神效 普濟方

又方

用婦人尿桶中白垢火煨一錢銀線三分麝香一

分和勻貼之大有神效 本草綱目

普門醫品

牙齒

卷四 五

又方

黃礬皂礬各半錢白礬一錢麝一分為末摻之涎

吐去 聖惠方

又方

雞內金不落者五枚焙枯礬五錢研搽 經驗方

又方

有尾糞蛆燒灰一錢褐灰五分和勻頻傳神効無

比 本草方

又方

蠶蛻紙燒灰入麝香少許貼之 集驗方

又方

楊花燒存性入麝香少許搽之 保幼大全

又方

梧桐臉黃丹等分為末摻之 醫林集要

又方

新棗一枚去核入砒一分同黃礬 音 燒焦為末油

和敷之 王氏博濟方

走馬牙疳出血作臭

普門醫品

牙齒

卷四 五

蜘蛛一枚銅線半錢麝香少許杵勻搽之蛛殼亦

可 直指方

走馬牙疳穿腮透骨

生南星一箇中心剗空入雄黃一塊麪裹燒候麪

焦烟出以盞子合定出火毒去麪為末入麝香少

許擦瘡甚効 經驗方

又方

兒茶雄黃貝母等分為末米泔漱擦之 本草綱目

又方

銅青滑石杏仁等分共研搗之

邵真人經驗方

又方

雄黃如豆大七粒每粒以棗去核包之鐵線串於燈上燒化為末每少許搽之吐去涎

全幼心鑑

又方

紅棗一枚去核入膽礬紙包煨赤出火毒研末敷之吐去涎

楊起簡便方

又方

皂礬入鍋內炭火煨紅以醋拌勻如此三次為末

普門醫部

牙齒

卷五 三

入麝少許米泔漱淨搽之

談野翁試驗方

齒腫

七方

齒齦腫痛

馬齒莧一把嚼汁漬之即日腫消

本草方

又方

垂楊枝槐白皮桑白皮白楊皮等分煎水熱含冷

吐

聖惠方

又方

桔梗薏仁等分為末茶服仍用荊芥煎漱

永類方

又方

山豆根一片含於疼所

政急方

又方

枯白礬等分每用二錢水煎含漱去涎

簡要濟眾方

又方

用獨活煮酒熱漱之

肘後方

齒齦隆起腫悶

用白鹽研末點之即愈

經驗方

普門醫部

牙齒

卷五 三

牙宣

十四方

齒縫出血

頭髮入銚內炒存性研搽之

華陀中藏經

又方

苦參一兩枯礬一錢為末日三搽之

日濟方

又方

麥門冬煎湯漱之

蘭室寶鑑方

又方

五倍子燒存性研末敷之即止

楊簡方

齒疼出血

每夜用鹽末厚敷齦上。汁瀝盡乃臥。汁出時叩齒

勿住。不過十夜。疼血皆止。忌食肉煎炒。肘後方

又方

用蟾酥為末。紙紵少許。按於患處。止止。冠宗藥方

又方

胡粉半兩。麝香半錢。為末。臥時揩牙。效。聖濟方

又方

用百草霜為末。搽之即止。集簡方

齒齦宣露

牙齒

參書 三

每日噙鹽。以熱水漱百遍。五日後齒即牢。千金方

又方

絲瓜藤陰乾。臨時火煨存性。切擦即愈。海上妙方

牙根宣露膿血腥臭

胡桐淚一兩。枸杞根一升。分四分。每分用水一碗。

煎半碗熱漱。聖惠方

又方

胡桐淚。葶藶等分。研搽之。聖惠方

牙宣發。口氣難近

丁香。射干。各一兩。麝香一分。研擦之。聖濟方

又方

用蠶蛻紙燒灰。研敷之。金治牙癰及口瘡。集驗方

取牙七方

牙痛欲取

茄科。以馬尿浸三日。曬乾炒為末。每用點牙即落。

極妙。鮑氏方

又方

齒齦宣露

牙齒

參書 三

用白馬尿浸巴豆。點之即落。勿近好牙。鮑氏方

又方

玉簪花根。乾者一錢。研砂七分。研砂二分。葶藶仙。

砒各三分。草烏頭一分。半為末。以少許點疼處。即

自落。余居士選奇方

又方

鳳仙花子研末。入砒少許。點疼牙根取之。梅玄方

又方

以藤黃點之。便落。李詢方

又方

馬肉一斤。硃砂二兩。拌和。候生蛆食盡。將蛆曬乾。為末。每兩入公霜五分。研勻。先以針撥動牙根四畔。次以燈心蘸末少許。點之。良久自落。普濟方

又方

鯽魚一個。入硃砂於內。煨過。置陰處。待有霜刮取。瓶收之。以針搜開牙根。點少許於上。咳嗽自落。本草綱目

固齒 十一方

牙門醫品

牙齒

卷五 三

除風熱化蟲固齒

槐枝煎濃湯一罈。入鹽一斤。煮乾炒研。日用揩牙。以水洗目。唐孫思邈方

牢牙去風並治牙疼牙宣

香附子炒存性三兩。青鹽生薑炒存性各半兩。為末。日擦之。並能烏髮。濟生方

齒風動搖

蒼耳一握。入鹽少許。水煮含漱。外臺秘方

牙齒動搖及被物傷動欲落者

五倍子。乾地龍炒。等分為末。先以薑揩過。然後點之。御藥院方

又方

土蒺藜去刺。生研五錢。入鹽擦牙。以溫水漱之。甚効。以根燒灰貼牙上。即牢固。或以白蒺藜為末。旦擦之。御藥院方

齒疎不堅

石燕一對。火煨醋淬七次為末。青鹽麝香各少許。研勻。日用擦牙。嚙吐任意。能牢牙止痛。元遺山方

牙門醫品

牙齒

卷五 三

擦牙固齒

羊脰骨。燒灰存性。香附子燒黑。各一兩。青鹽煨過。生地黃燒黑。各五錢。研末。日日用之。蘇頌方

牙齒蠹黑焦落乃腎虛也

胡桐淚一兩。丹砂半兩。麝香一分。為末。搽之。聖濟總錄

齒壞碎欲盡

常以綿裹白礬含嚼。吐去汁。明後方

齒疼脫落

應春藥譜人乳和膏擦之。日三四次。止疼復生齒。百日後復故。乃止。每以新汲水漱淨。外臺秘要

牙齒不生不拘大人小兒

用黑豆三十粒。於牛糞火內燒令烟盡。研入麝香少許。先以針挑齦血出。以少許擦之。不得見風。忌酸鹹。方

醫門醫品卷之二十終

牙

卷五 三

醫門醫品卷之二十五

東武王化貞元起父

門人陳斌憲卿父

咽喉門

腫閉 乳蛾 殺賊 懸癰

論咽喉之與會厭內經謂之吸門。喉以候氣。咽以嚥食。會厭管乎其上。以司開闔。為人身之橐籥。緊關之門戶。

張于和曰。咽喉諸證。一言可了者。相火是也。學者

醫門醫品

咽喉

卷五

一

各詳其狀。有十八證。其實一也。十八證外。又有喉痺。謂咽喉腫閉也。暴發暴收者。名曰走馬喉風。又曰鎖喉風。雖其名狀不同。要皆熱甚。生風火急變。故暴發而暴收也。又有尸咽證。此為陰陽不和。脾肺壅盛。風熱毒氣不能宣通。故尸蟲發動。上銜於喉。或癢或痛如蠶之候也。所謂乳蛾者。生於會厭兩旁。腫起如蛾。雙者輕。單者重。有殺賊證。與食積滯於咽間。不能傳化。與血氣搏。遂令腫痛如生殺刺也。有懸癰證。腫毒生上腭。甚者

塞咽不能下食若不速治皆能殺人

子和云喉痺病大槩痰火所致輕則腫痛重則閉塞急者宜吐痰後復下之上下分消而愈甚者以鹹刺去惡血然後用藥吐下此爲治之上策若畏縮逡巡時息喪命蓋治喉痺之火與救火同不容少待吐法以桐油或燈油脚以鷺翎探吐之

腫閉 六方

咽喉腫疼

蓬砂白梅等分搗丸艾實大每嚥化一九凡喉痺

專門醫品

咽喉

卷五 二

初覺卽以蓬砂嚥化輕者可愈重者亦殺其大發可以別藥取效 經驗方

又方

鉛白雷甘草各半兩青黛一兩爲末醋爲丸艾實大每嚥化一九立効 聖濟錄

又方

朴硝一兩硃沙一錢研末合嚥如氣塞不通卽生甘草末二錢吹之 外臺方

又方

嫩艾葉搗細嚥之以其渣入醋敷喉上冬月乾

艾亦可 醫方大成

又方

射干黃芩生甘草桔梗各五分爲末水調頓服立愈 便民方

又方

馬蘭根葉二兩水一升半煮一盞細飲之花亦妙 本草綱目

又方

專門醫品

咽喉

卷五 三

用鴨跖草 卽碧蟬花 搗汁合之嚥吐任意 袖珍方

又方

猪牙皂角去皮弦白礬黃連等分置新瓦上焙乾爲末吹之少頃當吐出膿血而愈 醫統

又方

牙皂一挺去皮絃米醋浸炙七次勿令太焦爲末吹入咽吐痰即止 聖濟總錄

又方

荆瀝細細嚥之 千金翼方

又方

露蜂房燒存性白僵蠶等分爲末每用半錢乳香

湯服 本草綱目

又方

蜂房燒灰一錢吹入喉內不拘老幼 食醫心鏡

又方

白僵蠶炒白礬半生半燒等分爲末每一錢用自

然薑汁調灌得吐頑痰立效小兒用薄荷生薑少

許取汁同調 仁存方

普門醫品

咽喉

卷五 四

又方

生香油一合灌之立愈 本草方

又方

石蟹磨水飲并塗喉外即愈 聖濟方

又方

大蒜塞耳鼻中日再易之 肘後方

又方

芥子末水和傅喉下乾即易之 聖惠方

又方

蘿蔔汁和皂莢汁服取吐 普濟方

喉腫

牛旁子根二兩水一碗煎半碗細細服 本草綱目

又方

扁竹根搗汁嚥之或嚼引涎出亦妙 醫方大成

喉腫不下食

生薑一把搗爛炒熱敷喉外冷即易 千金方

又方

升麻五錢煎服取吐 直指方

又方

苦苣菜搗汁半盞燈心湯泡絞汁半盞和勻徐徐

服之 普濟方

又方

老黃瓜一枚去子入硝填滿陰乾爲末以水許

吹之 醫林集要

又方

絲瓜搗汁灌之 普濟方

咽喉作痛

吳茱萸爲末醋調塗足心卽愈生附子末更妙

簡方

又方

山豆根含之嚔汁極妙或磨醋噙之

本草綱目

喉瘡作痛

用燈籠草卽酸漿炒焦研末白湯調服仍以醋調

敷喉外

丹溪要

又方

射干山豆根等分爲末吹之神効

袖珍方

普門醫品

咽喉

卷五 六

喉中腫塞

用蝸牛綿裹水浸含燕須臾立通

本草綱目

又方

用生半夏末搐鼻內涎出效

集簡方

神驗方 治喉中腫塞喘息不通

用絲石葉一兩水二盞煎一盞細細呷之須臾卽通

外臺秘要

又方

慈贖陰乾爲末每用二錢入膽礬末一錢和勻每

用一字吹之

世方

又方

天南星一個剝去心入白僵蠶七枚紙包煨熟研末薑汁調服一錢甚者灌之吐涎愈

博濟方

又方

生白礬爲末少許點腫處吐涎以痒爲度

聖惠方

又方

燈心草紅花各燒灰等分酒服一錢卽消

惠濟方

咽喉卒塞

普門醫品

咽喉

卷五 七

以皂角吹鼻取嚏仍以李樹根皮磨水塗喉外

藏

園雜記

冬月喉痺腫痛不可下藥者

蛇床子於瓶中燒以口對瓶吸其烟自愈

聖惠方

聖烟筒 治喉痺牙關緊急不通

用蓖麻仁研爛紙捲作筒燒烟薰吸卽通或只用

其油作燃薰用更妙

本草綱目

喉痺口噤不開欲吹

草烏頭皂莢等分爲末入麝少許擦牙并搐鼻內

子開自開 本草綱目

又方

羌活一兩，牛旁子五錢，水三鍾煎一鍾，入白礬少

許，灌之取効。聖濟錄

喉痺欲絕不可針藥者

乾漆燒烟，以筒吸之。聖濟總錄

喉痺垂死止有餘氣者

巴豆一枚，去皮，線穿，納入喉中，牽出即甦。千金方

急喉痺塞，遂巡不救

普門醫品

咽喉

卷五 八

皂莢生研末，每以少許點患處，外以醋調厚封項下。須臾便破出血，即愈。或按水灌之亦良。直指方

又方

白僵蠶、天南星等分，生研為末，每用一字，薑汁調

灌，涎出即愈。後以生薑炙過含之。王氏博濟方

急喉痺，內外俱腫，名纏喉風，不拘大人小兒俱效。

用蓮心去心，為末，水調，傅項上，一連立効。平治金

纏喉風，其證先兩口胸中氣緊喘促，為然咽喉腫閉。

手足厥冷，頃刻不救

巴豆七粒，三去殼生研，四去殼炒存性，雄黃明亮

者，皂子大一塊，蟬肚鬱金一箇，各研為末，每用半

字，茶調呷之。如口噤，用小竹管納藥吹喉中。須臾

吐利即瘥。華陀方

又方

鴨嘴膽二錢，白僵蠶炒三錢，研細，每以少許

吹之，有涎吐去，愈。濟生方

又方

普門醫品

咽喉

卷五 九

焰硝一兩，白僵蠶一錢，硼砂半兩，片腦一字，為末吹之。三因方

又方

雄黃一錢，磨新汲水一盞，取吐愈。續千金方

又方

番木鱉仁一個，木香三分，同磨水，調熊膽三分，臍

礬五分，以雞毛掃患處効。唐璠經驗方

纏喉風，腫藥不能下

先以涼藥灌鼻中，通利十餘行，用陽起石燒赤，伏

龍肝等分。細研。以新汲水調搗喉外。日用百遍。三

日即愈。儒門事親

喉風急症。牙關緊閉。水穀不下。

用山豆根。白藥子。等分水煎。嚥之。嚥下二三口。即愈。楊清史外科方

又方

馬屁勃。即灰菰。焰硝。等分爲末。每吹一字。吐涎血。

即愈。紹驗良方

走馬喉痺

醫門醫品

咽喉

卷五 十

白礬半斤。研末水化。用新磚一個浸透。曬乾。又浸。又曬。水盡爲度。入糞廁中浸一月。取洗。安陰處。待霜出。掃收。入麝香少許。每用半錢吹喉中。普濟方

又方

以燈盞油呷之。古有詩云。急喉腫痺最堪憂。急取盛燈盞內油。甚者不過三五呷。此方原是至人留。本草綱目

喉痺卒不得語

煮豉汁一升。溫服。覆取汗。仍着桂末於舌下。嚥之。

即効。千金方

喉痺失音

杏仁去皮炒黃三分。和桂末一分。研泥。綿裹含之。

嚥汁。文潞公藥准

又方

蟬蛻研末一錢。井花水服。藏器本草

又方

黑豆煮汁。煎稠如飴。含之。飲其汁良。千金方

乳蛾。十五方

醫門醫品

咽喉

卷五 十一

七寶丹。治雙單乳蛾及喉風腫閉。

真僵蠶。真全蝎去毒。各十箇。牙皂角炙去子弦。蓬砂。雄黃。明礬。各一錢。膽礬五分。爲細末。每吹一字。入喉立愈。丹溪方

水梅丸。治喉中乳蛾

青梅二十枚。鹽十二兩。淹五日。取梅汁。入明礬三兩。桔梗。白芷。防風。各二兩。猪牙皂角三十條。俱爲細末。拌汁和梅。人瓶收之。每用一枚。嚥之。嚥下。中風痰厥。牙關不開。用此擦之。尤佳。本草綱目

通開散 治全上

白礬三錢銚內溶化入劈開巴豆三粒煎乾去豆
研礬用一字吹喉立愈甚者醋調灌之 本草綱目

又方

皂礬入米醋同研含之嚥汁立瘥 劉禹錫傳信方

又方

牛膝一握艾葉七片搗和人人乳取汁灌入鼻內
須臾痰涎從口鼻出即愈若無新鮮者以水洗搗
之或只以牛膝搗汁醋和灌之亦妙 本草綱目

普門醫品

咽喉

卷五 十一

又方

雞內金勿見水陰乾燒末竹管吹之即愈 青囊方

又方

白丁香二十箇以沙糖和作三九每以一九綿裹
含嚥即愈甚者不過二九極有奇效 普濟方

又方

臘月初一日取猪膽不拘大小五六枚用黃連青
蒿僵蠶白礬朴硝薄荷各五錢爲末裝入膽內青
紙包住將地掘一坎方深各一尺以竹橫懸此膽

於內以物蓋定候立春日出風乾去膽皮研末
磁瓶密收每吹少許入喉神驗 御製人經驗方

又方

用青魚膽汁灌鼻中取吐愈含嚥亦佳一方用膽
藥裝青魚膽中陰乾每用少許吹喉取吐 萬氏方

又方

白礬研末入猪膽中風乾研細每吹一錢入喉取
涎出即愈 本草綱目

又方

普門醫品

咽喉

卷五 十一

蛇皮搽碎燒烟以竹筒吸入即破 本草綱目

又方

土蜂窠一箇爲末先以楮葉擦破病人舌令血出
以醋和末用翎點之痰涎出爲效後用竹根搗水
服半盞取利 瑞竹堂方

又方

用牆上壁錢七個內要活蛛二枚燃作一處以白
礬七分一塊化開以壁錢蘸惹礬淨燒存性出火
毒爲末竹管吹入立時就好忌食熱物 本草綱目

又方

蟾酥、草烏尖、猪牙皂角各等分爲末。九小豆大。研一九點患處神效。活人心統

又方

蠶蛻紙燒存性。煉蜜九。艾實大。含化嚥津。集驗方

〔殺賊〕二方

咽喉殺賊腫疼。治尸咽

蓬砂、牙硝等分爲末。蜜和半錢含嚥。直指方

誤吞穀。亡檜刺癢痛

普門醫品

咽喉

卷五 十四

脂麻炒研。每用三四錢。白湯調細細嚥下。三因方

〔懸癰〕五方

喉內懸癰腫塞

五倍子、白僵蠶、甘草等分爲末。白梅肉搗和。九彈

子大。擒嚥。其癰自破。朱氏經驗方

懸癰舌腫咽生息肉

羊蹄根煮汁。熱含令吐之。聖惠方

又方

先刺破出血。後用鹽豉搗細塗之。神效。聖濟總錄

又方

綿裹筋頭。蘸鹽點之。日五六次。愈。孫真人方

啓開散 治全上

牛旁子炒。生甘草等分。水煎含嚥。一方加馬蘭子。普濟方

諸哽門

通治 骨哽 魚刺哽 金鐵哽 竹木雜物哽

〔論〕陳無擇云。治哽之法。皆以類從。如鷓鴣獺治魚骨哽。慈石治鍼鐵哽。髮灰治髮哽。豺虎治諸骨哽。

普門醫品

諸哽

卷五 十五

亦各從其類也

凡物哽者。蓋以食入喉。而物不順。致物刺住。而不能下。推之以理。反而上出。則爲順矣。法當涌吐。乘其飲食之出。而上送。則順而易爲也。若刺之深者。必欲推下。勢所不能。延遲日久。咽喉潮腫。其刺愈深。卽欲涌吐。而又無食可送。以此因循。多致不救。

〔通治〕三方

咒法 治一切物哽喉甚驗

左手捏三山訣。擎淨水一盂。右手拈劍訣。地上寫

一轟字左足躡之。又寫一轟字右足躡之用劍訣於水上寫魑魍魎魑魑魑魑魑魑魑○魚刺類加一魑字。○禽類加一魑字。○獸類加一魑字。末寫雪山童子到寫畢飲之愈。足不離地。孟不更手又法

照前指訣擊水於水上書魑魑魑魑魑魑魑魑魑字亦同前將水飲之即愈。但以快為妙

九龍入洞法 治同上

左手指三山訣。捧淨水一盞向東。右手指劍訣。寫

雲龍鬼

諸便

卷五 七

三字於水內。念咒云。此蓋化為東洋大海。咽喉化作萬丈深潭。九龍入洞之法。吾奉太上老君急急如律令勅。吞法水一口。哽即化。俱經驗方

骨哽 二十一 方

諸骨哽喉

五月五日午時。取蛙中蚯蚓泥。面東勿語收貯。每用少許擦喉外。其骨自消

又方

尋多年懸掛麻繩。上有灰塵堆積者。連繩解來。用

新瓦盛之。炭火煨成灰。研末。沙糖丸如芡實大。含在口中化下。不十丸其骨不出即消。雖哽死之人。但有微氣。用箸啓齒。將丸入在口中化一丸。又入一丸。至八九丸定活。本草綱目

又方

乳香一錢。水研服之。衛生易簡方

又方

桑木上蟲。蒸米醋煎呷。承預鈴方

又方

骨門醫品

諸便

卷五 七

羊脛骨灰。米飲服一錢。聖惠方

骨哽在咽百計不下

用南蓬砂一塊。含化嚥汁。其哽即下。夾堅志

又方

瞿麥為末。水服二錢。日二服。外臺秘要

又方

半夏。白芷等分為末。水服一錢。當吐出。外臺秘要

又方

鳳仙花根。搗爛。含嚥自下。治雞骨哽尤妙。急以溫

水漱口。免。金治誤吞銅鐵。外臺秘要

又方

野薔薇根為末。水服二錢。日三服。外臺秘要

又方

白欬。白芷。等分為末。水服二錢。聖惠方

又方

薤白。驢葵。以絲線繫緊。嚼成團。吞到哽處。引之。即出。食醫心鏡

又方

醫門醫品

諸哽

卷五 十九

栗子肉上薄皮半兩。炒研末。乳香。鮎魚肝。各一錢。

同搗丸。梧子大。以綿裹線拴吞下。即鈎出。聖濟方

咽中骨哽欲死者

白鳳仙子。研水三五匙。以竹筒灌入喉中。其物即

軟。不可經牙。或為末吹喉。亦良。普濟方

又方

紅桑椹。細嚼先嚥汁。後嚥滓。新水送下。聖惠方

又方

烏賊魚骨。陳橘紅。焙。等分為末。寒食麴和錫為丸。

茨子大。每用一九。含化嚥下。聖濟總錄

又方

以雞足一雙。燒灰水服。外臺方

雞骨哽咽

五倍子為末。以少許吹入喉中。即化下。海上名方

又方

貫衆。縮砂。甘草。等分為末。罌末。綿包少許。含之。嚥汁。

久則隨痰自出。一方無貫衆。普濟方

獸骨哽咽

醫門醫品

諸哽

卷五 十九

虎骨為末。服二錢。或用象牙磨水吞之。外臺方

又方

狼屎。燒灰。水服之。千金方

魚刺哽。十三方

諸魚骨哽

用鯉脊三十六鱗。焙研。涼水服。其刺自跳出。神効。

筆峰雜興

又方

以好蜜少少服之。自下。荷氏方

又方

倒用食箸書一獺字於酒中或水中不語飲之即

下經驗方

又方

獨瓣蒜塞鼻中自出十便良方

又方

用飴糖丸如雞子黃大吞之不下再吞肘後方

又方

硝砂少許嚼嚥立下外臺秘要

又方

齧哽

參五 子

又方

白炭灰一小鍾用水和勻去渣服之即下

又方

玉簪花根搗汁以竹筒灌入咽中其哽自消不可

着牙齒乾坤生意

又方

蓖麻子仁研爛入百藥煎丸彈子大井花水化下

本草綱目

又方

椿樹子燒研酒服二錢生編

又方

百合五兩研末蜜水調圖頸項包住乾乾易之三

四次即下聖濟錄

諸魚骨哽橫在胸中不上不下痛極幾死

燉橄欖食之即消或將橄欖核研末急流水調服神

效名醫錄

又方

吳茱萸煎水一盞溫服其骨必軟出未出再服有

管門醫品

清便

參五 王

骨在肉中不出者搗吳茱萸封之即出食療本草

金鐵哽九方

誤吞金銀銅錢等物

濃煎縮砂湯飲之即下危氏得效方

又方

葵菜搗汁冷飲甚妙葵花煮汁飲之更妙普濟方

又方

官粉一兩猪油調分二服即消洋而出外臺秘要

誤吞銅鐵竹木等物

飴糖一斤漸漸食盡便出 外臺方

誤吞銅鐵骨刺不下危急者

王不留行黃藥等分爲末湯浸蒸餅爲丸彈子大青黛爲衣線穿陰乾冷水化服一丸 百一選方

誤吞銅錢

多食胡桃自化出胡桃與銅錢共食卽成粉可證 李樸方

又方

木賊爲末雞子白調服一錢 聖惠方

普門醫品

諸哽

卷五 二十二

又方

葶藶研汁細細含嚥自然消化成水此物善毀銅合銅錢嚼之則錢化足知其效 百一方

吞針入腹百藥不能治

煮豉豆同韭菜日食針卽從大便出 積善堂方

竹木錐物哽 九方

誤吞竹木哽喉

秤錘燒紅淬酒飲之 集玄方

又方

故錐燒令赤淬酒熱飲極驗 藏器本草

又方

蓖麻子仁一兩凝水石二兩研勻每以一捻置舌根嚥自然不見 本草綱目

又方

蓖麻仁紅麴等分研細沙糖丸皂子大綿裹含嚥痰出効 本草綱目

竹木刺及骨鯁入咽喉不拘大人小兒日久或入臟腑危甚者服之皆出

普門醫品

諸哽

卷五 二十三

臘月收鱖魚膽懸北簷下陰乾每用一皂子大煎酒溫呷得吐則哽隨涎出未吐再服以吐爲度酒隨量飲無不出者鯽膽亦可 勝金方

稻芒粘喉不得出者

紫花地丁嚼嚥之 乾坤秘鑑

桃李哽咽

狗骨煮湯摩頭上 子母秘錄

髮哽咽中

舊木梳燒酒服 集玄方

食哽

鷹屎燒灰水服二錢 外臺方

普門醫品卷之二十五終

普門醫品

諸哽

卷五 手內

普門醫品卷之二十六

東武王化貞元起父編輯

門人陳斌憲卿父較閱

癰疽門

通治 潰前 潰後
翻花 骨疽 癰毒 附

論陳無擇云癰則皮薄腫高疽則皮厚腫堅初發並宜灼艾

李氏云治疽之法灼艾之功勝于用藥初發二三日須用隔蒜灸法瘡潰則貼神異膏如此則瘡不開大肉不敗壞瘡口易斂一舉三得此方之妙人所罕知若頭上見疽宜用騎竹馬灸法及足三里穴灸之背疽漫腫無頭者用濕紙貼腫處但一點先乾處即是瘡頭可用大蒜十顆淡豉半合乳香末錢許研勻鋪瘡上攤艾灸之如上法

薛立齋曰灸法有回生之功凡背疽或附骨疽及腿臂諸毒初起未明者尋頭用灸灸自內消若毒氣熾盛更服活命飲其功尤捷若氣血虛弱必以補托為主若背疽大潰欲驗穿透內膜者不可用

普門醫品

癰疽

卷五

皂角取咬惟以紙封患處令病者用意呼吸如紙不動者未穿透也倘用取嚏鼓動內膜反致穿透慎之慎之

又云灼艾之法必使痛者不痛不痛者痛則其毒隨火而散否則非徒無益而又害之

凡癰疽大按乃痛者膿深小按便痛者膿淺以手按之熱者有膿不熱者無膿按之熱硬無膿按之半軟半硬已有膿大軟方是膿成所按之處不復者無膿按之即復者有膿也發腫而軟者血瘤也

醫門新編

癰疽

卷五十二

非癰也發腫日漸長大而不大熱時時牽痛者氣瘡也

瘡瘍之證五善之中見一二善證者可治七惡之內見一二惡證者難治若虛中見惡證者不救實中無惡證者自愈此證雖云傷火未有不山虛而致者故經云督經虛從臍出膀胱虛從背出豈可專泥于火而用苦寒藥乎

五善動息自寧飲食知味一也大小便調二也膿潰腫消水鮮不臭三也神彩精明語聲清亮四也

體氣平和五也

七惡煩燥時嗽腹痛渴甚或泄利無度或小便如淋一也膿血既潰膿狀尤甚膿色敗臭痛不可近二也目視不正黑睛緊小白睛青赤瞳子上看三也喘促短氣恍惚嗜卧四也肩背不便四肢沉重五也不能服藥食不能下不知味六也聲嘶色敗唇鼻青赤面目四肢浮腫七也

癰疽死地分一伏兔二腓脤三背四五臑俞五項六腦七髀八髂九臑

醫門新編

癰疽

卷五十三

凡瘡不起者托而起之八珍湯不成膿者補而成之十全大補湯膿成不潰四君子湯加耆歸肉桂仍及時針之若畏痛而不肯針必至自誤蓋患處肉已壞矣何痛之有何傷之慮壯實者自潰而出若怯弱之人待其自通必至大潰不能收斂氣血瀝盡而死矣

凡元氣虛弱者宜先補而後針其膿一出諸證自退若遲疑不決使膿瘀無從而泄毒氣無從而歸反攻于內欲望其生豈可得乎古人制法淺宜研

而深宜刺。毒結四肢。硬刺少緩。今腐潰深大。亦難收斂。若項、頰、胸、腹緊要之處。不問壯弱。急宜硬刺。必不容緩。

疽有椒眼十數。或如蜂窩。連蓬者。名連蓬發。膿不得出。宜用針橫直裂之。或當椒眼上。個個灸之。大抵此等惡證。惟用蒜灸。及金烏金膏為妙。

癰疽潰後。腐肉凝滯。急須取去。乃推陳致新之意。若壯者氣血充溢。正能勝邪。或自去自平。不能為害。若年高怯弱之人。血液少。肌肉澁。必用利刃快

醫門醫品

癰疽

卷五 四

剪。及時去之。若留而不去。則有爛筋腐肉之患。悔將何及。

潰後不斂。係氣血俱虛。宜大補。用十全大補湯。氣虛倍參耆。血虛倍芍歸。飲食不思者。六君子湯加乾薑。疼痛不可忍者。宜服內補黃耆湯。外付乳香定痛散。

瘡瘍用藥。有因人而異者。有因時而異者。亦有合時從證者。皆須通變。不可執一。惟隔蒜灸法。人人可用。神燈法。始終可用。能助湯劑。合表裏以成功。

通治

神燈 能治一切癰疽。惡瘡毒癰。不拘未成已成。未潰已潰。神效。

雄黃沒藥硃砂。血竭各二錢。麝香三分。為細末。用綿紙作燃。每燃藥五分。蘸香油于燈上點着。離患處寸許。自外而內。週圍徐徐照之。毒大者可用燃五根。日照五次。毒小者用燃二根。日照二次。重者不過五六日。已成者即消。已潰者即斂。陰瘡不起發者。一照即起紅暈。毒隨火出。保無後患。此乃屢

醫門醫品

癰疽

卷五 五

經試驗者。毋忽之。薛化南傳

蠟磬丸 治全上

明亮白磬二兩。生研。以好黃蠟七錢。溶化和丸。梧子大。每服三五丸。熱水送下。日三服。若一日服近百丸。其効甚速。未破即消。已破即斂。能解毒。止痛。生肌。托裏排膿。其功甚大。服至十兩以上。無有不効。活人不可勝數。有人遍身生瘡。狀如蛇頭。服此亦効。真奇力也。不可以賤而忽之。李迅

血方

遠志煎 治全上

遠志不拘多少。米泔浸透。槌去心爲末。每服三錢。溫酒一盞調澄少頃。飲其酒。以滓敷患處。陰瘡

疼者即疼。疼者即消。不潰者即潰。不飲者即

有神効 三四方

托裏消毒散 治全上

人參黃耆。鹽水拌炒。當歸酒拌。川芎白芍藥炒。白朮炒。茯苓各一錢。白芷金銀花各八分。甘草五分。水二鍾煎至八分。隨瘡上下服。未成即消。已成即

普門醫品

難症

卷三十六

潰腐肉易去。新肉易生

芙蓉散 治全上

芙蓉葉或生研或乾研。以蜜調塗患處。中間留頭。乾則頻換。初起者即覺清涼。痛止腫消。已成者易潰。已穿者易斂。妙不可言。花及根皮俱可用。或加赤小豆末尤妙 本草發明

桑木灸法 治全上

乾桑木劈成細片。繫作小把。燃火吹息。灸患處。每灸片時。日三五次。以瘡肉腐動爲度。大抵未潰則

解熱毒止疼痛。消淤腫。已潰則補陽氣。散餘毒。生

肌肉。陽證腫痛。或重如負山。用此法出毒水。即內

消。日久者用之。雖潰亦淺。且無苦楚。陰瘡不起者。

一灸即起。并治癰瘰。流注。腫瘡。頑瘡。久不愈者。俱

有神効 本草綱目

梅花點舌丹 治全上

雄黃飛硃砂飛乳香沒藥血竭硼砂苦葶藶各二錢。沉香蟾酥乳泡冰片牛黃各一錢。麝香熊膽珍珠煨各五分。各爲末。飯丸如綠豆大。每用一丸。噙

普門醫品

難症

卷三十六

舌下自化

麥飯石膏 治全上

麥飯石碎如碁子大。炭火燒赤。投米醋中浸之。如此十次。研末篩細。入乳鉢內。用數人更碾五七日。要細膩如粉。鹿角一具。要生取連腦骨者。自脫者不堪用。每二三寸截之。炭火燒令烟盡。即止。爲末。研細。每麥飯石末二兩。鹿角灰二兩。白欬生末二兩。用三年米醋入銀石器內。煎令魚目沸。旋旋入藥于內。竹片子不住手攪熬一二時久。稀稠得所。

傾盆內待冷以紙蓋收勿令塵入用時以鷄翎掃于腫上赤處盡塗之中留錢大空處洩氣如未有膿即內消已作頭即縮小已潰即排如滿水若日久潰腐露出筋骨者即塗軟布上貼之乾即易目見瘡口收斂但膜未穿透者即無不瘡已潰者先以猪蹄湯洗去膿血故帛拭淨然後用藥切忌手觸動嫩肉及口氣吹風一切腋氣婦人月經有孕人見合藥亦忌初時一日一洗一換十日後二日一換此藥要細方效若不細塗之即疼麥飯石處

普門醫品

瘡疽

卷三十八

處山溪間有之詳藥物考呂子華秘方猪蹄湯方見本門已潰條

又方

三七醋磨調塗即散破者研末乾摻瀕湖集簡方

又方

鹽白梅燒存性爲末入輕粉少許香油調塗四圍王氏簡易方

潰前

五十三方○與通治條參看

隔蒜灸法 治一切癰疽惡毒初起

凡惡毒初起或兩背胛間赤痒腫痛中有白粒即是瘡頭若漫腫無頭用濕紙搨上先乾處是頭以墨圍之用大顆獨蒜切片三分厚貼疽頂用艾隔蒜灸之每三壯易蒜痛者灸令不痛不痛者灸令痛艾炷大小視毒輕重不論壯數依法灸之其毒即散不散亦易于成就不至內攻萬無一失神効方也若毒深勢重其人昏憤躁亂瘡不起發即用艾于肉上灸之更妙若發背闊大非蒜錢所可灸者用濕紙貼尋瘡頭隨瘡大小用竹片作圈圍定

普門醫品

瘡疽

卷三十九

以大蒜十顆淡豆豉半合乳香一錢細研和勻填于竹圈內二分厚著艾灸之蒜乾欲然再以蒜搗和痛灸至痒痒灸至痛以百壯爲率外科精要

駒竹馬灸法 治全上

其法令病人以肘憑几直伸手臂用篋一條自腕中橫紋男左女右貼肉量起直至中指尖盡處截斷爲則不量指甲却用竹杠一條令病人脫衣正身騎定令二人扛起病人脚不着地又令二人扶之勿令偃僂欹斜却將前篋從竹杠上尾骶骨盡

處貼膏正中量至篋盡處為則用墨點記定此只
取中非灸穴也却用薄篋作則子量病人中指節
相去兩橫紋為則男左女右截為一則就前點記
處兩邊各量一則即是灸穴疔發于右則灸右發
于左則灸左甚者左右俱灸五壯此心脉所過處
灸則火流毒散起死回生屢試屢驗 外科精要

蟻針法 治全上

用筆管一箇入蟻蟻一條即水蟻先以水濕瘡以
管口對瘡頭使蟻吮瘡血其毒即散如瘡大須換

膏門醫品

雜症

卷三十六 十

三四條若正穴其蟻必死累試累効若血不止以
藕節上泥塗之若瘡頭未辯以井邊泥塗上先乾
處即是 洪丞相方

活蟾拔毒法 治全上

活蟾一箇繫放毒上半日蟾必昏憤置承中掇其
命再以一箇如前法其蟾必踉蹌再易一箇其蟾
無恙則毒散矣累驗若勢重者以活蟾一箇破開
連肚乘熱合瘡上不久必臭不可聞再用二三次
即愈慎勿以物微見輕也 醫林集要

國老膏 治全上

大甘草二斤槌碎河水浸一宿揉取濃汁用密絹
濾過沙鍋內慢火熬成膏磁罐收之每服一二匙
無灰酒或白湯下一連數服微利無妨最能消腫
逐毒使毒不內攻其功不可具述所謂消患于未
形也 外科精要

神像截法 治全上

真麻油一斤銀石器內煎十數沸取出入酒兩碗
通口熱服一日用盡緩則二三日服之吳安世云

膏門醫品

雜症

卷三十六 十一

吾家三世用此無有不驗聞獵者云凡中毒箭急
飲麻油藥毒即消可知其効 直積方

蝸涎解毒方 治全上

用活蝸牛二百箇以新汲水一盞入小瓶中封一
夜取涎水入真蛤粉旋調掃傳毒上日十餘度痛
止毒解其蝸仍送陰濕處勿傷其生 集驗方

護心內托散 治全上

真綠豆粉一兩乳香半兩焙焦燈心同研和勻以
生甘草濃煎湯調下二錢時時呷之要使藥常在

膈間若毒氣冲心。有嘔逆之證。大宜服此。凡遇疽發。三日之內。宜連進十餘服。使毒氣出外。可免憂。證。卽四五日後。亦宜間服之。服至一兩。則香徹。孔中。真聖藥也。老弱虛寒者。量服。李嗣立外科方

忍冬酒 治全上

忍冬藤五兩。用木槌爛。不可犯鉄。大甘草節一兩。同入沙碓內。水二碗。文武火慢煎至一碗。入無灰好酒一碗。再煎十數沸。去渣。分爲三服。一日一夜服盡。勢重者。一日二劑。以大小便通利爲効。別用

醫門書品 癰疽

卷五十二

一把。摘葉研爛。入白酒少許。稀稠得所。塗腫四圍。中留一孔泄氣。外科精要

又方

用黃龍石如鷄卵大者。猛火燒赤。淬醇醋中。再燒再淬。至石盡。澄取石屑。暴乾研末。醋調塗之。無不愈。徐氏醫案

又方

以熱湯頻沃之。不已卽愈。集簡方

又方

香油煎葱黑色。趁熱通手於瘡。自消。百一選方

又方

赤小豆研末。水調塗之。神驗。或納醋中浸一宿。晾乾炒研。酒和塗之。并治疔。甚妙。集驗方

又方

枯樓根。赤小豆等分。爲末。醋調塗之。楊文蔚方

又方

紫花地丁。鹽醋浸一宿。搗如泥。入麪和貼之。乾則易。有尼發背。夢得此方。數日而痊。集効方

醫門書品

癰疽

卷五十三

又方

龍葵莖葉。搗酒服。仍以滓敷之。甚妙。普濟方

又方

金銀花連莖葉。擣自然汁半碗。煎八分服之。以渣敷上。敗毒托裏。散氣和血。甚妙。積善堂方

又方

五葉藤。又名五爪龍一握。生薑一塊。全搗爛。入好酒一盞。絞汁。熱服。取汁以渣敷之。卽愈。壽域神方

又方

伏龍肝、蒜搗和作泥貼之。乾再易。極妙。外臺秘傳

又方
野菊花連莖搗爛。酒煎。熱服。取汁。以渣敷之。即愈。
孫氏集効方

又方

甘草三兩。炙剉瓶盛。用酒一斗浸之。乃鎔黑鉛一斤投酒中。如此九度。去渣飲酒。醉臥即愈。經驗方

又方

老鴉蒜搗如泥敷之。或水煎服。取汗愈。本草綱目

骨門醫品

癰疽

卷五 十四

又方

新掘天門冬三五兩洗淨。以器搗細。以好酒三五甌。濾汁頓服。未效再服。必愈。醫學正傳

又方

黑牽牛。白牽牛。各一兩布包槌碎。以好醋一甌。熬至八分。露一宿。次日五更溫服。以大便出膿血爲妙。老弱人勿用。張三丰方

一切腫毒初起。發熱便閉勢盛者

秦朮一兩。牛乳煎服。利三五度即愈。集驗方

治癰疽發寒顫

乳香半兩。熟水研服。即止。蓋顫發于脾。乳香入脾故也。仁齋直指方

癰疽發背初起。覺眼花頭暈。口乾舌苦。心驚背熱。四肢麻木。覺有紅暈在背後者

槐花一大抄。鉄杓內炒褐色。以熱酒一碗泡之。乘熱飲酒。一汗即愈。如未退再炒一服。極効。縱成膿者。亦無不愈。保壽堂方

一切癰疽發背無名腫毒。未成或已成。掀痛寒熱狀

骨門醫品

癰疽

卷五 十五

類傷寒

忍冬、葉黃耆。各五兩。當歸酒洗二兩。甘草八錢。爲末。每服三錢。酒調連渣服。少頃再進一服。未成者即消。已成者即潰。或以藥三錢。用酒盞半煎一盞。濾渣服。以渣敷腫處。亦妙。和劑局方

僊人活命飲 治一切癰疽惡腫。初起而未成。及已成而未潰者

穿山甲。以蛤粉炒黃白芷。防風。甘草節。赤芍藥。當歸尾。天花粉。貝母。皂角刺。各一錢。金銀花。陳皮。各

三錢酒水各一碗煎穀湯去渣入乳香沒藥末各一錢調服連服三四劑更多飲酒以助藥力未成者即消已成者即潰止痛消毒其効如神外用神燈法照之更妙神燈法見本門通治條

又方

取楸葉十重敷腫上舊帛裹之日三易當重重有毒氣成水流在葉上是其驗也冬月取乾葉鹽水浸軟或根皮搗爛敷之皆効止痛消腫蝕膿血勝于衆藥

普門醫品

癰疽

卷三十六

針頭散 治全上

蟾酥麝香各一錢研勻乳汁調和入罐中待乾每用少許津摩調敷之外以膏護之毒氣自出不能爲害也

保命集

一切癰疽焮熱作疼

大黃末醋調塗之燥即易不過四五次愈

肘後方

又方

蒼葦草葉五爪龍梗葉小薊葉各一兩搗爛入熱酒一盤絞汁服得汗立瘡

九種全愈

靈寶散 治全上

用鬼紫腰

絡石而生其藤柔細兩葉相對

取葉

洗晒勿見火皂莢刺新瓦炒各一兩甘草節半兩大瓜樓一箇取仁炒香乳香沒藥各三錢每服二錢水一盞酒半盞慢火煎至一盞溫服

外科精要

一切腫毒疼痛難忍

芭蕉根搗爛塗之并治疔瘡

肘後方

又方

冬瓜截去頭合瘡上瓜爛截去更合之瓜未盡瘡

普門醫品

癰疽

卷三十六

大勢已歛矣

肘後方

陰疽頭凹色黯不疼無熱服補藥不起發者

用人牙椒過穿山甲炙各一錢爲末分作兩服用當歸麻黃煎酒下外以薑汁和麴傳之

直指方

石癰堅硬不作膿者

生商陸根搗爛傳之燥即易取軟爲度

張仲文方

又方

苺荳子爲末醋和敷瘡頭根即拔出

千金方

癰疽腫硬不破或破而無膿

斑發爲末。以蒜搗膏。水和一豆許。貼瘡頭上。少時
膿出。卽去之。直指方

癰腫無頭

黃葵子一粒。水吞之。如吞兩粒。則有二頭。或蜀葵
子爲末。酒調敷之。經驗方

又方

用黃蠟如麥粒大。兩頭捻尖。冷水吞一粒。卽有頭
出。和効經驗方

又方

普門醫品

癰疽

卷三十六 十八

用白茅針初出土者。酒煮服之。一針一孔。二針二
孔。裁器本草

又方

皂角刺燒灰。酒服三錢。嚼葵子三五粒。覺其處如
針刺。卽有頭出。儒門事親

又方

蛇蛻燒灰。猪脂和塗。卽有頭出。本草綱目

替針丸

治一切癰疽膿成不潰

白丁香。卽雀屎。硃砂。沒藥。乳香。各二錢。各研爲末。

糯米四十九粒。先用礬灰奉大一塊。置磁碗內。置
入井水。待熟氣將息。以米排入灰中。露尖在外。良
久候。米如水晶狀。取出。將前四藥末。酌多少入糯
米和勻。丸麥粒大。每用一粒。水濕粘瘡頭。其膿自
出。普門醫品

又方

白丁香研細。以米醋和。用小豆大一粒。乘濕安瘡
上。卽穿。肘後方

又方

普門醫品

癰疽

卷三十六 十九

膽礬。雀屎。各少許。研細。蜜調點之。卽潰。直指方

又方

皂角刺麩炒。黃耆焙。各一兩。甘草半兩。爲末。每服
三錢。酒一盞。煎七分。入乳香五分調服。本事方

又方

用舊荻芒簾箔上經繩。燒灰。研和臘猪脂。傅上。卽
潰。不須針灸。千金方

八珍湯 治見論

當歸酒洗。白芍藥酒炒。熟地黃。川芎。人參。去蘆。白

茯苓白朮炒甘草炙各一錢薑三片棗二枚水二鍾煎八分溫服

十全大補湯 治見論

卽前方加黃耆一錢肉桂六分

四君子湯 治見論

人參白朮炒白茯苓各一錢半甘草一錢水二鍾煎八分溫服

潰後 四十一方 與通治條參看

癰疽初潰

普門醫品

癰疽

卷六十二

芫花根皮搓作擦插入則不生合膿易竭 集簡方

豬蹄湯 治一切潰瘍消熱毒去惡物解穢氣甚効

用白芷甘草羌活露蜂房有蜂兒者赤芍藥當歸

各等分先用豬蹄一隻水五碗煮取清湯三碗入

前藥三兩煎數沸去滓洗患處 外科精義

烏金膏 解一切瘡毒及腐化瘀肉最能推陳致新

妙不容言

巴豆仁炒焦黑研成膏點瘡處則解毒塗於肉則自化加乳香少許亦可若毒深不能收飲者宜作

然紅之。不致成漏再用純陽之藥以接其元氣庶易收歛 外科精義

乳香定痛散 治諸瘡潰爛疼痛難忍

乳香沒藥各二錢寒水石煨滑石各四錢片腦一分爲細末搽之 外科精義

壽星散 治全上

用天南星爲末遍搽于上瘡卽止 徐氏醫案

內補黃耆湯 治潰瘍作痛倦怠少食無睡自汗口

乾或發熱久不愈

普門醫品

癰疽

卷六十二

黃耆鹽水拌炒麥門冬去心熟地黃酒拌人參茯苓各一錢甘草炙五分白芍藥炒川芎官桂遠志

當歸酒洗各七分薑三片棗二枚水二鍾煎八分

食遠溫服虛者倍參耆 外科精義

潰癰作痒不可忍者

以鹽摩其四圍卽止 外科精義

癰疽惡瘡膿血不止

地骨皮洗淨將皮內細白穢刮取以粗皮同骨煎

湯洗令膿血盡以所取細白穢貼之立効有一朝

士病疽經歲或以地骨皮湯洗之出血一二升家人俱欲止之曰疽覺少快更以前湯洗之血漸淡乃止以細穰貼之次日結痂愈唐慎微本草

癰膿不出
人乳汁合麝敷之比曉膿盡出不可近手千金方

十全大補湯 治瘡潰膿清或有膿不潰久潰不斂

皆元氣虛弱不能營運服此生血氣壯脾胃補諸虛

方見本門潰前條

當歸補血湯 治瘡瘍潰後氣血俱虛肌熱躁熱目

赤面紅煩渴引飲晝夜不息脉洪大而虛重按全無

畏服涼藥必死

黃耆灸一兩當歸酒拌五錢水鍾半煎七分溫服

神異膏 治癰疽未斂

大露蜂房蛇蛻鹽水洗杏仁各一兩玄參五錢黃

丹水飛炒五兩麻油一斤男子亂髮如雞子一

先將麻油入鍋內煎髮溶盡下杏仁煎黑

蛇蛻仍煎黑濾去滓入黃丹急攪成膏

中其丹不必拘定前數凡膏日久必硬

膏少許和之凡癰疽潰後以麥飯石膏塗之候瘡根漸收却以此膏斂之乃解毒生肌之良劑也薛氏醫按

麥飯石膏方見本門未潰條

收斂一切癰疽瘡口

貓頭一箇煨研雞子一箇煮熟去白以黃煎油入

白蠟少許調灰敷之外以膏藥護住妙醫方摘要

又方 血竭麝香各少許大棗燒灰半錢同研津調塗之

先原方

普門醫品 癰疽 卷二十六 二十三

又方 經霜黃桑葉為末傳之直指方

又方 雞肫皮燒存性為末日搽之本草綱目

又方 牛屎燒末用雞子白和敷乾即易極効千金月令

又方 亂髮露蜂房蛇蛻各燒存性一錢用溫酒食前調

服神妙蘇沈良方

一切癰疽瘡口不飲者

患甲燒存性研摻之神妙 怪證奇方

又方

用生薑連皮切大片。塗白礬末炙焦。研細貼之。勿動良 普濟方

又方

用雞肫黃皮。同綿絮焙末。摻之即飲 本草綱目

又方

木香。黃連。檳榔。等分爲末。油調頻塗之 和劑局方

普門醫品

癰疽

卷三十六 二十四

又方

用鼠皮燒灰敷之 本草綱目

又方

忍冬藤一把。搗爛。入雄黃五分。水二升。以確煎之。

紙封七重。穿一孔。待氣出。以瘡對口熏之。三時久。

大出黃水。後用生肌藥 選奇方

又方

白膠香。輕粉。等分爲末。豬脂和塗 直指方

紅玉散 治瘡口不飲。生肌肉。止疼痛。去惡水

寒水石二兩。煨黃丹半兩。飛爲末。摻之 和劑局方

豆豉餅 治一切癰疽既潰不飲。瘡色黑黯

香豉一升。入少水。搗成泥。照瘡大小作餅。厚三分。

鋪瘡上。以艾灸之。但使溫溫。勿令破肉。覺熱痛急。

易之。患當減快。一日二次灸之。如瘡有孔。留孔勿。

覆。刈艾其傍灸之。聽汁出爲妙 千金方

一切癰疽發背潰大如盤。臭腐不飲

桐葉醋蒸貼之。即生肉收口。極驗 醫林正治

背疽大潰。爛見五臟。本屬死證。用此可愈

普門醫品

癰疽

卷三十六 二十五

鯽魚去腸。實以羯羊糞。烘焦爲末。乾摻之。瘡口自

收。此方屢用有效。須候膿少。欲生肌肉時用之 洪

氏方

冷瘡成漏

明礬半生。牛粘共一錢。五靈脂水飛一錢。爲末。以

皮紙裁條。燃作小撚子。香油潤濕于末上。拖過。剪

作大小撚。安入漏內。早安午換。候膿出盡。有少血

出。方住藥。自然生肉 普濟方

瘡癰作痒

為膏揭封之。痂落即瘥。附後方

又方

白馬乳揭末封之。痂落即愈。附後方

瘡中生蛆

以皂礬為末。摻之。即化為水。摘玄方

癰疽有蟲

鹿角燒為末。醋和塗之。本草綱目

又方

以栢枝節燒瀝取油塗之。本草別說

醫門醫品

癰疽

卷三十六 二十六

疔疽生於腠理間。惡水淋漓。經年瘡冷。敗為深疽。青

黑。好肉虛腫。百治不瘥。或愈而復發。

用烏金膏。蝕去惡肉。殺猪尿。燒研末。納瘡孔。令滿。

有汁擠去。更敷有惡肉。再蝕去。以平為期。千金方

烏金膏方見前

瘡似蜂窩。愈而復發者

官粉。硃砂。等分為末。蜜和塗之。聖濟方

附骨疽漏

蟻螂七枚。同大麥。搗敷。鬼遺方

蝦蟇膏 治附骨疽膿汁不已

用大蝦蟇一箇。亂髮如鷄子大一塊。猪脂四兩。煎

枯去渣。待凝如膏。先以桑根皮。烏頭。煎洗拭乾。蝦

龍骨末。摻四邊。以前膏貼之。錦囊秘覽

附骨疽膿不出

鼠皮生剝貼之。即追膿出。本草綱目

六君子湯 治見論

人參。白朮。土炒。白茯苓。半夏製。陳皮。各一錢。甘草

炙八分。水二鍾。煎八分。溫服

醫門醫品

癰疽

卷三十六 二十七

翻花 十方

惡瘡有肉如飯粒突出。破之流血。隨生

馬齒莧。燒研。猪脂和敷之。本草綱目

又方

鯽魚一箇。去腸。以羯羊糞填滿。燒存性。為末。先以

米泔洗過。搽之。本草方

又方

丁香末敷之。外以膏藥護之。怪證奇方

又方

蒼耳葉搗汁服三合并塗之日二三聖濟總錄

又方

用柳樹枝葉三斤水五升煎汁二升熬如飴日塗

三次聖惠方

又方

黎蘆末猪脂和敷日三四上聖濟總錄

又方

官粉乾臙脂等分爲末塩湯洗淨敷之日五次愈聖濟方

普門醫品

癰疽

卷二十六二十八

諸瘡等肉如蛇頭出數寸

硫黃末一兩敷之即縮聖惠方

又方

烏梅肉燒存性研敷惡肉上一夜立盡鬼遺方

積年惡瘡翻花瘡漏瘡不瘥

用牛旁根搗爛和臘猪脂日日封之千金方

骨疽六方

多骨疽常出細骨

蜜陀僧末桐油調勻攤貼之即愈聖濟方

又方

掘地作坑口小腹大深三尺以乾錫大同艾及荆葉搗碎入坑內燒令烟出以疽口就熏用衣擁之

毋令洩氣半日常有蟲出神効千金方

蝦蟆膏 治骨從瘡孔中出

方見本門已潰條

久疽久漏中有朽骨

以烏骨雞脰骨實以砒石塩泥固濟煨過出火毒

以骨研末飯丸粟米大每以白紙然送一粒入竅

普門醫品

癰疽

卷二十七二十九

中以板毒膏藥封之其骨自出醫學正統

骨疽出骨不止愈而復發

烏雞一隻剔去肉取骨燒成灰以三家蒸篁三

家砧案刮屑各一兩皆燒存性和納瘡中碎骨即

出盡而愈千金方

又方

蔓菁子搗敷用帛裝定日一易之千金方

附癰毒

三十一方 與通治潰前潰後條參看

一切腫毒瘡癰

草決明末水調敷之 日華方

又方

東壁土、大黃等分爲末。用無根井華水調塗乾。再上 瑞竹堂方

又方

大黃末。米醋調塗愈 肘後方

又方

好硫黃三兩。蕎麥粉二兩。井水和捏作小餅。晒乾收之。臨用細研。新汲水調敷之。痛者卽不痛。不痛

普門醫品

癰疽

卷三十六 三十一

者卽痛而愈 坦仙皆効方

又方

鬼蓋 卽土硫黃白色 日乾研末。和油塗之。凡菌從

地出。皆治瘡疥。牛糞上黑菌尤佳 藏器本草

又方

黃檗 音炒。川烏頭炮。等分爲末。唾調塗之。留頭頻

以米泔水潤濕 集簡方

小金絲膏 治一切瘡癰腫毒

黃香。白膠香。乳香。各二錢。沒藥一兩。黃蠟三錢。同

熬至滴水不散。傾入水中。扯干。遍收貯。每烘捻作

餅貼之 本草方

又方

五倍子炒紫黑色。蜜調塗之 簡便方

又方

鹿角尖。磨濃汁塗之。甚妙 類湖方

又方

牛旁根洗淨。搗敷之。入鹽少許。極効 本草綱目

又方

普門醫品

癰疽

卷三十六 三十一

蚤休 卽重樓草根 醋摩敷之。諺云。七葉一枝花。深

山是我家。癰疽如遇我。好似手拈拏 本草綱目

又方

野葡萄。晒研爲末。水調塗之。卽消 儒門事親

又方

荷葉中心蒂如錢者。不拘多少。煎湯淋洗。拭乾。以

飛過寒水石。同臘猪脂和塗。拔毒止痛神妙 本草綱目

又方

又方

小芥子末。同栢葉搗塗。無不愈者。千金翼方

癰毒初起

大黃五倍子。黃檗音。為末等分。新汲水調塗。日四

五次。簡便方

又方

紫花地丁。葱頭。生蜜。共搗貼之。楊氏方

又方

生薑一塊。炭火炙焦一層。刮下一層。為末。以猪膽

汁調塗。海上方

普門醫品

癰疽

卷三十六 三十二

又方

乾薑炒紫。研末。醋調敷。四圍留頭。諸症便宜

又方

牡蠣粉。雞子清調塗。乾即易。拔毒如神。藥方

癰毒初痛

土蜂窠研細。川烏頭。為末等分。醋調敷之。未結則

散。已結則破。戒器本草

又方

蓖麻子。中數即止。肘後方

太乙膏 治一切癰毒疼痛。及肺疽腸癰。為丸內服。
尤妙

玄參。白芷。當歸。肉桂。大黃。赤芍藥。生地黄。各一兩。

為咀。用真脂麻油二斤。春秋浸五日。夏三冬七日。

煎黑。濾去渣。入黃丹十二兩。再煎至滴水成珠。為

度。絹帛攤貼。若為丸服。如綠豆大。

瘡癰初發寒熱

用粉草節。晒乾為末。熱酒服一二錢。連進三服。寒

熱俱止。外科精要方

普門醫品

癰疽

卷三十六 三十三

癰毒不潰

白丁香研末。油調塗腫上。即潰。藥方

癰毒不愈

爛船底。臉灰研末。油調傳之。楊氏方

癰毒頻發不已

用通明。瀝青八兩。銅綠二兩。赤油三錢。雄猪膽汁

三箇。先溶瀝青。乃下油膽及銅綠。共熬至滴水成

珠。傾入水中。扯拔。收磁器中。每用絹帛攤貼。不須

再換。本草方

又方

露蜂房二枚燒存性以巴豆二十一粒煎清油二
三沸去豆用油調敷甚効唐氏得効方

鬚邊生瘡

貓頭上毛猪頭上毛各一把鼠屎一粒燒研油調

塗之城方

頭上軟瘤

大芋搗傅之即愈簡便方

又方

普門醫品

瘡

卷二十六 三十四

用抱出鵝卵殼燒存性研末入輕粉少許膏油調

敷危氏方

癰腫腫硬無頭不變色者

米粉四兩葱白一兩同炒黑爲末醋調貼之一伏

時又慘以消爲度外科精義

普門醫品卷之二十七

東武王化貞元起父編輯

門人陳斌憲卿父較閱

疔瘡門

論疔瘡言其瘡形如丁蓋之狀也夏月汗滴入肉
食之生疔疫死牛馬食之多生疔不可不慎初生
頭凹腫痛赤黃紫黑無定色或增寒頭疼或嘔吐
氣逆煩燥悶亂者是也急用艾炷灸之若不覺疼

普門醫品

疔瘡

卷七 一

針瘡四邊皆令血出若針之不痛多血者以猛火
燒鉄釘通紅于瘡上烙之令如焦炭取痛爲効如
烙又不痛其人眼黑多見火光者不可治此毒已
入臟腑也

薛立齋曰疔瘡一證其狀不一其色不同或如小
瘡或如水泡或作痛或麻木或有紅絲或寒熱頭
疼或嘔吐惡心或肢體拘急其候多端非灸法并
解毒之劑卒難濟事若不省人事或牙關緊急者
卽以奪命丹爲末葱酒調灌之若生兩足有紅絲

至臍。生兩手有紅絲至心。生于唇面有紅絲入喉。俱難治。急用針挑其紅絲出血。多有生者。若生于肢末之處。道遠位僻。藥力難達。艾灸之功為大。若更服損利之劑。耗損真氣。不惟無以去毒。而害反隨之矣。

凡人暴死。多是疔毒。急取燈。遍照其身。若有小瘡。形色可疑。卽是其毒。宜急灸之。及用神燈照法。并灌奪命丹。無不甦者。

疔毒。針刺之不痛者。宜明灸之。針疔四畔去惡血。

普門醫品

疔瘡

卷七 二

以奪命丹一粒。入瘡頭孔內。外以膏藥貼之。若患在手足。紅絲攻心腹者。就于絲盡處。砭去惡血。服荆防敗毒散。若絲近心腹者。宜挑破瘡頭去惡水。以膏藥貼之。服奪命丹。如牙關緊急。或喉內患者。並噙奪命丹一二丸。

通治 四十三方

凡手指及諸處有瘡起小泡。發痒。或麻木。寒熱惡心。頭疼者。卽為疔毒。乃極惡之證。

急用針刺破。擠去惡血。候血盡口。含凉水吮之。水

溫再換吮之。疼痒皆住。卽愈。最為妙法。保壽堂方
奪命丹 治疔瘡惡毒。或麻木。或嘔吐。重者昏愎。用此有奪命之功。

蟾酥乾者酒化。輕粉各五分。枯礬。銅。寒水石。煨乳香。沒藥。麝香。各一錢。硃砂三錢。各為末。和勻。用蝸牛二十一個。連殼搗為丸。如綠豆大。如無蝸牛。酒和丸亦可。每服二三丸。以葱白嚼爛。或搗爛。安手心內。男左女右。裹藥于中。熱酒吞下。再飲數盃。以助藥力。被蓋取汗。如無汗。約人行五里許。再進。

普門醫品

疔毒

卷七 二

一服。牙關緊急者。以三五丸為末。葱酒調灌之。外用神燈照法。及隔蒜灸法。無不愈者。屢試屢驗。不可忽之。

隔蒜灸法 治全上

以大蒜頭切片。一分半厚。安瘡頭上。用艾壯灸。三壯。換一片。疼者務要灸至不疼。不疼者務要灸至疼。毒勢重者不必用蒜。徑以艾炷着瘡上灸之。神驗不可盡述。

神燈 治全上

方見二十六卷癰疽門

砭法 治疔瘡初起紅絲走散。或時毒丹毒。瘀血壅盛。急砭去惡血。則毒解。

用綢緞為拳。碎取有鋒芒者一塊。以筋一根劈開。頭夾之。用線縛定。兩指輕撮筋稍。令磁芒正對患處。懸半寸許。再用筋一根。頻擊筋頭。令毒血遇刺。自出。若毒入肌。用則難治。外科秘訣。

御史散 治疔瘡初起

生鐵銹三錢為末。木香磨酒調下。分病上下食前。

普門醫品

疔瘡

卷五十四

食後服之。微汗即愈。外科心法。

換回丹 治全上

牡蠣煅二錢。青鹽一錢。生鐵銹三錢為末。先將瘡

頭挑破。以蠶蠶油調搽之。瘡有紅絲即自回。神驗。

蟻螂膏 治全上

蟻螂三個。肚白者佳。黃麻蟲十個。共搗勻。擦破患

處貼之。此方屢用屢効。如無黃麻蟲亦可。如患在

手足有紅絲上臂。于絲盡處用針挑斷出血。

一切疔腫初起

用多年土內鑄釘火煅醋淬。刮下鏽末。不論遍數。

只以盡為度。收貯。每用少許。人乳和挑破傳之。仍

炒研二錢。以蠶水煎滾。待冷調服。普濟方。

又方

白礬黃丹等分。以三稜針刺破。血盡傳之。不過三

上即愈。衛生寶鑑。

又方

鍼刺四畔。用石榴皮著瘡上。熨圖。以艾灸之。以痛

為度。仍研榴皮末敷上。急裹經宿。根自出。百一方。

普門醫品

疔瘡

卷五十五

又方

白芷二錢為末。生薑一兩搗細。入酒一盞溫服。取

汗即散。袖珍方。

又方

薺苳根搗汁。服一合。以渣敷之。三度瘥。千金翼方。

又方

小薊葉二兩。乳香明礬各五錢為末。每酒服二錢。

得即愈。普濟方。

又方

用益母草搗敷仍絞汁五合服之即消聖濟方

拔取疔毒

蟾酥以白麩黃丹搜和作劑每丸麥粒大以指底動瘡上按入重者挑破納之仍以膏貼之危氏方

又方

用蠅螂心在腹下其肉稍白是也度取之貼瘡半日許再易血盡根出即愈思羊肉 冊後方

又方

用生蜜與隔年葱研膏先刺破塗之如人行五里

醫門醫品

疔毒

卷之六

許則疔出後以熱醋湯洗去急濟仙方

海馬拔毒散 治疔瘡發背惡瘡奇效

海馬一對炙黃穿山甲黃土炒硃砂各一錢雄黃三錢龍腦麝香少許爲末入水銀研不見星每以少許點之一口一次其毒自出秘傳外方

一切疔瘡

皂莢子仁作末醋調敷之五日愈千金方

又方

龍葵根一握洗切乳香末黃連末各二兩杏仁四

十個去皮尖和搗作餅厚如三錢依瘡大小傳之覺痒即換去痒不可忍勿搔動候瘡中似石榴子戢戢然乃去藥時時以甘草湯溫洗洗後以蠟紙貼之終身勿食羊肉聖濟總錄

又方

土菌生糞土上朝生夕死者燒灰以針刺疔四圍納灰入內經宿出根若黑枯牛地糞石上待生菌采取焙乾希蕪草等分爲末以竹筒去兩頭緊縛合住疔上用水和末一錢入筒內少頃沸起則根

醫門醫品

疔毒

卷之七

拔出未盡再作二三次醫學正傳

又方

九月九日采芙蓉葉陰乾爲末每以井水調貼次日用蚰蜒螺一個搗塗之普濟方

又方

天水牛楊柳上者陰乾去殼四個蟾酥半錢巴豆仁一個鉛霜雄黃麝香少許先以天水牛研如泥入鎔化黃蠟少許同衆藥末和作膏密收每以針刺瘡頭破出血用榆條送藥膏麥粒大入瘡中以

雀糞二個放瘡口即止不必再用 本草綱目

又方

蕤黎炒去刺搗末以醋和封毒上拔根 外臺秘要

又方

雄黃蟾酥各五分爲細末葱蜜搗丸小米大以針刺破瘡頭插入甚妙

又方

用針刺疔四邊及中心以雄黃末傳之 積德堂方

又方

醫門醫品

疔瘡

卷八

土蜂窩煨蛇皮燒等分酒服一錢直指方

又方

先以針刺破以老葱生蜜杵貼兩時疔出以醋湯洗之神效 聖濟方

疔瘡腫毒不破則剪入膜

蟬蛻炒研蜜水調服一錢仍以津和塗 青囊集纂

又方

蟬蛻僵蠶等分爲末醋調塗瘡四圍候根出拔去再塗 醫方大成

又方

土蜂房一個蛇蛻一條黃泥固濟火煨存性爲末每服一錢空心好酒下少頃腹中大痛痛止其瘡已化爲黃水矣重者不過二服 普濟方

一切疔腫危困者

蒼耳根葉洗淨搗爛入童便絞汁冷服一盞日三服甚驗 食療本草

又方

菊花一握搗汁一盞入口即活無花用葉無葉用

醫門醫品

疔瘡

卷九

根用後方

赤根疔瘡

馬牙燒研臘猪脂和敷根即出 千金方

食牛羊馬諸畜肉生疔腫欲死者

烏柏樹葉湯自然汁一二盞頃服得大利去毒即愈未利再服冬用根 本草綱目

又方

先刺出血以海螵蛸末摻之其疔即出 普濟方

走馬丹 治魚臍疔瘡四面赤中央黑者

銀硃水和爲丸。失實大每服一九。溫酒下。首齊方

又方

絲瓜葉連鬚葱白韭菜等分。同入石鉢內研爛。取汁以熱酒和服。以滓貼腋下。病在左手貼左腋。病在右手貼右腋。病在左腳貼左脰。右腳貼右脰。在中貼心脰。用帛縛住。候肉下紅線處皆白則散矣。如有潮熱亦用此法。却令人抱住恐其顛倒則難療矣。危氏得効方

又方

普門醫品

疥瘡

寒食飴塗之良。乾者燒灰油敷之。千金方

又方

瞿麥燒灰和油敷之佳。崔氏方

魚臍瘡腫痛不可忍

以針刺破頭及四畔。以白芎汁滴孔中。外臺秘要

荆防敗毒散 治見論

方見二十八卷楊梅瘡門

瘰癧門

通治 潰前 潰後

結核 附 派注 附

〔論〕瘰癧者。累累結核是也。或在耳後。或在耳前。或在耳下。連及頤頤。又或在頸下。連及缺盆。皆謂之瘰癧。或在胸前及兩脇者。謂之馬刀。皆手足少陽經主之。又云結核連續者爲瘰癧。形長如蜣蛤者爲馬刀。瘰癧高起流膿不止者爲鼠瘻。

薛立齋曰。此證屬虛勞氣鬱所致。宜補形氣調經。未成者自消。已成者自潰。若投慄悍之劑。則氣血愈虛。多變爲瘰癧。蓋堅而不潰。潰而不合。氣血不足明矣。況二經之血原自不足。不可不察。若發

普門醫品

瘰癧

卷七 上

寒熱。眼內有赤脈貫瞳子。俱不治。一脈者一年死。

二脈者二年死。

又云。結核瘰癧初覺。宜內消之。如經久不除。氣血漸衰。肌寒肉冷。或膿汁清稀。毒氣不出。瘡口不合。聚腫不赤。結核無膿。外證不明者。並宜托裏。因怒結核。或腫痛。或發熱者。宜疎肝行氣。腫硬不潰者。補氣血爲主。潰後不斂者。屬氣血俱虛。宜大補。因有核而不斂者。腐而補之。

凡瘰癧結核初起。先用食鹽一二兩炒過。以長流

水一大盞煎放溫。作三四次頻服。少時以鷄翎于咽喉中探引吐痰汁三四升。後服涼血通經之藥。

通治 六方

必効散 治一切瘰癧。不問未成已成。未潰已潰。

蓬砂二錢五分。輕粉一錢。麝香五分。巴豆五個。去皮及心膜。白檳榔一個。斑蝥四十個。去頭翅同糯米炒。研極細。鷄子二個。去黃用清調藥。仍入殼內。以濕紙數重糊口。勿令透氣。蒸飯甑內。候飯熟取出。曝乾研末。虛者每服半錢。實者一錢。用炒生薑

醫門醫品

瘰癧

卷三 主

煎酒。五更初調服。至天明惡物自下。如小腹作痛。服益元散三錢。其毒從大小便而出。更服益氣藥數十劑。則瘡口自合。氣血自充。庶無變證。用巴豆者為解斑蝥之毒也。勿畏。孕婦不可服。薛氏醫案。益元散方見四卷暑證門。

遇仙無比丸 治全上

白朮。檳榔。防風。牽牛。半生半炒。郁李仁。湯泡去皮。蜜陀僧。甘草。各半兩。斑蝥二錢半。去翅足糯米炒焦去米。共為末。糊丸梧桐子大。每服二十九。早晚

煎甘草檳榔湯送下。日二服。一月後覺腹中微疼。小便中取下毒物如魚目狀。已破者自合。未破者自消。屢用有驗。丹溪方。

又方

秋分前後。蠶起。令人持袋摘楸葉。秤之足十五斤。以水一石。淨釜中煎取三斗。又換鍋煎取七八升。又換鍋煎取二升。乃納不津器中。用時先取麻油半合。蠟一丸。酥一栗子大。同化。又取杏仁七粒。去皮研如泥。生薑汁少許。米粉二錢。研同入膏中。攪

醫門醫品

瘰癧

卷三

勻。先塗瘡上。經二日拭去。更上新藥。不過五六上。已破者即生肌。未破者即內消。瘡後須將慎半年。采藥及煎時。并禁孝子婦人。僧道雞犬。篋中方。瘰癧馬刀。不問已潰未潰。或日久成漏。

夏枯草二兩。水二鍾煎七分。食遠溫服。虛弱者煎汁熬膏。并塗患處。此物乃治瘰癧之聖藥。其功甚大。外科經驗方。

又方

牡蠣煅四兩。甘草炙一兩。為末。每食後茶湯調下。

一錢神効初虞世方

又方

牡蠣煨四兩。玄參三兩。爲末。麪糊丸。梧子大。每服三十丸。食後酒下。日三服。盡除根。本草綱目

續前 十方

瘰癧初起如梅李狀

用海藻一兩。黃連一兩。爲末。時時舐嚥。先斷一切厚味。并以海藻浸酒日飲之。附後方

香附餅 治全上

普門醫品

瘰癧

卷五 高

用香附爲末。酒和。量瘡大小作餅覆患處。以熱熨斗熨之。外科精要

蛇盤瘰癧圍繞項上

蕎麥炒去殼。海藻。白僵蠶炒去絲。等分爲末。白梅泡取肉。減半爲丸。綠豆大。每服六七十丸。食後臨臥米飲下。日三服。其毒當從大便泄出。若以淡菜連服甚妙。阮氏方

瘰癧未破

用斑蝥五錢。去翅足。以糯米五合同炒焦。去米不

用。入薄荷二兩爲末。鷄子清爲丸。如綠豆大。空心茶下三丸。日加一丸。加至五丸。又日減一丸。減至一丸。後每日五丸。以消爲度。本草綱目

又方

黑鉛三兩。鐵器炒取黑灰。醋和塗故帛上貼之。頻換去惡汁。如此半月。不疼不破。內消爲水而愈。已破者不可用此藥

又方

商陸根和鹽少許搗敷。日再易之。或以艾灸藥上

普門醫品

瘰癧

卷五 玉

更妙千金方

又方

野菊根搗爛煎酒服。以渣敷之。即消。瑞竹堂方

又方

用馬齒莧陰乾燒研。臘猪脂和。先以溫米泔洗。拭乾敷之。外臺方

瘰癧結核無間有頭無頭

大蜘蛛五枚。晒乾去足細研。酥調塗之。日再上。聖惠方

瘰癧結核至胸脇者皆治之

取何首烏日日生嚼并取葉搗敷之極効斗門方

潰後 十三方

瘰癧已破膿水不絕

用百年茅屋厨中壁土為末入輕粉調敷半月即愈永類方

瘰癧潰爛

用荊芥根下一段剪碎煎沸湯溫洗良久看爛破處紫黑以鍼刺去血再洗三四次用樟腦雄黃等

醫門醫品

瘰癧

卷五 十六

分為末用油調掃上出水次日再洗再掃以愈為度凡瘰癧延至胸前腋下及兩肩四五年不愈者皆治其効如神活法紀要

又方

土茯苓為末五錢水煎服或入粥內食之多食為妙積德堂方

又方

蝸牛燒研輕粉少許用猪脊髓調傳之危氏方

又方

臘月貓屎瓦合定鹽泥固濟煨過研末油調搽之備門事親

又方

五月五日午時取貓兒眼睛草一捆用水一桶熬十餘沸去渣澄清再熬如膏瓶收先以椒葱槐枝煎湯洗淨攤此膏貼之數次愈便氏圖纂方

蓖麻膏 治瘰癧及惡瘡癰毒

蓖麻仁六十四個研白膠香一兩溶化投入攪勻入香油數匙再熬成膏試軟硬得中用絳帛量瘡

醫門醫品

瘰癧

卷五 十七

大小攤貼一膏可治四五癰子備門事親

瘰癧鼠瘻

石蔥蒲生研卷之微破以貓頭皮連毛燒灰用香油調敷內服白欬末酒下多多益善仍以白欬末少許酒和敷之更妙證治要訣

瘰癧瘻瘡

雄雞矢燒灰臘猪脂和傳之千金方

鼠瘻瘰癧有核流膿不止

用白馬尿白牛尿白羊尿白雞尿白犬尿各一升

于石上燒灰。滿處末一兩。以猪膏一斤煎油。亂髮一兩。同熬五六沸。調塗之神効。肘後方

療癰不飲

乾薑爲末。生薑汁打糊。和作團。以黃丹爲衣。每日隨瘡大小。入藥在內。追膿盡。肉生口合爲度。如不合。以葱白汁調大黃末。搽之。救急方

療癰潰爛久不愈

貓頭一個。蝙蝠一個。俱撒上黑豆同燒存性。爲末。搽之。乾則油調。內服五香連翹湯。醫林集要

醫門醫品

療癰

卷七

十八

附五香連翹湯

藿香。升麻。黃耆。桑寄生。連翹。射干。木通。各七分。大黃煨一錢。水二鍾。煎一鍾。入船上青木香。乳香。沒藥。丁香。各末七分。調勻。空心熱服。半日未利。再進一服。以利下惡物爲効。強者仍加芒消一錢。一方有麝香。丹溪方

又方

生玄參搗敷之。日二易。廣利方

附結核

論原病式曰。結核爲火。氣熱甚則結核堅硬。如果中核。不須潰發。但令熱氣散則自消也。凡獨形而單核者。爲結核。

丹溪云。結核或在頸。或在身。或在臂。在臂如腫毒者。每在皮裏膜外。多是濕痰流注。作核不散。若在頭項。久而不散。多成癰癰。必早治之。爲妙。人多忽畧。致成痼疾。久費調理。

通治六方

痰核紅腫寒熱如癰癰

醫門醫品

療癰

卷七

九

石灰火煨爲末。以白果肉同搗敷之。蜜調亦可。近人經驗

項後結核或赤腫硬疼

以生山藥一挺去皮。蓖麻子仁二個。同研貼之。如神。救急易方

惡核腫結

小蒜。吳茱萸。等分搗敷。即散。肘後方

又方

桑椹子二斗。黑熟者。以布取汁。銀石器熬成膏。每

白湯調服二匙。日三服。保命集

又方

連翹脂麻等分爲末。時時以溫水調服。簡便方

又方

蓖麻子炒去皮。每臨卧服二三枚。久之卽効。一生不可食炒豆。阮氏經驗方

〔附流注〕

〔論流注〕多因鬱結。或暴怒。或脾虛。濕氣逆于肉理。或衛氣虛。寒邪客于經絡。或閃撲。或產後瘀血流

皆門醫品

瘰癧

卷三 下

注關節。或傷寒餘邪未盡。皆因真氣不足。邪得乘之。大要以固元氣爲主。佐以見證之藥。如久而瘡口寒者。更用豆豉餅。或附子餅灸之。若不補血氣。及不慎起居飲食七情。俱不治。

〔通治〕
二方

太乙膏 治一切流注結核並宜

玄參。白芷。當歸。肉桂。大黃。赤芍藥。生地黃。各一兩。用麻油二斤。入銅鍋內煎黑去粗。入黃丹十二兩。再煎。水中試軟硬得中。卽成膏矣。

流注飲 治流注及一切悲怒或風寒濕毒搏于經

絡致氣血不和結成腫塊肉色不變或漫腫木悶無頭

桔梗炒。人參。當歸。酒拌官桂。甘草。黃耆。鹽湯浸炒。厚朴薑製。防風。紫蘇。白芍藥。烏藥。枳殼。各七分。檳榔。川芎。白芷。各五分。水二鍾。薑三片。煎一鍾。入木香末五分。調服。外科發揮

皆門醫品

瘰癧

卷三 下

東武王化貞元起父編輯

門人陳斌憲卿父較閱

癘風門

論癘風即今之所謂大風也。又謂之癘。是得天地間殺物之氣。古人謂之癘風者。以其酷烈暴悍可畏耳。治此證者。須分在上在下。看其疙瘩與瘡。上先見者。或上體多者。在上也。若下先見者。下體多

醫門醫品

癘風

卷二十八

一

者。在下也。上下同得者。在上復在下也。在上者用醉仙散。取涎血于齒縫中出。在下者以通天散。取惡物陳蟲于穀道中出。

癘風惡疾。雖名曰風。未必皆因風。大率氣血鬱熱。皆怨不謹所致。千金方所謂自作不仁。極惡之業。雖有悔言而無悔心。良得其情。然亦有傳染者。丹溪曰。從上從下以漸而來者。皆可治。人見其病勢之緩。多忽之。雖按法施治。病已痊可。若不能忌口。絕色。皆不免再發。發則終于不能救也。余曾治

好五人。中同惟一婦人不再發。以其貧甚。而且寡。無物可食也。餘四人三四年後皆再發而死。

通治三十二方

醉仙散 治大風生干頭面者

胡麻仁。牛旁子。蔓子。柏花子。各一兩。為末。同炒紫色。白茯苓。苦參。天花粉。防風。各半兩。八味。為末。每一兩。半入輕粉二錢。拌勻。大人一錢。空心日午臨睡各一服。淡茶調下。五七日間。必然齒縫中出臭涎水。渾身覺痛。皆悶如醉。利下惡臭尿。為度。量

醫門醫品

癘風

卷二十八

二

大小虛實加減與之。證候重而急者。須以再造散下之。候補養得還。復與此藥。須斷鹽醬醋諸般魚肉椒料燒炙等物。止可食粥及淡煮時菜食之。那尚不可食。醫方寶鑑

通天再造散 治大風生干下體者

鬱金半兩。生川大黃一兩。炮。皂角刺一兩。白牽牛頭末六錢。半炒半生。共為末。五錢。臨夜冷酒調下。候泄出蟲口黑者是。已多年。蟲口赤色是近日。三五日又進一服。直候無蟲。即絕根也。

大風癩疾

苦參末二兩以猪肚盛之。縫合煮熟。取出。去藥。先
飯一日。次蚤。先飲新水。一盞。將猪肚食之。如吐再
食。待一二時。以肉湯調服。每服五錢。取出。大小蟲
一二萬。為効。後以何首烏末二兩。防風末一兩半。
當歸末一兩。芍藥末五錢。人參末三錢。用皂角一
挺。去皮子。煮汁。入苦參末三兩。調糊。九煎。藥如梧
子大。每服三五十丸。溫酒或茶下。仍用麻黃苦參
制芥煎湯洗之。儒門事親

醫門醫品

癩風

卷之三

驅風膏 治癩風遍身疥癬

白花蛇酒炙。取肉四兩。天麻七錢半。薄荷。荆芥。各
二錢半。為末。好酒二斤。蜜四兩。砂鍋內熬成膏。每
服三匙。溫湯一盞。調服。溫酒取汗。醫聖元戎

又方

大何首烏一斤。米泔浸透。九蒸。九晒。胡麻四兩。九
蒸。九晒。為末。每酒服二錢。日二服。聖惠方

又方

三月採浮萍淘三五次。皆三五日。焙為末。不得見

日。每服三錢。食前溫酒下。常持觀音聖號。忌猪魚
雞蒜。本草綱目

大風及諸癩

大楓子油一兩。苦參三兩。入少酒糊。九梧子大。每
服五十丸。空心溫酒下。仍以苦參湯洗之。普濟方

又方

用新竹筒十個。內裝黑豆一層。頭髮一層。至滿。稍
糠火于盆內煨之。一頭微低。候汁滴出。以盞接盛。
用翎掃上。數日即愈。亦治諸瘡。御真人經驗方

醫門醫品

癩風

卷之四

又方

用鯊魚膽。生白礬。生綠礬。輕粉。水銀。麝香。各半兩。
研不見星。為度。每服一錢。井華水下。取下五色涎。
為妙。聖濟總錄

又方

用烏蛇三條。蒸熟。取肉。焙研為末。蒸餅丸。米粒大。
以喂烏雞。待食盡。殺雞。蒸熟。焙研末。酒服一錢。或
蒸餅丸服。不過三五雞。即愈。治例

白花蛇膏 治大風惡癩

用白花蛇五寸酒浸去皮骨炙乾研黃一兩水
研勻以白沙蜜一斤杏仁一斤去皮研爛同煉為
膏每服一錢溫酒化下日三服先服通天再造散
待下去虫物乃服此除根三四方

又方

乳香一斤光明者細研入牛乳五盞茸草末四兩
瓷盒盛之安桌子上置中庭安劍一口夜于北極
下祝禱去盒子蓋露一夜次日入甕中蒸一頓飯
時止夜間依前祝露又蒸如此三次乃止每服一

醫門醫品

萬風

卷天 五

匙空心及午臨卧溫酒調服當有惡物出至三日
三夜乃愈也聖惠方

又方

大黃煨一兩皂角刺一兩為末每服二錢空心溫
酒下取出惡物如魚腦狀未下再服俟取下如亂
髮之蟲乃服通天再造散十便良方

又方

凌霄花五錢地龍焙僵蠶炒全蠍炒各七個為末
每服二錢溫酒下先以藥湯浴過服此出臭汗為

効驗古家方一方加蟬蛻七個

遍身風癩

石灰一斗淋汁煮荷葉三十枚微熟漬之半日乃
出數日一作良聖惠方

遍身白癩

蝮蛇一條勿令傷以酒一斗漬之糠火溫令稍熱
取蛇一寸和臘月猪脂搗傳或將蠟燒熟坐之當
有赤蟲如馬尾出他蛇亦可尉後方

又方

醫門醫品

萬風

卷天 六

水上小浮萍草煮濃汁浴之半月可効關經本草

又方

楓木燒存性研輕粉等分麻油調極妙經驗良方

又方

蒼耳葉荷葉等分為末每服二錢用溫酒下日二
服袖珍方

大風濕洗方

青蒿蘆艾忍冬藤蒼耳子桑條桃條柳條搥碎共
用水一桶煎兩三滾入炒鹽半斤間日一洗密室

中以屏帷之。洗出汗為妙。不過十次可愈。

又方

狼毒、秦艽等分為末。每服錢半。酒調下。日二服。
千金方

癩風鼻塌。手指彎曲。節間疼不可忍。漸至斷落。

蓖麻子一兩。去皮。黃連一兩。制豆大塊。以小瓶子入水一升。同浸。春夏二日。秋冬五日。以後每日蚤取蓖麻子一枚。劈破。面東以浸藥水吞之。漸加至四五枚。微利不妨。瓶中水盡更添。兩月後吃大蒜。

醫門醫品

癩風

卷之七

猪肉試之。如不發是効也。若發再服。直至不發乃止。
杜仁方

大風雙目昏盲。眉髮脫落。鼻鼻崩倒。

皂莢刺三斤。燒灰。蒸一時久。乾為末。食後濃煎大黃湯服三錢。一旬眉髮再生。目明。
本草綱目

大風惡疾。眉髮脫落。

桑柴灰。熱湯淋取汁。洗頭面。以大豆水研漿解灰味。或用熱水入綠豆。煮濯之。三日一洗頭。一日一洗面。不過十度愈。
聖惠方

又方

側柏葉九蒸。九晒為末。煉蜜九。梧子大。每服五丸。至十九。日三服。夜一服。酒下。百日即生。
聖惠方

大風眉鬚脫落。遍身頑痺。

禹餘糧二斤。白礬一斤。青鹽一斤。為末。罐盛固濟。炭火煨之。從辰至戌。候冷。研粉。埋土中。三日取出。每一兩。入九蒸九晒胡麻末三兩。每服二錢。荆芥茶下。日二服。
聖惠方

又方

醫門醫品

癩風

卷之八

黃檗末。皂角刺灰。各三錢。研勻。空心酒服。取下蟲物為驗。食白粥兩三日。服補氣藥數劑。各神効散。忌一切魚肉發風之物。取下蟲大小長短。其色不一。新蟲嘴赤。老蟲嘴黑。
存仁堂方

又方

楊花四兩。搗成餅。貼壁上。待乾取下。米泔水浸一時。取起。瓦焙研末。二兩。白花蛇。烏蛇。各一條。去頭尾。酒浸取肉。全蠍。蜈蚣。蟾酥。雄黃。各五錢。苦參。天麻。各一兩。為末。水煎麻黃取汁熬膏。和丸。梧子大。

硃砂爲衣每服五十九溫酒下一日三服以愈爲度集効良方

又方

蔓菁子四兩炒研醋和塗之聖惠方

又方

生半夏羊屎燒焦等分爲末生薑自然汁調塗聖濟方

大風瘡裂

大楓子燒存性和麻油輕粉研塗仍以穀煎湯洗

普門醫品

瘡風

卷八 九

之嶺南衛生方

預辟瘡癰

桃仁一斤吳茱萸青鹽各四兩同炒熟以新瓶密封一七取出揀去茱萸將桃仁去皮尖每嚼一二二十枚山居尤宜選奇方

楊梅瘡門

論舊名天泡今名楊梅其實一也本肝腎二經濕熱所致然由傳染而得者多濕勝者宜先導濕用

導水丸表實者宜先解表用荆防敗毒散裏實者宜先疎裏用黃連解毒湯表裏俱實者經表攻裏用防風通聖散虛者宜補用八珍湯加土茯苓

通治十五方

捷法 治楊梅瘡不問新舊不過旬日即愈

膽礬末白礬末水銀各三錢半入香油津唾各少許和勻坐無風處取藥少許塗兩脚心以兩手心對脚心擦磨良久再塗藥少許仍前再擦用藥盡即卧汗出或大便去垢口出穢涎爲驗連擦三日

普門醫品

楊梅

卷八 十

煎防風通聖散洗澡更服內疎黃連湯或荆防敗毒散愈後服導濕湯諸方俱見後

又方

冷飯團四兩皂角子七個水煎代茶飲者一二七日深者四七日見効筆峯雜興

搜風解毒湯 治楊梅瘡重者一月愈輕者半月愈

或服輕粉藥筋骨攣痛癰瘰不能動履者服之亦効用土茯苓一兩薏以仁金銀花防風木瓜木通白鮮皮各五分皂莢子四分氣虛加人參七分血虛

加當歸七分。水二大盃煎一盃溫服。一日三服。忌飲茶。及牛羊雞鵝魚肉。燒酒。發麪。房慾。蓋秘方也。
導水丸 治楊梅瘡初起。濕盛宜先用此丸。數服。並治便癰初起。腫痛。

大黃酒拌炒。黃芩炒各二錢。黑牽牛炒。滑石煨。各四兩。爲末。糊丸。梧子大。每服五十丸。臨卧溫水下。楊梅瘡初覺用之。蚤則不發。多用則不復着人。極妙。並治便毒。

羊角燒灰。核桃殼燒灰。等分。秤准研極細。每用錢。新門醫品 楊梅 卷八 土

半。好酒調。蚤晚各一服。三四日後毒從大便出。如膿血。卽減服。服至半月後。服八瓊湯六七劑。補之。荆防敗毒散 治一切瘡瘍。時毒。腫痛發熱。服此可以解散。

荊芥。防風。人參。羌活。獨活。前胡。柴胡。桔梗。枳殼。白茯苓。川芎。甘草。各一錢。水二鍾煎八分。食後服。黃連解毒湯 治積熱瘡瘍。喉腫作痛。煩躁飲冷。黃芩炒。黃連。黃連炒。山梔炒。各錢半。水二鍾煎八分。稍熱服。

內疎黃連湯 治全上

黃連。黃芩。各酒炒。山梔子炒。白芍藥炒。當歸酒浸。薄荷。桔梗。檳榔。甘草。各一錢。大黃連翹。各二錢。水二鍾煎一碗。入木香末五分調服。

楊梅惡瘡綻裂

大楓子燒存性和麻油輕粉研塗。仍以殼煎湯洗之。嶺南衛生方

又方

銀硃。輕粉。各一錢。黃蠟。清油。各一兩。化開和收。以新門醫品 楊梅 卷八 土

油紙攤貼。瘡痂自脫 本草綱目

又方

黑鉛。廣錫。各二錢半。結砂。蜈蚣二條。爲末。紙捲作小撚。油浸一夜。點之。照瘡。日二次。七日愈。集玄方

革薺湯 治先患楊梅瘡。服攻擊之藥。致傷脾胃。氣血筋骨疼痛。或久而潰爛成癰。綿延不愈。或成殘廢。土茯苓。每用一兩。以水三鍾煎至二鍾。去粗。不拘時代茶徐徐飲之。月餘卽安。有熱加炒黃芩。炒黃連。各一錢。氣虛加四君湯。血虛加四物湯。

外科發掘 四君方見 瘰癧門 四物方見 中風門

碧雲散 治楊梅結毒入于顛頂以致頭疼及脹者

鷺不食草川芎各一兩青黛二錢共為細末令患

者口噤涼水以虛管吹鼻隨其疼之左右取嚏為

効 經驗方

防風通聖散 治見論

方見二十一卷面病門

八珍湯 治見論

方見二十六卷癰疽門

普門醫品

楊梅

卷八

痔漏門

通治 痔 漏

蟲痔 內痔

論 巢氏病源云痔有五種曰牡痔曰牝痔曰脉痔

曰腸痔曰血痔又有酒痔又有氣痔皆由醉飽房

勞使動氣血而經脉流溢滲漏腸間衝于下部致

成諸痔久而不愈必變為漏○牡痔肛邊生瘡癰突

珠如鼠竅時出膿血○牝痔肛邊生瘡癰痛突出

如癰而血出○脉痔肛邊生瘡痒而復痛血出淋

瀉○腸痔肛邊腫核寒熱往來而血出或肛脫○

血痔因大便而清血隨出○漏痔其人酷飲而成

每飲即發腫痛流血○氣痔遇憂鬱忿怒立見腫

痛或血出

大端初生肛門成癰不破者為痔久而破潰膿血

黃水浸淫淋漓不止者曰漏漏久蟲生則為蟲痔

大便下血為內痔

丹溪曰治痔須治血為主大法用條芩黃連生地

槐角之類漏瘡須服補藥以生氣養血參耆歸朮

主之仍常以附子餅灸之令微熱不可令痛乾則

普門醫品

痔漏

卷八

易之再加再灸以肉平為度必須戒酒色方效

通治 七方

一切痔漏

用五倍子二錢為細末加水片少許研勻先以槐

花水洗輕拭留潤以藥搽之不過四五次愈

又方

早蓮草一把連根鬚洗淨石臼內搗如泥以極熱

酒一盞沖入取汁飲之相敷患處至重不過三服

保壽堂方

又方

苦蘆。苦蕒菜煎湯先熏後洗以熊膽蜜陀僧膽
礬片腦末敷之摘玄方

又方

銅青。蜜陀僧各一錢。麝香少許為末津和塗之齊
急方

又方

連翹煎湯熏洗。後以絳礬刀上飛過。同麝香研貼
之集効方

醫門醫品

痔漏

卷八 五

又方

馬兜鈴。于瓶中燒煙熏之日華本草

痔漏瘡疼不可忍

胡黃連末。鷲膽汁調搽之孫氏集効方

序二十七方

雌雄散 治一切痔瘡

木鼈子帶潤者雌雄各五個尖者為雄圓者為雌

乳細作七丸。鹽覆濕處勿令乾。每以一丸唾化開

貼上其疼即止。一夜一丸自消微胡集簡方

又方

用油透舊羅段。帽簷燒灰。杭粉瓦上煨黃等分研
極細。磁碓收貯。用紅棗十五枚。甘草三錢。煎湯溫
洗。把乾搽之即効

又方

熊膽水化塗効。一切方不及也。即十餘年者亦効
外臺方

又方

夏月磚縫中生。出野園葵。搗貼之本草綱目

醫門醫品

痔漏

卷八 六

又方

歲靈仙三兩。水一斗。煎湯先熏後洗。冷再溫之。
科精義

又方

鉛白霜。片腦各半字。油調塗之。隨手効嬰童百問

又方

青膽礬煨研。蜜水調敷。即消直指方

又方

槐子未開者一升。枝梗及花瓣揀去。炒黃色。放

下一宿去火毒每早服四五錢清湯送下服至半

升除根

又方

葱延白蜜和塗先以木鼈子煎湯熏洗後塗上其
冷如水即効唐仲舉方

又方

隔年風乾橙子桶內燒煙熏之神効醫方摘要

切痔瘡

用蝸牛浸油塗之丹溪方

醫門醫品

痔漏

卷之七

又方

取蠟牛一枚放盆內入麝香少許次日取其水塗
之濟生方

又方

木鼈仁三枚鉢內搗如泥入百沸湯一盞乘熱先
薰後洗日用三次仍塗少許孫用秘寶方

又方

蜈蚣三四條香油煮一二沸浸之入五倍子末二
三錢瓶收密封用時以油點上瘡即止集効方

又方

用蠶金爲末水調塗之醫方摘要

又方

碧蟬花印鵝脂草投吹即効危氏得効方

又方

雞冠花鳳眼草各一兩煎湯頻洗本草綱目

又方

蛇床子煎湯熏洗愈簡便方

又方

醫門醫品

痔漏

卷之七

先以皂角燒煙熏之後以猪膽汁調白芷末塗之
即消醫方摘要

又方

公兒茶一錢麝香少許爲末津調塗之集効方

又方

片腦一二分葱汁化擦之簡便方

痔瘡初起

馬齒莧不拘鮮乾者熟急食之以湯熏洗一月內

外即愈楊氏經驗方

痔瘡

黃連赤小豆為末敷之 斗門方

又方

烏雞膽水研點洗 本草綱目

痔長寸許

用蜘蛛絲纏之即落 本草綱目

又方

槐花煎湯頻洗并服之 集簡方

治酒痔飲酒即發

醫門醫品

痔漏

卷八 九

絲瓜燒存性研末酒服二錢 最月軒方

(補) 十三方

治漏令管自出

刺蝟皮焙焦蜂房焙焦各一兩京墨一兩六錢黃

連一兩二錢去毛炒大黃九蒸九晒四兩槐角子

二兩人黑牛膽內陰乾連膽為末血竭六錢乳香

沒藥各三錢不見火以上各為細末每空心用四

錢水一鍾入猪板油四兩煎百沸調送藥下忌雞

魚色慾 馬鳴陽傳

痔瘡成漏

蓮蕊黑牽牛頭末各兩半當歸五錢為末每空心

服二錢忌熱物三十年者三服除根 孫氏方

又方

苦參煎湯日日洗之 直指方

又方

大露蜂房燒存性研搯之乾則以菜子油調塗

又方

五倍子煎湯熏洗久之自縮或以五倍子燒煙熏

醫門醫品

痔漏

卷八 十

之 直指方

又方

猪膽七個綿燕脂十個以膽汁泡洗擦七次即好

救急方

又方

大腹皮煎湯洗之 直指方

又方

用人牙灰油髮灰雄雞肫內黃皮各等分為末入

麝香輕粉少許油調敷之最能乾水生肌 直指方

又方

蜈蚣一枚陰乾入米片少許為細末紙撚蘸末入

孔內漸漸生肉藥自退出即愈 唐氏方

痔漏出血疼痛

槐花枳殼等分炒為末醋丸每二十九米飲下

又方

熊膽半兩入片腦少許研和猪膽汁塗之 毒瘡方

反花痔漏

木瓜為末鱈魚身上涎調貼以紙護住 醫林集要

醫門醫品

痔漏

卷六 五

痔漏翻花瀉血不止

用狐手足一付陰乾穿山甲蜎皮各三兩黃明膠

白附子五靈脂川烏頭川芎乳香各二兩剉細入

砂鍋內固濟候乾炭火煨紅為末入木香末一兩

以羌萎煎酒調下二錢日二服屢驗 永賴鈴方

蟲痔 十方

諸痔發癢

用全蠍不拘多少燒煙熏之即効 袖珍方

痔痒如蟲咬及痛

掘地作坑煑赤以酒沃之坑旁又二升入坑裏熱
坐有孔板熏之冷乃止不過三四度愈 肘後方

又方

白牽牛頭末二兩沒藥一錢為細末先日勿食晚

飯次日空心將猪肉四兩炙切片蘸末細嚼食之

取下白蟲膿血為効量入加減 儒門事親

痔痒有蟲

槐白皮煮濃汁先熏後洗良久欲大便當有蟲出

不過三度即愈仍以皮為末綿裹納下部 梅師方

醫門醫品

痔漏

卷六 五

又方

枇杷葉蜜炙烏梅肉焙為末先以烏梅湯洗後敷

之 集要

又方

蒸大棗取膏以水銀和捻長寸許以綿裹夜納下

部明日蟲當盡出 肘後方

又方

杏仁杵膏順敷之 孫氏集効方

下部蟲盛

用楊葉性第一十梓樹蒸極熱內小器內隔布坐

蒸之蟲盡死

下部蟲痛痒生孔竅

蟻卵七枚五月五日收者新牛糞半兩肥羊肉一

兩炒黃同搗細膏丸蓮子大炙熱綿裹納肛中半

日大便中即有蟲出三四度瘡集驗方

蟲蝕肛爛若見五臟則死

猪脂和馬蹄灰綿導入下部日數次瘡用後方

內痔七方

審門醫品

痔漏

瘻管

內痔不出

草烏爲末津調點肛門內痔即翻出乃以雌雄散

點之外科集驗雌雄散方見前

槐角內消丸 治內痔

槐角一斗搗汁晒稠苦參五兩爲末同煎至可丸

如梧子大每服二十九米飲下兼作槌子納下部

外臺秘要

腸痔出血

用葱白三斤煮湯薰洗良外臺方

痔漏下血多年不止

木賊枳殼各二兩乾薑一兩大黃二錢半並炒黑

存性爲末每粟米飲調服二錢國經本草

又方

益母草搗汁飲之食醫心鏡

又方

槐樹上木耳爲末米飲服二錢日三服肘後方

又方

蠶紙半張益內燒灰酒服自愈美養備急方

審門醫品

痔漏

瘻管

禿瘡門

論禿瘡由三陽經風熱所致或剃頭剪髮不慎風

寒風鬱生蟲痒而成瘡小兒多有之治法以清熱

殺蟲爲主其赤禿無髮者氣血虛也當補氣血則

自生詳見二十一卷鬚髮門

通治 二十七方

桃花散 治禿瘡

三月三日收未開桃花陰乾與桑椹赤者等分

末先以灰汁洗去癩以猪脂和塗之 食療本草

又方

五月五日取蒲蘆草燒灰猪膏和塗之 聖濟總錄

又方

貫衆研末油調塗并治漆瘡作痒 聖惠方

又方

百草霜和猪脂塗之 簡便方

又方

乾挑一兩黑豆一合爲末臘猪脂調擦 聖惠方

普門醫品

禿瘡

卷六 五

又方

白頭翁根搗敷一宿卽作瘡半月愈 肘後方

又方

板藍煎汁頻洗或以澉敷之最妙 聖濟總錄

又方

洗刮令淨以猪胞乘熱套上蟲出而愈 本草綱目

又方

黎蘆末猪脂搗和塗之 肘後方

又方

羌花爲末猪脂和敷 集効方

又方

溫水洗淨搔破用蚯蚓數條搗爛攤上其蟲聞腥上行俱入蚓內次日乾了剝下卽愈如蟲未盡再作一次更妙 經驗方

又方

采獨根羊蹄勿見婦女雞犬風日以陳醋研如泥生布擦去癩敷之日一次 肘後方

又方

普門醫品

禿瘡

卷六 五

羊蹄根切二升以桑柴灰水煮四五沸取汁洗之仍以汁和白礬末塗之 千金方

白癩頭瘡

炭燒紅投沸湯中溫洗之最効 百一方

又方

雞子殼七個炒研油和敷之 子母秘錄

又方

雄雞矢末和陳米醋洗之 千金方

又方

用羊骨髓調輕粉搽之。先以泔水洗淨。一日二次。數日愈。經驗方

又方

皂莢、棟樹子燒研。搽之。普濟方

又方

乾地龍爲末。入輕粉、麻油調搽。普濟方

又方

破朱、紅漆器。剥取漆朱燒灰。油調敷之。救急方

又方

普門醫品

禿瘡

卷八 七

芙蓉根皮爲末。香油調敷。先以柳枝煎湯洗之。醫學集成

梅花禿

瘡

清油一椀。以小竹子燒灰。入內煎沸。猪膽汁一椀。和勻。刺頭擦之。二三日卽愈。勿令日晒。普濟方

又方

蜂房切末。臘猪脂和。塗之。効。聖惠方

又方

用熊白敷之。本草綱目

乾濕頭瘡

白礬半生。牛煨。酒調塗之。生生編

頭瘡風濕諸毒

用五倍子、白芷等分。研末。搽之。膿水卽乾。如乾者。以清油調塗。衛生易簡方

禿瘡出膿。晝間夜合

馬蹄燒灰。生油調塗。聖惠方

普門醫品

禿瘡

卷八 天

東武王化貞元起父編輯

門人陳斌憲卿父較閱

臙瘡

腎厥風附
足趾諸瘡附

薛立齋曰臙瘡生于兩臙初起赤腫久而腐潰或津滲搔痒因而膿水淋漓蓋因肝腎二經虧損或陰火下流外邪相搏而致外臙屬足三陽濕熱可治內臙屬足三陰虛熱難治若患處黑黯肢體

普門醫品

臙瘡

卷九

畏寒飲食少思屬脾腎虛敗用八味地黃丸若燥用攻伐復損胃氣絕其化源治亦難矣

通治二十四方

夾紙膏 治一切臙瘡不問新舊神效

枯礬血竭兒茶沒藥黃丹炒五倍子炒銀硃輕粉

雄黃各爲末等分量瘡大小剪油紙二張夾藥于

內周圍以膏藥粘住上以針刺孔先將瘡口用葱

椒湯洗淨拭乾然後貼上以帛縛之三日一洗翻

轉再貼即愈經驗方

又方

官粉四兩水調入碗內艾葉燒煙熏乾乳香少許

同研香油調作隔紙膏反覆貼之集効方

又方

胡粉炒過研細桐油調隔紙貼之楊氏簡便方

又方

船船陳油灰煨爲末以人髮拌桐油炙乾研細仍

以桐油調作夾紙膏刺孔反覆貼之楊起簡便方

又方

普門醫品

臙瘡

卷九

一

黃蠟一兩熬化入銅綠細末七分用厚紙表裏

又方

過紙隔貼之出水炒亦治一切頑癬筆峯雜典

電心土年久者佳研細入黃礬黃丹赤石脂輕粉

又方

等分爲末清油調攤絹上夾貼之數日愈齊急方

黃丹飛炒黃蠟各一兩香油五錢熬膏攤油紙上

又方

先以葱椒湯洗拭乾貼之積德堂方

黃連爲末。用陳年臘猪油搗和。攤油紙上。先將葱
椒湯洗淨瘡口。拭乾貼之。至重者不過一月愈。屢
試屢驗。經驗方

又方

樟腦三錢。黃丹飛炒五錢。爲細末。先用猪脂一兩
熬淨。後將二味調勻。確盛封口。埋地一晝夜取出。
青布攤膏。溫茶洗淨貼之。每日一換。忌羊肉雞魚
燒酒。本草綱目

又方

船上舊油灰。瓦礫內煨過。研末。入輕粉少許。苦參
煎湯洗淨。拭乾敷之。邵真人經驗方

又方

羊屎燒存性。研末。入輕粉少許。搽之。集要方

又方

燒過人骨碎者爲末。搽之。壽域神方

又方

凡竭末。搽之。以乾爲度。救急仙方

又方

陳艾五錢。雄黃四錢。青布捲作大炷。點火熏之。熱
水流數次愈。筆峯雜興

又方

牛蹄甲燒灰。桐油和敷。海上方

又方

以鹽汁洗拭。刮虎骨末傳之。便氏圖纂

又方

柿市帶燒灰。柿霜等分。研傳之。甚効。筆峯雜興

瘰癧及一切瘡。日久不愈。瘡口冷滯不合

瘰癧

瘰癧

瘰癧

以艾燒煙熏之。仍燒艾湯洗之。經驗方

又方

銀硃飛一錢。千年石灰五分。松香五錢。香油一兩。

熬化入藥調勻。用好綿紙攤貼。應急良方

瘰癧熱疹

黃礬末一兩。輕粉三錢。猪膽汁調搽之。本草綱目

瘰癧黑爛

多年老杉木節燒灰。麻油調作隔紙膏貼之。絹帛

包定。數貼即愈。救急方

膝瘡有蟲蛀爛

乾馬齒莧研末。蜜調敷。一宿蟲自出。神效。海上方

又方

黃鱔數條打死。香油拌。腹蟠瘡上暴定。少頃痛不可忍。然後取下。看魚腹有針眼即蟲出也。後以人脛骨灰。油調搽之。奇効方

八味地黃丸 治見論

方見三十七卷產後諸證門

〔附腎臟風〕

普門醫品

腫瘡

卷五

〔論〕腎臟風。俗名血風瘡。屬腎虛風邪乘于膝脛。以致皮膚如癰。或漸延上腿。久則延及遍身。外證則搔癢成瘡。膿水淋漓。眼目昏花。內證則口燥舌乾。腰腿倦怠。吐痰發熱。盜汗體疲。治法用六味丸爲主。佐以四生散。則自愈也。

〔通治〕九方

血風瘡生兩股間。乃濕毒成風也。

黃蠟一兩溶化。入銀硃一兩攪成膏。夾紙刺孔貼之。簡便方。

又方

千年陳石灰研敷。痛即止。瘡即愈。神效。藍氏方

血風瘡生脚脛者

雄鷄脫皮。洗淨貼之。一日一換。十日愈。小山奇方

四生散 治血風瘡浸淫不愈。并治風癰疥癩。

白附子真者。黃耆。獨活。茯苓。俱生用。等分爲末。用

猪腰子一枚批開。入藥。濕紙包裹煨熟。空心連腰

子細嚼。鹽湯下。

脚肚風瘡如癰

普門醫品

腫瘡

卷六

桐油。人乳。等分調勻。掃之。效。次即愈。集簡方

脚肚生瘡。初起如粟。搔之漸開。黃水浸淫。痒痛潰爛。

遂至連脛而成痼疾。

酸石榴皮。煎湯冷定。日日掃之。愈乃止。醫學正宗

又方

先以貫衆煎湯洗拭。後以百藥煎研末。唾調。逐瘡

四圍塗之。自外而內。日一次。醫林集要

遍身生瘡。陰囊兩腿尤甚者

草烏一兩。鹽一兩。入水浸一夜。炒赤爲末。猪腰子

一個去膜煨熟竹刀切搗爛醋糊爲丸綠豆大每

服三十九空心鹽湯下

唐寮方

六味地黄丸 治見論

方見十三卷虛勞門

附足趾諸瘡

論脚上生瘡地僻位遠藥力難達然甲趾諸瘡患在皮肉猶可敷貼而愈惟脚跟爲腎脉發源之地腎經所過之處此處生毒最爲利害須用六味地黄丸等藥以滋化源不可易視

普門醫品

瘡毒

卷九 七

通治十七方

加減八味丸 治足跟生瘡發熱作渴嗽赤疼痛

熟地黄自製二兩山藥焙山茱萸肉焙乾各一兩

牡丹皮澤瀉酒蒸焙乾白茯苓各八錢厚肉桂去

粗皮五錢五味子一兩五錢爲細末不見鐵煉蜜

搗丸梧子大每用七十九五更溫酒或鹽湯下

補中益氣湯 治脚跟腫毒疼痛寒熱體倦食少

方見五卷內傷門

六味地黄丸 治脚跟腫毒火痛肺熱煩躁發渴

方見前

逍遙散 治婦人足跟生瘡日晡發熱經脉不調

方見三十九卷勞瘵門

甲疽生趾甲邊腫爛疼痛

蘭茹三兩黃耆二兩醋浸一宿漉出以猪脂五合

同煎取膏三合日三塗之即消

孟詵必効方

硃砂丹 治全上

硃砂乳香各一錢輕粉五分橄欖核燒存性黃丹

二分半各研細麻油調敷先用鹽湯洗過

普門醫品

瘡毒

卷九 八

甲疽弩肉膿血疼痛

乳香爲末膽礬燒研等分敷之四五次愈

靈苑方

又方

牡蠣頭厚處生研爲末每服二錢紅花煎酒調下

勝金方

甲疽或因割甲傷肌或因甲長侵肉遂成瘡腫黃水

浸淫五指俱爛漸上脚跌泡漿四起如火燒狀

皂礬五兩燒至汁盡研末色如黃丹收之每以鹽

湯洗拭用末厚敷之以軟帛緩裹之即汁斷瘡乾

每日一遍。鹽湯洗濯。有膿處拭淨。敷之。其痂乾處不須近。但覺急痛。塗酥少許。令潤。若痂脫。依前洗敷。或生白膿。泡擦破。敷藥。自瘡。外臺秘要

脚縫搔痒成瘡。有竅出血不止。

以多年尿桶燒灰。傳之。本草綱目

手搔瘡腫

鍋底墨研細。香油調搽。簡便方

脚上諸瘡臭爛

熟雞子黃一個。黃蠟一錢。煎油塗之。本草綱目

醫門新書

瘡

卷九

足瘡生蟲。南方卑濕人多患此。

用猪肚。或羊肚一個。去糞勿洗。切碎。石臼內搗如

泥。入枯白礬八兩。研勻。塗帛上貼之。須臾痒入心。

徐徐連帛取下。火上炙之。出蟲如絲髮者千萬。以

湯洗之。三日一作。不過數次。蟲盡瘡愈。詢岐神書

婦人足甲生瘡。惡肉突出。名臭田螺。

皂礬日晒夜露。每以一兩煎湯浸洗。仍以礬末一

兩加雄黃。硫黃。乳香。沒藥。各一錢。研勻敷之。醫方

摘要

女人甲內惡肉突出。疼痛。

蜈蚣一條焙研。爲末傳之。外以南星末醋和。敷四

圍。醫方摘要

婦人纏脚生瘡

荊芥燒灰。葱汁調傳。先以甘草湯洗之。摘玄方

婦人足瘡經年不愈。名裙風瘡

男子頭垢。桐油調作隔紙膏。貼之。簡便方

便毒

即魚口瘡

醫門新書

便毒

卷九

論便毒多患于勞役之人。或房慾不節。或慾心不

遂。或強固其精。或肝膽濕熱所致。須辯虛實。及

成否。不可槩用大黃之類下之。以求內消。人多欲

內消者。恐收之難也。若補養血氣。不旬日而收矣。

若膿既成。豈有可消之理。再用克伐之劑。反速其

禍

凡便毒初起作痛。急服內消之藥。仙人活命飲之

類。若膿成不潰。托而潰之。托裏消毒散。加皂角刺。

既潰不斂。補而斂之。十全大補湯。補中益氣湯之

類並須內外夾治。與癰疽治法畧同可參看。

薛立齋曰。便癰血疔也。屬厥陰肝經之脈絡。衝任督脈之隧道。故患此多在兩肋間。或腹中結塊。小便澀滯。苟治者得法。患者又能調攝。自然易潰易斂。若槩用大黃等劑。損其氣血。及不慎起居飲食者。皆為不治。

通治 二十六方。與二十六卷癰疽門兼治。

神燈 治便毒未成即消。有膿即潰。既潰即斂。外照兼服湯劑。共成其功。屢試屢驗者。

醫門警品

便毒

卷九十一

方見二十六卷癰疽門

雙解散 治便毒初起內蘊熱毒。外感寒邪。腫結疼痛。大小便秘者。宜先用此藥通解。

大黃煨。官桂白芍藥炒。牽牛炒搗。桃仁去皮尖。各一錢。澤瀉。甘草炙。乾薑炮。各五分水。二鍾煎一鍾。

空心服

隔蒜灸法 治便毒初起兼服仙人活命飲即愈。
方見二十六卷癰疽門

便毒初起

葱白切炒熱布包熨數次。却以葱根和蜜搗如泥敷上。以紙封之。外服仙人活命飲。即愈。本草綱目。

又方

大蜘蛛一枚。去足研爛。熱酒一碗。攪勻。空心服。隨左右側卧。取利不退。再服。必効。毒域神方。

又方

黃瓜蔓一個。黃連五錢。水二鍾煎一鍾。空心連服。効。永類方。

又方

醫門警品

便毒

卷九十一

黃葵子四十九粒。大皂角半挺。為末。以石灰同醋調塗之。永類方。

又方

牛旁子二錢炒研。入蜜一匙。朴消一匙。空心溫酒服。袖珍方。

又方

皂角子七個研末。水服。或照年歲吞之。儒門事親。

入方
肥皂角搗爛敷之。甚効。簡便方。

又方

蜈蚣一條。瓦焙存性。研末空心酒調服。得汗愈。清生秘覽

又方

用雞子一個。開孔八紅娘子六個。紙包煨熟。去紅娘子。食雞子。空心以酒送下。小便中出膿血即愈。積德堂方

又方

五倍子炒黃。研末。入百草霜等分。以臘醋調塗。

骨門藥品

便毒

紫雲圭

日一夜即消。香林摘要

又方

五倍子。用陳醋熬成膏。用布攤貼之。乾即換。三五次愈。本草綱目

又方

瓜萸一個。連殼帶肉。用水臼杵碎。加沒藥三錢。甘草一錢。當歸五錢。酒一盃。水一碗。煎八分。空心服。三服即愈。忌雞羊魚麪燒酒糟物。繆氏驗方

又方

貝母。白芷等分。為末。酒調空心服。或酒煎服。以渣敷之。効。永類餘方

又方

穿山甲半兩。猪苓二錢。並以醋炙研末。空心酒調服二錢。仍用穿山甲末。麻油輕粉和塗之。直指方
仙人活命飲。治便毒腫疼。未成即消。已成即潰。方見二十六卷癰疽門。

治便毒不拘已成未成。隨即消散

斑蝥三個。去足翅炒。滑石三錢。同研。作三服。空心

骨門藥品

便毒

紫雲圭

白湯下。日一服。毒從小便出。如疼以車前子炒。本通。澤瀉。猪苓。各錢半。水二鍾煎一鍾服之。東垣方

又方

葱涎。白蜜。和塗之。先以木鼈子湯熏洗。後塗上。其冷如水。一人苦此。蚤用之。午即安。唐仲舉方

又方

端午日午時。取樹上青胡桃。筐內陰乾。臨時連筐燒為末。空心黃酒服。少行一二次。有膿自大便出。無膿即消。二三服平。楊試經方

豆豉餅 治便毒已潰不飲

方見二十六卷癰疽門

托裏當歸湯 治便毒既潰發熱不飲

當歸黃耆鹽水炒人參熟地黃川芎白芍藥炒各一錢柴胡甘草炙各五分水二鍾煎一鍾空服便毒出膿不止

白膠香一兩爲末八麝香少許搽之 袖珍方

補中益氣湯 治見論

方見五卷內傷門

普門書

便毒

卷九 五

十全大補湯 治見論

方見二十六卷癰疽門

懸癰門

論懸癰俗名騎馬癰謂毒發于玉莖之後殺道之前屬足三陰虧損之證輕則爲漏瀝盡氣血而亡重則內潰而卽殞初起小便清滯用龍膽瀉肝湯熨腫痛甚仙人活命飲並以國老煎佐之雖患亦輕雖傷亦淺若膿已成急針之先服八珍湯補之

若用寒涼消毒則誤矣

此病治之不早鮮不傷生凡覺腫痛急用國老煎以殺其大勢仍用隔蒜灸法及神燈法潰而不飲者用附子餅灸或豆豉餅灸內服十全大補湯

囊癰謂腎囊生癰也屬陰道虧損濕熱不利所致故滋陰除濕藥不可缺腫痛而小便秘澀者行濕爲主滋陰佐之胃苓散加黃檗知母金銀花山梔候膿成急針之有針遲而陰囊大潰畢九懸掛者用十全大補湯有熱者龍膽瀉肝湯多得保全患

普門書

懸癰

卷九 六

者勿畏有潰而膿清及飲遲者並宜大補以附子餅或豆豉餅灸之始終治法與懸癰相同

通治

十四方與二十六卷癰疽門參看

國老煎 治懸癰生于殺道前後初發如米粒漸如蓮子數十日後赤腫如桃或已潰者并治囊癰

橫紋甘草四寸截斷以溪澗長流水一盃河水井水不用以火慢慢煎水炙之自蚤至午令水盡爲度劈視中心水潤乃止每用一兩細剉用無灰好酒二小盃煎至一盃溫服次日再服便保無虞待

二十日方能平復。急欲痊愈者。須用神燈照法。及獨蒜灸法。共成其功。未潰即消。已潰即斂。李迅方托裏消毒散。治懸癰。囊癰。未成即消。已成即潰。潰者印斂。極爲穩當。

仙人活命飲。治懸癰。囊癰。初起。或已成而未潰者。二方俱見二十六卷癰疽門。

懸癰初起

紡車絃燒灰。傳之。時珍方

龍膽瀉肝湯。治懸癰。腫痛。小便赤澀。又治陰囊腫。

醫門醫品

懸癰

卷元 七

痛。或潰爛。疼痛。及羣丸懸掛。

龍膽草酒拌炒黃色。澤瀉各一錢。車前子炒。木通。

生地黃酒洗。當歸尾酒洗。山梔炒。黃芩炒。甘草。各

五分。水二鍾煎八分。食前服。大便秘者加大黃。

囊癰腫痛。小便赤澀。

車前子二錢微炒。製甘草二錢。即國老煎製法水

通。山梔。澤瀉。龍膽草。赤茯苓。各一錢。當歸尾酒拌

生地黃。金銀花。皂角刺。白芷。各八分。水二鍾煎一

鍾。空心服。

加味小柴胡湯。治囊癰初起。腫痛發熱。

柴胡一錢半。黃芩八分。半夏七分。人參五分。黃連

炒。青皮炒。各八分。金銀花一錢。白芷七分。水二鍾

薑三片煎一鍾。空心服。

附子餅。治懸癰。囊癰。既潰。氣虛不能收斂。或爲風

邪所襲。以致不斂。皆宜用此。

大附子炮去支脂。研末。以唾津和爲餅。置瘡口處。

將艾炷于餅上灸之。每日灸數壯。但令微熱。勿令

痛。餅乾加津和。以瘡口紅潤爲度。內服十全大補

醫門醫品

懸癰

卷元 八

湯。無不愈者。

囊癰潰爛。或羣丸懸掛。

用紫蘇葉研細末敷之。即生肉。薛氏驗方

神燈照法。治見論。

八珍湯。治見論。

隔蒜灸法。治見論。

豆豉餅。治見論。

四方俱見二十六卷癰疽門。

胃苓散。治見論。

方見第八卷泄瀉門

下痢門

論下痢屬肝經濕熱下注。或陰虛火燥。實者用龍膽瀉肝湯。虛者用補中益氣湯。以滋化源。加炒山梔炒龍膽。及麥門冬。

玉莖腫疼。及生瘡。小便淋瀝者。並用龍膽瀉肝湯。氣弱體虛倦者。用清心蓮子飲。

通治

醫門醫品

下痢

卷九 九

珍珠散 治下痢瘡如神

枯白礬。雄黃飛。珍珠煅。黃礬。官粉煅。各爲末等分。和勻。先以米泔水洗淨。後摻藥。

經驗方

又方

米泔洗淨。兒茶。胡黃連。等分研細敷之。一方去黃連。加輕粉。冰片。各少許亦妙。

纂奇方

又方

紅褐。乾桃奴。各燒存性。各五錢。蘆甘石煅紅淬醋中。浸七日。二錢五分。共爲細末。臨用入冰片少許。

用葱椒湯洗淨。搽上

又方

破絲網燒存性。兒茶。各等分研末。先以濃茶洗淨。卷之。三四次効。忌生冷房事發物。

集簡方

又方

舊傘油紙燒灰。出火毒一夜敷之。便生痂。

油珍方

又方

五倍子。枯礬。等分研末。先以苦茶洗過摻之。

全切

心鑑

醫門醫品

下痢

卷九 十

又方

輕粉三分。盧甘石煅五分。腳指甲燒。鳳凰衣燒。各二分。研極細末敷之。

又方

生白果。研塗之。

趙原陽方

又方

五倍子。花柳去子炒。各一錢。細辛焙三分爲末。先以葱湯洗淨。搽之。即生肉。

各書同要

又方

取鍋蓋黑垢同雞腔胚黃皮蠶繭燒灰枯礬等分
爲末米泔洗後頻敷之

本草綱目

又方

蠶蛻燒灰三錢輕粉乳香少許先以溫水洗淨敷
之

儒門事親

陰頭痔蝕

雞內金不落水拭淨新瓦焙脆出火毒爲細末先
以米泔水洗瘡搽之亦治口瘡

又方

醫門書品

下痔

卷元 主

白海肥三個煨紅研末搽之

簡便單方

又方

雞蛋殼炒研油調敷之

杏林摘要

又方

橄欖燒存性研末油調傳之或加孩兒茶等分

坤生意

又方

地骨皮研爲末先以漿水洗後敷上生肌止疼

生寶鑑

碧珠散 治下疳腐爛痛極難忍及湯潑火燒皮損
肉爛疼痛不止者

珍珠新白者一錢入豆腐內煮數滾取出研極細
無聲加青缸花

卽旋缸浮沫

水飛過五錢真輕粉

一兩共研極細磁礮收貯下疳用甘草湯洗淨猪
脊髓調搽諸瘡不生皮者可乾搽婦人陰蝕瘡及
小戶嫁痛搽之俱効

大盧會丸 治下疳潰爛作痛焮腫及小兒疳積發
熱口臭生瘡牙齦蝕爛并蟲蝕肛門腫痒

醫門書品

下痔

卷元 主

胡黃連黃連醋炒盧會木香白蕪荑青皮醋炒白
雷丸鶴虱草各一兩麝香一錢爲末蒸餅糊丸桐
子大每服一錢空心米湯下

下疳潰爛

用頭髮鹽水洗去油再用清湯洗晒乾燒灰米泔
洗瘡拭乾傳之卽生肌

又方

棗核七個燒研髮灰等分貼

全切心鑑

又方

蠶繭一個盛頭垢。再以一繭合定。煨紅出火。毒研
搽。不日而愈。楊氏方

又方

陀拔燒灰。水澄過。入雄黃丹等分。爲末。搽之。龔氏
經驗方

妬精下疳

訶子燒灰。入麝香少許。米泔洗後搽之。或以荊芥。

黃檗甘草。馬鞭草。葱白。煎湯洗亦可。夷堅志

陰蝕欲盡

醫門醫品

下疳

藥丸 重

蝦蟆燒灰。兔屎。等分爲末。敷之。肘後方

又方

杏仁燒黑。研成膏。時時敷之。永類鈴方

治下疳。玉莖蝕去。用此完好如初。只少元首。縱舌被
咬去。用此藥尚可長全。

黑鉛五錢。化開。卽投水銀二錢五分。研不見星。入

寒水石三錢五分。真輕粉二錢五分。好硼砂一錢。

共爲極細末。先用葱艾花椒煎水洗患處。若怕洗。
將湯入瓶內。將龜頭向瓶口熏之。止了疼再洗。拭

乾。搽藥。若治舌咬。先以乳香沒藥煎水。口噙止痛。
後上藥卽長。醫全方

陰頭生瘡

甘草蜜炙爲末。頻頻塗之。神效。千金方

又方

牛蹄甲燒灰。油調敷之。醫集備錄

又方

絲瓜連子搗汁。和五倍子末。頻傳。丹溪方

陰莖生瘡痛爛者

醫門醫品

下疳

藥丸 舌

豉一錢。蚯蚓濕泥二錢。爲末。水和敷之。乾卽易之。

忌熱食酒蒜芥菜。藥性論

陰頭生瘡人不能治者

鼈甲一枚。燒研。雞子白和服。千金方

男子陰瘡。不忌月事。行房以致陰莖潰爛者

室女血氣。瓦上燒存性。研末。麻油調敷。本草綱目

又方

盧葁石火煨醋淬五次。一兩。孩兒茶三錢。爲末。麻
油調敷。立愈。醫真方

清心蓮子飲 治見論

黃芩炒黃耆炙人參赤茯苓麥門冬石蓮子去皮
心各一錢地骨皮車前子微炒各五分甘草炙四
分水二匙煎八分空心服

龍膽瀉肝湯 治見論

方見本卷癰癤門

補中益氣湯 治見論

黃耆蜜炙人參去蘆白水炒各一錢當歸陳皮甘
草炙各八分升麻柴胡各四分薑棗煎服

醫門醫品

下疳

癰疽

諸瘡門

論諸瘡名狀最為龐雜自各門而外又有脫疽謂
毒生于足指節潰而骨節自脫也亦有生于手指
節者名蛙節重者節脫輕則筋攣有代指謂指
頭腫痛甲際潰爛重生新甲相代也 有天蛇頭
瘡謂指上生毒腫如蛇頭也亦曰發指 有對口
瘡謂毒發于項後窩中前與口對失治則腐筋斷
喉 有瘰癧謂瘡雖合傍有膿眼出膿不止故名

瘰也 有瘰癧多生四肢累累如赤豆也 有癰

瘡膿潰深陷如雀啄也 有黃水瘡多生頭面亦

名肥瘡 有火帶瘡繞腰生瘡色赤也 有膿泡

瘡盈盈裹水成膿也 有髮毛瘡生于頭上如菊

菊狀也 有浸淫瘡膿水淋漓延生不已也 有

狐刺瘡有孔刺痛也 有蛇纏瘡繞腰生瘡如粟

粒也 有似癰瘡癢甚結頑痂剥之還生爬搔不

禁也 有坐板瘡生臀上癢痛也 有天柱瘡貼

脊生瘡赤色出水也 有天火瘡初起似沸漸成

醫門醫品

諸瘡

癰疽

泡皮脫如火燒也 有燕窩瘡生眉間也 有漆

毒瘡畏漆之人見漆及聞漆氣則生瘡癢疼 有

馬汗瘡身原有瘡近馬汗及聞馬氣因而毒發腫

痛也 有風水瘡謂瘡未愈傷于風水更發腫痛

也 有無名瘡謂惡瘡不經見人所不識也 有

頑瘡謂瘡歷年不愈肉寒口冷頑不結痂也諸門

所不勝載故總附于此以便檢查云

通治 九十二方

脫疽蛭節不拘腫潰

蛭也

手足酸指痛不可忍

用壁間土蜂泥爲末。乳香少許研勻。以醋調塗乾。卽以醋潤之。奇効方

又方

烏梅肉搗敷之。或以仁搗爛和醋浸之。李機奇方

地榆煮汁漬之。半日愈。或以葱葉煮汁漬之。亦良。
千金方

對口惡瘡

又方

二次即愈 經驗方

諸唐

卷五 天

硃砂爲末。唾和麪作指籬。粘硃于內。套指上。一日。

又方

卽瘥千金方

用熱雞血頻塗之。卽散。

天蛇頭瘡。生手指頭上。腫如蛇頭者。

又方

蜈蚣一條燒煙熏一二次或爲末猪膽汁調塗之

猪頭骨燒存性研每溫酒調服三錢便民食療

奇効方

對口惡瘡已潰出膿

又方

非地蚯蚓搗爛涼水調敷

水蛇一條去頭尾。取中截似手指長。剖去骨肉。勿

一切瘰癧不拘蜂瘰鼠瘰

令病者見以蛇皮包手拊自然束緊外以紙裹之

鍊成松脂末填令滿日三度

覺遍身清涼其病卽愈數日解視蛇皮內當有二

又方

蟻燒末醋和敷之 千金方

又方

蜥蜴二枚酒炙地膽斑蝥各二十枚各同糯米炒為末蜜丸小豆大每服二丸白湯下 鬼遺方

又方

古塚中石灰研細醋調厚敷之 千金方

又方

啄木鳥一隻火煨存性研末每服二錢酒下 姚大

又方

諸瘡

卷九

露蜂房一枚炙黃研末每以一錢用臘豬脂和塗 肘後方

又方

桃花為末豬脂和敷之 千金方

又方

白鮮皮煮汁服一升當吐如風于而愈 肘後方

兒瘰

貓兒眼草連根采來倒放鍋內水一碗煮爛先撈

出科搜再煮葉極爛濾淨熬成膏夜露一宿將蠟攤貼其枝梗曬乾燒之不可使腳踏恐令再發

鼠瘻潰爛

鼠一枚亂髮一雞子大以三年陳臘豬脂煎令消盡以半塗之以半酒服不問之妙法也 葛氏方

鼠瘻核痛未成膿者

以柘葉搗塗炒槐炭之氣透即消 集驗方

瘰癧生手足肩背繫繫如赤豆剝之汁出

鯽魚一個長三四寸者亂髮如雞子大一塊豬脂

又方

諸瘡

卷九

四兩同煎膏塗之 千金方

又方

用枸杞根葵根葉煮汁煎如飴隨意服之外以豬膽汁塗之 千金方

瘰癧惡毒

臘月飴糖浸水晝夜敷之自愈 千金方

又方

莖臺菜葉煮汁服一升并食其菜數頓少許搗醬冬月以子研末水調服 千金方

又方

髮灰米湯調服二錢外仍以髮灰三分皂刺灰二分白及一分爲末乾摻或以猪膽汁調敷髮須用生人者直指方

又方

皂角刺燒存性研白及少許爲末敷直指方

又方

蔓菁子熟搗帛裹展轉其上晝夜勿止肘後方

療瘡作痛

諸瘡

諸瘡

卷元 三

雀屎燕窠土土等分研傳之直指方

療疽已潰

車軸脂和梁上塵敷之外臺秘要

濕癩瘡

燕窩土托子處研末淡鹽湯洗拭乾傳之小品方

又方

取荆瀝日塗之深師方

足上癰瘡

桃花食鹽等分杵勻醋和敷之肘後方

黃木瘡

真栢油二兩香油二兩熬稠擦之如神精德堂方

又方

官粉煨松香各三錢黃丹一錢飛炒枯礬二錢爲末剪綿紙條卷藥作撚香油潤透點着火滴油于磁器內於地上出火毒指蘸擦之數次即愈屢試屢驗者毋忽之 仰其人方

又方

燕窩土一分麝香半分研敷之普濟方

諸瘡

諸瘡

卷元 三

又方

羊苗曬乾燒存性研擦即真人經驗方

又方

寒食節收桃花爲末食後以水半盞調服二錢日三服甚良 崔元亮海上方

火帶瘡速服生者

剪春羅花或葉搗爛蜜調敷爲末亦可證治要訣

膿泡瘡

柳絮膩粉等分以麻油調塗普濟方

又方

絲瓜取汁調官粉傳之 本草綱目

又方

荷花瓣貼之 簡便方

又方

雞子黃熬油搽之甚効 唐瑤經驗方

又方

蓮蓬燒存性研末并華水調塗 海上方

雞毛瘡生于頭上如葡萄狀疼甚者

諸瘡

諸瘡

卷元一五

黃檗一兩乳香二錢半為末槐花煎水調作餅

子貼之 普濟方

浸淫瘡滿頰滿項濕爛延兩耳痒而出水發渴不定

用凌霄花并葉煎湯日日洗之 仁齋直指方

又方

以雞冠血塗之日四五度 肘後方

又方

用胡燕窩中土研末水和敷之 葛氏方

浸淫惡瘡自心起者不治遍身則殺人

秫米炒令黃黑為末敷之 肘後方

又方

五倍子末津調塗之 普濟方

狐尿刺瘡

麝末和獨蒜杵碎納瘡孔中蟲出愈 古今錄驗

又方

李葉杏葉搗汁點之 千金方

狐尿刺人腫痛欲死

用桑汁熱漬之冷即易 肘後方

諸瘡

諸瘡

卷元一五

蛇經惡瘡

雄黃為末醋調敷之 普濟方

又方

以生鐵浸水中數日頻塗之 譚野翁方

似癩惡瘡十年不愈者

莢若子炒焦研細油調敷之 千金方

又方

蛇蛻一條燒灰猪脂調敷仍以溫酒調服 千金方

又方

自死蛇一條。水漬至爛。去骨。取汁塗。即愈。千金方

坐板瘡

絲瓜皮。焙乾為末。燒酒調搽。攝生衆妙方

天枉毒瘡。每生脊大椎上。如錢赤色出水。

驢蹄二片。胡粉炒一錢。麝香少許。為末。醋和塗。乾則搽之。聖惠方

天火熱瘡。初起似癰。漸如水泡。似火燒赤色。能殺人。

用雲薑根苗。蔓菁根苗。各三兩為末。或搗如泥。以雞子清和貼。即消。無蔓菁以商陸根代之。近効方

毒門醫品

諸瘡

瘡

天行發斑。狀如火燒。及豌豆瘡。頭面及身須臾周遍。

皆戴白漿。不治數日則死。皆惡毒之氣所為。

以蜜水煎升麻。時時服之。又以升麻汁。綿沾拭之。

葛洪肘後方

燕窩瘡

肥皂煨存性。枯礬等分為末。香油調塗。調摘玄方

又方

韭地蚯蚓泥。米泔水和成塊。煨過。入百草霜等分。

研末。香油調塗。摘玄方

瘡

黃連葉搗之。即愈。或煎湯洗之。亦効。本草綱目

又方

以生織浸水中。二三日。頻洗。愈。外臺秘要方

又方

乾荷葉煎湯洗之。集驗方

又方

芒消泡湯塗之。或白礬湯洗之。或以羊乳塗之。俱効。千金方

毒門醫品

諸瘡

瘡

又方

蟹黃塗之。或者蟹水頻浴之。經驗方

又方

白菜搗爛塗之。或以芥菜煎湯洗。或以楊花煎湯洗之。亦妙。本草綱目

洗之。

又方

以川椒煎湯洗之。譚氏方

馬汗入瘡

石灰敷之。摘玄方

驢馬汗毒傷瘡疼痛

枯白礬黃丹飛過炒紫等分研末敷之王氏博濟方

馬汗入瘡或馬毛入瘡腫入腹即殺人

以冷水浸之頻易水仍飲好酒立瘥或以沸湯頻洗之千金方

又方

用烏梅連核搗爛以頭醋和敷仍先刺瘡出紫血乃敷之縛定經驗方

風水傷瘡痛劇欲死

醫門書局

諸瘡

卷五

牛屎燒煙熏令汗出愈外臺秘要方

又方

青布于瓶內燒烟以口熏瘡惡汁出則瘥凡惡瘡以青布和蠟燒烟筒中熏之則不怕水藏器本草

又方

以耳垢封之一夕水盡出而愈經驗方

瘡犯惡露甚者殺人

薤白搗爛以帛裹烘熱敷之冷即易亦可搗作餅以艾灸之熱氣入瘡水出即瘥梅師方

又方

以桑條用漚火炮熱斷之以頭髮瘡上令熱冷即易蓋二條則瘡自爛仍取韭白或薤白搗敷急以帛裹之有腫更作千金方

無名惡瘡人不識者

用死蜚蠊杵汁塗之廣利方

又方

巴豆三十粒麻油煎黑去豆以油調硫黃輕粉末頻塗取効普濟方

醫門書局

諸瘡

卷五

又方

蟾酥一錢白麝二錢硃砂少許并華水調成錠如麥粒大每用一錠并華水服如瘡勢緊急連服五七錠葱湯服之汗出即愈本草綱目

又方

黃蠟香油各二兩黃丹半兩同化開頃冷瓶收攤貼王仲勉經驗方

水沉金絲膏 治無名惡瘡

白膠香瀝青各一兩以麻油黃蠟各二錢半同溶

化入冷水中。扣于通。難貼。偏門事親。

毒瘡惡腫。叫號不得眠臥。人不能別者。

獨蒜兩顆。搗爛。麻油和。厚敷瘡上。乾即易之。屢用。

救人無不神効。本草綱目。

頑瘡

蒲公英。搗爛敷之。救急方。

多年頑瘡。百方不瘥。或腫。或癢。不已。

取馬齒莧。搗爛。敷上。不過三兩遍。此方出于武元。

衡相國。因苦脛瘡。痛痒不可堪。自治無効。得此方。

普門醫品

諸瘡

卷九 三

愈。本草綱目。

廣瘡

雄黃一錢半。杏仁三十粒。去皮。輕粉一錢。爲末。洗。

淨瘡口。以雄猪膽汁調上。二三日即愈。積德堂方。

穿掌腫毒。

新桑葉研爛。傅之。即愈。通至論。

普門醫品卷之三

東武王化貞元起父編輯。

門人陳斌憲卿父較閱。

金瘡門

鐵刀不出。附。竹木刺傷。

論金瘡。以止血定痛爲主。出血不止者。急宜止之。

若去血過多。身體強痙。口噤不能言。似中風者。宜。

大補氣血。不可作中風治。若箭頭不出。瘀血在內。

流入腹者。急用破血之藥。逐去惡血。可無後患。

普門醫品

金瘡

卷三

通治四十八方。

凡殺傷未透膜者。用此即愈。

乳香沒藥。各皂角子大一塊。研末。以小便半盞。酒。

半盞調藥。通口服。然後用花蕊石散。或石灰散。傳。

上立止。徐氏醫統。

花蕊石散。治一切金刃箭鏃所傷。或流血不止。或。

瘀血不散。昏運疼痛。用此即愈。

花蕊石一兩打碎。硫黃四兩。罐盛。鹽泥固濟。火煨。

半日。研末。搽患處。並用熱酒童便調服一錢。其血。

化為黃水無不立愈。詳見下折傷條。薛氏醫案

石灰散 治刀箭傷止血定痛

石灰、韭菜共搗作餅。乾為末。敷諸傷。血止痛定。端

午日製之尤妙。經驗方

沒藥散 治全上

風化石灰、定粉各一兩。枯礬三錢。乳香、沒藥各一錢。另研細末收貯。用時乾摻之。外科精義

治一切金瘡

石灰羅細。用臘月黃牛膽汁和。納入膽中。陰乾。研

金瘡神驗方

金瘡

卷二

為末敷之。殊勝草藥。又倉卒無藥。以石灰羅細

裹之。止血定痛。又速愈。瘡深不宜速合者。入少滑

石末最驗。但不宜見水。反能爛肉。肘後方

金瘡神驗方

用炭為極細末。入松香等分。鍋內化開。攪勻冷定。

臨時為末敷之。經驗方

又方

古石灰、新石灰、絲瓜初生兩葉者連根用。韭菜根

各等分。搗一千下。作餅陰乾。用時為末擦之。止血

定痛生肌如神。董炳集驗方

又方

生薑嚼敷。勿動。次日即生肉。甚妙。扶壽堂方

又方

白僵蠶炒黃研末敷之立愈。斗門方

又方

新桑白皮燒灰。和馬糞塗瘡上。數數易之。若腹破

腸出。即以桑白皮縫之。以雞血塗上神効。唐安金

藏以此法得活。百一選方

金瘡神驗方

金瘡

卷三

金瘡磕損折傷疼痛不止

用葱白、砂糖炒熟研爛。封之。疼立止。更無痕痕。葱

葉亦可。百一選方

又方

用葱白連葉煨熟。或炒焙熟。搗爛敷之。冷即再易。

一人傷指血出淋漓。用之再易而疼止。次日遂愈。

凡殺傷氣未絕者。用此即活。經驗方

又方

生牛膝搗爛敷之立止。梅師方

又方

用青蒿葉搗封之。血止則愈

又方

用青蒿。麻葉。石灰。五月五日搗和晒乾。臨時爲末。摻之。肘後方

治刀箭傷血湧出不止

以鹽梅研爛敷之。卽止。大明日華

又方

黃丹。滑石。等分爲末傳之。凡金瘡且無用藥合口。

金瘡

金瘡

金瘡

恐潰傷好肉。宜用此。集玄方

又方

刮花葉石末傳之。卽合。仍不作膿。嘉祐本草

又方

晚蠶蛾炒。爲末傳之。卽止。勝金方

又方

地錦草。研爛塗之。危氏得効方

又方

石膏。松香。等分爲末。乾摻。勿經水。積德堂方

又方

雲母粉傳之。絕妙。事林廣記 製雲母法見藥物考

金瘡出血甚多。若血冰冷。則殺人

宜用炒鹽三撮。酒調服之。梅師方

又方

慈石末傳之。止疼斷血。千金方

又方

小薊苗。搗爛塗之。食療本草

又方

以嫩紫蘇葉。桑葉。同搗貼之。永額鈴方

金瘡

金瘡

金瘡

金瘡

又方

血竭末敷之。立止。廣利方

又方

柳絮封之。卽止。外臺秘要

又方

葱炙熟。按汁塗之。卽止。梅師方

又方

牡蠣粉敷之。肘後方

金瘡犯内血出不止

取所交婦人禪帶三寸。燒末水服。千金方

又方

用月經衣炙熱。熨之即止。藏器本草

金瘡出血不止及瘡口不斂

用壁錢頻貼之。極効。藏器本草

金瘡不合

五倍子。降真香。等分炒。研末敷之。皮肉自痊。名撮

合山救卒方

金瘡

金瘡

卷六

金瘡出血悶絕

蒲黃半兩。熱酒灌下。危氏方

金瘡悶絕不識人

琥珀研粉。童便調服一錢。三服瘥。鬼遺方

金瘡煩滿

赤小豆半升。醋浸一日。炒燥再浸。滿三日黑色爲

末。每服二錢。日三服。千金方

金瘡瘀血不出煩悶不止

大蔥白二十枝。麻子三升。杵碎。水七升煮一升半。

頭服當吐出膿血愈。千金方

金瘡惡心

白積柳四兩。橘皮一兩。爲末。每空心生蜜湯服二

錢。聖惠方

刀砍斷筋

旋菖根。即鼓子花。搗汁。瀝瘡中。仍以滓敷之。日三

易。半月斷筋即續。此方蘇景中療奴有効者。外臺

秘要方

又方

金瘡

金瘡

卷七

楓香末敷之。危氏方

陰莖割去流血疼痛

即以所割之莖。全酥炙乾。爲末。酒服。每一錢。數日

愈。頌湖方

腹破腸出。詳見折傷門

乾人糞研抹入。桑皮線縫合。熱雞血塗之。生生編

又方

以香油抹手送入。煎人參枸杞子汁。溫淋之。喫羊

腎粥十日。即愈。危氏得効方

又方

用油抹納入以慈石滑石等分爲末米飲調服錢半日再或慈石醋淬七次鬼遺方

刀斧所損接指方

用真蘇木末敷之外以蠶繭包縛完固數日如故攝生方

毒箭所傷

搗藍汁飲以渣敷之如無藍以青布漬汁飲之用後方

醫門書品

金鑑

卷八

又方

麻子仁杵汁飲或用真香油飲之亦妙肘後方

〔附錄〕刀傷十日方

刀箭入肉及刀傷出血處不出

藜麥爲末酒服二錢千金方

又方

杵杏仁敷之肘後方

金刃入骨不出

半夏白欬等分爲末酒服方寸匙日三服不過二

十日即出李全太白經

神應丹 治箭頭不出

端午前一日不語尋葦若科枝莖花葉全好者云先生你却在這裏道罷用柴灰自東南起圈了以木楔于掘根下周圍土次日日未出時依前不語用鐵取出洗淨勿令鴉犬婦人見于靜室中以石臼搗如泥丸彈子大黃丹爲衣紙袋懸高處陰乾遇有箭頭不出者先以象牙末敷瘡口後以緋帛裹一丸放臍中塊肚紫紫即便出也儒門事親

醫門書品

金鑑

卷九

又方

枯蔓根搗敷之日三易自出海上方

又方

用錫糖頻頻注之醫說良方

又方

以螻蛄杵汁滴上三五度即出千金方

箭鏃入肉不出

用螳螂一個巴豆半個同研敷傷處微痒忍之候極痒乃撼拔之以黃連貫衆湯洗拭石灰敷之

單方

又方

蜚螳十枚。土狗三枚。婦人髮灰少許。將蜚螳去殼。取白肉。與二味同研爲泥。生塗中箭處。少頃微痒。卽以手捉之。箭頭自出。

箭鏃入肉

大雄鼠一枚。取肉薄批焙乾。每服二錢。熱酒下。瘡痒則出矣。

箭鏃入骨不出

醫門醫品

金齋

卷十

巴豆七粒。微炒去皮膜。大蜚螳一枚。同搗爛塗患處。斯須痛定。覺微痒忍之。待極痒不可忍。乃撼動。拔之立出。外以生肌膏傅之。此方神効。凡諸瘡皆可療。楊氏家傳方

又方

天水牛取一角者。小瓶盛之。入硃砂一錢。同水數滴。在內待自然化水。取滴傷處卽出也。本草方

箭鏃入骨不可拔者

鼠一枚。熬取油。蜚螳一枚。新瓦上炙焦爲末。皂角

燒灰存性。定粉煨。龍骨煨。各一錢。乳香五分。另研爲細末。以鼠油熬成膏。敷瘡口內外。用礞石末蓋之。箭頭自出。

又方

花藥石煨七次。爲末。敷傷四圍。卽出。醫鑑

附竹木刺傷二十二方

諸竹木及針刺入肉不出者

生薑。橘皮。食鹽等分。研爲膏。塗之自出。

桂蠟丸 治惡刺入肉不出

醫門醫品

金齋

卷十

桂皮爲末。以黃蠟溶化。和桂末作丸。如豆大。遇刺以一丸置刺處。以濕紙五層搭定。以炭火炙蠟溶入肉內。其刺自出。無刺自愈。

又方

頭垢塗之卽出。思遠方

又方

刮人指甲末。用酸漿搗爛塗之。次日定出。聖惠方

又方

以人齒垢封之。卽自爛出。通變要法

又方

藍梅肉嚼敷之。即出。孟詵方

又方

松脂如乳頭者。研傳。帛裹三五日自出。兵部手集

又方

鹿角燒末。水調塗上立出。遲不過一夕。千金方

竹木入肉

蟬螬搗塗之。立出。肘後方

又方

普門書品

金瘡

卷下 三

酸棗核燒末。水服立出。外臺秘要

又方

瞿麥。水煎汁。日飲三次。或用玉。不日行爲未熱水

服二錢。兼以其根搗傳之。即出。

又方

白茅根燒末。猪脂和塗之。肘後方

又方

豨豆豉塗之。即出。千金方

又方

用葭菰根煮汁浸之。冷則易。神方也。

又方

乾羊屎燒灰。猪脂和塗。不覺自出。並治箭鍼入肉

神效。集驗方

蒿刺入肉

生嚼粟子敷之。外臺方

鍼入肉不出者

雙杏仁搗爛。以車脂調貼。其鍼自出。瑞竹堂方

又方

普門書品

金瘡

卷下 三

車軸脂。攤上如錢大貼之。二日一易。三五度即出。

或用牛膝根。嚼爛。卷之即出。集玄方

又方

以大醬烏翎三五根。炙焦研末。醋調敷之。數次即

出。甚効。集驗方

又方

象牙刮末。水和服之。即出。本草方

骨刺入肉

象牙刮末。水煮白梅肉調塗。自軟。齋家方

剥馬皮破骨刺傷。腫痛欲死。

用馬腸中屎尿搗敷。以尿洗之。大効。外臺秘覽

折傷

消腫止痛 行血止血
續筋接骨

張子和云。諸落馬墜屋打撲悶肺。一切損傷。及杖瘡腫發。喉痛不止。可峻下之。痛止腫消。後服和血散毒之藥。

玉機微義云。損傷一證。專從血論。須分其有無瘀血停積。及亡血之多之證。蓋打撲壓墜。皮不破而

醫門書中

卷五

內損者。必有瘀血。皮肉傷破者。亡血過多。一者治法不同。有瘀血者宜攻利之。亡血過多者補而行之。

凡手脚骨皆有兩脛。若一脛斷則可治。兩脛俱斷則不可治矣。

凡打撲損。刀刃傷損。便覺氣絕不能言。製藥不及者。均開口以熱小便灌之。妙。

凡肉裏有碎骨。只用黑龍散敷貼。後皮肉自爛。其碎骨自然出來。後方可愈。

凡服傷損藥。若未折骨。及骨碎者。不可用自然銅。宜去之。

凡損折整頓不得。必先服麻藥一貼。方可下手。好酒調此。少與服。若其人如醉。不可加藥。

凡墜損金刃石打諸般損傷至重者。皆先服熱小便。次服去血藥。

傷損肚皮已破。腸出在外。若腸全斷者難治。但傷破而不斷者皆可治。用花蕊石散傳線上。輕手從上縫之。莫待糞出。清油捻滑。放入肚內。用麻縷爲

醫門書中

折傷

卷五

線。或桑皮爲線。肚皮破者。亦用花蕊石散傳線上。從裏重皮縫。不可縫外重皮。留外重皮用藥摻上。待其生肉。

消腫止寒

二十方

花蕊石散 治一切跌打損傷。猪犬咬傷。或至死。急手傷處。摻藥。其血化爲黃水。再摻藥便活。

花蕊石一兩打碎。硫黃上色明者四兩研末。和勻于磁罐內密封口。以鐵線扎住。泥固候乾。安在四方磚上。磚上書八卦五行字。用炭二十斤。籠燒周

匪自辰時從下生火。先文後武至晚方息。經宿勿動。次蚤取出研細末。以淨磁確收貯。如內傷重者。血入臟腑。男子用熱酒童便。女人用醋與童便各半。調一二錢服之。血化為水。立効。若牛觸腸出未損者。急收腸入縫合。肚皮摻藥于上。血止立活。並不封裹瘡口。恐作膿血。如瘡乾以津液潤之。後摻藥。
外科精義

撲打損傷腫痛

香油煎過和酒服之。以火燒熱地卧之。覺即寒腫。

跌打損傷

折傷

卷六

俱消。有毆傷者用此法。及經官驗無痕迹。
濟急方

又方

童便入少酒飲之。推陳致新。其功甚大。一切傷損。不問壯弱。及有無瘀血。俱宜服此。若脇脹或作痛。或發熱煩燥口渴。服此一甌。勝似湯藥。不動臟腑。不傷氣血。萬無一失。軍中多用此。
外科發揮

又方

取新鮮葱漚火煨熱。剥皮搓爛。便將瘡損處仍多。煨熱。續易之。止疼如神。
傳信方

損傷疼痛

白礬末一匙。泡湯一盞。布蘸乘熱。搗傷處。少時疼止。然後排整筋骨。敷藥。
靈苑方

又方

鳳仙花葉搗如泥。塗腫處。乾又上一夜。血散即愈。冬月收取乾者研末。水和塗之。
通便要法

又方

五靈脂。白芨。各一兩。乳香。沒藥。各三錢。為末。熟水同香油調塗患處。
乾坤生意

跌打損傷

折傷

卷七

又方

卮子。白麩。等分同搗。塗之甚効。
良簡方

又方

雄雞一隻。刺血熱酒和。隨量飲之。痛立止。
青囊方

跌撲損傷疼痛難忍

黃麻皮。即火麻。燒灰。頭髮灰。各一兩。乳香五錢。為末。每服三錢。溫酒下立愈。
王仲勉經驗方

跌撲傷損及閃拗手足疼痛

生葱白。生薑搗爛。和麝少熱膏之。
良簡方

墜落車馬。或跌撲。筋骨疼不止

延胡索末。豆淋酒服二錢。日二服。聖惠方

磕損跌撲腫痛。或出血不止

葱白細切杵爛。炒熱敷患處。冷再易。神效。經驗方

損傷血出疼不可忍

雀瓢一名雞屎。搗水服。瘡口立効。袖珍方

又方

乾冬瓜皮一兩。真牛皮膠一兩。剉炒存性。研末。每

服五錢。好酒熱服。仍飲酒一杯。厚蓋取汗。其痛即

普門醫品

止。一宿如初。極効。摘玄方

打傷腫疼

無名異為末酒服。逐散毒血于四肢。即愈。集驗方

跌撲及壓傷。但有氣者。用此即活

抱雞卵已成形未出者。用黃泥固火煨存性。研末。

熱酒調服。被蓋出汗即愈。陳氏經驗方

顛墜拘攣

桑根白皮焙為末一升。煎膏敷之。疼便止。亦無添

血。終身不發。經驗後方

又方

黃芩子研末。酒服二錢。梅師方

折傷筋骨痛不可忍

生地黃一斤。薤白薑糟一斤。生薑四兩。切碎俱炒

熱。布裹。瘡處。冷即易之。此方係神龜所傳。極効。本事方

行血止血

一切傷損。從高墜下。及木石所壓。落馬墮車。淤血凝

滯。氣絕欲死者

普門醫品

淨黃土五升炒熱。以故布重裹作包。更互熨之。勿

大熱。恐破皮。痛止則已。神効。千金方

又方

取大嘴烏鴉右翅翎七根。燒研酒服。常吐血便愈。

或用胡粉一錢。熱水調服。亦効。肘後方

一切傷損。或為兵杖所加。木石所壓。血在胸背脇下

刺痛

青竹茹亂髮各一團。炭火炙焦為末。酒一椀。煮三

沸服之。三服愈。千金方

從高墜下瘀血在內

琥珀一錢。蒲黃二錢。研末酒服。日三服。外臺秘要

又方

大黃酒蒸一兩。杏仁去皮二十粒。細研。酒一盞。煎六分。雞鳴時服。至曉取下瘀血。即愈。三因方

又方

大黃當歸。爲末。每服五錢。酒下極効。和劑局方

打撲閃肭。皮不破。內作疼痛

蘿蔔。或葦。搗封之。牛膝搗敷亦妙。經驗方

普門醫品

打傷

卷三 手

又方

蒲席。臥者。燒灰。酒服二錢。或以蒲黃。大黃。當歸。赤芍藥。朴消。煎湯調服。血即下。甚効。甄權方

又方

白馬蹄。燒煙盡。研末。溫酒調服二錢。日二服。血化爲水。劉涓子鬼遺方

又方

蜚蠊二十枚。牡丹皮一兩。爲末。酒服二錢。血化爲水。備急方

打撲損傷。瘀血攻心。悶亂疼痛者

乾荷葉五片。燒存性。爲末。每服二錢。童子熱尿一盞。調下。日三服。利下惡物。爲度。聖惠方

又方

蒲黃末。空心溫酒服三錢。塞上方

又方

官粉。礪砂。等分。爲末。每服一錢。蘇水湯調下。仍頻飲蘇水湯。大効。接骨方

頭墜瘀血在腹。時時唾出者

普門醫品

折傷

卷三 手

乾藕爲末。酒服二錢。日二服。千金方

墜損跌傷。積血在心。嘔血不止

乾蓮花爲末。每酒服二錢。其効如神。醫方摘要

打跌損傷。肝肺吐血不止。或舌上有孔出血

生地黃八兩。取汁。童便五合。同煎熟。入鹿角膠炒

研一兩。分三服。本草方

跌撲傷損。瘀血淋漓者

三七嚼爛。卷之。即止。青腫即消。若受杖時。先服一

二錢。則血不沖心。杖後尤宜服之。本草發明

打撲淤血凝滯或作潮熱

大黃末薑汁調塗。一夜黑者紫紫者白。集簡方

一切損傷止血生肌令無痕痕

鹽藏楊梅和核搗如泥做成挺子以竹筒收之凡

遇破傷研末傅之神聖絕妙。經驗方

磕撲青腫

老黃茄極大者切片如一指厚新瓦焙研爲末欲

卧時溫酒服三錢一夜盡消無痕。勝金方

又方

跌打損傷

折傷

卷三

水調半夏末敷之一宿卽消。永類鈴方

玉真散 治打撲金刃傷及杖傷瘡傷皮破血出中

風四肢強痙角弓反張如癰狀者

天南星防風等分爲末水調敷之妙仍以溫酒調

服一錢已死心尚溫者童便調服二錢間歐堅壓

傷重酒和童便連灌三服自甦亦可煎服。三因方

跌打損傷

損傷接骨法

無名異甜瓜子各一兩乳香沒藥各一錢爲末每

服五錢熱酒調服小兒三錢服畢以黃米粥塗紙

上搽左顧牡蠣細末裹之竹篦夾住。多能鄙事

黑龍散 治跌撲折傷筋斷骨碎差爰出日痛不可

忍

穿山甲燒存性丁香皮各六兩土當歸二兩百草

霜半兩枇杷葉去毛半兩焙研爲末先用生葱一

大根剉芥土當歸各三錢煎湯熱洗患處拔伸整

頓令骨接續平正却用薑汁生地黃汁和勻將此

藥調稀稠得所以軟帛或皮紙量損處大小薄攤

跌打損傷

折傷

卷三

上貼之外用杉木皮片約如指大排令周匝小繩

三度繫縛之三日一次如前淋洗貼裹不可去夾

勿令搖動俟骨生牢穩方去夾則如故

又方

土鼈陰乾一個臨時旋研入乳香沒藥龍骨自然

銅火煅醋淬各等分麝香少許爲末每服三分入

土鼈末以酒調下須先整定骨乃服藥否則接錯

也亦可代杖。家傳秘方

又方

牛蹄甲一個乳香沒藥各一錢爲末入甲內燒灰以黃米粉糊和成膏放之

秘製方

又方

薑薑子一兩小黃米炒二合龍骨煨少許爲末醋調成膏攤紙上貼之

乾坤秘鑑

一釐丹 跌打損傷接骨至寶

血竭五分大生半夏末五分骨碎去毛六分土

鼈蟲肥大者一個銀石器盛火上焙乾五銖錢一

丈火燒紅醋淬利末再燒再淬以刮盡爲度半兩

骨門醫品

折傷

卷三 五

錢半文燒紅水淬刮末如上法俱研細

分酒少許入膽浸化并入前六味和勻爲丸如麻

子大約重釐許每用一九先將甜瓜仁七粒去油

同藥入口以黃酒送下隨量一醉神効扶前服卽

麻木不疼杖後服卽止疼消毒

江元陽方

又方

狗頭一個燒存性爲末熱醋調塗避風

衛生方

又方

五靈脂一兩茴香一錢爲末先以乳香末傳于極

痛處以小黃米粥塗之乃搽二末于患處

片子定三五日効

儒門事親

又方

大蝦蟆生研如泥劈竹葉縛其骨自痊

奚蒙傳急

跌撲傷損扭閃出骨等證

蠶沙四兩炒黃綠豆粉四兩炒黃枯礬二兩四錢

爲末醋調傳之細包縛定隔日一換三四次卽愈

忌見產婦 邵真人經驗方

又方

骨門醫品

折傷

卷三 五

合歡樹皮去粗皮炒黑四兩芥子炒一兩爲末每

二錢臨卧溫酒調服以渣傳之甚妙

百一選方

跌打骨折

白芨末二錢酒調服其功不減自然愈

永類方

折傷骨節離五

生蠐蛄爛熟酒領入連飲數碗以其相塗之半日

覺骨內有聲卽好乾蠐蛄灰酒服亦可

摘要方

又方

用鵬骨燒灰每服二錢酒下在上食後在下食前

骨接如初 接骨方

又方

用藏瓜藍帶一物入赤小豆末和勻。懸于斷傷處。以杉片或白桐片夾之。不過三日即愈。類編

折傷筋骨

接骨木半兩乳香半錢芍藥當歸川芎自然銅醋淬各一兩為末蠟四兩化開和勻。衆手丸如美子大。若止傷損酒化一丸。若筋骨碎折。仍用敷貼。衛生易簡方

普門醫品

折傷

卷三 美

接骨續筋止疼方

定粉當歸末各一錢礪砂末一錢半。每服一錢。蘇木煎湯調下。仍頻服蘇木湯。衛生易簡方

又方

米粉四兩炒黃入沒藥乳香末各半兩。酒調成膏。攤貼之。嘉祐本草

腦破腸出

腦骨破碎

蜜和葱白搗勻。厚封立効。用後方

脇破腸出

急抹香油納入。煎人參。枸杞汁淋之。喫羊腎粥十日愈。危氏得効方

腹傷腸出

以大麥飯飲洗腸。推入。桑白皮搓線縫住。飲粥百日愈。千金方

墜損腸出

以冷水噴其面。則腸自入也。嘉祐本草

麻藥 治損傷骨不歸窠者。此藥麻之。然後整頓。

普門醫品

折傷

卷三 美

牙皂木鼈子。紫荆皮。白芷。半夏。烏藥。川芎。川烏。土

當歸。各一兩。舶茴香。坐奴草。酒煎熟。草烏各半兩。

木香一錢。為末。每服一錢。好酒調下。麻倒任意整

理。如麻不倒者。加曼陀羅花二錢。和入藥內。若人

昏沉後。用鹽湯灌之。立醒。

杖傷門

論杖後飲童便酒一甌。即服邊成十二味飲一劑。以七真膏敷之。無不愈者。

先以童便和熟酒飲之或加紅花蘇木其功甚捷
若藥用攻利之劑所誤必多

胸滿或脇脹者宜行血更飲童便酒腹痛者宜下
血老弱宜行氣活血須分所患輕重有無淤血及
元氣虛實不可誤下蓋恐有傷氣血難于潰歛

(通治)

邊成十二味飲 治杖瘡破血止痛

當歸尾蒲黃紅花蘇木桃仁牡丹皮生地乳香沒
藥赤芍藥紫蘇各一錢大黃煨二錢酒一大鍾木

香附醫品

杖傷

卷下 天

一大鍾煎八分溫服

七真膏 治杖傷神効

乳香焙另研沒藥焙另研輕粉三七微焙乾兒茶
各三錢研極細木麝香四分片腦七分人肉共研
細瓶收聽用遇杖傷不可經湯水洗將前藥末用
好蜜調勻敷上薄綿紙蓋之如藥乾將蜜水潤之
有疔自化有毒自散只此一敷可愈不用更換

神仙九味膏 治杖瘡

生大黃四兩寒水石一兩四錢生半夏乳香各三

錢官粉火燒黃色四錢陳石灰七兩水片二錢麝
香一錢各為細末用生桐油調攤青布上杖後勿
以水洗即將此膏貼之二日一換至重者不過三
四貼全愈輕者不必用水磨

一切杖瘡

川芎當歸尾防風荆芥白芷三七僵蠶各一兩大
黃三兩黃藥一兩五錢木鼈子五十個補骨脂二
兩用水五六碗砂礪煎至二三碗濾淨去渣又用
血餘清水洗淨晒乾一兩蛇蛻蟬蛻天南星各三

香附醫品

杖傷

卷下 天

錢全蠍穿山甲龍骨生半夏各五錢大蜈蚣三條
象皮二兩入麻油三斤煎至汁全熬至象皮黑
色滴水成珠為度離火以棍攪尺餘長不住手攪
之俟火氣稍緩用黃丹水飛炒紫色二斤以細羅
篩入篩畢入潮腦四兩又俟火氣漸溫以兒茶血
竭各三錢乳香沒藥輕粉各五錢麝香三分水片
一錢共為細末投入冷定涼水浸之攤貼

杖瘡腫疼

官粉一兩赤石脂生一錢水銀一分以麻油調成

膏藥油紙貼之內潰者填滿紫藥

又方

雄黃二分蜜陀僧一分研末水調傅極妙救急方

又方

新石灰麻油調敷勿令見水仍用油洗或猪蹄湯

洗立効集簡方 猪蹄湯方見癰疽門

又方

滑石粉赤石脂大黃等分爲末茶湯洗淨以油紙

貼之即効趙氏經驗方

醫門醫品

杖傷

卷三 手

又方

大黃末醋調塗之醫方摘要

黃藥方

治杖傷撲跌及一切腫毒

大黃黃連黃藥黃柏梔子當歸象皮燒灰各一

兩酒醋一引五錢白及二兩共爲細末用蜂蜜調

擦患處止癢消腫驗方妙不可言霍氏經驗方

又方

綠豆粉炒研以雞子白調塗之生生酒

又方

竈心土爲末油調和即愈千金方

又方

五倍子去穢米醋浸一日火炒黃研末乾搽之

不使者醋調塗之衛生方

杖傷止癢不作瘡

黍米燒灰和油塗之孟詵方

治杖瘡不問已破未破俱効

生半夏爲末韭汁調敷止疼止血無痕

杖瘡未破只腫者用此消腫散毒

醫門醫品

杖傷

卷三 手

大黃無名異炒木耳灰各等分爲極細末用蜜水

調傅四傍腫處

又方

豆腐切片熱貼之頻易或以燒酒煮貼之色紅即

易不紅乃已拔毒方

又方

童便入雞子清內調黃土細末塗患處俟乾以熱

水洗去復刷復洗數十次以紫色轉紅爲度仍塗

兩勝以防血攻陰攝生方

杖瘡潰爛

乳香煎油搽瘡口即愈永領鈴方

又方

雞子黃炒油擦之甚効 唐瑤經驗方

生肌散

乳香沒藥兒茶血竭黃連澄過日正牡蠣各等分

片腦麝香少許共為末瘡口 霍氏經驗方

烏龍瓜 治杖傷有疥不化用此起之

猪蹄甲炒黃色三錢輕粉一錢瘡少許為細末

普門醫品

杖傷

卷三十三

瘡上 霍氏經驗方

杖傷折損割肌理骨用此昏昏如醉則不覺苦

七月采火麻子花八月采胡茄子花各陰乾等分

為末熱酒調服三錢少頃即麻不覺疼時珍方

白膏藥 治一切杖傷如神

真香油八兩熬熱雖火入黃蠟二兩攪化俟將凝

入官粉研細二兩雞子清二個冰片研細五分共

攪勻以煮過油紙攤貼凡受杖後勿着人手及用

水洗即貼此藥無不立愈王太初傳

紅膏藥

乳香沒藥兒茶血竭水片三七以上各二錢潮腦

二兩煉淨猪油半斤用大碗盛之入鍋內煮滴水

成珠離火候油冷入前藥攪勻用磁碗盛之各樣

癰疽一切刑傷俱効霍氏經驗方

鐵布衫 治情不由已事出不虞受害難免預服此

可不苦亦且保命

自然銅股紅醋淬七次乳香另研沒藥另研地龍

去土焙乾木鼈子香油擦炭火焙去皮無名

普門醫品

杖傷

卷三十三

服一丸溫酒化之

臨時再飲 一方加當歸蘇木

等分一方 坑上醋潑蒸一日用

狗聖散 治 不甚疼亦不甚傷

無名異為末溫酒服三五錢最妙蘇野翁試効方

東武王化貞元起父編輯

門人陳 斌憲卿父較閱

蟲獸傷門

虎狼 蛇虺 風犬 諸獸
蜂蟻 諸蟲 人咬肉 辟蟲附

論蟲獸之類具有角齒爪牙之利莫不有毒須視
其人之強弱審其毒之輕重而施治之黃石公曰
禽之制在氣故用其所不勝及其所畏此中真有
妙解則善醫者也

普門醫品

蟲獸

卷三十一

蟲獸傷人有其初不知者如射工蠃蟷之類有其
傷甚微者如毒蛇狂犬之類因循不治皆能殺人
須辨之于蚤折其方前庶易愈也

凡治蟲獸之毒須預儲藥如山居則有虎狼蛇虺
澤居則有蛟龍蜈蚣有陰無患在預以待之免至
臨事倉皇束手莫救

虎狼咬傷

虎狼咬傷及抵觸傷出者

急納入用桑白皮線縫之搽花藍石散血止立活

經方

熊虎咬傷

生鐵煮令有味洗之附後方

虎狼傷人

月經衣燒末酒服二錢日三服 蘇頌本草

又方

將三七塗之仍以米飲服二錢 集簡方

又方

但飲酒常令大醉當吐毛出而愈 梅師方

普門醫品

蟲獸

卷三十一

又方

蘆白搗汁飲之并塗之日三次 初 蘇頌方

又方

服生薑汁仍以汁洗之敷白礬末于上 外臺秘要

又方

乾薑末敷之 附後方

又方

水化沙糖一碗服并塗之 附後方

虎爪傷人

刺蝟脂。日日傳之。內服香油。本草方

又方

先喫清油一椀。仍以油洗傷處。濟急方

虎傷人瘡

蟻螫。搗爛塗之。唐璠經驗方

虎傷狗咬蜘蛛咬。蠅螬溺等傷

並用稀荇草。搗敷之。藏書本草

蛇虺。二十八方

蛇螫傷人。倉卒無藥

普門醫品

出驗

卷三十三

以艾炙數壯。最良。集簡方

又方

梳垢一團。尿和傳上。仍炙梳出汗。熨之。千金方

又方

蜈蚣炙研傳之。本草方

又方

以竹筒合瘡上。銹蠟灌之。効。徐伯玉方

又方

嚼蒜封之。頗易。仍以乳煎。空心頓服。孟詵方

又方

研銅青傳之。千金方

毒蛇螫傷

以閉口椒或葉。搗封之。肘後方

毒蛇螫傷。滿身紅腫。發泡

黃荊嫩頭。搗汁。塗泡上。祖會咬處。自消。談野翁方

又方

紫莧搗汁。飲一升。以粗塗之。集驗方

又方

普門醫品

出驗

卷三十四

薤白。搗汁敷之。徐伯玉方

又方

先以小便洗去血。以牙塗之。甚妙。醫方摘要

又方

紫蘇葉。搗敷之。千金方

又方

嚼鹽塗之。仍于傷處灸三壯。徐伯玉方

又方

令婦人尿于瘡上。良。千金方

蝮蛇傷人

薑末敷之乾即妨千金方

惡蛇傷

青木香半兩煎湯飲之袖珍方

蛇犬咬傷

以熱尿淋傷處日華本草

蛇蝎傷人

燒刀赤置白礬于上化汁熱滴之立瘥傳信方

又方

普門醫品

蟲獸

卷三十一

端午日將白礬一塊自蚤晒至晚收貯用時旋取

研末水調擦患處

又方

小蒜搗汁飲以渣敷之肘後方

毒蛇沙虱射工等所傷口噤眼黑手足僵直毒攻腹

內成塊迢巡不救

用蒼耳嫩苗一握取汁和酒溫灌之以滓厚敷傷

處即愈勝金方

毒蛇惡蟲射工等傷人口噤目黑手足僵直腹脹

白礬甘草等分爲末冷水服二錢瑞竹堂方

蛇咬久潰不愈

小茴香搗末敷之千金方

毒蛇咬人牙折在肉中疼不可忍

勿令人知用荇葉覆其上以物包之所折牙自出

肘後方

蛇骨刺人痛甚

死鼠燒傳之肘後方

蛇入七孔

普門醫品

蟲獸

卷三十一

剖母猪尾血滴入即出千金方

蛇纏人足

就令尿之即解肘後方

蛇繞不解

以熱湯淋之即脫千金方

〔風犬〕二十一

風狗咬傷此乃九死一生之病

急用璣瑩七枚以糯米炒黃去米爲末酒一盞煎

半盞空心服取小肉狗三四十枚爲効如數少

越五六日再服一次再越五六日又服一次連服
三次無狗形。瘡不再發。累試累驗。衛生易簡方

又方

大斑蝥七枚。去頭足翅。同糯米一斗。炒。去斑蝥。
別用七枚。如前炒。色變。復去之。又以七枚。如前炒。
至青煙爲度。去蝥。將米研粉。用冷水入青油少許。
空心調服一錢。須臾再進一服。以小便利下毒物。
爲度。未利再進。覺肚疼。急用冷水調青酸服之。以
解其毒。黃連水亦可。不可服一切熱物。醫方大成

普門醫品

蟲獸

卷三十一

七

又方

急于無風處。以冷水洗淨。卽服韭汁一盞。隔七日。
又一盞。四十九日共服七盞。百日忌食酸鹹。一年
忌食魚腥。終身忌食狗肉。方得保全。簡便方

又方

乾薑末。水服二錢。本草方

又方

陳醬塗之良。本草綱目

又方

飲生薑汁卽解。小品方

又方

虎骨刮末。水服二錢。并傳之。卽愈。小品方

又方

紫荊皮末。沙糖調塗。留口出氣。退腫。仍嚼嚙杏仁。
以去毒。仙傳外科

又方

紫蘇葉嚼傳之。千金方

又方

普門醫品

蟲獸

卷三十一

八

藜蘆。搗如泥敷之。仍絞汁服。立効。唐本草方

又方

雄黃五錢。麝香二錢。爲末。作二服。酒下。救急方

又方

膽礬。研末傳之。立愈。齊急方

又方

瓦松。雄黃。研貼。卽不發。生生編

又方

黃若子七枚。水吞之。日三服。或用根和莖。搗爛敷。

之。日三上。外臺秘要

又方

蓖麻子五十箇去殼入井華水研成膏。先以溫水洗咬處。乃貼之。袖珍方

惡犬咬傷

先以溫水洗淨。熱牛糞封之。卽時痛止。千金方

犬咬成瘡

蔓菁根搗汁飲之。肘後方

又方

普門醫品

蟲獸

卷九

白果仁嚼細塗之。本草方

又方

爛嚼杏仁塗之。寇氏方

犬咬瘡發

蠟炙溶。灌入瘡中。葛氏方

銅犬毒入瘡重發者

頭垢少許。納瘡中。用熱牛屎封之。本草方

諸獸 七方

馬咬成瘡。心中煩悶

馬齒莧煮食之。千金方

又方

獨頭果子燒研敷。並治熊虎爪傷。醫說

又方

益母草細切。醋炒研塗之。孫真方

猪鬃成瘡

松脂煉作餅貼之。千金方

又方

龜板燒研。香油調擦之。葉氏摘玄方

普門醫品

蟲獸

卷十

鼠咬成瘡

麝香封之妙。經驗方

又方

貓頭燒灰。油調敷之。以瘡爲度。趙氏方

蜂蠆 十七方

蜂螫螫傷

蟹殼燒存性。研末。蜜調塗之。證治要訣

又方

頭垢封之。本草方

又方

人尿洗之。醋調黃丹塗之。或嚼青蒿葉敷。肘後方

又方

野苧搗擦之。張文仲方

九里蜂及多年老蠍螫人毒痛欲死

皂角鑽孔貼傷處。就孔上用艾灸三五壯。即安。丹溪心法

又方

鮮薄荷葉搗敷之。經驗方

醫門醫品

蟲獸

卷五 土

蜂蠍所傷

獨頭蒜擦之即止。梅師方

又方

酥油塗之。聖惠方

又方

冷水洗青布搗之。頻易。或溫湯漬之。亦愈。千金方

又方

半夏末。水調塗之即止。錢中方

蜈蚣

醋磨大附子汁敷之。醫心方

又方

川椒末。津和塗之。麻即止。杏林摘要

又方

水調硃砂塗之。立愈。千金方

又方

苦杏仁。嚼塗之。古今錄驗

蜂蟻螫傷

反手取地上土敷之。醋調亦可。千金方

醫門醫品

蟲獸

卷五 土

又方

芋梗葉搗之。良。特珍方

一切蜂蠍蜘蛛等毒

米醋磨雄黃塗之。本草綱目

諸蟲

蜘蛛蜈蚣及一切蟲咬傷

大藍絞汁入雄黃麝香末貼咬處。神異之極。或以

香油擦之亦妙。錢中方

蜈蚣諸毒蟲所傷

用燈心蘸清油點患處重傷處三四次即止 經方

螻蛄尿 治一切瘡毒

鹽湯洗淨之或將鹽塗之愈 本草

蟹味交人成瘡

用酒洗淨貼之 二方

又方

蒜磨鐵錫全上即愈 經方

又方

雄黃研末油敷之 經方

膏門醫品

蟲獸

卷三 七

又方

脂麻研爛敷之或以油和鹽擦之亦妙 經驗方

蜘蛛尿瘡 初如粟粒漸大如火烙漿泡疼痛

茶末生油調敷藥至痛止 勝金方

又方

用葱葉去尖入蚯蚓一條在內待化成水取點咬

處即愈 兵部手集

又方

土蜂窠水調敷之 橘玄方

蜈蚣咬傷

雞冠血塗之 錢相公留中方

又方

胡椒嚼爛封之多能驅毒

又方

盡地作王字取字土摻之愈 集簡方

又方

蚯蚓泥傳之 集効方

又方

膏門醫品

蟲獸

卷三 七

醋磨生鐵敷之 龍中方

又方

棟樹枝葉汁塗之 楊起簡便

蜈蚣咬瘡

嚼小蒜塗之 肘後方

又方

灰見葉擦之即愈 肘後方

螻蛄尿瘡狀如茱萸中央白膿惡寒發熱此形似

蜈蚣短小六足咬尾能夾人

犀角磨汁塗之 千金方

又方

盡地作螻蛄形以刀掘取腹中土唾和塗之再塗
即愈 千金方

又方

官粉醋和塗之 千金方

又方

用雞屎塗之 丹溪心法

又方

普門醫品

蟲獸

卷五

故蓑衣結燒灰油和敷之 藏器本草

又方

槐白皮醋浸半日洗之 千金翼方

又方

烏雞翅毛燒灰油調敷之 領碎錄

射工毒瘡

大蜈蚣一條炙研醋和敷之 千金方

射工中人狀如傷寒發熱瘡偏聚一處異于常瘡
赤竟合莖葉搗汁飲一升日再服之 集驗方

又方

熊膽塗之更以雄黃同酒磨服即愈 斗門方

溪毒射工中人

知母搗爛投水絞汁飲一二升即無事夏月出行
宜多取其屑自隨欲入水先以少許投上沉便無
畏亦可煮湯浴之 肘後方

沙虱毒瘡沙虱在水中人澡浴則着人身鑽入皮內
初時皮上赤如小豆黍粟狀摩之痛如刺三日後寒
熱發瘡若入骨則殺人嶺南多此

普門醫品

蟲獸

卷五

即以茅葉刮去搗苦苣菜汁塗之 肘後方

諸毒蟲傷

青黛雄黃等分研細新汲水調服二錢 古方集驗

又方

紫草煎油塗之 聖惠方

毛蟲螫人赤痛不止

馬齒莧搗熟封之並治蜂螫蜈蚣等傷 聖惠方

蜈蚣咬人

醋和石灰塗之 聖惠方

蚯蚓咬人其毒若大風屑髮皆落

石灰水浸之良經驗方

又方

濃煎鹽湯浸數遍即愈經驗方

咬成瘡

蜜調麝香敷之廣利方

誤吞水蛭

藜蘆炒爲末水服一錢吐出德生堂方

又方

晉門醫品

蟲鼠

卷三 七

藍澱調水飲即瀉出普濟方

誤吞蜈蚣

刺猪羊血灌之即吐出三元延壽膏

附人咬三方

人咬傷瘡

龜板、鼈腦骨各一片燒研油調敷之葉氏摘玄方

人咬手指

瓶盛熱尿浸一夜即愈通便要法

人咬指爛欲脫者

鼈甲燒灰敷之葉氏摘玄方

附辟蟲十三方

辟除壁蟲跳蚤蒼蠅

龜板、白鱉魚骨、樟腦各五錢共爲末放末香內床

下燒之即絕或加雌黃等分尤妙

又方

昌陽燒烟熏之昌陽即臭蒲也陶弘景方

又方

棟葉燒研摻之鋪席下本草綱目

晉門醫品

蟲鼠

卷三 六

辟除壁虱

木瓜切片鋪之席下羅仙神隱方

壁虱蜈蚣

蕎麥糝燒烟熏之本草方

辟蚊法

鱉魚骨、夜明砂水上浮萍、棟樹花晒乾燒一次七

日蚊蟲不入家

燒烟去蚊

五月五日取浮萍陰乾燒熏之孫真人方

又方

龍骨。鯉魚骨。黎蘆。苦參。苦楝花。冬等分爲末。每日臨晚取一撮。燒之。蚊自飛去。臭蟲盡無。

熏衣去虱

百部。秦艽。爲末。于竹籠內燒烟熏之。自落。亦可煎

湯洗衣

經驗方

衣不生虱

白果三十個。去殼打碎。研入漿內。漿衣。永不生虱

頭上生虱

普門醫品

蟲獸

卷五 九

水銀和蠟燭油。搗之。一夜盡死。

摘玄方

又方

包銀硃紙。以盤覆燒之。茶清洗下煙子。揉擦頭上。

包裹一夜。至旦虱盡死。

積德堂方

陰毛內生蟲。或白或紅。痒不可當。

用銀杏嚼。搗之。或紙撚銀硃燒熏之。卽除。

本草方

湯火傷門

附錄

論薛立齋云。湯火之證。若發熱作渴。小便赤澀。用

四物山梔連翹甘草養陰血。以消毒。若患處肉未

死而作痛。用四君芳歸山梔連翹甘草。健脾胃。以

消毒。若患處肉已死而不潰。用八珍加白芷甘草。

補氣血。以排膿。如未應。加肉桂。如已潰而不收斂。

用四君加芳歸黃耆。健脾胃。以生肌。如未應。加炮

薑。若小兒患之。日割頭插等證。用四君加芳歸山

梔健胃。主以清肝木。

又云。初患此證。急用神効當歸膏敷之。輕者自愈。

重者自腐。良肉易生。其色赤者。乃火毒未盡。必搽

普門醫品

湯火

卷五 十

至色白爲度。倘患于肢節隱曲之處。敷此可免生

痂。傷碍新肉。復潰難痊。倘回祿煙熏致死者。以蓬

蒿搗汁灌之。卽甦。

通治 五十三方

神効當歸膏 治湯火傷初起。起泡熱毒。赤疼。痛。毒

氣壅盛。肉未壞者。用之自愈。肉已壞者。用之自潰。新

肉易生。搽至肉色漸白。其毒始盡。生肌最速。亦不結

痂。免皺揭之痛。殊有神効。若以涼藥敷貼。通火毒入

內。多致不救。

川當歸一兩。麻油真者四兩。懷生地一兩。黃蠟一兩。先將當歸地黃入油煎黑去粗。入蠟溶化攪勻。候冷即成膏。用塗患處。將紙蓋之。凡癰疽發背湯火一切潰爛者。用之尤妙。如洗拭換膏。必須預備。以新肉畏風。不可不慎也。

湯火傷灼

栢葉生搗塗之。或炮爲末以香油調擦。止痛生肌。
本草圖經

又方

醫門醫品

湯火

卷三 五

瓶盛真麻油。以筋夾取黃葵花。收入瓶內浸之。勿犯人手。密封。遇有傷者。以油塗之。甚妙。
經驗方

又方

大黃生研。蜜調擦之。不惟止疼。大能滅癰。
夷堅志

又方

白欬末敷之。
外臺方

又方

瓦松。生栢葉。同搗敷。乾者爲末。油擦。
醫方摘要

又方

苦參末。油調敷之。
衛生寶鑑

又方

甘草煎湯。入蜜塗之。
李校奇方

又方

舊葫蘆瓢燒灰敷之。
類集簡方

又方

五月五日。摘黃瓜入瓶內。封掛簷下。用時取水刷之。
醫方摘要

又方

醫門醫品

湯火

卷三 五

絲瓜葉焙研。入辰粉一錢。蜜調擦之。
海上名方

湯火傷。及花砲所傷

又方

生蘿蔔。搗汁塗之。子亦可。并飲其汁。良。
聖濟總錄

又方

煮狗汁。上浮脂。調銀硃塗之。甚効。
外科精義

又方

醋調黃土敷之。
談野翁方

又方

銀硃研細。菜油調傳二次。愈。
多能醫事

又方

細磁器打碎埋竈內置炭火于上一夜取出去火

毒為末入黃丹少許傳之立愈多能斷事

又方

官粉羊髓和研塗之孫真人方

又方

年久石灰研敷或加燭油調塗肘後方

又方

木炭研細末香油調塗齊急方

醫門醫品

湯火

卷五 三

又方

胡麻生研為泥塗之外臺方

又方

虎骨炙焦研傳之神効漢氏易簡方

又方

蒸餅燒存性研末香油調敷之未成瘡者急以醬

塗之極効肘後方

又方

蕎麥麴炒黃研水和敷之如奇効方

又方

粟米半生半炒研末酒調傳之崔行功纂要

又方

急以醋淋洗并以醋和蚯蚓泥敷之甚妙并無痕

痕本草綱目

又方

用薤葉與蜜同搗塗之即時疼止寇氏方

湯火傷瘡

青竹燒油同鐵鑊擦之積德堂方

醫門醫品

湯火

卷五 四

又方

卮子末和雞子清掃上救急方

又方

油調芙蓉末敷之奇効方

又方

水煎牛皮膠如糊冷掃上効上門方

又方

熟雞子黃五個炒取油入輕粉一錢攪勻掃上三

五日永除癰痕集驗方

又方

猪膽汁調黃礬末音末塗之外臺方

湯火傷灼未成瘡者

小麥炒黑研入輕粉油調塗之勿見冷水袖珍方

熱油灼傷

以臘猪脂煎栢白皮數沸取油塗上愈肘後方

又方

石膏末敷之良梅師方

又方

普門醫品

湯火

卷三

丹參八兩剉以水拌濕用羊脂二斤煎三沸以塗

瘡上肘後方

又方

以白蜜塗之梅師方

火燎成瘡防毒氣入心腹則不可救

白麴炒入梔子仁末和油敷之千金方

又方

白糖燒灰敷之即燥易瘡小品方

又方

用枸杞子葉搗汁服之立愈肘後方

又方

兔腹下白毛貼之毛落即瘡百一方

火毒瘡冬月好近火者火氣入內兩股生瘡其汁

淋滴

黃礬音末細末搽之即愈或以薄荷煎濃汁頻塗之

亦良法華醫說

火瘡未發

厄子仁燒研末麻油和敷之千金方

普門醫品

湯火

卷三

火瘡敗壞

雲母粉和生牛髓塗之製雲母法入鹽同搗細袋

盛接水中沃去鹹味懸風中乾成粉聖惠方

火燒悶絕不省人事

新尿填服二三升即甦千金方

灸瘡及火灼腫痛

薤白一升猪脂一斤切醋浸一宿煎三沸去渣塗

之梅師方

灸瘡不瘥痒痛

用楸葉頭及根皮爲末敷之 聖惠方

灸瘡不斂

尾松陰乾爲末，搗枝葱白湯洗，候乾之 濟生秘覽

又方

芙蓉花研末油敷之 奇効方

又方

車釭脂塗之 千金方

又方

烏賊骨、白礬等分爲末，日日塗之 千金方

晉門醫品

湯火

卷五 五

烟熏欲死

蘿蔔搗汁飲之 本草綱目

附凍瘡

二十六方

凍傷成瘡

用野雞脂塗之 本草方

又方

用臘月雀脂燒灰油調塗之 妙本草綱目

又方

以鹽殼燒存性，酒調塗之 本草綱目

凍瘡破爛

大黃末水調塗之 衛生寶鑑

手足凍裂

附子去皮爲末入麪水調塗之 藏書會試驗方

凍瘡欲墮

馬糞煮水漬半日，即愈 千金方

又方

山藥一截磨如泥敷之 簡明事親

手足凍瘡

晉門醫品

湯火

卷五 五

橄欖核燒研，油調塗之 乾坤生意

又方

老絲瓜燒存性和臘猪脂塗之 海上方

又方

生薑自然汁熬膏塗之 暇日記

又方

蜜炙黃芩，搗爲末，乳汁調塗之，立愈 儒門事親

冬月面手足皴瘡

麥藥煮取汁洗患處 本草綱目

又方

桐油一碗。髮一握。熬化瓶收。每以溫水洗令軟。敷之即愈。救急方

又方

葛蒸熟搗爛。本之。本草綱目

酒糟臘猪脂。鹽食鹽等分。研爛炒熱。擦之。覺甚痛。少頃即合。再擦數次。即愈。袖珍方

又方

普門醫品

湯火

蘇王 手九

川椒。水煮去粗。漬之。半食頃出。令燥。須臾再浸。候乾。以猪羊腦髓塗之。勝金方

又方

用白果嚼爛。夜夜塗之。本草綱目

又方

大楓子搗泥塗之。本草綱目

又方

五倍子末。同牛骨髓填抹縫中。即愈。醫方大成

又方

白及末。水調搽之。勿洗。濟急方

又方

以酒糟猪脂洗。并傳之。肘後方

又方

用兔腦髓生塗之。或用牛髓敷之。俱妙。聖惠方

又方

以醋洗之。研藕敷之。本草綱目

又方

濃煎黃蠟塗之。姚和仲秘訣

普門醫品

湯火

卷五 手

又方

甘草煎湯洗之。以黃連。黃檗。黃芩。爲末。入麝香。油調敷。譚莖翁方

海水鹹物所傷。及風吹膚裂。痛不可忍。

用蜜半斤。酒十五斤。防風。當歸。羌活。荆芥。各二兩。爲末。煎湯浴之。一夕即愈。徐氏醫案

東武王化貞元起父編輯

門人陳 斌憲卿父較閱

時毒

并腫

論時毒為四時邪毒之氣而感之于人也其候發于鼻面耳項咽喉亦腫無頭或結核有根寒熱頭疼恍惚不寧狀如傷寒五七日之間亦能殺人裏實而不利者下之表實而不解者散之表裏俱實

卷三十一

醫門醫品

而不解者解表攻裏表裏俱解而不消者和之甚者硬去惡血并用通氣散噤鼻內取嚏以泄其毒十日外自消若噤藥不嚏者不可治如嚏出膿血者治之必愈凡左右看病之人宜每日用嚏藥嚏之庶不傳染

通治 四方

通氣散 治時毒腫甚取嚏以泄其毒

玄參一錢五分猪牙皂角川芎各一錢黎蘆五分

羊躑躅花二錢五分為末用紙燃薰少許入鼻內

取嚏為度 外科秘傳

升麻黃連湯 治時毒腫痛或發寒熱

升麻當歸川芎各一錢五分連翹黃連牛旁子白芷各一錢水煎服

犀角升麻湯 治時毒疔腮一切風熱頭面腫疼咽喉不利

犀角升麻防風羌活各一錢白芷黃芩白附子各五分甘草六分水二鍾煎一鍾食遠溫服

梔子仁湯 治時毒腫痛大便秘結

梔子仁湯 治時毒腫痛大便秘結

鬱金枳殼升麻山梔炒各一錢水煎服

附疔腮

論疔腮屬足陽明胃經或外因風熱所乘或內因積熱所致若腫痛寒熱用荊防敗毒散腫痛內熱口乾者用犀角升麻湯若發腫焮痛連耳下者手足少陽經當清肝火若連頤及耳後者屬足少陰經虛火當補腎水不可泥于風熱執用剋伐

通治 六方

疔腮腫疼

附疔腮

論疔腮屬足陽明胃經或外因風熱所乘或內因積熱所致若腫痛寒熱用荊防敗毒散腫痛內熱口乾者用犀角升麻湯若發腫焮痛連耳下者手足少陽經當清肝火若連頤及耳後者屬足少陰經虛火當補腎水不可泥于風熱執用剋伐

陰經虛火當補腎水不可泥于風熱執用剋伐

通治 六方

疔腮腫疼

通治 六方

疔腮腫疼

陳石灰醋調厚敷之簡便方

拔毒散 治疔腮腫疼

蒲黃白芷半夏黃丹各一兩赤小豆二兩先將二味研細末入蒲黃黃丹再研勻金銀花藤搗自然汁和敷四圍頻以水潤之丹溪方

又方

鷄子白調赤小豆末時時塗之即消本草綱目

又方

栢葉搗汁調蚯蚓泥塗之丹溪方

普門醫品

時毒

卷三 三

顯頗赤腫及丹毒

赤小豆末和蜜塗之一夜即消或加芙蓉葉末尤

妙本草綱目

荆防敗毒散 治見論

方見二十八卷楊梅瘡門

癭瘤門

附疣贅

論癭瘤之病乃足陽明經與任脉氣血凝滯加以

憂鬱所致

五癭一曰肉癭其色不變軟硬中和二曰筋癭其

筋脉露出三曰血癭赤脉交結如纏紅絲四曰氣

癭憂愁腫甚喜樂漸消隨氣消長五曰石癭其中

堅硬如石不能轉移是也 瘡病有六一曰骨瘡

二曰脂瘤三曰肉瘤四曰膿瘤五曰血瘡六曰石

瘡

五癭俱不可決破決破則濃血崩潰多致天枉瘡

亦不可決破決破亦難醫肉瘤石瘡尤不可治治

則殺人惟脂瘤破而去其脂粉則愈不可不知

普門醫品

瘡瘡

卷三 四

丹溪曰治癭必須斷厚味

通治十六方

海藻酒 治癭

色海藻如亂髮而大一斤絹袋盛之以清酒二

升浸之春夏二日秋冬三日每服二三杯日三次

酒盡再作其粗晒乾爲末每服二錢日三服不過

一月即愈范汪方

瘰癧結核

昆布一兩洗去鹹味晒乾爲末醋糊丸如彈子大

養化熱汁 聖惠方

又方

牛蒡子根一升。水三升。煮取一升半。分三服。或為末。蜜丸。常服。 救急方

又方

黃藥子一斤洗剉。酒一斗浸之。每日早晚常服一盞。忌一切毒物。怒氣。即漸消瘦。 斗門方

又方

自然銅貯水甕中。逐日飲食皆用此水。其瘰自消。

普門醫品

瘰癧

卷三 五

仁齋直指方

又方

秫米三斗炊熟。取大葉白楊皮十兩。勿令見風切。

水五升。煮取二升。漬麴末五兩。如常法釀酒。每日

一盞。日再服。 本草綱目

開結散 治全上

猪脰四十九枚。係猪喉系下肉團。大如棗。微匾。色紅者是也。沉香二錢。真硃砂四十九粒。橘紅四錢。為末。臨臥冷酒調服二錢。徐徐嚥下。以除日合之。

忌酸鹹油膩 杏林摘要

又方

羊脰七枚陰乾。海藻二兩。乾薑桂心。昆布。水邊柳。各一兩。為末。蜜丸。莢子大。每一丸含嚥。 千金方

又方

羊脰猪脰。各二枚。昆布。海藻。海帶。各二錢。洗焙。牛旁子炒四錢。石。為末。搗二脰和丸。彈子大。每服一

丸。含化。嚥汁。 雖病治例

又方

普門醫品

瘰癧

卷三 六

鹹砂入水甕中浸之。飲食皆用此水。十五日一換。

沙。半年自消散。 直指方

又方

海藻。海帶。昆布。各一兩。廣茂醋。青鹽。各半兩。為末。煉蜜丸。如彈子大。每用一丸。食後嚥化。 丹溪方

項下卒腫欲成瘰

昆布。海藻。等分為末。蜜丸。杏核大。時時含之。嚥汁。 外臺秘要

腋下瘰癧

長柄壺蘆燒存性研末搽之以消爲度

集簡方

癰有瘡不可忍者。蝨癰也。一人病此。剖之出蝨無數。最後出二大蝨。一白一黑。頓愈。

用艾炙之。並以多年陳木梳燒灰傳之。

本草綱目

塗癰去瘰。先以針撥患處。然後點藥。

砒雄黃巴豆仁等分。蟾酥少許。研塗之。

丹溪心法

頭面上生癰及結核。大者如拳。小者如粟。或軟或硬。不疼不癢。不可輒用針灸。

生南星大者一枚。研爛。滴好醋二匙。乾者研末醋

膏門醫品

癰瘡

卷三 七

調。先以針刺令氣透。乃貼之。

濟生方

附癰瘡

論。癰瘡屬血燥筋縮。或怒動肝火。客邪淫氣所致。蓋

肝熱水涸。腎氣不榮。而筋攣也。宜滋腎水生肝血。

爲善。若專用蛛絲。蠅蟬蝕艾火灸。卽隨手而愈。

然生生不已。奈之何。

通治 十一方

頭上癰瘡

用小針十餘枚。縛作一束。于癰上亂刺。微見血。以

新南星醋磨。入麝香少許。日二次敷之。卽如梳。

半月全消。治癰瘡俱効。

濟生方

縮癰焦瘻

甘草煎膏。塗患處。四圍三次。別用芫花大戟。甘

遂等分爲末。醋調。另用筆塗患處中心。勿近甘草。

次日縮小。又以甘草膏塗小瘻三次。如前仍上藥。

于中。自然焦縮。

范氏得効方

癰瘡繫法

取稻上花蜘蛛十餘枚。放桃枝上。待絲垂下。取粟

膏門醫品

癰瘡

卷三 八

邊者。撚爲線繫之。七日一換。自消落。

總微論

點癰瘡法

藜灰。灰灰。蒿灰等分。水淋取汁。熬成膏。點之。卽去。

并蝕惡肉。

本草綱目

又方

麥楷灰。淋汁。煎石鹼。礦灰等分。至乾。爲末。以針刺

破。水調敷之。三日卽去。須新合者方効。

聖濟錄

又方

巴豆以石灰炒。信各一錢。糯米五分炒。研水調塗。

身面疣目

杏仁燒黑研膏。擦破日日塗之。千金方

又方

白礬地膚子等分煎水頻洗之。多能鄙事

又方

每月望子時以禿帚掃疣目上。三七遍。聖惠方

又方

牛口涎頻塗之自落。奚囊方

手足疣目

膏門醫品

瘰癧

卷三十九

白梁米粉。鐵鎚炒赤。研末。以衆人唾和。傅厚一寸。即消。肘後方

癩風門

汗斑附

論癩風有紫白二種。白癩風者。面皮頸項身體皮膚色變爲白。與肉色不同。亦不疼不痒。謂之曰白。

癩。係風邪搏於皮膚之間。氣血不和所生。紫癩風者。多在四肢或身上。成紫疙瘩。此爲風熱壅結。雨然治法並同。

濕熱鬱於皮膚。久而不散。發而爲斑。黑白相雜。遍

身花藻。名曰汗斑。久而不愈。則成癩風矣。雖無疾

痛害事。不可不防微而杜漸也。

通治十六方

玄參升麻湯。治紫白癩風及汗斑。內熱乾燥者。

玄參升麻各二錢。甘草一錢。水煎服。

白癩風

紅灰。槐五斤。茄子根莖三斤。蒼耳根莖五斤。並晒

乾。燒灰。以水一斗煎湯淋汁。熬成膏。別以好乳香

膏門醫品

癩風

卷三十九

半兩。鉛霜一錢。膩粉一錢。牛油二兩。和勻。每日塗

三次。即愈。聖惠方

又方

青核桃皮一個。硫黃五分。研勻。日日搽之。本草方

又方

硫黃。白附子。研末。以茄蒂蘸擦之。半月即効。白癩

用白茄蒂。紫癩用紫茄蒂。亦各從其類。本草綱目

又方

杏仁連皮尖。每蛋嚼二七粒。搗令赤色。夜臥再用。

此指聖濟總錄

又方

用韭菜上露。日旦塗之。本草綱目

赤白癩風

生薑頻擦之良。易簡方

又方

猪胆一具。酒浸。飯上蒸熟食之。不過十具。壽域方

癩風汗斑

夏枯草煎濃汁。日日洗之。乾坤生意

癩風

又方

端午日收紫背浮萍晒乾。每以四兩煎水洗。并以萍擦之。或入防已二錢亦可。袖珍方

又方

桑柴灰二斗。甑內蒸之。取金內熱湯洗之。不過五六度瘡。聖惠方

六度瘡

又方

羊蹄根二兩。獨科掃帚頭一兩。枯礬五錢。輕粉一錢。生薑半兩。同杵如泥。先以湯洗手。抓患處起粗

皮以布包藥。著力擦之。暇臥取汗愈。經驗方

癩風汗斑

用生薑片蘸信末。蜜陀僧末。擦之良久。用小便洗。過再用清水洗三次愈。

又方

用蛇蛻摩數百遍。令熱。葉草中勿回顧。外臺方

風白駁

蟬皮灰醋調塗之。聖惠方

又方

癩風

蜜陀僧為細末。以隔年醪醋調搽之。即愈。蘇氏方

丹毒門

論經曰。人身忽經變赤狀如塗丹。謂之丹毒。以風

熱惡毒所為

熱邪積久。鬱于皮膚。輕則發為小斑。重則發為丹

毒。其遊走不定也。為遊風。總為熱鬱。甚者防風通

聖散。輕則解毒。防風湯

徐氏曰。丹毒由火邪結熾。挾風而作。蓋熱毒搏于

榮血而風乘之。所以赤浮肌白而為之走注也。火與血皆主于心。若自內而外。走于四肢者。易治。自四肢而走心腹者。難治。甚則肌肉糜爛。大可畏也。敷之不散。宜用排針。刺出血。則愈。

薛立齋曰。丹毒為惡毒熱血。蘊蓄於命門。遇相火而合起也。如霞片者。須砭去惡血為善。如腫起赤色。遊走不定者。宜先以生麻油塗患處。仍砭之以泄其毒。凡從四肢起入腹者。不治。雖云丹有數種。治有數法。無如砭之為善。常見患之重者。不用砭。

普門醫品

丹毒

卷三 十三

法俱不救

潔古曰。斑疹之病。其為證各異。發焮腫於外者。屬少陽三焦相火。謂之斑。小紅靨行皮膚之中。不出者。屬少陽君火。謂之疹。凡斑證若自吐瀉者。多吉。慎無亂治。謂邪氣上下皆出也。小兒斑證。首尾不可下。便秘則微疎之。令邪氣不壅。并令其次弟出。使兒易禁也。

通治

二十方

防風通聖散

防風。川芎。當歸。白芍藥。連翹。薄荷。麻黃。各四分。石膏。桔梗。黃芩。各八分。白朮。梔子。荆芥。各三分。滑石。二錢四分。芒消四分。大黃五分。甘草一錢。生薑三片。水煎溫服。自利去消黃。自汗者去麻黃。

消毒犀角飲子 治斑丹癰疹。或癢痒。或作痛。及風熱瘡毒。

牛旁子二錢。荆芥。防風。各一錢半。甘草三分。水一鍾煎五分。徐徐服。

砭法

普門醫品

丹毒

卷三 十四

用細磁器擊碎。取有鋒芒者。筋頭夾之。用線縛。兩指輕撮筋頭。令磁芒懸對患處。離半寸許。另用筋一根。頻頻敲之。使磁芒刺破患處。血出則毒解。外科精義。

蟬針法治丹毒最妙

水蛭十餘枚。竹筒盛合腫處。使其啞之。取皮皺肉白為効。咬啞血滿自脫。更用饑者。治一切癰腫俱効。藏氣方。

解毒防風湯 治斑丹癰疹。或痒。或痛。

防風一錢地骨皮黃耆芍藥荆芥枳殼炒各二錢

水二鍾煎一鍾食遠徐徐溫服

金銀花散 治一切丹腫消毒止痛

金銀花黃耆鹽水浸炒當歸酒洗生甘草各等分

爲末每服二錢滾湯調服

黑末子 人面身卒得赤斑及療毒不治殺人

殺羊角燒存性研令極細雞子清調塗甚効

火焰丹毒

醋調陳石灰塗之或用酸調擦

又方

無名異末蔥汁調塗立消

又方

以酪和鹽煮熱摩之即消

又方

蒲席燒灰雞子白調塗之

又方

水調芒消末塗之

五色丹毒俗名遊腫或至死者不可輕視

榆白皮爲末雞子白和調塗之

赤遊丹毒忽然腫痒不治則殺人

野葡萄根搗如泥塗即消

又方

新生荷葉搗爛入鹽塗之

又方

薔薇葉搗敷隨手而消亦可搗汁服

手足紅腫熱如火炙

鐵鏽磨全之

丹毒

丹毒無常色及發足躁者

搗蒜厚敷乾即易之

因飲燒酒而發丹毒者

米醋飲一二杯即解此神妙之法

玄參丹麻湯 治丹毒

方見瘰癧風門

疥癬門

論五疥者乾濕蟲沙膿也五癬者濕頑風馬牛也

赤癬皆血分積熱蘊毒。起于皮膚浮淺者。亦深沉者。為癬。疥多挾熱。癬多挾濕。

亦有膿窠者。屬濕熱。乾疥屬火。屬風。碎而痒甚者。屬蟲。

癬亦有乾濕。皮肉癢。疹如錢子。漸漸增長。或圓或斜。有匡廓。痒痛不一。匡內生蟲。搔痒出汁。久久延及遍身。則成頑癬。

通治 五十四方

合掌丸 治一切疥如神

醫門醫品

赤癬

卷三十一

蛇床子。大楓子仁。木鼈子仁。樟腦。雄黃。各二錢。木銀一錢。各搗細。以油核桃仁和研為丸。龍眼大。以一九合掌搓少時。將藥收起。仍將兩手極力摩盪。令熱。以鼻嗅之。不過數次。愈。經驗方

治乾疥及癬甚妙

巴豆十枚。炮黃去皮心。右順手研。入酥少許。膩粉少許。抓破搽上。不得近目。并腎有誤犯者。以黃丹塗之。即無妨。甚妙。千金方

又方

羊蹄根。猪脂和搗入鹽少許。日塗之。外臺秘要

又方

猪膏煎荒花。塗之。肘後方

又方

生黃香。生白礬。相油各五錢。水銀二錢。鉛一錢。結砂研勻。搽之。神効。

又方

石灰淋汁洗之。數次。愈。孫真人方

又方

醫門醫品

赤癬

卷三十一

初生者。嚼鹽頻擦之。妙。千金翼方

風疽瘡疥

青竹筒三尺通節。着大豆一升在內。用磚閣起。以

馬糞糠火燒熏。以器兩頭取汁。搽之。先以泔清和

鹽洗之。不過三度。効。千金方

疥瘡痛痒

煮薤葉搗爛塗之。愈乃止。肘後方

膿泡疥瘡

相油二兩。水銀二錢。樟腦五錢。同研。頭入唾津。不

見星乃止溫湯洗淨瘡以藥敷搽唐經方

又方

硫黃五錢爲末以雞子黃一個煎油調擦極効救急良方

又方

黃香研細輕粉少許先以油塗瘡搽末在上二日便乾二三度愈鬼遺方

積年疥瘡

狼毒一兩半生半炒研末水銀輕粉各三錢茶末

普門醫品

疥癬

卷五十五

一錢磁器內以津液研化爲末和合一處用香油

浸藥高一寸待三日藥沉油清遇夜不見燈以指

蘸油塗瘡上仍以鼻于藥蓋上吸氣取効未類方

疥瘡積久不愈

斑蝥七個醋浸露一夜搽之永類方

疥癬滿身治不愈

何首烏艾葉等分水煎濃湯浴之甚妙博濟方

又方

苦楝根研末米醋調塗甚良煎湯洗風癰惡瘡

癩金効本草綱目

疥癬瘰癧治牛馬疥絕妙

商茹末三錢入輕粉五分香油調傳之多能斷事

獨聖散治一切癰瘡如錢如豆大者此藥神効

斑蝥二三枚去翅足用針刺于燈上燒存性

爲末醋調如泥以手抓癰擦藥即起泡出汁而愈

身而惡癬

姓合草入生禁研敷二三次斷根直指方

又方

普門醫品

疥癬

卷五十五

陳豆醬和人尿塗之千金翼方

又方

皂角肥者五兩炙去皮弦搗碎河水浸採取濃汁

砂鍋熬成膏黑牽牛炒令香研取頭末二兩以皂

角膏和丸梧子大每服三十五丸虛者二十九食

後溫水下愈後月服一次永無疥癬之疾東垣方

又方

螺螄二十枚少水養之澄清取泥槿皮一兩皂藥

煨紅三錢爲末和泥搗勻搽之螺須放去集效方

又方

韭根炒存性搗末以猪脂和塗之數度愈經驗方

頭面花癬

生白果仁切斷頻擦取効郭氏經驗方

又方

槿樹皮爲末醋調重湯頓如膠敷之經驗方

下體癬瘡

船船灰牛糞燒烟熏之二日一次即愈醫方摘要

脚上癬瘡

香門醫品

疥癬

卷三十一 五

白犬血塗之立瘥奇効方

荷錢乾癬

巴豆仁三個連油研泥以生絹包擦日一二次三

日全愈經驗方

又方

雄雞冠血頻頻塗之范汪方

乾癬積年不愈搔之黃水出陰雨即痒

用狼毒爲末香油調擦聖惠方

牛皮風癬

川槿皮一兩大楓子仁十五個半夏五錢各剉碎

河井水各一碗浸露七宿研入輕粉一錢用壳

掃塗覆以青衣數日有臭涎出且勿澡浴妙夏月

尤宜扶壽堂方

又方

川槿皮肥皂同煎濃汁以頻擦之或以槿皮汁磨

雄黃擦之治癬蟲痒甚妙簡便方

又方

牛蹄甲鹽糞各一兩燒存性研末油調抓破傳之

香門醫品

疥癬

卷三十一 五

五七日愈關氏經驗方

又方

生驢皮一塊朴消淹過燒灰油調擦之李機奇方

又方

舊皮鞋底燒灰入輕粉少許麻油調搽直指方

又方

雌黃爲末入輕粉和猪膏傳之直指方

又方

石榴皮藥明礬末擦之直指方

惡癬有蟲痒不可忍

葦荊子根搗爛蜜和敷之 千金翼方

又方

貓兒眼睛草。乾爲末香油調搽之 千金翼方

又方

海桐皮蛇床子等分爲末以臘猪脂調搽之 艾元英如宜方

又方

青槐枝燒取汁塗之 本草綱目

書門醫品

疥癬

卷三 三

又方

蚤起采帶露絲瓜葉七片逐片擦七下如神忌雞魚發物 攝生衆妙方

又方

五倍子去蟲白礬枯等分爲末油調搽之 簡便方

又方

日午搗桃葉取汁擦之 千金方

遍體癩癬痒

葛勒蔓一大捆水四桶煎數沸乘熱漬洗不過三

四次愈 書門醫品

又方

水銀胡粉等分研傅 外臺秘要

又方

銀硃牛骨髓桐油調搽 醫方摘要

又方

水銀燕麥酥油合傅之 同上

一切風瘡頑癬疥癩年久不愈者

黑魚一頭去腸肚以蒼耳葉填滿外以蒼耳安鍋

書門醫品

疥癬

卷三 三

內置魚於上少着水慢火煨熟去皮骨淡食

入塩醬功效甚大 醫林

又方

羊蹄根杵汁入輕粉少許和如膏塗之三五次即

愈 簡要濟衆方

惡癬瘡癩十年不瘥者

苦瓠一枚煮汁搽之日三度 肘後方

楊梅瘡愈後驚掌風癬年久不愈一擦如神

牛油和油香油黃蠟各一兩銀硃一錢二分宜粉

二錢。麝香五分。三味另研細。將油蠟溶化。入末調勻。抹患處。火烘再擦再烘。

又方

雌黃研細。醋和雞子黃調塗之。聖惠方

又方

以米醋熬嫩皂莢刺作煎。搽之。奇効。圖經本草

附錄

論癰瘡者。隱隱似瘡也。風氣挾熱。鬱于腠理。無從發散。出于皮膚。而為癰瘡。久而不退。且為丹毒。皆

疥癩

卷五十一

風熱之所鬱。不散而成也。

癰瘡未有不癢者。亦有無癢瘡而癢者。所謂風瘡也。熱癰似癰瘡。而非癰瘡。夏月多汗之人。常有之。蓋濕熱之氣所熏蒸也。甚者成瘡。

經曰。諸瘡為虛。肺主皮毛。肺氣不通而癢。宜防風參耆之類。補之。鬱熱生風。作痒。宜清熱疎風。涼血。防風通聖散妙。方見前丹毒門

通治 十六方

消風散 治風熱癰瘡癢。及婦人血風癢。或

皮腫痒。頭目昏眩。耳作蟬鳴。

荆芥穗。甘草炒。各一兩。陳皮焙五錢。人參。白僵蠶。

炒。茯苓。防風。川芎。藿香。蟬蛻。各一兩二錢。厚朴。

炒五錢。羌活。一兩。各為末。每服三錢。茶清調下。

癰溫酒下。

何首烏散 治脾肺風毒。鬱滯皮膚間。如蟲行癢。瘡

播痒。

胡麻。荆芥穗。苦參。何首烏。威靈仙。各等分。甘草。

減半。為末。薄荷湯下三錢。或酒調得汗妙。

風熱癰瘡

疥癩

卷五十一

浮萍蒸過焙乾。牛蒡子酒煮晒乾炒。各一兩。為末。

每薄荷湯服一二錢。日二次。古今錄驗

風癢癰瘡

鐵鏽磨水塗之。亦瘡以香油磨塗。最良。集簡方

又方

赤小豆。荆芥穗。等分為末。雞子清調塗之。

又方

巴豆五十粒去皮。水七升煮二升。以帛蘸拭之。隨

手愈 千金方

又方

楮樹枝葉煮湯洗浴 別錄

遍身風癢作痒痒痛不可忍夜不得睡

皂角二兩切水一升浸揉取汁熬膏和苦參末

梧子大每三十九食後溫水服極効 本草衍義

又方

白僵蠶焙研酒服一錢立効 聖惠方

又方

香門膏品

疥癬

聖王

楓香脂即白膠香煮水浴之良 唐本草

又方

蠶沙一升水二斗煮數沸去粗避風洗浴 聖惠方

治赤瘡

用蛇啣草搗極爛敷之即瘥 古今錄驗

風癢癰瘡及瘡癰

牛膝末酒服二錢 千金方

又方

蒼耳莖葉子焙為末每二錢豆淋酒調下 聖惠方

風癢遍身百計不愈

雲母煨為粉清水調服二錢良 千金方

附風癢十一方

身上虛痒

四物湯加黃芩一錢浮萍一錢煎服 丹溪纂要

又方

凌霄花為末酒服一錢 醫學正傳

皮膚間習習如蟲行痒不可當

牛旁莖葉煮汁浴之 孟詵本草

香門膏品

疥癬

聖王

又方

蜂房炙蟬蛻等分為末酒服一錢日三次 經驗方

又方

露蜂房煎汁入芒消傳之日五次 梅師方

又方

枳實醋浸火炙熨之即消 外臺秘要

遍身風痒欲生疥

茵陳煮濃汁洗之立瘥 千金方

遍身癢痒不止

薄荷、蟬蛻等分爲末。每溫酒調服一錢。永類鈴方

又方

吳茱萸煎酒拭之良。千金方

又方

用青箱莖葉熬水乘熱熏洗

腿彎足彎發痒。異常不可忍。搔破成瘡疼痛。名四彎風。一月一發。

用大麥一小升。砂鍋內桑柴火煮開。乘熱熏患處。

溫則洗之。日二作。四五次愈。楊氏經驗方

普門醫品

疥癬

卷三 手

附癩七方

夏月熱癩如瘡

蜜陀僧五錢。雄黃四錢。先以薑片擦熱。仍以薑片

蘸末擦之。次日即焦。活人心鏡

又方

早起取帶露黃瓜葉擦之良。經驗方

又方

石灰煨一兩。蛤粉二兩。甘草一兩。研撲之。集玄方

又方

綠豆粉。蛤粉各二兩。滑石一兩。和勻撲之。易簡方

瘡癩

水慈姑葉搗汁調蚌粉塗之。本草綱目

熱癩瘡痒

升麻煎湯頻飲。並洗之。千金方

又方

乾壁土爲末。擦之。隨手隨愈。普濟方

普門醫品

疥癬

卷三 手

東武王化貞元起父編輯

門人陳 斌憲卿父校閱

調經門

附經血妄行經閉

〔論〕初虞世云。女子十四天癸至。任脉通。月事以時。於是。有子。天癸者。物之自然。月者。以月至。經者。有常也。其過與不及。皆謂之病。若榮血虧損。不能滋養百骸。則髮落面黃。羸瘦燥熱。但助胃壯氣。則榮

調經

卷三十一

血生而經自行。須慎飲食。調七情。保神氣。庶可得生。

薛立齋云。先期而至者。有因脾經血燥。有因脾經鬱火。有因肝經怒火。有因血分有熱。有因勞役火動。過期而至者。有因脾經血虛。有因肝經血少。有因氣虛血弱。宜各明其因而治之。血。脾土主。血病當用苦甘之劑。以助陽氣而生陰血。大凡肝脾血燥。四物為主。肝脾血弱。補中益氣為主。肝鬱結。歸脾湯為主。肝經怒火。加味逍遙散為主。

〔通治〕

四物湯 治衝任虛損。月經不調。諸血證。隨用加減。

當歸身酒洗一錢半。熟地黃二錢。白芍藥酒炒。川

芩各一錢。水二鍾煎一鍾。溫服。○經候欲來。臍腹

絞疼。加炒玄胡。檳榔。苦楝。木香。○經水行時作痛。

血氣實也。加桃仁泥。炒黃連。炒香附。各一錢。○經

候過而作疼。血氣俱虛也。加人參。炒白朮。白茯苓。

炙甘草。各一錢。○經行過多。去熟地黃。加生地黃。

炒黃芩。炒白朮。各一錢。○經水溢少。加蘇花。紅花。

會門醫品

調經

卷三十一

各八分。○經行身熱頭昏。加柴胡。黃芩。各二錢。通

期紫黑有塊者。血熱也。必作疼。加炒香附。炒黃連。

各一錢。過期色淡者。痰多也。去熟地黃。白芍藥。加

製半夏。白茯苓。陳皮。各一錢。炙甘草八分。

經水先期而來屬血虛有熱

當歸酒洗。條芩。各一錢半。川芎。白芍酒炒。生地黃。

各一錢。阿膠炒成珠五分。黃連炒八分。甘草炙四

分。水一碗煎五分。空心溫服。色紫者加炒黃檗。

五分。成塊者加桃仁泥七分。蘇木五分。

經水後期而來屬血虛氣滯

當歸酒洗一錢半。川芎。白芍酒炒。熟地黃。香附製。蘇木各一錢。桃仁十四粒去皮尖研水通八分。紅花。甘草炙各五分。水二鍾煎一鍾。空心溫服。將來而腹痛者屬血實氣滯。加蓬朮八分。玄胡索一錢。行後作痛者屬虛寒。去香附。紅花。蘇木。加肉桂五分。艾葉八分。人參一錢。紫黑成塊者屬氣鬱血滯。加牡丹皮七分。玄胡索八分。色淡者屬痰。加製半夏陳皮。白茯苓各八分。

醫門醫品

調經

卷三

經水適來適斷或寒熱往來

先服小柴胡湯。去寒熱。後以四物湯和之。小柴

胡湯方見下。四物湯方見前

月經不調癥瘕帶下及一切諸病

大香附子一斤。分作四分。以童便鹽水酒醋各浸一分。春三夏一。秋五冬七。淘淨。晾乾。搗爛。微焙。艾葉一斤。漿水浸過。曬乾。搗爛。同香附用醋糊和作餅。曬乾。為末。晚蠶沙半斤炒。菝葜木。當歸。各四兩。酒浸焙。為末。醋糊丸。梧子大。每服七十九。米飲下。日

二服 瑞竹堂方

婦人經脈不調。或前或後。或多或少。產前胎不安。產後惡血不下。兼治冷熱勞。腰脊骨節煩疼。

丹參洗切。為末。每二錢溫酒調下。婦人明理方

月水淋漓。或踰期不來。送臍寒疼。及產後血氣不調。腹中癥結。

牛膝浸酒一宿。乾漆炒令烟盡。各一兩為末。生地

黃汁一升。入石器內。慢火熬至可丸。丸如梧子大。

每服二十九。空心米飲下。拔萃方

醫門醫品

調經

卷三

婦人女子經脈不調。腹中刺痛。

玄胡索去皮醋炒。當歸酒浸炒。各一兩。橘紅二兩。

為末。酒煮米糊為丸。梧子大。每服一百丸。空心艾

醋湯下。濟生方

醋附丸 治元臟虛冷。月候不調。

大香附半斤。醋煮焙。為末。醋糊丸。桐子大。每服三

四十丸。米飲下。

返魂丹 治月經不調。

方見三十七卷產後血運門。

月經不絕來無時者

白綿紙三十張燒灰漬酒半升和服即止冬用暖酒服傳信方

婦人經候微少漸漸不通手足煩疼日見羸瘦潮熱食少

當歸身酒洗錢半白芍藥酒炒川芎各一錢澤蘭葉二錢甘草炙五分柴胡八分水二鍾煎八分服婦人月經不利血氣上攻欲嘔不得臍下氣脹

當歸尾四錢乾漆燒存性二錢爲末煉蜜丸梧子

醫門醫品

調經

卷五 五

大每三十九酒下永類方

補中益氣湯 治脾胃虛弱飲食減少肢體倦怠發熱月經不調

方見五卷內傷門

歸脾湯 治思慮傷脾血不歸經月水不調及妄行人參去蘆白朮土炒黃耆蜜炙白茯苓龍眼肉當歸身酒洗遠志製酸棗仁炒各一錢甘草炙五分薑三片棗二枚水二鍾煎八分調木香末三分服逍遙散 治肝脾血虛有熱過身瘙痒或口燥咽乾

發熱盜汗食少嗜臥小便澀滯月經不調又治瘰癧流注虛熱等證

柴胡二錢白朮炒白茯苓當歸酒洗白芍藥酒炒甘草炙各一錢水二鍾煎八分溫服

加味逍遙散 治因怒傷肝月經不調或淋漓不絕錯經妄行

即前方加炒梔子牡丹皮各五分

附經血妄行

論經血妄行者謂經候既至不循常道由口鼻耳

醫門醫品

調經

卷五 六

門出也蓋人身氣行血隨火性炎上血不得下隨氣上行尋竅而出因暴怒者多

通治五方

經血妄行自口鼻出者屬火載血上

當歸酒洗川芎白芍藥酒炒生地黃黃芩酒炒梔子炒黑牡丹皮犀角麥門冬去心陳皮各一錢水二鍾煎八分溫服

又方

鬱金末二錢韭汁一酒盞入四物湯煎服升舉方

又方

先以京磨磨汁服之次用當歸尾紅花各三錢水一鍾半煎八分溫服即愈簡便方

又方

魚鱉切炒新綿燒灰等分爲末每服二錢米飲調下即愈多能即愈

小柴胡湯 治暴怒傷肝經血逆行

柴胡二錢黃芩一錢半炒半夏一錢薑製人參七分生薑五片聚二枚水二鍾煎一鍾溫服加牡丹

醫門醫品

調經

卷三 七

皮山梔各五分尤妙

附經閉

論夫經水者陰血也屬衝任二脉上爲乳汁下爲月水生于心藏于肝統攝于脾三經和壅血自流通經閉之證有因脾虛而不能生血者有因脾虛而血耗損者有因胃火而血消錄者有因勞傷心而血少者有因怒傷肝而血少者有因氣虛不能行血而閉者當隨證消息不可專用通經之藥經云損其肺者益其氣損其心者調其榮損其脾者

調其飲食適其寒溫損其肝者緩其中損其腎者

益其精審而治之庶無誤矣

女子十四腎氣全盛衝任流通經血既盈應時而下若逾時不至者或稟受陰血不足或因怒傷肝或憂鬱傷脾或胃經積熱審而治之

室女經閉者多成勞宜及時早治用栝子仁丸澤蘭湯之類以養陰血制虛火若服苦寒之劑復傷胃氣必致不起如青蒿蟲蟲等藥不宜輕用

通治二十四方

醫門醫品

經閉

卷三 八

地黃通經丸 治月經不行

自製熟地黃二兩蟲去頭翅炒水蛭糯米同炒黃去米桃仁去皮尖各二十四枚爲末蜜丸桐子大每服五七丸空心溫酒下並治產後惡露不行

又方

童男女髮各三兩燒灰斑蝥二十一枚糯米炒黃麝香一錢爲末每服一錢空心熱薑酒下普濟方

又方

屋上鮮瓦松五兩熬膏當歸鬚一兩乾漆一兩燒

煙盡麝香當門子二錢爲末以瓦松膏爲丸梧子

大每服七十九紅花湯下最能破血通經

月經不通或半年一年者

麻子仁二升桃仁去皮尖二兩研勻酒十斤浸

晝夜日服一盞

又方

疾藜子炒去刺當歸酒洗等分爲末米飲下每服

三錢

又方

婦門醫品

經閉

金匱九

草麝子炒爲末蜜丸彈子大綿裹納陰中二寸一

宿易之有汁出止

又方

蠶沙四兩沙碓內炒微黃入無灰酒一壺煮沸

去沙每溫服一盞

萬病無憂丸治月經瘀閉臍腹作疼及產後癥瘕

用乾漆炒烟出青白爲度牛膝酒浸焙各一兩爲

末生地黃汁一升沙鍋內慢火熬膏爲丸桐子大

每服二十九空心米飲下

牛膝散治婦人月水不利臍腹作疼

牛膝桂心赤芍藥桃仁去皮尖玄胡索炒當歸酒

浸牡丹皮各一兩木香三錢爲末每服一錢溫酒

調下或用五錢水煎服

紅花當歸散治經候不行腰膀重疼小腹堅硬

紅花當歸尾酒拌紫苑牛膝酒製甘草炙蘇木各

二錢白芷桂心各一錢半赤芍藥炒一兩劉寄奴

去根五錢爲末每服三錢熱酒調服

琥珀散治月信不通心膈迷悶肚腹撮疼

婦門醫品

經閉

金匱十

烏藥二兩當歸酒洗蓬莖醋煮各一兩爲末每服

二錢酒調服

月水不通結成癥塊腹脇脹大欲死

牛旁根二斤剉蒸三遍以生絹袋盛之酒二斗浸

五日每空心飲數盃

六合湯治婦女經事不行結塊腰腹疼痛

四物湯加官桂蓬莖各八分

本卷調經門

又方

用葛上亭長五枚以糯米炒去翅足研末分三服
空心甘草湯下須臾覺臍腹急疼黑豆煎服之

聖惠方

月水不通臍下血痕堅如盃時發熱下痢羸瘦

乾漆一斤燒研生地黃三斤取汁和煎至可丸
梧子大每服三丸空心酒下

千金方

婦人血氣不行上衝心膈名爲乾血氣

絲瓜一枚燒存性空心溫酒服

壽域神方

婦人因月水來或悲或驚致成狐癩精神恍惚月水

經閉

卷五 上

不通嗜食欲嘔如有孕狀

新鼠一枚以新絮裹之黃泥固住入地坎中桑柴

火燒其上一日夜取出去絮入桂心六錢爲末每

服一錢不過三服

外臺素女方

烏賊魚骨丸 治婦人血枯肢體消瘦飲食到口則

聞腥臊口出清液每食少許腹作脹此脾肺肝虧損

用烏賊魚骨去甲四兩蘭茹一兩爲末以雀卵丸

小豆大每服五丸加至十丸乾熬魚煎湯下以飯

壓之再兼服八珍湯

女科機要

附八珍湯方

當歸酒洗白芍藥酒炒熟地黃川芎人參去蘆

茯苓白朮炒甘草炙各一錢薑三片棗二枚水二

鍾煎八分溫服

室女經閉

當歸尾沒藥焙各一錢爲末紅花浸酒面北飲之

日一服

普濟方

又方

雄鼠矢一兩炒研空心溫酒服二錢

千金方

香薷散

經閉

卷五 上

栢子仁丸

治室女稟氣不足陰血未完經閉不行

用栢子仁炒另研牛膝酒製卷栢各半兩澤蘭葉

一兩爲末蜜丸桐子大每服三十九空心米飲下

澤蘭湯 治同前

澤蘭葉二錢當歸酒洗白芍藥酒炒各錢半甘草

炙五分水鍾半煎七分溫服

室女經閉煩熱恍惚

鉛霜半兩生地黃汁一合調勻分三服空心正午

臨臥服之即愈

聖惠方

崩漏門

血崩 血漏

論經云陰虛陽搏謂之崩。又云陽絡傷則血外溢。陰絡傷則血內溢。又云脾統血。肝藏血。若脾胃虧損。不能攝血歸源。用六君子湯加芍歸柴胡。若肝經風熱而血妄行。用加味逍遙散。或小柴胡湯加梔芍丹皮。若怒動肝火而血沸騰。亦用前藥。若脾經鬱結而血不歸經。用歸脾湯加柴梔丹皮。若悲傷胞絡而血下崩。用四君湯加柴梔升麻。或補中益氣湯加炒芍藥山梔荆芥。東垣先生云。凡下血證。須用四君子以收功。有言哉。若去血過多。當急用獨參湯救之。勿以脉論。苟用寒涼止血之藥。復傷脾胃。反不能攝血歸源。是速其危也。大法當補脾胃為主。

婦人月水不斷淋漓無時。多因勞損氣血而傷衝任。或遇經行而合陰陽。以致外邪客於胞門。滯於血海故也。但調養元氣。而病邪自愈。若攻其邪。則元氣反傷矣。

崩中獨聖散 治一切血崩

防風去蘆炙赤為末。每服一錢。以麴麴酒調下。炒黑蒲黃一錢尤妙。經驗方

又方

荆芥穗於麻油燈上燒焦為末。每服二錢。童便調服。婦人良方

又方

大小薊根一升。酒一斗。浸五宿。任飲。或以酒煎服。

不飲酒者。搗汁溫服。

千金方

又方

蓮蓬殼。荆芥穗。各燒存性。等分為末。每服二錢。米飲下。並治經水過多不止。聖惠方

又方

老絲瓜。櫻櫚。各燒灰等分。鹽湯空心服。奇効良方

又方

荷葉燒半兩。蒲黃炒。黃芩酒炒。各一兩。為末。每服心酒服三錢。本草綱目

又方

楮樹皮。荆芥穗等分爲末。每用二錢。冷醋調服。
治血痢。危氏得効方

又方

取東引細椿根一大握。洗淨。水一升。煮半升。分二服。便斷。金治產後血不止。赤白帶下。本草綱目

又方

槐花一兩。炒。摻灰五錢。鹽一錢。水二鍾。煎一鍾。溫服。綱目方

普濟醫書

崩漏

卷五 十五

又方

草血竭。卽地錦嫩者蒸熟。以油鹽薑淹食之。飲酒一二盃。或陰乾爲末。薑酒調服。一二錢。一服卽止。
危氏得効方

又方

白扁豆。花焙乾爲末。每服二錢。空心炒米煮飲。入鹽少許調下。卽効。奇効良方

血崩不止

槐花三兩。黃芩二兩。各炒爲末。每服半兩。酒一盞。

秤錘桑柴火燒紅。淬酒調服。乾地黃

又方

皂莢。卽勃勝一歲一箇。燒存性。研末。酒服。李氏方

又方

椶皮燒。枯礬等分爲末。空心酒服三錢。婦人良方

又方

椶灰一錢。貫衆灰。京墨灰。荷葉灰。黃絹灰。各五分。酒調服卽止。集簡方

又方

普濟醫書

崩漏

卷五 十六

好綿及婦人頭髮。共燒存性。百草霜等分爲末。服三錢。溫酒下。或加椶灰。本草綱目

又方

綿子。蓮花心。當歸。茅花。紅花。各一兩。綿紙裹定。泥固濟。燒存性爲末。每服一錢。入麝香少許。食前酒服。東垣方

又方

敗蒲蓆燒灰。酒服二錢。時珍方

又方

漆器灰、椶灰各一錢、栢葉煎湯下

又方

夏枯草爲末、每服二錢、米飲調下

聖惠方

又方

百草霜一錢、狗膽汁拌勻、當歸酒下

經驗方

又方

貫衆半兩、煎酒服之、卽止

集簡方

又方

三七研末、白酒調服二錢、二服愈、或以一錢入四

崩漏 卷三 七

物湯煎服

新集方

四物湯方見本卷

又方

黃芩細末、每服一錢、秤鑄燒紅、淬酒調下

本事方

又方

蠶紙一張、剪碎炒焦、槐子炒黃、等分爲末、酒服二

錢、立愈

衛生易簡方

又方

五寸長鯽魚一箇、去腸、入血竭乳香各五錢、于內

綿包燒存性、研末、每服三錢、熱酒調下

摘玄方

又方

五靈脂四兩、研末、水二碗、煎一碗、去渣澄清、再煎

爲膏、入神麴末二兩、和丸如梧子大、每服二十九

空心溫酒下

本草綱目

血崩遠年不癒者

木賊、香附子、製各一兩、朴硝半兩、爲末、每服三錢

黑色者、水一盞、煎紅者、酒一盞、煎和渣服之、日三

服、臍下痛者、加乳香、沒藥、當歸各一錢

醫聖元戎

血崩不止、諸藥不効、服此立止

崩漏

卷三 十八

用甜杏仁土黃皮、燒存性爲末、每服三錢、空心

酒下

保壽堂方

崩中腹痛

蟹殼燒存性、米飲服一錢

証治要訣

血崩腹痛甚者

白芍藥炒黃色、栢葉微炒、各一兩、水一升、煎六合

入酒五合、煎至七合、空心服、或爲末、每服三錢、酒

調服亦妙

聖惠方

六君子湯

治見論

人參去蘖白朮土炒白茯苓去皮半夏製各一錢

陳皮八分甘草炙六分薑三片棗二枚水二鍾煎

八分食遠溫服

四君湯 治見論

方即前方去半夏陳皮

加味逍遙散 治見論

小柴胡湯 治見論

歸脾湯 治見論

以上三方俱見本卷調經門

醫門醫品 崩漏 卷五 十九

補中益氣湯 治見論

方見五卷內傷門

獨參湯 治見論

人參去蘖一兩加生薑三片大棗一枚水二鍾半

煎一鍾食前服

血漏 十七方

崩漏不問年月久近

用槐耳燒存性為末每服二錢溫酒下 產寶方

赤白崩漏

燒灰酒服二錢白崩用白蘄紅用紅蘄 漏上方

崩中漏下五色使人無子

蜂房燒為末每用三錢溫酒服之神效 張文仲方

又方

茶葉內箬葉蠶紙各燒灰等分為末每服二錢食

前米飲下 聖濟總錄

經水過多不止成漏者

赤石脂煨破故紙炒等分為末每服二錢米飲下

普濟方

醫門醫品 崩漏 卷五 二十

又方

白芍藥炒香附製熟艾葉各錢半水一鍾煎半鍾

空心溫服 熊氏補遺

又方

紅雞冠花乾為末每服二錢空心酒調下忌食腥

猪肉 孫氏集効方

瑞蓮散 治同上

陳蓮蓬殼燒存性研末每服二錢熱酒下 經驗方

漏血不止

槐花燒存性研末。每服二錢。食前溫酒下。聖惠方

又方

烏梅肉七枚。燒存性研末。米飲服。日二。本草綱目

月水漏下。暫止數日。小勞輒劇。久疾失治。面黃者。

桑耳焙研。每服二錢。食前熱酒下。日二服。或用楓

耳。赤石脂等分。如前法服。亦妙。普濟方

又方

鼈甲醋炙研末。清酒服二錢。日二服。甄權方

又方

普門醫品

崩漏

卷五 五

側柏葉炙乾。白芍藥炒等分。每用三錢。水酒各半

煎。煎減半。溫服。或用側柏葉。木賊。各炒為末。等分

每服二錢。米飲下。室女更宜。聖濟總錄

又方

五靈脂炒烟盡。研二錢。當歸半兩。酒一盞。煎六分

食前熱服。三五服効。經驗方

又方

羊前左脚脛骨一條。紙固泥封。令乾。煨赤。入樓

灰等分。為末。每服一錢。溫酒調下。本草綱目

凡婦人七七後。天癸當住。每月仍行。或過多不止。或

用條芩心二兩。米醋浸七日。炙乾。又浸。如此七次。

為末。醋糊丸。梧子大。每服七十九。空心溫酒下。日

二次。瑞竹堂方

又方

木賊炒三錢。水一盞。煎七分。溫服。聖惠方

帶下門

附白淫白濁

論婦人帶下有五。因經行產後。風邪入胞門。傳于

普門醫品

帶下

卷五 五

臟腑而致。若傷厥陰肝經。色如青泥。傷少陰心經

色如紅津。傷太陰肺經。形如白涕。傷太陰脾經。或

如爛瓜。傷少陰腎經。黑如衄。音坏血。人有帶脉。橫于

腰間。如束帶之狀。病生于此。故名為帶。

薛立齋云。徐用誠先生云。帶證白屬氣而赤屬血。

東垣先生云。血崩久則亡陽。故白滑之物下流。未

必全拘於帶脉。亦有濕痰流注下焦。或腎肝濕熱。

或因驚恐而木乘土位。濁液下流。皆當壯脾胃。大

陽氣為主。佐以各經見證之藥。不可拘泥人多。

瘦人多火而以燥濕瀉火之藥藥治之也大抵
虛而濕痰下注者多宜用補中益氣湯加茯苓
夏蒼朮黃檗

通治二十九方

白芷散 治下元虛弱赤白帶下或經行不止

白芷一兩海螵蛸二枚燒胎髮一團煨為末每服
二錢食前溫酒調下 婦人良方

婦女赤白帶下

禹餘糧火煨醋淬乾薑煨等分為末每服二錢空

帶下

心赤調服赤帶乾薑減半 勝金方

又方

雲母粉製水和二錢服神效 千金方

又方

益母草正花開時採曬乾搗為末每服二錢食前
溫湯下 集驗方

又方

蛇床子枯白礬等分為末醋糊丸彈子大乾胭脂
為衣綿裹納陰中熱極再換日一次 儒門事親

又方

秋石研末蒸棗肉搗丸梧子大每服六十九空
醋湯下 摘玄方

又方

牛角鯁燒令烟斷附子鹽水浸七度去皮等分
末空心酒服二錢 孫用和方

又方

槿根皮二兩切白酒碗半煎一碗空心服之白帶
用老酒妙 纂要奇方

帶下

又方

夏枯草陰乾為末每服二錢米飲下 徐氏家藏

又方

石菖蒲破故紙等分炒為末每服二錢更以菖蒲
浸酒調服日二服 婦人良方

又方

白扁豆炒為末食前米飲下每服二錢 本草綱目

又方

白芷四兩以石灰半斤淹三宿去灰切片炒研

末酒服二錢日再服 醫學集成

又方

桑耳切碎每用三錢酒煎服 蘇頌圖經

又方

椿根白皮炒滑石飛等分爲末糊丸梧子大每服
腹白湯下百丸 丹溪方

帶下流白

白鷄冠花曬乾爲末每旦空心酒服三錢赤帶
紅者 孫氏集効方

帶下

帶下崩中

舊壺盧瓢炒焦存性蓮房燒存性等分研末每服
二錢熱水調服有汗爲度不過二服 本草綱目

又方

松香五兩酒二升煮乾木臼杵細酒糊丸如梧子
大每服百丸溫酒下 摘玄方

帶下臍腹冷痛面色痿黃

葵花乾爲末每空心溫酒服二錢白帶用白赤帶
用紅 聖惠方

室女白帶因衝任虛寒

鹿茸酒蒸炙二兩金毛狗脊燎去毛白欬各一兩
爲末艾葉煎醋打糯米粉糊丸梧子大每食前酒
酒下五十丸日二服 齊生方

婦人漏下赤白不止

地榆三兩米醋一升煮半升濾去渣食前稍熱服
一合 聖惠方

又方

白芍藥三兩乾薑半兩剉碎同炒焦搗末空心水
調服三錢日再服 廣利方

帶下

調服三錢日再服 廣利方

又方

石燕一枚磨水服服盡即愈 徐氏家傳方

赤白帶下年深諸藥不能療者

貫衆一箇全用不剉只揉去毛及花萼慢火薰
炙令香熟候冷爲末空心米飲服二錢 婦人良方

白帶不止

槐花炒牡蠣煨等分爲末每酒服三錢 摘玄方

移楊皮半斤。牡丹皮四兩。升麻。杜鵑椒。各一兩。爲
籠末。每用一兩。酒二鍾煎一鍾。食前服。集簡方

又方

兔皮燒烟盡爲末。食前酒服二錢。外臺秘要

桂附湯 治白帶腥臭多悲不樂

黃藥。栝知母。各鹽水炒。甘草炙。各五分。肉桂一錢。

附子三錢。黃耆蜜炙一錢五分。人參七分。水二鍾

薑三片煎一鍾。食前服。丹溪方

下元虛憊帶下不止

醫門寶品

帶下

卷三

白果蓮肉糯米。各五錢。胡椒一錢半。爲末。用烏雞

雞一隻去腸盛藥。瓦器煮爛。空心食之。集簡方

赤白帶下日久不止。顏色黃碎

依龍肝。櫻欄燒灰。庭梁上塵。等分爲末。入龍腦。麝

香。各少許。每服三錢。溫酒或淡醋調下。十年者生

月卽愈。大金方

附白淫白濁

論婦人白濁。謂小便濁白如膏也。白淫。謂白汁浸

淫時流不止也。皆由心腎不交。水火不濟。或元氣

下陷。脾經鬱結所致。宜與帶下參看。總之以清心

補脾爲主

婦人白濁

鹿角屑炒黃爲末。酒服二錢。婦人良方

鎖精丸 治婦女下元虛弱。小便白濁。白帶淋漓

破故紙炒。青鹽。白茯苓去皮。五味子炒。等分爲末

酒糊丸。桐子大。每服三十九。空心鹽湯或酒下

固精丸 治胞氣虛寒。小便白濁。或無度

醫門寶品

帶下

卷三

牡蠣煨。兔絲子酒浸蒸炒。韭子炒。龍骨煨。五味子

炒。白茯苓去皮。桑螵蛸酒炙。白石脂煨。等分爲末

酒糊丸。梧子大。每服七十九。空心鹽湯下

白濁白淫

百草霜一兩。金墨半兩。研末。每用三錢。猪肝一葉

批開。入藥在內。紙裏煨熟。溫酒下。永類方

又方

風化石灰一兩。白茯苓三兩。爲末。糊丸。梧子大。每

服二三十丸。空心米飲下。絕妙。集玄方

婦人子臟堅僻中有乾血下白物

用礬石燒杏仁等分研勻煉蜜丸棗核大納入
中。日一易之。金匱玉函方

求嗣門

附治妬

論凡欲求子者當先察夫婦有無勞傷痼疾依方
調治使內外和平則有子

丹溪先生云人之有胎者陽精之施也陰血能攝
之精成其子血成其胞胎孕乃成今婦人無子者

醫門醫品

求嗣

卷三 三十九

率由血少不足以攝精也血之少也固非一端
欲得子者必須補其精血使無虧欠乃可成胎
泛用秦桂丸薰戕臟腑血氣沸騰禍不旋踵

陳氏曰無子者其因有三一墳墓風水不利二
婦年命相尅三夫婦疾病除墳墓不利年命相尅
非藥力可治若夫婦疾病必須藥餌然婦人無子
或勞傷血氣或月經閉澁或崩漏帶下若調攝失
宜飲食不節乘風襲冷結于子臟亦令無子

凡求子宜擇吉日交會當避望晦朔大風大雨

盛寒盛暑雷電霧雹天地晦冥日月無光虹霓地
動日蝕月蝕及日月星辰之下神廟之中井竈園
厠冢墓屍柩之傍交會受胎多損父母生子殘疾
夭枉愚頑不孝若交會如法則生子福德智慧驗
如影響不可不慎

凡受胎皆以婦人經絕一日三日五日為男以經
絕後二日四日六日為女過六日皆不成胎又遇
旺相日尤佳夜半交合生子者賢明貴壽餘時皆
凶春甲乙夏丙丁秋庚辛冬壬癸春寅卯夏巳午

醫門醫品

求嗣

卷三 三十九

秋申酉冬亥子為旺相日

世人求嗣用計百端妾媵無數乃至暗首終身不
能如意者是皆心行有虧受天之罰非病也苟能
革心之非所行向善積德累功施恩布惠上天鑒
報不爽自然慶流後裔此溫隱居求嗣篇之所由
作也書曰惠迪吉從逆凶惟影響又曰作善降福
作惡降殃子之有無自王公至於庶民亦在乎陰
德而已豈可專泥於藥哉

秘方

延嗣奇傳

用好黑鉛六十四斤。放新鍋內大火化汁。鴻蒙洞入口邊。准黃末九錢。扇搗百下。鉛面藥生成。鐵杓取。又入雄黃末九錢。如此九次。將所取藥揀去。留止用一斤。即氣母也。選定執成吉日。昧爽赴父母塚上。四方離塚一尺五寸。各取土一升。如取北方土人。面北不可差錯。餘倣此。塚頂上取土一升。共五升。與氣母配合。先祭后土畢。緊靠塚前掘穴一尺五寸。深求貴用品字穴。求子用貫珠。


寶門藥品

求嗣

卷三 三

附穴圖

貫珠穴圖



每穴俱闊一尺

穴內紅紙圖



此紙與穴一樣圓大安置穴底上方填藥填完用原土封掩與地相平勿令高起有跡

寶門藥品

求嗣

卷三 三

右方原一羽士所傳。有李生老而無子。得此方連舉二子。艾公維新始以傳人。余亦以此舉子。因刻而廣之。有蒸服貼三方。并錄於後。

蒸餅胡元丹

紅鉛二兩。紫河車一具。各照後法製。鎖陽半箇。人參堅實者。去蘆黃耆。審炙。松脂各二兩。共為細末。磁器裝盛。外加油紙包裹。以防潮潤。臨時量人肚臍大小。淺深。麪圈因之。藥二錢。或三錢。人乳調濕。將麪圈安臍上。填藥在內。上以槐皮錢蓋之。用大

艾條十二炷。槐皮着火換之。久則透徹丹田。生長精血。四肢壯健。百脉流暢。此即所謂形不足者。溫之以氣。蒸畢。食熟棗三枚。沸湯半盞。安妥真氣。後用膏藥貼臍。每十數日蒸一次。須蒸三遍。

附取紅鉛法

擇十三四歲室女。要眉清目秀。齒白唇紅。髮黑面光。不肥不瘦。算他生年月日起。約至五千四十八日之先後。看兩腮如桃紅。額上有光。身熱氣喘。腰膝酸疼。困倦呻吟。將降矣。先預備絹帛搥洗。或

求嗣

卷三

羊胞做囊簪。或金銀打就。偃月器。等候經至。更繫合陰門。於椅凳上平坐。不可斜倚。如覺有紅事下。再換一幅。多餘處。用絹帛夾展更換。收入磁盒內。取完同製。

附製紅鉛法

先將烏梅一斤。煎水一桶。去梅殼冷定。取有紅鉛。或器或帛。俱用梅水洗下。紅鉛一箇。約用梅水三碗。或多或少。酌量加減。不可太過不及。梅水洗下。再加清水。大磁盆內。以木棍攪數十轉。至佳。

待澄清。輕輕逼去清水。將澄下紅鉛加水。又打又攪。又澄。如此七次。或九次。數足逼去水盡。止剩紅漿一碗。或半碗。取淨灰用盆盛。中挖一窩。以軟絹鋪紙。把鉛漿傾于紙上。候水盡。於日色處曬乾。曬之氣盡去。方可入藥。助血養神。其功甚大。

附製紫河車法

男胎首生者佳。即壯實婦人次產亦可。先將米泔少浸。輕輕擺開。換洗令淨。不可挑動筋膜。將竹器盛于長流水中浸一刻。以生氣提回。用新瓦二箇。

附門醫品

求嗣

卷三

一仰一覆。下用炭火。徐徐焙乾。存性。不可太枯。則無力。

內服翊元丹

鹿茸一具。酥炙。人參堅實者。去蘆。陽起石煨。各一兩五錢。當歸酒洗。八錢。杜仲去皮。酥炙。六兩。金櫻子焙。甘州枸杞焙。自製熟地黃。各三兩。蓮藥焙。破故紙炒。甘草炙。去皮。肉蓯蓉去鱗。甲酥炙。山茱萸去核。各二兩。為細末。合一處收貯。將糯米一升。黑絲子二兩。魚鱉一兩。剉碎。拌勻。入砂鍋內。水煮百

膏劑藥品

求嗣

卷三

之以味。凡遇黃梅節氣。動曬以防生蟲。

貼臍翹元膏

鹿茸酥炙。大附子去皮臍。牛膝去蘆虎脰骨酥炙。蛇床子。鬼絲子。搗去皮。川續斷。遠志肉。肉苁蓉。天門冬。去心。麥門冬。去心。杏仁去皮。生地黃。熟地黃。官桂去麋皮。川棟子去核。山茱萸去核。巴戟去心。破故紙。杜仲去皮。水鼈子去殼。肉豆蔻。紫稍花。絞草。穿山甲。草麻子去殼。各一兩。甘草二兩。剉細。以真香油一斤四兩。浸一晝夜。慢火熬至衆藥焦。

膏劑藥品

求嗣

卷三

膏。功難盡述。須一一製造如法方効。

斷艾丸 治婦女氣血百病爲生育神方。屢用屢驗。白茯苓去皮。熟斷艾。各四兩。當歸酒洗。香附子。炒。各二兩。川芎。白芍藥。炒。吳茱萸湯泡七次。去盡苦味。炒乾。各一兩五錢。白木炒一兩。玄胡索七錢。阿膠炒五錢。各咀於砂鍋內。用醋一碗。拌勻。炒乾爲末。醋糊丸。梧子大。空心淡醋湯下七十丸。婦人久不孕。服盡一料。卽有子。胡隆宇傳。婦人陰寒無子。

吳茱萸、川椒、去目等分爲末。煉蜜丸。彈子大。綿裹納陰中。日再易之。子宮暖而開。卽有子也。經心錄

又方

母丁香末。紗囊盛如指大。納陰中卽愈。本草衍義

子宮虛寒不孕。及月水不調。或閉或漏。

紅娘子六十枚。大黃、皂莢、葶藶各一兩爲末。巴豆一百二十枚。同搗。東肉爲丸如彈子大。以綿裹繫紫留繫。以竹管送入陰戶。一時許發熱。渴飲熱湯。

二盞解之。或發寒靜臍。安三日方取出。每日空

醫門醫品

求嗣

卷三 三

心以雞子三枚。胡椒末二分炒食。酒下以補之。則子宮溫暖受子。

又方

取蛇床子仁爲末。入官粉少許和勻。如棗大綿裹

納陰中。自然溫暖。金匱玉函方

婦人斷產不孕

剪有印紙燒灰。水服一錢。本草綱目

附治妬

三方

正心化妬丸 治婦人妬妻譖夫無子

天門冬去心。益智仁各二兩。赤黍米去殼微炒。薏苡仁炒。各四兩。茯神去木。百合各一兩。爲細末。煉蜜爲丸如梧子大。每服九十九丸。食遠白湯送下。婦人常服有子。且不妬。醫統

又方

取婦人月經布裏頭。燒灰一個。埋於廁前一尺。入地五寸。卽使婦人不妬。博物志

又方

赤黍米去殼。薏苡仁各微炒。等分爲末。糊丸梧子

醫門醫品

求嗣

卷三 三

大每用百丸。食遠白湯下。常常服之。萬畢術方

醫門醫品卷之三十三終

其終不能存不如早去之以免害

一子煩謂妊娠苦煩悶也係心肺虛熱或痰積于胸若三月而煩者但熱而已若痰飲而煩者吐瀉惡食甚則胎動不安

一子癇由娠婦體虛受風風寒相搏則口噤背腰弓反張亦名為瘕須臾自醒良久復作

一子懸謂妊娠胎上逼心腹脹疼胸滿噯氣飲食少思

一子腫謂妊娠腫滿也因脾虛水氣流溢或渴痢

妊娠

卷三

臍膈虛寒或水漬于胞不能分利皆能致此或三月之後足膝腫出水飲食不甘謂之子氣分泄乃消

一子淋謂娠婦小便澀少也由腎與膀胱虛熱濁相干所致甚者心煩悶亂宜審其虛實滋養之源不可專用滲利之藥

一轉胎由胎滿逼胞胞系了戾以致小便不通為轉胞胞逼于胎不時尿出則為遺尿以常法藥多不効但升舉其胎胞系疎而小便自順矣

一妊婦心痛及腹疼或風有冷疾或新觸風寒寒飲相搏疼甚則動胎必致傷墮

一妊婦腰背疼因勞役傷損腎經風冷乘之腰腹相引而疼胞繫于腎腰疼甚則胎墮

一妊婦心腹脹滿此脾胃虛寒復因冷飲相搏所致宜調補脾胃升舉清氣忌用尅伐

一妊婦欬嗽由肺虛痰理不密寒邪乘之則為喘欬不止恐傷胎

一妊婦吐血衄血由七情所傷氣逆于上以致

妊娠

卷四

衄不止則墮胎有因而致死者

一妊婦溺血因熱在血分血熱流滲于胞因而尿血以清熱為主

一鬼胎因其人榮衛虛損精神疲弱妖魅之類乘之亦如懷娠之狀

一妊娠傷寒為患匪輕多致傷胎又有時氣謂四時不正之氣所感其證無少長皆相類發于五月

以後者為熱病皆妊娠所忌患之多致傷胎若不急治以致墮胎漏血母命亦不可保

一熱病傷胎。視其母面赤舌青。知其子必面青舌赤。母歔子生。唇青吐沫。子母俱歔。若有雙胎。一死一活。急用平胃散加朴硝水銀下之。庶不金傷生者。

一妊娠下痢腹痛胎氣不安。宜調補脾胃。則胎自安。仍察看痢疾本科。

一妊娠病瘧。多傷于胎。宜審內傷飲食。或外感風寒。及暑邪鬱怒所致。仍參瘧疾本科治之。

凡妊娠有疾。投以湯藥。衰其大半而已。使病去母

妊娠

卷五

安胎亦無損

驗胎一方

婦人經脈不行。已經三月。未審是胎。以此探之。

川芎爲末二錢。濃煎艾湯。空心調下。腹內微動。有胎也不動者爲非胎。

安胎 五方○與後胎動條及驚胎條參看

保胎散

白朮一兩。水煎濃汁。調黃芩末二錢服。或用條芩白朮等分。炒爲末。米飲和。凡梧子大。每白湯下五

十九

安胎丸 妊娠常宜服之。庶無墮胎之患。

當歸酒洗。川芎。白芍藥酒炒。條芩酒炒。白朮炒。等分爲末。酒糊丸。梧子大。每服五十九。米飲下。凡瘦人血虛有熱。慣墮胎者。宜多服。或加炒阿膠五錢。千金保胎丸。凡婦人受胎。宜節飲食。絕慾。戒怒。庶免半產之患。服此可以保全。

當歸酒洗。阿膠炒。條芩炒。續斷酒洗。香附童便浸炒。益母草。各二兩。川芎。陳皮。艾葉醋煮。各一兩。熟

妊娠

卷六

地黃薑汁炒。白朮土炒。杜仲薑汁炒。各四兩。砂仁炒五錢。爲末。煮棗肉爲丸。如梧子大。每服百丸。空

心米湯下 雲林方

芎藭補中湯 治懷孕血氣虛弱。不能榮養。屢致墮

黃耆炙。當歸酒洗。白朮炒。杜仲炒。白芍藥酒炒。各

一錢。人參。芎藭。阿膠炒。各八分。乾薑煨。五味子。其

草炙。各五分。水二鍾煎一鍾。入木香末五分調服。

婦人良方

妊娠慣墜或三月五月屢墜不已者

先期兩月前用杜仲八兩糯米煎湯浸透炒去氣
續斷二兩酒浸焙乾為末山藥五兩另研打糊為
丸梧子大每五十九空心米飲下簡便方

轉胎三方

轉女為男法

歌曰桃樹東南枝作柄親夫張日自脩成谷安床
底双朝下無令人見亦無令本婦知男即生若置

伏雞雞窠下滿窠盡是雞之雄雄黃一塊綴其襠

普門醫品

妊娠

卷四 七

真陽氣化產仙郎萱草將來簪左髻宜男靈藥不
尋常腰繫弓弦百日間轉女成男有萬千或將夫
婦手足剪爪甲潛銷男即轉雄雞長尾扯二莖插

安床下產男嬰軒轅野雲傳此訣其中玄理妙無

窮本草經目

又方

婦人始覺有孕取弓弦一枝縫袋帶於臂上則轉
女為男房屋經云凡覺有娠取弓弩絃縛婦人腰
下滿百日解却紫官玉女秘傳方

又方

婦人覺有妊以雄黃一兩絳囊盛之佩於腰下能
使胎轉女為男神妙千金方

禁忌三方

胎殺忌凡遊殺所在方位不宜安床帳及掃舍十

干日遊胎殺甲巳日占門乙庚日占碓磨丙辛日
占井竈丁壬日占厨廨戊癸日占米倉十二支

日遊胎殺子丑日占中堂寅卯辰酉日占竈巳午
日占門未申日占籬下戌亥日占房月遊胎殺

普門醫品

妊娠

卷四 八

立春在房床驚蟄在戶車房清明在門雙扇立夏

在竈芒種在母身小暑在竈立秋在碓白露在厨

寒露在門立冬在戶及厨大雪在爐及竈小寒在

房母身

食忌

雞肉不可合糯米食鴨子不可共桑椹食羊肝雞
鯉魚鱸犬肉兔肉雀肉團魚螃蟹皆不可食慎之

藥忌

除茺青斑蝥螻蛄蛇虫蜈蚣等一切毒蟲烏頭側

子。野葛。藜蘆等一切毒草。金石。水銀。礞砂。錫粉等一切毒物。不可用。即尋常服餌之品。能損胎。傷孕者。俱宜忌之。歌曰。槐子牽牛連皂角。蘭茹瞿麥與茅根。意。以牡丹同巴豆。天雄附子暨桃仁。牛膝三稜紅芽戟。半夏通草天南星。赤箭芫花消石。朴。乾薑。胡蒜。黃雌雄。牛黃。代赭。胡粉。麝。蜚。皮。蟹。爪。乾漆同。說與婦人產前忌。此歌熟憶在胸中。

惡阻 七方

人參橘皮湯 治妊婦嘔吐痰水。食少倦怠。

黃芩 九

人參。橘紅。白朮炒。麥門冬。去心。白茯苓。各一錢。厚朴。薑製。甘草炙。各五分。竹茹一團。薑三片。水二鍾。煎一鍾。食遠服。婦人良方。

又方

當歸酒洗。白芍藥炒。陳皮。香附炒。白朮炒。半夏薑湯泡過。香油炒。白茯苓。去皮。薑香。神麩炒。砂仁炒。各八分。甘草炙。四分。生薑三片。棗一枚。水二鍾。煎一鍾。溫服。玉機微義。

白朮湯 治胃虛惡阻吐水。甚至十餘日粥漿不入。

用白朮炒一錢。人參五分。丁香。甘草炒。各二分。薑二片。水一鍾。煎六分服。婦人良方。

又方

縮砂仁炒為末。每服二錢。薑湯或米飲下。心鏡。

妊娠吐水作酸。心腹痛。不能飲食。

人參去蘆。乾薑炮。等分為末。以生地黃汁和。丸。梧子大。每服五十九。米湯下。劑局方。

子大。每服五十九。米湯下。劑局方。

妊娠惡阻。氣不升降。嘔吐酸水。飲食不進。

香附子炒。一兩。藿香葉。甘草。各二錢。俱為細末。湯。

黃芩 九

湯入鹽調服三錢。聖惠方。

妊娠嘔逆不食。甚者腹痛傷胎。

半夏泡炒。黃陳皮。砂仁炒。各一錢。白茯苓二錢。甘草炒五分。用烏梅一個。薑三片。棗二枚。水二鍾。煎一鍾。溫服。婦人良方。

一鍾。溫服。婦人良方。

胎動 十四方。與前安胎條後驚胎條參看。

妊娠胎動不安。

香豉一升。葱一升。水二升。煮取一升。入炒阿膠二兩。化服。或用炒阿膠。桃艾葉。各二兩。葱白一合。水。

兩。化服。或用炒阿膠。桃艾葉。各二兩。葱白一合。水。

四升煮一升分服 聖惠方

又方

秦艽甘草炙鹿角膠炒等分爲末每服三錢用糯米煎湯服或用阿膠炒成珠艾葉秦艽等分入糯米煎服 聖惠方

又方

硃砂末一錢雞子白三枚和勻頓熱服之胎必即出未久即安 普濟方

胎動不安及數傷胎下血不止

聖惠方

妊娠

胎動

鯉魚一個治淨阿膠炒一兩糯米二合水二升入葱薑橘皮各少許煮糜食五七日效 聖惠方

妊娠胎動或子氣腹中血下疼痛口噤欲死服此探之損則痛止胎安已損則立下神妙方也屢驗

當歸酒洗二兩芍藥一兩爲倉米每服三錢水一

盞煎令泣泣欲乾投酒一盞再煎至半盞溫服或

灌之約人行五里再服不過三服 備急方

胎動欲產日月未足者

蒲黃二錢并華水調服 集驗方

胎氣不安氣不升降嘔吐酸水

香附炒藿香甘草炙等分爲末每服二錢入鹽少

許沸湯服之 聖惠方

黃耆湯 治氣虛胎動腹痛下水

急用糯米二合黃耆炒二兩川芎酒浸一兩水四

碗煎二碗半分三次服若胎已死宜用平胃散加

朴硝腐化之 婦人良方 平胃散方見本門熱病條

妊娠胎動水黃如膠或如豆汁

用小黃米 即稗米 黃耆蜜炙各一兩水五碗煎二

聖惠方

妊娠

胎動

碗分三服 梅師方

安胎寄生湯 治妊娠下血胎不安或腰腹作疼

桑寄生白朮炒各五分白茯苓四分甘草炙一錢

水一鍾煎半鍾溫服 婦人良方

又方

川芎二兩葱白五兩水三碗煮二碗半分三服 婦人良方

人良方

胎動欲墜腰痛下血氣上搶心

急以葛蒲根搗汁一二鍾服之即効 千金方

胎動下血或胎已殞

百草霜二錢。煨灰一錢。伏龍肝五錢。為末。每服二錢。白湯入酒及意便調下。筆峯雜興

釣藤湯 治胎動腹痛。面青冷汗。氣欲絕者。

釣藤鈎。當歸酒洗。茯神去木。人參去蘆。桑寄生。各

一錢。桔梗一錢。水鍾半煎八分。溫服。婦人良方

胎漏 十二方。與前胎動條參看

胎漏下血

益智仁半兩。縮砂仁一兩。為末。每服三錢。空心白

黃門齋品

湯下。日二服。胡氏方

又方

蓮房燒研。麪糊丸。梧子大。每服百丸。湯酒任下。日

二服。朱氏集驗方

又方

黃蘗一兩。老酒一。碗。鎔化。熱服即止。本草綱目

又方

五倍子為末。二錢。酒調服。朱氏集驗方

又方

條芩。白朮。砂仁。阿膠。各炒等分。為細末。每服二錢。

艾湯調下。婦人良方

二黃丸 治胎漏下血。或發熱頭疼。眩暈煩躁。

生地黃。白製熟地黃。各二兩。白朮炒。枳殼麪炒。各

一兩。為末。將二黃杵為膏。入白朮枳殼末為丸。每

服六七十丸。米飲下。婦人良方

妊娠胎漏下血不止。血盡則胎傷。

雞子黃十四枚。好酒二升。煮如餲服之。未瘥再作。

以瘥為度。不飲酒者。入醋同水煮之。普濟方

黃門齋品

又方

阿膠三兩。炒為末。酒一升半。煎服即愈。梅師方

又方

鹿角屑。當歸。各半兩。水三盞。煎盡半。頓服。普濟方

安胎散 治妊娠因令熱不調。七情失宜。卒然下血。

若傷於胎。則痛而下血。甚則胎墮。

白芍藥。黃耆。阿膠。甘草。各炒。地榆。自製熟地黃。艾

葉。川芎。當歸。酒洗。各五分。薑三片。棗二枚。水一鍾。

煎半鍾。溫服。婦人良方

子芩丸 治肝經有熱致血妄行

細條黃芩炒爲末。每服一錢。以秤鐺燒赤。淬酒熱調服。脾胃虛者勿用。婦人良方

防風丸 治脾經有風。血得風而流散。以致妄行。

防風爲末。每服一錢。白湯調服。婦人良方

驚胎 七方。與前安胎條及胎動條參看

懷胎偶有所觸。或跌墮傷損。致腹不安。痛不可忍者。

用縮砂連皮炒焦。去皮搗碎。每服二錢。熱酒調下。

須臾覺腹中極熱。胎動即無事。孫尚藥方

妊娠

參看 七方

又方

青竹茹三兩。酒水各一碗。煎一碗服。子母秘錄

佛手散 治全上

當歸。川芎。各五錢。水酒各半鍾。煎五分。溫服。

膠艾湯 治妊娠顛仆。胎動不安。腰腹疼痛。或胎上

搶心。或下血腹痛。

阿膠一兩炙焦。艾葉三錢。水二碗。煎碗半。分二服。

婦人良方

又方

川芎末二錢。酒下。二服即安。胎死即下。婦人良方

妊娠從高墜下。腹痛不止。

生地黃。益母草。各二錢。當歸酒洗。黃耆蜜炙。各一

錢。薑三片。水鍾半。煎八分服。婦人良方

婦人妊娠爲夫所動。因絕

竹瀝飲一鍾。立愈。產寶方

胎不長 二方

黃耆湯 治妊娠體倦少食。面黃晡熱。胎不長。

黃耆蜜炙。白朮炒。陳皮。麥門冬去心。白茯苓。前胡。

黃耆湯

妊娠

參看 七方

人參去蘆。各八分。川芎五分。甘草炙三分。薑三片。

棗二枚。水鍾半。煎七分服。婦人良方

又方

用鯉魚長尺許。治如食法。飲其汁。其胎即漸大而

長。本草綱目

玉胎 七方

桂心散 治妊娠因病胎不能安者。可下之。

桂心。瓜蒌仁。牛膝。瞿麥。各五分。當歸尾一錢。水一

鍾。煎七分服。婦人良方

又方

榆白皮煮汁服。二盞卽下。子母秘錄

又方

用麥蘖一升。搗碎。水二升。煮一升。服之卽下。觀此則知麥蘖損氣破血。虛人不宜用也。婦人良方

又方

牛膝一兩。酒一鍾。煎七分。作二服。婦科心鏡

又方

蟹爪二合。桂心。瞿麥。各一兩。牛膝二兩。爲末。空心

溫酒服一錢。千金方

又方

蜥蜴肝。蛇蛻等分。研。以醋和勻。摩妊婦臍上及左

右令溫。胎卽下。聖惠方

佛手散

治胎漏服之卽安。胎損服之立下

方見前驚胎條

子煩七方

知母散 治妊婦煩燥悶亂

知母。麥門冬。去心。黃耆。蜜炙。子芩。炒。赤茯苓。各一

錢。甘草炙五分。水二鍾。煎一鍾。去渣。入竹瀝一合。再煎二沸服。

又方

以竹瀝頻頻飲之。本草綱目

竹茹湯 治妊婦煩燥。或胎不安

淡竹茹一兩。水二鍾。薑二片。煎一鍾服。婦人良方

又方

知母炒爲末。棗肉丸。彈子大。每服一丸。人參湯下。本草綱目

書開書品

妊娠

竹葉湯 治妊娠煩悶

黃芩炒。防風。麥門冬。去心。各一錢。白茯苓二錢。竹葉七片。水鍾半。薑一片。煎八分服。外臺秘覽

人參黃耆散 治妊婦煩燥。身熱口乾

人參去蘆。黃耆蜜炙。葛根。秦艽。赤茯苓。麥門冬。去

心。各一錢。知母。甘草炙。各五分。薑三片。竹葉十五個。水二鍾。煎一鍾服。婦人良方

妊婦煩悶不得臥。口乾日澀

黃連末。每服一錢。粥飲下。爲尤亦可。婦人良方

子痢三方

釣藤散 治子痢風痙角弓反張及頭運

釣藤釣陳皮炒半夏薑製麥門冬去心白茯苓茯
神人參去蘆耳菊花防風各一錢耳草炙三錢石
膏煨二錢水二碗薑三片煎碗半食遠服婦人良方

羚羊角散 治子痢冒昧目吊口噤反張

當歸酒浸川芎防風獨活白茯苓五加皮薏苡仁
杏仁去皮尖酸棗仁炒各五分羚羊角銹七分耳

普門醫品

妊娠

卷五

草炙四分生薑五片水二鍾煎一鍾入木香末二
分調服醫統

又方

縮砂連皮炒黑研末熱酒調下二錢不飲酒者米
飲下此方安胎止痛功效不可具述溫隱居方

子懸六方

紫蘇飲 治子懸上衝腹痛或臨產驚恐氣結連日
不下或大小便不利

當歸耳草炒大腹皮製人參去蘆川芎橘皮白芍

藥炒各五分紫蘇一錢薑三片葱白二枝水二鍾
煎八分服婦人良方

又方 治胎上逼心腹熱痛下血或煩悶困篤

葱白二十莖濃煎水飲胎未安即安已死即下未
動再服若唇口青黑手足厥冷須佐以當歸湯

當歸湯 治妊娠子懸煩燥或生理不順唇青厥逆

用當歸人參去蘆阿膠炒耳草炒各一錢水四碗
煎至二碗去渣入連根葱白一握再煎至一碗分

二服婦人良方

普門醫品

妊娠

卷五

胎上冲心

一葡萄煎湯飲之即下聖惠方

又方

用弓弩弦繫腰立下醫林集要

胎上搶心或下血者

生麴餅研末水和絞汁服冊後方

子腫八方

全生白朮散 治妊娠面目虛浮四肢腫如水氣

白朮土炒一兩生薑皮大腹皮製陳皮白茯苓各

半兩爲末。每服二錢。米飲下。日二服。婦人良方

又方

羌活。蘿蔔子。同炒香。只用羌活爲末。每服二錢。溫酒調下。三服即愈。本事方

又方

梔子一合炒研。每三錢米飲下。九服亦可。丹溪方

澤瀉散 治妊娠遍身浮腫。上氣喘急。大便不通。小便赤澀。

澤瀉。桑白皮炒。木通。枳殼炒。檳榔。赤茯苓。各八

分。

孕婦

醫統

薑三片。水一碗。照半碗。空心溫服。醫統

妊娠水腫。小便不利。忌寒。

赤茯苓。去皮。葵子。各半兩。爲末。每服二錢。食前新

汲水下。禹講師方

鯉魚湯 治子腫腹大有水氣

白朮土炒五兩。白茯苓四兩。當歸酒洗。白芍藥炒。

各三兩。先以小鯉魚一個。如食法煮取汁。每汁二

盞。入藥五錢。薑七片。橘皮少許。煎七分。空心服。千金方

千金方

妊娠從脚腫至腹。小便不利。口渴引飲。

猪苓爲末。熱水調服二錢。子母秘錄

天仙藤散 治婦人有水氣而成胎。以致足膝浮腫。

行步艱辛。喘悶少食。脚指間有黃水出。

天仙藤洗畧炒。香附子炒。陳皮。甘草炙。烏藥軟白。

辣者。各等分。每服五錢。上盤木瓜。紫蘇葉。各三片。

水一鍾。煎半鍾。日三服。陳景初方

子淋八方

妊娠小便澀痛

醫統

婦人良方

醫統

冬葵子。滑石。木通。等分。每五錢。葱白七寸。水一鍾。

煎六分。空心服。婦人良方

又方

蕪菁子末。空心熱水服二錢。日二服。子母秘錄

安榮散 治今上

麥門冬去心。通草。滑石飛。當歸酒洗。燈心。生甘草。

人參去蘆。細辛。各五分。水一鍾。煎六分。空心溫服。

婦人良方

火府丹 治心經積熱。小便澀及五淋。亦治渴。

生地黃二兩杵膏。木通黃芩炒。各一兩為末。入煉

蜜九桐子大。每三十九。水通煎湯下。婦人良方

妊娠小便澀痛。心煩悶亂

麥門冬去心。赤茯苓。木通。淡竹葉。各一錢。水一碗煎七分。空心服

妊娠患淋。熱疼酸楚。手足煩痛

地膚子二兩。水一碗。煎半碗。空心服。三服即愈。母秘錄

又方

普濟書品

妊娠

普濟書品

猪苓為末。熱水調服二錢。日三服。通為度。小品方

又方

滑石粉水調。塗臍下二寸。外臺秘要

轉尿十方○附遺尿

妊娠小便閉。臍腹作脹。此胃氣虛。胎壓尿管所致

當歸酒洗。川芎。白芍藥酒炒。熟地黃。半夏。白茯苓

陳皮。甘草炙。人參去蘆。白朮土炒。各一錢。水二鍾

煎一鍾。食遠溫服。服後探吐數次即愈。婦人良方

又方

葵子研。榆白皮切。各一兩。葱白七莖。水四鍾煎二

鍾。分三服。婦人良方

又方

杏仁去皮尖炒黃。搗丸。燈心湯吞七粒。古今錄驗

又方

車前草汁調滑石末。塗臍周圍四寸。熱易之。心鏡

又方

杏仁去皮尖。滑石飛。等分共搗。飯丸小豆大。每服

二十九。葱白湯下。婦人良方

普濟書品

妊娠

普濟書品

妊婦氣血虛弱。胎壓膀胱。小便不通

用床將妊婦托住倒豎起。其胎自運。溺自濺出。漢方

妊娠轉尿。因過忍小便而致

滑石飛。葱湯服一錢。聖惠方

妊娠遺尿不禁

桑螵蛸十二箇炙為末。分二服。米飲下効。產乳書

又方

雞屎燒灰。酒服二錢。產寶方

又方

白微製。白芍藥炒。等分爲末。用好酒食前調服。三錢。日三服。千金方

心腹疼十五方

妊娠心疼

五靈脂。蒲黃。各二錢。研末。醋二杯調熬數沸。入水一盞。煎至七分。連渣熱服。未止再服。和劑局方

妊娠心痛煩悶

麻子仁一合。研水二盞。煎六分。去滓服。聖惠方

婦人書品

妊娠

妊娠心疼不可忍

鹽一撮。燒赤。泮酒服。卽安。產寶

妊婦卒然心痛氣欲絕者

川芎。當歸。酒洗。白茯苓。厚朴。薑製。各一錢。水一鍾。煎半鍾服。婦人良方

又方

雞子一枚。傾入酒內和服。本草綱目

又方

金銀藤一味。煎湯時時飲之。婦人良方

又方

桔梗一兩。薑半兩。水煎服。婦人良方

又方

鹽半盞。溫水調服。仍以冷水嚥面。待吐卽安。婦人良方

又方

竈心土研末。每服二錢。白湯調下。婦人良方

又方

用熟艾二兩。水二碗煮一碗服。並治心腹痛。或吐

婦人書品

妊娠

血衄血。婦人良方

當歸芍藥湯。治妊娠心腹急痛。或去血過多眩暈。

用白芍藥酒炒。當歸酒洗。白茯苓。白朮炒。澤瀉。各

一錢。川芎二錢。水二鍾煎一鍾溫服。婦人良方

妊娠腹痛

車脂脂燒末二錢。酒一盞調飲之。千金方

又方

枳殼三兩。麩炒。黃芩一兩。酒炒。每服五錢。水盞半煎一盞服。若脹滿身重。加炒白朮一兩。活法紀要

腹疼胎欲落

白銀五兩。茅根一斤。水三碗。煮至二碗。入酒一鍾。

再煎數沸。徐徐服立安。金銀首飾亦可。婦人良方。

鐵罩散 治妊娠腸結腹痛胎動不安

香附子炒為末。煎蘇蘇湯服二錢。或加炒砂仁。

尤妙 中藏經

腰背疼 六方

杜仲丸 治妊娠腰背痛

杜仲炒。續斷酒浸。等分為末。煮棗肉為丸。梧子大。

醫門書品

妊娠

卷五

每服七十丸。酒下。米飲亦可。婦人良方。

膠艾湯 治同上

方見本門驚胎條

妊娠腰痛如折

用銀一兩。水二鍾。煎一鍾。服之即止。千母秘錄。

又方

鹿角截五寸長。燒赤。淬酒中。又燒又淬。如此數次。

細研。空心酒服二錢。產寶方。

通氣散 治妊娠腎虛腰痛神妙

破故紙炒為末。空心每服二錢。嚼連皮核桃仁。個。溫酒下。婦人良方。

脹滿 二方

下氣湯 治心腹脇肋脹滿。飲食少思。四肢無力。

羌活。赤芍藥炒。甘草炒。檳榔。青皮醋炒。大腹皮。

陳皮。赤茯苓。半夏薑製。桑白皮炒。各五分。桂心。

分。紫蘇梗一錢。水鍾半。前八分服。婦人良方。

紫蘇飲 治全上

方見本門子懸條

醫門書品

妊娠

卷五

欬嗽 六方

金沸草散 治肺受風邪。頭目昏疼。咳嗽聲重。涕唾稠粘。

稠粘

荆芥穗一錢。前胡。麻黃。旋覆花。各七分。甘草炙。

芍藥炒。半夏製。各五分。薑棗煎服。婦人良方。

又方

貝母去心。麝炒黃為末。沙糖和丸。芡子大。每于食。

後含嚥一丸。神効。救急方。

華蓋散 治肺感寒邪。欬嗽聲重。鼻塞頭眩。項背痠。

急時發寒熱

紫蘇子炒。陳皮。赤茯苓。桑白皮炒。麻黃。各一錢。甘草炙五分。薑三片。葱白一枝。水一鍾半。煎七分。食後服。婦人良方

旋覆花湯 治感冒喘嗽。胸滿痰盛

旋覆花。赤芍藥。前胡。半夏炮。甘草炙。荆芥穗。白茯苓。五味子。杏仁去皮尖炒。麻黃去節。各等分。每服四錢。薑三片。棗二枚。水一鍾。煎五分。臨卧服。有汗者莫服。婦人良方

婦人良方

妊娠

卷四 三九

人參平肺散 治夏月咳嗽喘嘔。痰涎壅盛

人參去蘆。青皮麩炒。白茯苓。天門冬去心。陳皮。地骨皮。桑白皮製。各一錢。甘草炙五分。知母七分。五味子十粒。薑三片。水二鍾。煎八分。食後服。東垣方

吐血 四方

四生丸 治吐血衄血

生荷葉。生艾葉。生柏葉。生地黃。各等分。研爛。九。彈子大。每服一丸。水煎去粗服。丹溪方

柔脾湯 治虛熱吐血衄血。汗出

甘草炒。白芍藥炒。黃耆。各半兩。自製醃地黃一兩。五錢。每服五錢。水酒各半鍾。煎半鍾服。婦人良方

紫蘇飲 治氣逆吐血

方見本門子懸條

加味小柴胡湯 治怒動肝火吐血衄。及溺血下血

柴胡錢半。半夏製八分。人參去蘆七分。甘草六分。山梔仁炒。黃芩酒炒。生地黃。各一錢。水鍾半。薑三片。棗二枚。煎七分服。仲景方

尿血 六方

婦人良方

妊娠

卷四 三九

妊娠尿血

豆醬一盞熬乾。生地黃二兩焙。爲末。每食前米飲下一錢。普濟方

又方

生地黃一斤。酒四升。煮二升。分三服。婦人良方

又方

取夫爪甲燒灰。酒服。千金方

又方

生艾葉一斤。酒五升。煮二升。分三服。婦人良方

又方

蔡子三合研細水二碗煮取汁八分食前溫服日
三本草綱目

又方

阿膠炒黃為末食前溫飲下二錢聖惠方

鬼胎三方

斬鬼丹 治鬼胎如抱一甕

吳茱萸川烏炮秦艽柴胡僵蠶等分為末煉蜜丸
梧子大每七丸蜜酒送下取出惡物愈丹溪心法

常用藥品

妊婦

卷四

雄黃丸 治鬼胎瘀血腹痛

雄黃飛鬼白去毛莽草硃砂飛巴豆去油癩肝炙

黃各半兩蠲蟬一枚炙黃蜈蚣一條炙黃為細末

蜜丸桐子大每服二丸空心溫酒下日二服或下

如蛇蟲之類其病乃除婦人良方

娠婦腹內鐘鳴或如鬼哭

鼠穴中土研為末入麝香少許酒調服二錢立愈

或以黃連濃汁呷之薛氏醫案

傷寒 二十方○與三卷傷寒門參看

阿膠散 妊娠患時氣先服此安胎仍與主藥間服

阿膠炙焦白朮炒桑寄生人參去蘆白茯苓等分
為末每服二錢糯米飲調下日二服婦人良方

又方

伏龍肝為末一錢雞子清少許水調服之仍以水

和塗臍方寸乾再上傷寒類要

白朮散 治傷寒及熱病服此保胎

白朮炒黃芩酒炒各二錢水一鍾薑三片棗二枚

煎半鍾服四肢厥逆者不用婦人良方

常用藥品

妊婦

卷四

熱病用此以安胎氣

井中泥塗心下乾則易本草綱目

又方

用青羊屎研爛塗臍外臺秘要

又方

伏龍肝細研每用一錢水調塗臍下或加井底泥

青黛等分研塗臍中乾即易醫統

麥門冬湯 治傷寒壯熱嘔逆頭疼胎氣不安

人參去蘆石膏煨各錢半竹茹前胡黃芩酒炒各

五分。葛根。麥門冬去心。各一錢。水二鍾。薑三片。棗二枚。煎八分。溫服。婦人良方

柴胡石膏湯。治妊娠頭疼惡寒。身熱拘急。口乾。

柴胡二錢。甘草一錢。石膏煨三錢。水鍾半。薑三片。煎八分。服。如氣虛加人參八分。

葛根飲子。治時氣煩熱。口乾頭疼。

乾葛。麻黃去根節。各半兩。石膏煨一兩。豉一合。梗米半合。梔子十四個。葱白二莖。水三碗。煎二碗。分

三服。汗出為効。婦人良方

金匱要略

任廣

卷四 五

妊娠感冒風寒。狀如中風。不省人事。

用熟艾三兩。米醋炒極熱。以絹包熨臍下。良久即甦。婦人良方

清熱飲子。治時氣六七日。大小便不利。

芒硝一兩。研。葵子微炒二兩。水煎服。以利為効。

孕婦傷寒。大熱煩渴。恐傷胎氣。

嫩捲荷葉焙半兩。蚌粉二錢半。為末。每服三錢。新汲水入蜜調服。並治熱病。鄭氏方

妊娠熱病。頭疼嘔吐煩悶。

知母三兩。蘆根二兩。麥門冬去心兩半。青竹茹。葛根。各一兩。每用四錢。連根葱白三寸。水一鍾。煎六分。溫服。一方加人參一兩。婦人良方

梔子仁散。治熱病發黑斑。小便赤。氣喘急。胎欲落。

梔子。升麻。石膏。生地黃。各二兩。黃芩。大青。各一兩。

如無大青。即用青黛。共為末。每服半兩。葱白七寸。豉四十九粒。水一鍾。煎六分。溫服。

又方

車轄脂燒末二錢。酒一盞。調飲之。一方用艾葉四

金匱要略

妊娠

卷四 五

錢。酒二鍾。煮一鍾半。分三服。傷寒類要

妊娠熱病。面赤舌青者。其胎必死。亟宜下之。

朴硝研末。童子小便和熱酒調服三錢。立下。

又方

紅花一碗。酒三升。煮汁飲之。即下。婦人良方

佛手散。生胎即安。死胎即下。

方見本門驚胎條。

又方

伏龍肝為末。溫酒或白湯調下二錢。婦人良方

加味平胃散 治見論

蒼朮炒。厚朴製。陳皮。各錢半。甘草炙八分。水一鍾。煎七分。去渣入朴硝三錢。煮化服。未下再服。
婦人良方

痢疾 六方。○與八卷痢疾門參看

妊娠下痢

禪帶三寸。燒研水服。
千金方

又方

梔子炒為末。每服二錢。白湯調甚効

醫門醫品

妊娠

卷五 五

妊娠下痢日夜百餘行者

橡實二兩。楮葉炙一兩。為末。每服一錢。食前烏梅湯調下。
聖惠方

妊娠下痢肚腹絞疼

用烏雞子一枚。開孔去白留黃。入黃升一錢在內。厚紙裹定。泥固煨乾為末。每服三錢。米飲下。一服愈者是男。兩服愈者是女

妊娠下痢腹疼小便澀滯

糯米一合。當歸炒。黃耆蜜炙。各一兩。水煎分四服

補中益氣湯 治久痢不止

方見五卷內傷門

瘧疾 三方。○與七卷瘧疾門參看

七寶散 治妊娠瘧疾。不拘一日一發。或間日一發。或一日兩發者

常山。厚朴薑製。青皮麩炒。橘紅。甘草炒。檳榔。草果。等分。每用五錢。酒水各一盞。煎一盞。去粗露一宿。發時面東溫服。良久再服。一劑即愈。
婦人良方

又方

醫門醫品

妊娠

卷五 五

常山酒蒸。石膏煨。各一錢。烏梅炒五分。甘草炙四分。水酒各半鍾。浸一夜。平旦溫服。姚僧坦集驗方

又方

夜明砂末三錢。空心溫酒下。
經驗秘方

醫門醫品卷之三十四終

普門醫品卷之三十五

東武王化貞元起父編輯

門人陳斌憲卿父較閱

小產門

論薛立齋曰。小產重于大產。蓋大產如瓜熟自脫。小產如生摘斷其根蒂。豈不重哉。而人輕忽。死於是者多矣。大抵治法宜補形氣。生新血去瘀血為主。若未足月痛而欲產。用芎歸補中湯。倍加知母。

普門醫品

小產

卷三十五

止之。產而血不止。人參黃耆湯補之。產而心腹疼痛。歸川芎湯調之。元氣弱而欲產。八珍湯固之。血過多而發熱。聖愈湯治之。若汗不止。或昏憤喘。救急用獨參湯以托元氣。

丹溪曰。墮胎乃氣虛血虛。血熱所以黃芩熟艾膠等為安胎之妙藥。

徐春甫曰。醫家安胎多用香附砂仁。殊不知血氣清和。無火煎燥。則胎自安而固。氣虛則提不佳。火盛則血妄行。欲其不墮得乎。香附砂仁雖云快。

開鬱多用則耗真氣。況香燥之性尤能助火。氣血兩傷。反速其墮矣。

墮胎多在三月。以三月屬相火。所以易墮。治法須審其月。屬某經育養而治之。

王節齋曰。婦人半產多在三個月。五個月。及七個月。除跌撲損傷不拘外。若前次三個月而墮。則下次必如期復然。蓋先于此時受傷。故後至期必墮。乘其虛也。凡遇有半產者。產後須多服養氣血固胎元之藥。以補其虛損。及至有胎。須于兩個半月。

普門醫品

小產

卷三十五

後。即服固胎藥十數服。以防三月之墮。至四個月後。又服八九服。防過五月。至六個半月後。服五七服。以防七月。及至九個月內。服丹溪達生散十數服。可保無虞。其有連墮數次。胎元損甚者。服藥須多。不拘前例。如固胎飲。安胎丸。泰山盤石方。俱可用。多氣加香附砂仁。有痰加薑製半夏。大要在于清熱養血。條實黃芩為安胎聖藥。清熱故也。月宜倍用之。養胎全在脾胃。如鐘懸于梁。梁軟則鐘下墜。梁折則鐘墮矣。故白朮為安胎主藥。

故也。若因氣惱致胎不安者，少加行氣藥，如香附、木香之類。

凡妊娠腰痛，即是欲墮，可急治之。

通治

千金保孕丸 治婦人有孕，慣墮服此可免小產之患。

杜仲四兩，用糯米炒斷絲，川續斷酒洗二兩，為細末，山藥煮糊為丸，如梧桐子大，每服八十五丸，空心米飲下。忌酒戒惱怒。

小產

千金方

千金方

泰山磐石方 治婦人稟賦素弱，氣血不足，或肥而不食，或瘦而多熱，或食少勞多，素有墮胎之患，覺受孕後，即服此，更戒惱怒，少食酒醋辛熱之物，永保無虞。

人參、黃耆、蜜炙各一錢半，白朮炒，當歸酒洗，續斷酒洗，黃芩炒各一錢，川芎、白芍藥酒拌晒各八分，糯米一撮，甘草炙，砂仁炒各五分，水鍾半煎七分，食遠服，三五日即一服，保過四月即無慮也。有熱者倍黃芩，減砂仁，胃弱少食者加砂仁，減黃芩。

固胎飲 治妊婦氣血俱虛，每至三個月，慣墮者，此以固之。

人參去蘆，黃耆蜜炙，白朮炒，條芩炒各二錢，黃芩一錢，川芎、白芍藥炒各七分，熟地黃、陳皮各五錢，黃連升麻、柴胡各四分，糯米八十一粒，薑三片，二枚，水二鍾煎一鍾，空心溫服。

又方

鯉魚三斤重者一尾，粳米一升，用鹽醬煮食，大能固胎，打食三次。婦人良方

小產

千金方

千金方

胎動欲墮，腰痛下血，氣上搶心。

急以萆薢根，搗汁一鍾服之，即効。千金方

安胎丸

立聖散 治胎動欲產，下血不止。

雞肝二具，好酒一斤，煮熟，共酒食之大効。產寶

芎歸補中湯 治懷孕血氣不能榮養，以致半產，此可免。

方見三十四卷，妊娠諸證門安胎條。

八珍湯 治元氣虛弱，欲致小產，服此固之。

方見三十三卷經閉門

艾葉湯 治胎動不已。勢欲墮。已有所見。

艾葉。阿膠炒成珠。當歸酒洗。川芎各一兩。甘草六錢。每服五錢。水鍾半。煎至一鍾去粗。入阿膠。烱。停溫服。丹溪方

槐子丸 治妊娠月數未足。欲產脹痛。

槐子炒。蒲黃等分爲末。煉蜜丸。如梧子大。溫酒下。三十丸 大全良方

知母丸 治日月未足。欲產腰痛者。

小產

聖惠方

知母爲末。煉蜜丸。雞頭子大。每服一九。溫酒下。

或如梧子大。每服二十九。米飲送下。聖惠方

麥米湯 小產後氣血虛損。用此補之。

人參。白朮炒。各一錢。茯苓。歸身酒洗。陳皮。川芎。各八分。甘草五分。薑棗煎溫服。丹溪方

龍骨散 因用藥傷胎。半產。下血不止。

龍骨煨。當歸身酒洗。熟地黃。各八分。艾葉四分。榆。阿膠炒成珠。芍藥炒。乾薑。各六分。蒲黃五分。生角。總炙焦三分。爲末。每服二錢。食前米飲調下。

全良方

當歸川芎湯 治小產後瘀血。心腹疼。或發熱惡寒。

用當歸酒洗。川芎。白製熟地黃。白芍藥酒炒。各一錢。玄胡索炒。香附炒。青皮炒。澤蘭。牡丹皮。各八分。桃仁十粒研。紅花五分。水鍾半。入童便酒各小半鍾。煎八分服。婦人良方

人參黃耆湯 治小產氣虛血下不止。

人參去蘆。黃耆蜜炙。當歸酒洗。白朮炒。白芍藥酒炒。艾葉各一錢。阿膠炒二錢。水二鍾。薑三片。棗二枚。煎八分服。婦人良方

小產

又方 榆白皮炒。當歸酒洗。焙。各半兩。生薑三片。水二鍾。煎一鍾溫服。普濟方

又方

桑米中。蝎蟲燒末。酒服二錢。日二服。蟲屎亦可。

又方

又方

小薊根葉。益母草。各三兩。川水三大碗。煎至一盛。

又方

小薊根葉。益母草。各三兩。川水三大碗。煎至一盛。

去渣再煎至一盞分二服一日服盡

獨參湯 治全上

方見三十三卷崩漏門

聖愈湯 治小產去血過多五心煩熱睡臥不寧

自製熟地黃生地黃酒拌黃耆蜜炙人參去蘆

芎當歸酒洗各一錢水二鍾煎八分服婦人見

妊娠胎損下血腹痛

阿膠一兩炒艾葉半兩水一大碗煎半碗服

遺胎下血煩滿寒熱

鹿角鎔炒爲末每服三錢水調下日三服

又方

鷄翎爲末每服二錢溫酒下以効爲度

束胎門

論凡妊娠至九月宜用滑胎湯藥使胎瘦易產

學士云妊娠惟在抑陽助陰然胎前藥極惡羣

陰陽錯雜別生他病惟枳殼散以抑陽四物湯以

助陰然枳殼散其味多寒若單服恐致胎寒腹

更以內補丸佐之則陽不致強陰不致弱陰陽調和胎無不利餘方俱平和無礙并錄于後任人裁

通治 十三方

枳殼散 能令胎瘦易產昔湖陽公主每產累日不

下南山道人進此方

商州枳殼炒二兩甘草炙一兩爲末每服二

錢空心沸湯調服日三服孕至七月後宜服之徐

氏醫按

管門醫品 束胎

四物湯 治見論

方見三十三卷調經門

內補丸 補血養胎妊婦衝任虛者最宜

自製熟地黃三兩杵膏當歸一兩酒洗炒爲末和

丸梧子大每服三四十九溫酒或熱水下

榆白皮散 臨月服之滑胎易產

榆白皮炒甘草炙各二兩葵子一兩爲末每服五

錢水煎服

又方

車前子爲末或酒或米飲調服二錢日三服

又方

白朮炒枳殼麩炒等分爲末米飲九倍子大入月
每日溫水下三十丸胎瘦易產神良

保命集

又方

榆皮焙爲末臨月每水服二錢日三服產極易
本草別論

又方

五月五日收赤堊陰乾和馬齒莧爲細末等分與

普門醫品

東垣

卷五 九

妊娠八常服即易產

神寢丸 治全上

通明乳香半兩焙枳殼麩炒一兩各爲末煉蜜丸

梧子大每服三十九空心溫酒下

蘇州施少卿方

便產蕪下氣寬膈

枳殼麩炒五兩甘草炙一兩半香附子製二兩

末每服二錢白湯調服

達生散 八月後服此扶正氣散滯氣人尤宜

大腹皮當歸俱酒洗白朮炒芍藥炒人參陳皮紫

蘇各七分甘草炙五分水鍾半煎服春加川芎防

風夏加黃芩五味子秋加澤瀉冬加砂仁上氣倍

紫蘇性急多怒加柴胡黃芩少食加砂仁神麩湯

加麥門冬葛根饑加黃楊有痰加半夏黃芩腹寒

加水香連用十數服甚得力

東胎丸 妊娠八月胎氣展大恐難產用此東之

條黃芩酒炒春夏一兩秋冬五錢白朮炒三兩白

茯苓七錢半陳皮二兩爲細末米糊爲丸梧桐子

大每服五十九白湯下

普門醫品

永胎

卷五 十

又方 第九個月服

黃芩炒一兩怯弱及食少者減半白朮一兩炒枳

殼炒七錢半滑石末飛七錢半小便多者減用

救生散 胎氣本怯不宜服枳殼散用此益氣順胎

易產

人參訶子煨去核白朮炒神麩陳皮各一錢麥芽

七分爲末每服三錢水一鍾煎七分空心服

順胎飲 妊婦九月以後服此保無驚恐

香附子製四兩縮砂仁炒三兩甘草炙一兩爲末

每服二錢米飲下 朱氏集驗方

溫養胎氣 胎至九月邊宜常用

猪肚一枚如常着五味煮熟食甚有益 千金

保產無憂散 治妊娠身怯安逆口厭甘肥憂樂不

常食物不節致胎肥厚根蒂堅牢預服此易生

當歸酒洗川芎白芍藥酒炒枳殼麩炒乳香各一

錢木香甘草炙血餘即髮灰以豬猪血和之各一

錢半為末每用三錢水煎日二服神効 醫統

預備待產及便產事宜俱見下卷

醫門藥品

原方

卷五 十一

醫門藥品卷之三十六

東武王化貞元起父編輯

門人陳斌憲卿父較閱

臨產須知

論凡妊婦至臨月當安神定慮時當步履不可多

睡飽食過飲酒醴雜藥宜先貼產圍密鋪床帳預

請老練穩婆備辦湯藥器物欲產時不可多人喧

鬧倉皇但用老婦二人扶行及凭物站立若見藥

醫門藥品

臨產

卷五 一

水腰腹痛甚是胎離其經令產母仰臥令兒轉身

頭向產門用藥催生坐草若心煩服水調白蜜一

匙覺饑吃糜粥少許勿令饑渴恐乏其力不可強

服催藥早於坐草慎之慎之

凡臨月不得洗頭濯足多致產難不可不知

凡冬末春初產室用火衣服尤當溫厚方免胎寒

血結之患

穩婆須擇老練者當先施惠預說真知倘有生理

不順只說未產或雙胎只說胎衣未下恐驚則氣

散。愈難生息。

王子亨難產逆生。海紀一切神殺。雖未必盡然。然時日鬼神。先望立效。必非虛誕。寧信其有。不可自貽後悔。但神殺之類。恐非山野之人。所能盡悉。今擇其簡要者錄之。

凡安產藏衣。並向月。德月空方。並從節氣更換。若交次月節。便作次月用。若值閏月。只看節氣用之。如正月在丙壬。可于壬位。產婦床帳。丙位藏衣之類。預寫一圓貼產房北壁。月信日宜見大統曆

普門醫品

臨產

卷三六 二

又有禍害方。絕命方。不得于其上產。又不得向之。大小便。遇懸尸日產。不得攀繩。宜懸馬轡攀之。閉肚方。臨月至滿月。並不得向之。大小便。及棄不淨之水。八疰方。產帳不得向之。開門。切須謹之。禍害等方及懸尸日見通書

入月宜預備藥物。如佛手散。治血虛之危證。花薤石散。黑神散。治血入胞內。脹不得下。或惡露上攻。心疼悶絕。加味芳歸湯。治交骨不開。失笑散。治惡露腹疼。不省人事。清魂散。治血暈等證。催生如神。

散。治橫生逆產。順生丹。催生符。催生易產八珍湯。

十全大補湯。治難產。勞傷血氣。加味平胃散。腐化死胎。及催生油蜜。冬葵子。益母草。皆為緊要之藥。必不可缺。其斷臍帶。先用線近臍紫紫。吊裹咬斷。如天氣風寒。或難產。致兒困危。首先紫臍帶。以油紙燃燒斷。此又為迴生起死之要法也。

楊子建十產論。凡生產先知此十證。庶免子母之命。折於無辜也。一曰傷產。言胎未足月。有所傷動。以致忽然臍腹疼痛。或服催藥過早。或產母用力太早。逼見錯路。不能正生。凡分娩須待兒身轉順。頭對產門。努力一送。兒即正生。二曰催生。言產時兒頭至產門。或藥水已下。方服藥催之。或日久產母困倦難生。宜服藥以助其血氣。令兒速生。

普門醫品

臨產

卷三五 三

○三曰凍產。言天氣寒冷。產母血氣凝滯。不能速生。故衣裳宜厚。產室宜暖。背心宜溫。和庶兒易生。仍以大油紙撚徐徐燒斷臍帶。勿用剪刀。○四曰熱產。言盛暑之月。產婦當溫涼得宜。熱甚則產母頭疼面赤昏暈。室中人眾。熱氣蒸逼。亦致前患。名

曰血運。若夏月風涼陰雨亦當謹避。○五日橫產。兒方轉身產母用力逼之故也。凡產母當令安然仰臥。穩婆先推兒身順直。頭對產門。以中指探其肩。不令臍帶羈扳。方用藥催之。繼以產母努力。兒卽生。○六曰側產。言兒尚未轉身。產母努力故也。當令產母仰臥。穩婆推入候兒自順。若良久不生。令穩婆手入產戶一邊撥兒轉頭近產門。却服催藥并努力卽下。○七日偏產。言兒身未順生路。產母努力逼兒頭偏一邊。產雖露頂非也。乃額角耳。

普門醫品

臨產

卷三十六 四

○十日盤腸產。謂臨產子腸先出。然後產子。其腸不收。穩婆以醋水各半盞。嚙產婦面背卽收。不可不知。
 (附方)
 佛手散 以下治俱見論
 方見三十四卷妊娠諸證門
 花蕊石散
 失笑散
 清魂散
 普門醫品 臨產 卷三十六 五
 黑神散
 八珍湯
 十全大補湯
 以上六方俱見三十七卷產後諸證門
 催生如神散
 順生丹
 以上二方見本卷催生門
 加味芩歸湯
 加味平胃散

以上二方見本卷產難門

體玄子借地法 能避一切神殺

入月一日朱書咒法一幅貼產婦房內壁上更不須避忌神殺咒曰東借十步西借十步南借十步北借十步上借十步下借十步壁方之中四十餘步安產借地或有穢污或有東海神王或有北海神王或有日遊將軍白虎夫人遠去十丈軒轅格搖舉高十丈天符地軸入地十丈令地空閑產婦某氏安居無所妨碍無所畏忌諸神擁護百邪遠

青門醫品

臨產

卷六 六

去急急如律令勒

催生靈符

𠄎𠄎𠄎𠄎

右四符入月一日墨書鞋底上密安產婦褥下

𠄎𠄎𠄎𠄎

右四符以水飛硃砂書之貼於房內北壁上坐坐薦時將符以針挑就盞內燒化溫水調服

𠄎𠄎𠄎𠄎 貼產婦北壁上

𠄎𠄎𠄎𠄎 貼產婦枕上

如產婦覺不安穩用水飛硃砂書右符貼之

𠄎𠄎𠄎𠄎

右三符遇產難以墨書紙上化溫水中吞之

𠄎𠄎𠄎𠄎

右四符遇胞衣不出以朱砂書紙上化溫水中吞

青門醫品

臨產

卷六 七

之俱不可用涼水

催生門

論人生榮枯貴賤係於生時得其時則終身富貴失其時則沒世貧賤然則命稟于有生之初豈可催乎催生之說蓋為難產而設也窘迫急難之中一壺千金催生符藥其可少乎

婦人以血為主惟氣順則血和胎安則產順富貴之家過於安逸以致氣滯而胎不轉動或為交合

使精血聚於胞中。皆致產難。若腹或疼或止。名為
弄胎。穩婆不悟。入手試水。致胞破裂。乾兒難轉身。
亦難生矣。凡產值痛極。兒過產門。方可坐草。時當
盛暑。或血暈血溢。當飲清水解之。

若胎胞破早。血水先乾。或難產勞傷血氣者。金用
八珍湯。或十全大補湯。加益母草。不時與服。以協
濟之。或黃耆數斤。芎歸四五斤許。大釜水煎。藥氣
氤氳滿室。使產婦口鼻俱受其氣。

通治 二十方

普門醫品

催生

卷三六 八

催生如神散 服之即生。又治橫生逆產。其功甚大。
用百草霜。白芷各為末等分。每服三錢。候胎順產
門。以童便米醋和如膏。加沸湯調下。或童便共酒
煎。連進二服。此藥大能回血。又免血乾甚妙。凡見
橫逆不順者。即急服之。便產方

催生丹 服之易產

臘月取兔腦髓一箇。金紙上風乾。通明乳香二兩。
同研令勻。於臘月初七夜。安桌子上。露星月中。設
茶果齋戒焚香。望北拜告曰。大道弟子某。脩合救

世上難產婦人。藥順降威靈。佐助此藥。速令生產。
禱畢。以紙包藥。路一夜。天未明時。以猪肪搗和。丸
芡實大。紙袋盛懸透風處。每服一丸。溫醋湯吞下。
良久未下。更用冷酒下一丸。即生。仙方也。經驗方

順生丹 全上

臘月兔腦髓去膜。研如膏。乳香。母丁香。各一兩。麝
香一錢。俱研細。用兔腦髓和。九鷄頭子大。陰乾。每
服一丸。溫水吞下。即生。藥在兒手握中。神驗。婦人
良方。

普門醫品

催生

卷三六 九

催生開骨膏 全上

用猪心血。和乳香末。九梧子大。朱砂為衣。面東酒
吞一丸。未下再服一丸。或以二丸。金嚼。冷酒送下。
婦人良方

催生靈符 全上

法見本卷臨產須知門

催生神驗方 全上

兩手各把石燕一枚。即生。唐本草

又方

黃蜀葵花。焙研爲末。熟湯調服二錢。如無花用子。半合。研末。酒淘去滓飲之。如漏血乾澁難產。併進三服。良久覺腹中寬。胎滑卽下。如神。或臨產時以子四十九粒研爛。溫水服之。亦效。產寶方

又方

蜀葵子三錢。滑石三錢。爲末。順流水調服。本草方

又方

通明乳香一塊。如皂子大。爲末。腰痛時。用冷水入醋少許調服。令人扶立。兩手拏石。燕二個。念醫靈

書附醫品

催生

卷六十一

藥聖三遍。行數步。坐草便生。更無痛楚。本草綱目

又方

路傍破草鞋一隻。洗淨燒灰。酒服二錢。路左生男。路右生女。覆者兒死。側者有驚。屢驗不爽。胎產方

又方

用臘月兔腦一個。攤紙上陰乾。剪作符子一面。上書生字一個。候腹痛極時。燈上燒灰。煎丁香湯調服。婦人良方

又方

臘月兔頭煨爲末。蔥白煎湯調二錢。立生。或臘月兒血。紙袋盛掛當風處陰乾。爲末。煎乳香湯調下二錢。或兔皮和毛燒爲末。酒調下二錢。卽產。如胎衣未下。再服。本草綱目

又方

魚鰾尺許。新瓦上煨研。陳醋調服。立下。婦人良方

又方

鑿柄木燒灰酒服。或用銃楔亦妙。藏器本草

又方

書附醫品

催生

卷六十一

用弓弦弩弦縛腰。及燒弩牙納酒中飲之。皆取其快速之義。外臺秘要

又方

五月五日午時。令一人在壁內捧乳鉢。一童子在壁外持乳香。以筆管自壁縫中逐粒遞過。用鉢研細。水丸。芥子大。每服一九。無灰酒下。簡要濟衆方

催生易產

蓮花一瓣。書人字吞之。卽產。肘後方

又方

蓖麻仁一個。巴豆仁一個。麝香一分。研貼臍中及足心。集簡方

催生勝金散 治人弱難產

鹽豉一兩。以舊青布裏之。燒紅爲末。入麝香五分。

秤鍾燒紅。淬酒。服二錢。卽下。本草綱目

胞漿先乾胎不得下

急服大料四物湯。滋其血氣。并濃煎蔥湯。薰洗產

戶。更用油燭塗產戶內。却服前藥。薛已方四物湯

方見三十三卷調經門

普門醫品

催生

卷三十一

產難門

生產艱難 橫生逆產 盤腸產
子死腹中 胞衣不下

論產之有難去聲也。由產婦平日起居失宜。或臨時

用力太早。以致生理不順。或橫或逆。可驚可愕。治

之失宜。每致子母俱殞。不可不慎。

橫者手先見也。見轉身未順。用力一逼。致手先出。

宜令產母安然仰臥。以針刺兒手心。以鹽擦之。兒

手縮入。仍令穩婆推兒身順。以中指摩兒肩。不令

臍帶扳碍。則易生也。

逆生足先見也。見未轉身。產母覺肚疼。卽使用力。

致一足先出。宜以針刺兒足心。以鹽擦之。候兒自

順。若不縮入。令穩婆以手推入。撥轉之。亦有逆而

生出者。雙足並下。爲踏蓮花生。

盤腸產者。臨產子腸先出。或產畢不收。令人可畏。

宜明諭產婦。不必驚惶。慎毋傷動。按法治之。隨手

而上矣。

有胎死腹中者。多因觸犯禁忌。或驚動太早。或抱

腰太重。或頻探試水。胞衣先破。血水乾涸。所致。若

普門醫品

產難

卷三十一

已死不下者。其證產母腹冷脹悶。舌青黑。或指甲

俱青。甚者口中作屎臭。宜用加味平胃散下之。因

熱病胎死者。詳見妊娠諸證門。

胞衣不下者。因氣力疲憊。不能努出。或血入衣中。

脹大而不能下。以致腹痛喘急。急服花蓋石散。或

牛膝散。血散脹消。其衣自下。欲斷臍帶者。須先以

小物繫墜。然後斷之。

生產艱難 十九方

生產艱難困欲絕

冬葵子一合搗破。水二升煮汁半升頓服。少時便產。本草綱目

又方

芒硝末三錢。童子小便溫服。必效。并治死胎不下。有猫下一子。號叫不已。知爲死胎不下。以此灌之。遂連下四猫。信効方

又方

益母草。搗汁七大合。煎減半頓服。即生。無鮮者以乾者一握煎服。并治胎死腹中即下。韋宙獨行方

醫門醫品

產難

卷六 高

又方

蛇蛻泡水洗產門。自易。實鑒

又方

酸漿子研末。水吞立產。別錄

又方

赤小豆。生吞七枚佳。有日久氣乏。用赤小豆一升。水九升煮取四升。入炙過黃明膠一兩煎。不時服五合。不過三四服即產。集驗方

又方

產時細嚼馬櫛柳數枚。并華水下。須臾立產。再以四枚去瘀。兩手各握二枚。惡水自下。江表方

又方

臨時持馬銜勒。并煮汁服之。立產。開寶方

又方

法製雲母粉半兩。溫酒調服。入口即產。不順者即順。萬不失一。積德堂方

平日生產艱難

用海馬一對。帶於身。臨時以兩手握之。即易產。蘇

醫門醫品

產難

卷六 高

胎漏乾澀難產

香油蜂蜜各一兩。同煎數沸。溫服。胎滑即下。胎產

須知

難產數日不出

桃仁一個。劈開一片。書可字。一片書出字。吞之即生。本草綱目

又方

車軸脂。吞大豆許二丸。即下。逆產者。即以其脂塗

又方

車軸脂。吞大豆許二丸。即下。逆產者。即以其脂塗

兒脾心。即順千金方

加味芎歸湯 治難產三五日不下垂死及矮小文
人交骨不開

乾龜殼一個酥炙婦人頭髮一窩燒灰川芎當歸
各一兩每服七錢水煎服如人行五里許再一服
生胎死胎即下 摘玄方

婦人難產或死胎不下皆因風熱燥澀結滯緊飲不
能舒緩故也

飛過滑石末六錢甘草末一錢分作二服以香油

書附醫品 產難 卷六 大

入蜜少許調服甚效 傷寒直格

又方

墨一寸研末溫水服立下胎死即出 普濟方

又方

以瞿麥煮濃汁服之 千金方

產難及胞衣不下或血搶心脹刺欲死者

臘月鬼皮連毛燒灰酒服二錢極効 蘇恭方

婦人難產及日月未至而產

臨時取夫衣帶五寸燒爲末酒服之視帶更佳 蘇

器本草

種生通生 十二方

一切生型不順或積或逆

當歸二兩芎藭一兩爲末先以大黑豆炒焦入長
流水一盞重便一盞去豆煎一盞分二服未効再
服若胎已死者服之即下 婦人良方

又方

伏龍肝細研每一錢酒調服并擦母臍中仍以針
刺兒手足心入分許兒驚轉即回順而生 急救方

書附醫品 產難 卷六 大

又方

人參末乳香末各一錢丹砂末五分鷄子白一枚
入生薑自然汁三匙攪勻冷服即生 婦人良方

又方

取布針十四枚燒紅淬酒七遍飲之 瀕湖方

又方

兔絲子車前子等分爲末酒服二錢 聖惠方

又方

葵花爲末酒服二錢 千金方

又方

蛇蛻一具。蟬蛻十四個。頭髮一箇。金燒存性。分二

服酒下 濟生秘覽

又方

以手中指取金下墨。交畫兒足下。即順千金方

又方

以鹽塗兒足底。急爬搔之。或以針刺之。仍以布包

熱鹽。產婦腹千金方

秘方益母丸 專治橫生逆產及難產神効

普門醫品

產難

卷之六

五月五日。采益母草陰乾。石臼搗末。煉蜜丸如梧

子大。每五十丸。臨時童便溫酒送下 玉機微義

倒生口噤

冬葵子炒黃爲末。酒服二錢 產寶方

橫產及胞衣不下

用鐵藥杵燒赤。淬酒飲。自順 大明本草

盤腸產 九方

產時子腸先出。產後不收。名盤腸產

以半夏末頻搗鼻中。即上也 婦人良方

又方

蓖麻子仁四十九粒。研。產母頭頂。腸收上。即洗去。其腸若乾。以磨刀溫水少許潤之。再用葱石煎湯服之。即收

又方

大紙撚用麻油潤點着吹滅。以烟薰產婦鼻中。腸即上

又方

腸出盛以潔淨漆器。濃煎黃耆湯浸之。腸即上

普門醫品

產難

卷之六

產後腸脫不收者

檉枝取皮焙乾一握。水五升。連根蔥五莖。川椒一

撮。同煎至三升。去粗。傾盆內。乘熱熏洗。冷則再熱

一服。可作五次用。洗後睡少時。忌鹽酢醬。麪發風

毒物。及用心努力。年深者亦治 婦人良方

又方

皂莢樹皮。川棟樹皮。各半斤。石蓮子炒去心。皂莢核。各一合。共爲末。以水煎湯。乘熱以物圍定。坐熏洗之。挹乾。便吃補中益氣湯一服。仰睡 婦人良方

補中益氣方見產後諸證門

又方

香油三斤煉熟。盆盛令婦坐盆中飯時許。先用皂角炙去皮研末吹少許入鼻作嚏立上。半開方

又方

以五倍子同白礬煎湯熏洗。婦人良方

又方

老鴉蒜葉如蒜秧。采取一把以水三碗煎至半。去渣薰洗神効。危氏得効方

產門諸品

產難

卷六 三

子死腹中

十七方

加味平胃散 治死胎不下

蒼朮厚朴陳皮各錢半甘草一錢酒水各一盞煎

至一盞去粗投朴消五錢再煎三五沸溫服其胎

即化水而出神驗如不下者再服加赤銀一錢同

煎更妙。婦人良方

觀音救生散 治全上

桂末二錢待痛緊時童便溫熱調下亦治難產

生加麝香少許酒下。何氏方

又方

朴消三錢溫童便調下。猶犬牛畜用之皆驗

又方

鹿角屑三錢入葱豉煮湯服之立出。產乳方

又方

錫粉水銀各一錢棗肉九大豆許溫水吞下立出

又方

川芎爲末酒服二錢死胎即出。不過二服。千金方

又方

產門諸品

產難

卷六 三

以利斧煨赤置酒中待溫飲之便下

又方

麝香當門子一枚桂心末二錢溫酒服。本事方

又方

取木婦鞋底炙熱熨腹。集玄方

又方

用鬼臼黃色者不拘多少去毛爲細末再碾如粉

爲度每服一錢無灰酒一盞同煎八分通口服如

神活人無數。婦人良方

又方

苦壺蘆燒存性研末每服一錢空心熱酒下

又方

葵子爲末酒服二錢黃蜀葵更妙千金方

又方

清油和蜜等分入湯頓服普濟方

柞木飲子

治產難或胎爛腹中脹悶其効如神

柞木

生南方葉小而細齒可作梳本名鑿子木

取嫩枝一尺寸剉甘草大者五寸剉五段用水三

產門難

產難

卷五 五

鍾煎一鍾半溫服若用催生候胎順產門服之立

下更無諸苦

本草綱目

子死腹中并雙胎一死一生服之令死者出生者生

用蟹爪一升甘草二尺東流水一斗以葦薪煮至

二升濾去粗入真阿膠三兩令化頓服或分二服

若人困不能服者灌入即活

本草綱目

胎死腹中及胞衣不下上搶心者

用雀麥一把水五升煮二升溫服

子母秘錄

胎死不出胞衣不出及產後諸疾狼狽者

刺羊血熱服一小盞極效

聖惠方

胞衣不下

二十一方

花蕊石散 治產後敗血流入胞中脹滿不下至死

心頭疼者急用一服化水即出其効如神

方見三十七卷產後諸證門

牛膝散 治胎衣不出腹中脹痛急服此藥腐化而

下緩則不收

牛膝酒浸川芎朴消蒲黃各二兩當歸酒洗一兩

桂心五錢每服五錢生地黃一錢煎服婦人良方

產門難

產難

卷五 五

又方

蓖麻子仁七個研爛塗足心衣下速洗去遲則腸

出即以此膏塗頂上腸自入亦可催生

崔元亮方

又方

百草霜白芷等分爲末每服二錢童便醋各少許

調勻熱湯化服不過二服即愈

和方

奪命丹 治瘀血入胞脹滿下急服此藥血即消

衣自下

附子炮半兩牡丹皮乾漆炒令烟盡各一兩爲細

末好醋一升。大黃末一兩。同熬成膏。和丸如桐子。

大每十數丸。溫酒下。女科秘要

胎衣不下。惡血冲心。

五靈脂半生半炒。研末。每服二錢。溫酒下。產寶方

又方

以本婦髮倒捺口中。令作呃逆聲。即下。孫真人方

治一切胞衣不出。

取本婦手足爪甲。燒灰。酒服。即令有力。婦人抱起。

將竹筒於臂前起下。聖惠方

產前諸病

產難

卷之六

又方

取夫單衣蓋井上立出。婦人良方

又方

以本婦褲覆井上。或以所着衣籠竈上。千金方

又方

鹿角屑。為末。二錢。溫酒下。百一方

又方

黑豆一合。炒熟。入醋一盞。水一盞。煎三五沸。作二

三次服。酒煎亦可。婦人良方

又方

竈心土五錢。醋調。納臍中。續服甘草湯三四合。

寶方

又方

紅花酒煮汁。飲二盞。熊氏補遺

又方

蒲黃二錢。溫酒調服。楊氏產乳方

又方

水煮弓弩絃。飲汁五合。或燒灰酒服。千金方

產前諸病

產難

卷之六

又方

以水入醋少許。喫面。神效。聖惠方

胎衣不下。經日脹滿至極。

用返魂丹。以炒鹽湯化下。方見血。運門

胞衣不下。困極。

螻蛄一枚。水煮二十沸。灌之下喉。即出。延年方

又方

蓮蓬殼。酒煮服之。或用荷鼻煎酒服。亦驗。救急方

產後無憂散。治產後氣虛。不能送出胞衣。腹中不

覺脹悶。卽知非瘀血也。宜服此及益母丸。

膏歸。川芎。白芍藥。枳殼。乳香。血餘灰。各等分。每服三錢。水煎。日二服。女科撮要

普門醫品

產難

卷六 天

普門醫品卷之三十七

東武王化貞元起父編輯

門人陳斌憲卿父較閱

產後諸證門

血暈 惡露不行 惡露不止 中風 惡病 心腹疼 不語 發熱 嘔逆 自汗 乳汁不通 水腫 煩渴 發狂 產門不利 惡露 瘀分 血虧 血虛 下痢 難治

論產畢飲熱童便一盞。閉目少坐。上床倚高立膝。仰臥。不時喚醒。及以醋塗鼻。或用醋炭。及燒漆罌。更以手從心掄至臍下。使惡露不滯。如此三日。以防血運血逆。酒雖行血亦不可多。恐引血入四肢。

普門醫品

產後諸證

卷三十七

且易昏運。宜頻食白粥少許。一月之後。宜食羊肉。猪蹄少許。仍慎言語。七情寒暑。梳頭洗足。以膏爲度。否則患手足腰腿酸疼等證。不可刮舌。恐傷心氣。不可刷牙。恐致血逆。須血氣平復。方可治事。犯時微若秋毫。成病重于山嶽。可不慎哉。丹溪先生云。產後如無惡血。惟當大補氣血。雖有雜證。以末治之。

產後血入肝經。令人眼花昏悶。或敗血冲心。及去血過多。皆能作運。宜預燒秤錘。以醋沃之。或釀醋。

塗口。或燒漆器熏之。使產母鼻吸其氣。庶無此患。
若敗血冲心而作運者。宜失咲散。下血過多而作
運者。宜芎歸湯。

產後惡露不下。因臟腑勞傷。氣血虛損。或風冷損
搏。以致氣滯血凝而不行也。宜失咲散。及花蕊石
散最妙。

產後惡露不絕。因傷經絡。或肝虛不能藏血。或脾
虛不能統血。或胃氣下陷。致血隨之。或肝火暴盛。
致血妄行。各因而治之。不可執一。

普門醫品

產後諸症

卷五

二

產後中風。或血氣未復。風寒所感。以致筋攣拘急。
口眼喎邪。或肢體緩弱。入臟則恍惚驚悸。郭稽中
曰。產後強力下床。或入房。或憂怒。內傷臟腑。皆能
致風。○薛立齋云。前證果外邪所傷。屬形氣不足。
病氣有餘。當補元氣為主。稍佐以治病之藥。若強
力下床。月內入房。屬形氣病氣俱不足。當純補元
氣。多有復甦者。若誤投風藥。乃促其危也。
產後發瘧。因去血過多。元氣虧極。或風邪相搏。其
形口噤。背強。腰背反張。如風如癰。或搖頭馬嘶。不

時舉發。氣息欲絕。若汗出如雨。兩手不及拭者。不

治。○有汗而不惡寒者。名柔瘧。若無汗而惡寒者。
曰剛瘧。皆為敗證。急以十全大補湯主之。如不應
加附子。多有甦者。若攻風邪。死無疑矣。○又有瘧
瘵一證。瘵者筋脉拘急也。瘵者筋脉縱弛也。因產
後陰血去多。陽火熾盛。筋無所養而然。雖未至如
瘵之甚。然亦瘵之類也。宜用八珍散加丹皮。鈞藤
以生陰血。食少者用四君加芎歸。丹皮。鈞藤。以補
脾土。蓋外證似風。皆屬虛象。無風可逐。無痰可消。

普門醫品

產後諸症

卷五

三

惟當固本為善。若無力抽搐。戴眼反折。汗出如珠
者。皆不治。

產後心疼。為陽氣虛寒。或陰火上冲。致傷心胞絡。
疼痛。腹痛亦係瘀血壅滯。或外感風寒。內傷生冷。
當審其因而治之。

產後遍身疼痛。由氣血虛。百節開張。血流骨節。以
致肢體沉重不利。筋脉引急。發熱頭痛。若誤作傷
寒發汗。則變為瘵。當大補氣血為主。

產後不語。因心氣虛而不能通于舌。則舌強不能

言。又脾病舌本強而不能言。又腎之別脉上入于心。繫舌本。虛則不能言。宜用八珍湯。如不應。加附子。或用獨參湯。

產後喉中氣急喘促。因榮血暴竭。衛氣無主。獨聚于肺。名曰孤陽。最為難治。若因敗血停凝。服二味參茸飲。若因風寒所傷。服旋復花湯。

產後呃逆。屬胃氣虛寒之惡候。調理得宜。亦有得生者。

產後汗不止者。由陽氣頓虛。腠理不密。而津液妄

審門醫品

產後諸證

卷三 四

泄也。虛乏短氣。身體消瘦。唇口乾燥。久則經水斷絕。由津液竭故耳。且汗多。每變為瘧。遂為危證。不可不早治也。

婦人乳汁。乃氣血所化。若元氣虛弱。則乳汁短少。若累產無乳。此內亡津液。宜滋化源。若產後乳自出。乃胃氣虛。宜服補藥止之。若乳多。滿痛。用溫帛熨之。或炒大麥芽煎湯服之。未產而乳自出。謂之乳泣。生子多不育。

產後大便悶澀。因腸胃虛弱。津液不足。若小腹悶

疼。宜服麻仁丸潤之。若用寒藥。則促其危。○產後腸胃虛弱。津液燥竭。大小便多不利。宜養血滋陰。若小便不利而渴者。用清肺飲。不利而不渴者。用滋腎丸。

產後四肢浮腫。乃敗血乘虛流注。及風邪所乘。若皮膚腫而浮虛。乃氣也。若皮膚腫如熟李。乃水也。氣腫者宜發汗。水腫者宜利小便。

產後餘血奔心。煩悶。蓋因產後不飲童便。以故虛火上炎所致。亦有因食米麪乾飯太早。脾胃不能

審門醫品

產後諸證

卷三 五

消化。熱鬱于內。煩渴痞悶者。宜服見睨丸。慎不可下。

產後狂言譫語。乃心血虛也。心虛則神不守舍。及敗血上冲。證似顛狂。俱以補養元氣為主。仍參各證治之。○若言語譫妄。如見鬼神。由血氣虧損。瘀血停滯所致。宜用調經散。

產後陰脫。及玉門不閉。因產時努力太過。及舉動房勞所致。或陰挺逼迫。腫痛。小便淋漓。若發熱惡寒者。用補中益氣湯。

產婦因穩婆不慎。用手鹵莽。以致損脾。小便淋漓。須大補氣血。自可復完。若陽氣虛弱。不能約制。致小便頻數。或為遺尿者。用桑螵蛸散。

產後虛煩發熱。乃陽隨陰散。氣血俱虛。若惡寒發熱。煩燥作渴。急用十全大補湯。若熱愈甚。急加桂附。若作渴面赤。宜用當歸補血湯。若誤認為火證。投以涼劑。禍在反掌。

產後蓐勞。多因產理不順。疲極筋力。憂勞心慮。或生產日淺。妄有動作。將養失所。致令虛羸喘乏。寒

普門醫品

產後諸證

卷三七 六

熱如瘧。頭痛自汗。肢體倦怠。痰嗽欬逆。腹中絞刺。名曰蓐勞。沉重着床。顏容憔悴。

產後血崩。因經候未復。而勞傷。或食酸醎之味。致傷血海。若小腹滿疼。肝經已傷。最為難治。宜急服固經丸。小便尿血者。因虛熱。血滲于胞也。亦有怒動肝火。致血妄行者。宜小柴胡湯加山梔。產後下痢作渴者。乃內亡津液。及胃氣虛。不能生津液。但止其渴。痢自瘥。

血運

二十二方

花並石散 治婦人產後敗血冲心。血運血風。

花並石二兩。硫黃四兩。並作小塊。拌勻入陽城礮。泥固濟晒乾。用四方磚一塊。上書八卦五行字。以礮置其上。用炭簇定。自下生火。煨二時。冷定取出。為細末收貯。凡血運血風等證。及胎死腹中。胎衣不下。至死。但心頭微溫者。急以童子小便調服一錢。取下惡物即愈。終身不患血證。若隔上有血。化為黃水。即時吐出。或從小便出。甚効。利濟局方。

失咲散 治產後惡血上攻。眩暈滿悶。或牙關緊急。

普門醫品

產後血運

卷三七 七

用五靈脂蒲黃各一錢。醋水煎服。神効。婦人良方。

芩歸湯 即佛手散 治產婦去血過多。昏悶作運。

方見三十卷妊娠諸證門。

返魂丹 治產後血運。眼黑口渴。煩悶。如見鬼神。狂言。不省人事。或氣喘欬嗽。胸膈不利。惡心吐酸。面目浮腫。自汗發熱。或惡露不利。結滯刺痛。上搶心胸。滿悶寒熱。衄血瀉血。嘔血等證。

益母草方梗紫花者。于五月五日。六月六日。七月七日。各連根收采。陰乾。用葉及花子。以石器碾細。

末煉蜜丸如彈子大每用一九童便酒化下日二

三服以愈為度或丸如彈子大每服七十九亦可

凡產後服此安魂定魄調血順氣百病不生產後

清魂散治產後氣血暴損虛火妄動血隨火上以

致心神昏亂口噤眼花悶絕

澤蘭葉人參太蘆川芎各一錢荆芥三錢各為末

和勻每服一二錢熱湯和酒調灌之女科撮要

產後血運狂言煩渴不止

香附子薑汁炒為末每二錢米飲下朱氏方

普門醫品

產後血運

卷三七 八

又方

用生藕汁飲之或用生藕汁生地黃汁童便等分

煎服更妙羅安時方

奪命丹治血運腹痛

沒藥血竭等分為末每服二錢熱酒童便調下

產後血運不知人事

五靈脂二兩半生半炒為末每服一錢白水調下

如口噤者幹開灌之入喉即愈國經本草

又方

益母草汁一盞入童便溫服即愈子母秘錄

又方

紅花一兩為末分作二服酒煎連進如口噤拘攣

灌之入童便尤妙子母秘錄

又方

神效炒黃為末水服二錢千金方

又方

半夏為末水丸豆大入鼻中即醒婦人良方

又方

普門醫品

產後血運

卷三七 九

墨二錢燒赤簪滅為末酒調半匕服之即愈

又方

韭菜切安瓶中沃以熱醋聞其氣即醒丹溪心法

又方

用舊漆器燒煙熏之即甦本草綱目

又方

鹿角一段燒存性出火毒為末酒調灌下即醒方摘要

又方

蘇木三兩。水五升。煎二升。分二三次服。本草綱目

又方

荊芥穗一兩三錢。桃仁去皮尖炒五錢。爲末。水服三錢。若喘加杏仁。去皮尖。甘草炒各三錢。保命集

又方

雲臺子。生地黃。等分爲末。每服三錢。薑七片。酒水各半。煮煎七分。溫服。卽甦。溫隱居海上方

又方

沒藥末二錢。酒調服。圖經本草

普門醫品

產後血暈

卷七

又方

人參一兩。紫蘇半兩。童便酒水各鍾半。煎一鍾。溫服。醫方摘玄

傷寒生產血暈欲死

荷葉。紅花。薑黃。等分炒研末。童便調服二錢。唐史常傷寒論

惡露不行 八方

紫金丸 治產後惡露不快。腰腹疼如刺。時寒熱頭疼。不思飲食。并療心寒。

五靈脂水淘淨炒末一兩。以好米醋調稀。慢火熬

膏入。真蒲黃末和。丸如雞眼大。每服一丸。水與童

便各半盞。煎至七分。調服。少頃再服。惡露卽下。血

塊經閉者。酒磨服之。楊氏產乳

黑神散 治產後惡血未盡。或胎衣不下。氣攻心腹

作疼。及血迷血暈等證

黑豆炒熟一抄。熟地黃。當歸。酒洗。肉桂去粗皮。赤

芍。乾薑炮。甘草炙。蒲黃炒。各一兩。爲細末。每服二

錢。酒和童便調服

普門醫品

產後惡露不行

卷七 十一

雲臺散 治產後惡露不下。血結冲心。刺痛。及一切

心腹諸疾

雲臺子炒。當歸。桂心。赤芍藥。等分爲末。每服二錢。

酒調下。起下惡物卽愈。楊氏產乳

失咲散 治全上

方見本門前

花蕊石散 治全上

方見本門前

產後惡血不下

沒藥血竭末各一兩童便溫酒各半盞煎服良

久再服惡血自下可無他疾婦人良方

又方

益母草汁一小盞入酒一合溫服聖惠方

又方

桃仁二十枚去皮尖藕一塊水煎服之經方

五方

補中益氣湯治產婦脾胃虛弱氣下陷不能攝血

致血下流不止

普門醫品

產後惡露不止

卷七 主

黃耆蜜炙白朮土炒人參甘草炙各一錢陳皮六

分當歸酒洗八分升麻柴胡各四分薑三片棗二

枚水二鍾煎八分午前食遠服如有汗倍黃耆

六君子湯治脾氣虛弱不能飲食血無所統下流

不絕

人參白朮土炒白茯苓各一錢甘草炙陳皮半夏

各八分薑三片棗二枚水二鍾煎八分食遠服

返魂丹治產後惡露不絕

方見本門前

又方

敗醬當歸酒洗各八分生地黄一錢二分水二鍾煎

川芎六分竹茹五分生地黄一錢二分水二鍾煎

一鍾空心服外臺秘要

產後下血不止羸瘦欲絕

蒲黃二兩水二碗煎八分頓服立効產實方

中風九方

豆淋酒治產後中風困篤或背強口噤煩熱痰癰

或頭面皆腫身痒嘔逆或手足頑痺眩暈直視皆虛

普門醫品

產後中風

卷七 主

熱生風之證及產後血氣上冲一切百病

黑大豆三升炒熟微烟出入瓶中以酒五升沃之

一日夜後取溫服之覆衣臥微汗即愈口噤者加

獨活半斤微搥破同沃之產後常服妙危氏方

交加散治產後中風不省口吐涎沫手足痙攣

常歸荆芥穗等分爲末每服三錢水一盞酒少許

童便少許煎七分灌之下咽即有生意聖惠方

返魂丹治產後中風牙關緊急半身不遂失音不

語

方見本門前

產後中風口噤手足痙攣角弓反張不省人事四肢強直或心眼倒築吐瀉欲死

荊芥穗微焙為末每服三錢黑豆炒焦有聲及熟酒中用其酒調藥服之童便亦妙口噤則掣開灌之或灌入鼻中其効如神華陀方

又方

黑豆一升半同雞矢白半升炒熟入清酒一升半浸取一升入竹瀝服取汗產寶方

普門醫品

產後中風

卷七 古

又方

大蒜三十瓣水三升煮一升灌之即甦子母秘錄

產後中風煩渴 紅花子五分炒研水煎徐啣之婦人良方

產後身背拘急妄言發熱四肢攣曲不時驚悸

川芎羌活羚羊角屑酸棗仁炒研白芍藥炒各四錢桑白皮六分防風五分水三碗煎二碗分三服婦人良方

產後中風虛人不可服他藥者

白鮮皮五兩水三升煮一升分二次溫服小品方

產後中風

十全大補湯 治產後發瘧口噤欲死

當歸酒洗白芍藥酒炒川芎熟地黃白朮土炒人參去蘆白茯苓黃耆各一錢甘草炙八分肉桂六分薑三片棗二枚水二鍾煎一鍾服重者加附子一錢薛立齋治一婦產後發瘧已死令人推正其身一人以手挾正其面掣開其口用前藥加附子炮去皮二錢煎熟乘熱灌之不嘔俟冷側面

普門醫品

產後瘧病

卷七 古

出之仍扶正又以熱藥灌之又冷又灌凡五次方得下咽即甦若見其死而不治則無望矣醫按

小續命湯 治剛瘧口眼喎邪牙關緊急角弓反張

用麻黃去節桂心甘草炙白芍藥炒白朮炒人參去蘆川芎附子炮防已酒拌黃芩炒各五錢防風二錢每服五錢水鍾半煎八分入薑汁少許溫服若自汗為柔瘧去麻黃有熱去附子減桂一半冬春去黃芩婦人良方

急風散 治產後腰背攣急角弓反張手足痙攣

荆芥穗畧焙爲末每服三錢豆淋酒下童便亦可

其効如神牙噤准口或鼻婦人良方

交加散 治產後癰瘰瘰癧不醒人事口吐涎沫

當歸荆芥穗等分每服三錢水一盞酒少許煎灌

下咽卽甦如木應急服十全大補湯婦人良方

又方

白鮮皮一兩獨活三兩酒二碗水二碗煎二碗溫

服婦人良方

又方

普門醫品

產後癰瘰

卷七 十六

白朮四兩酒煎頓服張文仲方

人珍湯 治見論

方見三十三卷調經門

四君湯 治見論

方見三十三卷崩漏門

心腹疼 二十四方

失咲散 治產後惡血上攻心腹作痛欲絕

方見本門前

艾附丸 治全上

香附子三兩艾葉半兩以酒湯同煮熟去艾炒

爲末酒下婦人良方 集簡方

蠲痛散 治全上

荔枝核燒存性香附米炒等分研爲細末鹽湯米

飲調下二錢婦人良方

產後血滯心腹疼痛欲死者

槐上木耳半兩爲末酒濃煎飲之立愈婦人良方

又方

沒藥焙研紅花當歸酒洗延胡索炒等分爲末每

普門醫品

產後心腹疼

卷七 十七

服二錢童便酒各半盞同煎至六分熱服用秤鍾

燒紅淬過調服亦可婦人良方

產後穢血不盡腹中滿疼心頭硬悶手足煩熱等證

用玄胡索炒研二錢酒服其効聖惠方

大岩蜜湯 治產後陽氣虛寒心腹作疼不食嘔吐

四肢厥逆

生地黃當歸酒洗獨活吳茱萸乾薑煨甘草炙桂

心小草各一兩細辛半兩每用五錢水鍾半煎八

分溫服婦人良方

產後大虛心腹絞疼手足厥逆

羊肉一斤用水十碗煮取清汁六碗入甘草炙白

芍藥炒當歸各七錢半煎二碗分二服凡產後虛

羸自汗腹內不調用羊肉佳本草綱目

產後心痛

荷葉剉碎炒香爲末每服二錢沸湯或童便調下

或煎服亦可救急方

又方

鬱金燒存性爲末二錢米醋少許調灌之袖珍方

普門醫品

產後心腹絞疼

卷七 十九

又方

桂心爲末用狗膽汁和丸芡子大每一丸熱酒下

聖惠方

又方

沒藥爲末二錢酒調服醫林集要

又方

好官粉爲末蔥汁和丸小豆大每服七丸黃酒送

下卽止蓋粉能殺蟲蔥能透氣也 御真方

產後腹痛

桂枝酒服二錢取効用後方

又方

白芍藥酒炒各二錢水一盞煎半盞溫

服聖惠方

產後腹痛如錐刺者

敗醬草五兩水四升煮二升每服二合日三服衛生易簡方

生易簡方

當歸建中湯 治產後腹絞拘急自汗少食

當歸桂心各三兩白芍藥六兩炒焦黃甘草炙二

普門醫品

產後心腹絞疼

卷七 十九

兩每服五錢水一碗薑三片棗二枚煎七分入飴

糖一匙調服未効再服婦人良方

延胡索散 治產後惡血凝滯暗下作疼或作寒熱

用延胡索桂心各半兩當歸一兩爲末每服二錢

食前用熱酒調下

澤蘭湯 治產後惡露腹疼胸滿少氣

澤蘭生地黃當歸酒洗白芍藥炒生薑各一錢甘

草炒五分大棗四箇水鍾半煎八分服陶隱居方

產後血脹腹絞引脇

當歸酒洗三錢玄胡索二錢乾薑炮五分爲末

一盞煎八分入鹽醋少許熱服

婦人良方

四神散 治產後風冷凝滯於小腹宿血作疼名曰

見枕疼

菊花當歸酒洗旋復花去梗葉荊芥穗各一錢蔥

白三寸水鍾半煎八分服

婦人良方

產後腹痛有塊

熟地黃三兩乾生薑一兩同炒乾爲末每服二錢

熱酒調下並治經後腹痛

婦人良方

普門醫品

產後心腹疼

卷五 三

又方

土牛膝洗切焙爲末酒煎溫服極効

國經本草

婦人小腸氣痛

馬鞭草一兩酒煎熱服仍煮湯浴身取汗卽愈

要奇方

遍身疼

八方

趁寒散 治產後骨節疼痛發熱頭重四肢不舉

牛膝酒炒甘草炒薤白各一兩當歸酒洗桂心白

木炒黃耆炒獨活生薑各半兩每用五錢水鍾半

煎八分服

婦人良方

當歸沒藥丸 治產後肢體刺痛筋攣骨痺或手足

麻木

當歸酒洗五靈脂炒各一兩沒藥半兩爲末醋糊

丸桐子大每服三十九丸薑湯下

婦人良方

返魂丹 治產後兩太陽穴疼呵欠心忪氣短羸瘦

不思飲食手足頑麻百節疼痛每用一九米飲下

方見本門前

五積散 治產後感寒遍身疼痛

普門醫品

產後遍身疼

卷五 三

當歸酒拌白芍藥酒炒川芎乾薑炮人參去蘆白

茯苓陳皮桔梗厚朴薑炒白芷蒼朮炒半夏薑製

肉桂麻黃甘草炒各五分薑三片棗二枚水二鍾

煎一鍾服

補中益氣湯 治氣血虛遍身作痛

方見本門前

通靈丸 治血風手足痛不可忍

白附子僵蠶炒去絲各一兩全蠍半兩炒麝香一

字爲末煉蜜丸桐子大每服十五丸溫酒下日三

服 婦人良方

婦人產後腰痛不可轉者乃敗血流入隧道也

敗血當歸酒洗各三錢川芎白芍藥酒炒各二錢四分桂心二錢水二碗煎一服分二次服忌葱 廣濟方

如神湯 治產後腰痛迷敗血去風寒

即五積散加桃仁泥五分方見上

(不語) 五方

七珍散 治產後不語

普門醫品

產後不語

卷三

人參石菖蒲生地黃川芎各一兩細辛一錢辰砂

另研防風各半兩為末每一錢薄荷湯調服

又方

人參石蓮肉不去心石菖蒲等分每服五錢水鍾半煎八分溫服 婦人良方

胡氏孤風散 治產後閉目不語

生白礬末每服一錢熱水調下 婦人良方

產後舌出不收

丹砂為末傳之暗擲盆罍墮地作聲驚之即收

簡方

八珍湯 治見論

方見三十三卷調經門

(發喘) 六方

二味參蘇飲 治產後發喘乃血入肺竅危證也

人參去蘆為末一兩用蘇木二兩水二碗煎一碗調服神效 聖惠方

芩薈湯 治產後失血過多孤陽作喘

川芎當歸酒洗白芍藥酒炒等分每服五錢水鍾

普門醫品

產後發喘

卷三

半煎八分溫服 婦人良方

五味子湯 治產後喘促脉伏而厥

五味子炒杵人參去蘆杏仁去皮尖各二錢麥門

冬去心陳皮各一錢薑三片棗二枚水二鍾煎八

分溫服 婦人良方

產後欬逆喘急氣亂心煩

乾柿市切碎水煮汁呷之 聖惠方

又方

胡桃肉人參去蘆各一錢水一鍾煎七分頓服 本

旋復花湯 治產後感冒風寒欬嗽作喘

方兄妊娠欬嗽門

〔呢逆〕 六方

產後呃逆

白豆蔻丁香各半兩伏龍肝一兩研細吳茱萸桃

仁煎湯調服一錢少頃再服 乾坤生意

又方

青橘皮爲末三錢葱白童子小便煎服 經驗後方

普門醫品

產後呃逆

卷五 五

又方

羌活附子炮茴香炒各五錢木香乾薑炮各一錢

爲末每服二錢水一盞鹽一捻煎半盞溫服 婦人良方

良方

又方

桂心五錢薑汁三合水一鍾煎半鍾溫服 婦人良方

方

產後欬逆嘔吐心忪目運

用石蓮子兩半白茯苓一兩丁香五錢爲末每用

米飲調服二錢 良方補遺

麥附湯 治產後呃逆不食腹疼自利手足冷多汗

不止或發瘕

人參一錢附子炮五錢水一碗薑三片棗二枚煎

半碗徐徐服

〔自〕 八方

麻黃根湯 治產後虛汗不止身熱發渴

當歸酒洗黃耆酒炒麻黃根生剉煨爲粉人參甘

草炙各六分水一鍾煎半鍾服 婦人良方

普門醫品

產後自汗

卷五 五

產後自汗壯熱氣短

當歸酒洗三錢黃耆酒炒白芍藥酒炒各二錢水

二盞薑三片棗二枚煎八分溫服 和劑局方

產後氣脫汗不止小便短少四肢厥逆以肩伸

甘草炙一兩附子炮五錢桂心白芍藥酒炒各一

兩半每服三錢薑三片棗二枚水一鍾煎半鍾服

虛甚加多効爲度

產後諸虛自汗或發熱頭疼身疼眩暈不食

用猪腰子一個去膜切小片以水三升糯米半合

葱白二莖同煮米熟取汁一盞以人參當歸各一錢為末入汁調勻食前溫服未類方

又方

小麥麴牡蠣煨灰等分為末以煮猪肉汁調服三錢日二服胡氏婦人方

又方

馬齒莧研汁三合服如無鮮者即以乾者煮之亦可婦人良方

十全大補湯 治產後虛汗不止防其成瘕亟服此

普門醫品

產後自汗

卷三 五

不應即服參附湯

方見本門前

參附湯 治陽氣虛寒自汗或手足逆冷大便自利或臍腹痛疼呃逆不食或汗多發瘧等證

人參一錢附子炮五錢作一服薑三片棗二枚水鍾半煎七分徐徐服或去人參加酒炒黃耆一兩名耆附湯

乳汗不通

十八方

湧泉散 下乳如神

王不留行黃連麥門冬龍骨各二錢用猪蹄煮汁一碗酒一盞煎服以木梳梳乳日三次忌食辛辣之物宜常服猪蹄羹婦人良方

產後乳汁不下

京三稜三個水二碗煎汁一碗洗乳以下汁即出極妙 外臺秘要

又方

母猪蹄四枚水二斗煮一斗入土瓜根通草漏蘆各三兩再煮至六升去渣納葱豉作粥或羹食之

普門醫品

產後乳汁不通

卷三 五

廣濟方

又方

穿山甲炮研末酒服二錢日二服外以油梳梳乳即通單驗方

又方

瓜蒌子淘洗控乾炒香紙上壓令白色酒服二錢合面臥一夜乳出姚僧坦集驗方

又方

以猪蹄湯調益元散三錢日三服妙子母秘錄

元散方見四卷暑證門

又方

知母貝母壯陽粉等分爲細末。每用猪蹄湯調服二錢。湯液本草

又方

土瓜根爲末。酒服一錢。一日二服。楊氏產乳

又方

萵苣葉煎酒服。或以萵苣子一合。生甘草三錢。糯米粳米各半合。煮粥頻食之。本草綱目

普門醫品

產後乳汁不通

卷五

又方

白僵蠶爲末二錢。酒服。少頃以芝麻煎湯一盞投之。用梳梳乳頭數十通。如汁如湧。經驗方

又方

赤小豆煮汁多飲之。乳如泉流。產書

又方

絲瓜連子燒存性研。酒服二錢。被覆取汗卽通。簡便單方

又方

用鯉魚一頭。燒才每用一錢。酒調下。產寶

玉露散 治乳脈不行。身熱頭目昏痛

人參白朮蒼朮枳椇白芍藥酒炒各一錢。甘草炙六分。水煎服。婦人良方

乳婦氣脈壅塞。乳汁不行。乳房脹痛。或作癰毒

葵菜子。縮砂仁。各炒香。等分爲末。熱酒服二錢。極驗。本草綱目

產婦無子。食乳。乳不消。發熱惡寒。致成吹乳。

大麥蘖炒爲末。每服五錢。白湯下。丹溪纂要

普門醫品

產後乳汁不通

卷五

又方

神麴炒研。酒服二錢。日二服。甚驗。本草綱目

又方

用男子裹足布。勒住乳經。卽止。本草綱目

閱結十五方

阿膠枳殼丸 治產後大便燥澀

阿膠枳殼二味。等分爲末。蜜丸。桐子大。滑石末爲衣。溫水下二十丸。未通再服。凡產後悶結。不可以大黃利之。如利者百無一生。慎之。慎之。婦人良方

又方

細茶爲末。葱涎丸如綠豆大。每服百九茶下。或只
以芝麻研汁煮粥作羹食之。亦佳。郭稽中婦人方

又方

大麥蘖炒黃爲末。每服三錢。沸湯調下。與粥間服。
婦人良方

又方

杏仁去皮炒黃。麻仁。枳殼麩炒。訶子炒去核。各研
末。蜜丸桐子大。每服三十丸。溫水下。婦人良方

普門醫品

產後調結

卷七 三

麻仁丸 治產後大便閉結。小腹胀悶

大麻仁研如泥。枳殼麩炒。人參。各四錢爲末。煉蜜
共搗爲丸。桐子大。每服二十九。空心溫酒下。一方

加煨大黃二錢。婦人良方

加味四物湯 治血虛火燥。大便不通

當歸酒洗。白芍藥酒炒。川芎。熟地黃。各一錢。柴胡
八分。牡丹皮。山梔。各五。分。水鍾半。煎一鍾。空心服

產後虛悶

阿膠炒。枳殼炒。各一兩。滑石飛二錢半。爲末。蜜丸

梧子六。每服五十丸。溫水下。未通再服。和劑局方

產後風秘

皂角子二百粒。破作兩片。慢火炒。入酥一棗大。炒
燥。又入酥炒至焦黑爲度。研末。蜜丸。桐子大。每服
三十九。用蒺藜炒杵去刺三兩。酸棗仁炒一兩。每
五錢。水一盞。煎七分。去滓。送下前丸。婦人良方

產後大小便不通

桃仁去皮尖。葵子。滑石飛。檳榔。等分爲末。空心葱
白湯服二錢。卽利。集驗方

普門醫品

產後調結

卷七 三

通氣散 治全上

陳皮紫蘇。枳殼麩炒。木通。各一錢。水一鍾。煎七分。
空心溫服。婦人良方

產婦大小便不通。諸藥不應

日取牛乳飲之。人乳亦妙

產後尿閉不通

陳皮去白爲末。每空心溫酒服二錢。一服卽愈。婦人良方

五淋散 治膀胱有熱。小便不通。淋瀝不出。或如豆

汁。或成砂石或凝濁如膏

赤茯苓一錢五分。赤芍藥。山梔炒各一錢。當歸。甘草。各一錢二分。灯心十莖。水鍾半煎八分。空心溫服。婦人良方

滋腎丸 治小便不利而不渴者

清肺飲子 治小便不利而渴者

二方俱見前十一卷小便閉門

〔水腫〕四方

小調經散 治四肢浮腫

普門醫品 產後水腫

沒藥。琥珀。桂心。白芍藥。酒炒。當歸。酒洗。等分。為末。每服半錢。薑汁溫酒調下。婦人良方

漢防已散 治全上

漢防已。猪苓。枳殼。麩炒。桑白皮。各一兩。商陸。甘草。各三錢。每服四錢。水一鍾。煎半鍾。溫服。婦人良方

澤蘭葉。防已。等分。為末。每服二錢。溫酒調下。醋湯亦可。備急方

金匱加減腎氣丸 治脾腎虛寒。腰重脚腫。小便不

利。或肚腹脹。四肢腫。氣喘痰盛。已成水證。其効如神。

用白茯苓三兩。大附子製半兩。川牛膝。肉桂。澤瀉。車前子。山茱萸。去核。山藥。牡丹皮。各一兩。為末。熟地酒蒸八兩。拍碎。杵膏。入煉蜜和丸。桐子大。每服七八十九。空心米飲下。東垣方

〔煩悶〕六方

金黃散 治虛火上冲。心胸煩悶作渴

延胡索。蒲黃炒。各一錢。桂心二錢。為末。酒調服

失笑散 治全上

普門醫品 產後煩悶

方見本門前

產後滿悶不能食

赤小豆十四粒。燒研。冷水服之。千金方

產後煩悶。及兒枕血痕。胸腹腫痛

蒲黃三錢。米飲服。或用東流水服之。更妙。產寶

產後因怒發熱迷悶者

荆芥穗。以新瓦半炒。半生。為末。童便調服二錢。或

劉散童便煎服亦妙。戴元禮要訣

見睨丸 治產後食麪飯乾食太早。煩渴病悶

薑黃炒。三稜醋炒。草澄茄。陳皮。良薑。人參。義茂酒炒。等分爲末。用蘿蔔汁糊丸。桐子大。每服三十九。白湯下。醫聖元方

發狂八方

產後敗血入心。邪氣乘虛而入。顛狂如祟者。

大珠砂二錢。研細飛過晒乾。用乳汁三四茶匙調濕。以地龍一條。入藥滾三滾刮淨。仍以水洗地龍。放之。入無灰酒一盞。分作三次服。何氏方

又方

普門醫品

產後發狂

考老 三

四物湯加青黛二錢煎服。摘古方 四物湯方見三

十三卷調經門

產後敗血上衝發熱狂走

乾荷葉。生地黃。牡丹皮。各二錢。水一碗。煎六分調

生蒲黃末二錢服之即止。良方

寧志膏

治產後心神不安。言語失常。顛狂驚悸

辰砂。琥珀。另研。酸棗仁炒。人參。白茯苓。各五分。乳

香一錢。爲末。每服一錢。棗湯空心調下。婦人良方

定志丸 治心神虛怯。語言鬼怪。喜咲驚悸

人參。茯苓。各一兩五錢。菖蒲。遠志。去心。各一兩。爲末。蜜丸。梧子大。每服七八十九。滾湯下。婦人良方

調經散 治血虛及瘀血。言語謬妄。如見鬼神

沒藥。琥珀。肉桂。去粗皮。各一錢。白芍藥。酒炒。當歸

酒洗。各八分。制辛五分。麝香少許。各爲末。每服一

錢。薑汁溫酒各半酒鍾調服。婦人良方

酸棗仁丸 治心虛膽熱。不得睡臥。顛狂驚悸

茯神。去木。酸棗仁炒。遠志。去心。柏子仁。焙。防風。各

一兩。枳殼。麩炒。生地黃。杵膏。各半兩。青竹茹。二錢

普門醫品

產後發狂

考老 三

五分。爲末。煉蜜爲丸。桐子大。每服七十九。白水下

又方

用猪心一枚。五味豉汁煮食之。心鏡

產門不閉十四方

補中益氣湯 治產後陰脫。或玉門不閉。惡寒發熱

方見本門前。外加五味子五分

硫黃散 治產後陽氣虛寒。子宮脫出。玉門不閉

硫黃。烏賊魚骨。五味子等分。爲末。摻之。日三次

又方

石灰一斗沙黃以水二斗拌之。澄清熏洗。肘後方

子宮不收名瘕疾不可忍

慈石火煨酒淬三次。研末。米糊九梧子大。每服四

十九丸。時滑石湯下。別用慈石半兩。鐵粉二錢半。

當歸五錢爲末。侵辰米湯調服。本草綱目

產後陰脫

先以鹽湯洗淨。五靈脂燒烟熏之。危氏得効方

又方

草麻子仁十四枚。研塗頂心。入卽洗去。婦人良方

普門醫品

產後產門不開

卷之五

又方

龍頭五枚。燒研。并華水服二錢。日三服。錄驗方

又方

燒車轄脂。納酒中服。子母秘錄

又方

以溫水洗軟。用雄鼠矢燒烟熏之。卽上。或以茄根

燒存性爲末。油調攤紙上。捲筒安入陰內。亦妙。乾

坤生竟

陰脫作癢

枯礬空心酒服二錢。日三服。千金方

產婦陰痛

訶子和蠟燒烟熏之。及煎湯熏洗。日華方

又方

蛇床子水洗過。絹袋盛。蒸熱熨之。或用蛇床子五

兩。烏梅十四個。煎湯日洗五六次。千金方

產後陰門燥熱遂成翻花

澤蘭葉四兩。煎湯熏洗二三次。再用枯礬煎洗之。

卽安。集簡方

普門醫品

產後產門不開

卷之五

產門生合不開

用銅錢磨利割開。以陳石灰敷之。卽愈。通變方

損胎九方

產婦損胎。小便淋漓不斷

炭灰淋汁。煮黃絲絹三尺極爛。清水洗淨。入黃蠟

半兩。蜜一兩。茅根。馬勃末。各二錢。水一升。煎一盞。

空心頓服。慎勿作聲。一作聲卽不効。婦人良方

又方

黃生絹一尺。剪碎。白牡丹根皮。白及各一錢。水二

盤煮至稍爛如服之不許作聲婦人良方

雞內金散 治產婦遺尿

用雞內金并腸燒為末溫酒調服婦人良方

又方

猪胆猪肚各一枚糯米半升入胞內更以胞入肚內加五味煮食之醫林集要

產後遺尿及尿數

桑螵蛸炙半兩龍骨煨一兩為末每服二錢米飲下徐氏胎產方

普門醫品

產後損肝

卷七 五

產婦小便不禁

用雞尾燒灰酒服二錢唐濟方

桑螵蛸散 治陽氣虛弱小便頻數或遺尿

桑螵蛸三十個炒鹿茸剉炒黃耆炙各三兩牡蠣

煨人參厚朴製赤石脂煨各二兩為末每服二錢

空心粥飲調下婦人良方

又方

益智仁為末每服二錢米飲下經方

婦人因生產陰陽易位前陰出後入各曰交腸病

取舊幘頭燒灰酒服仍間服五苓散分利之如無幘頭凡舊漆紗帽皆可代之極効陳總領方 五苓散方見七卷霍亂門

發熱 八方

十全大補湯 治產後發熱煩燥作渴或惡寒

方見本門前

當歸補血湯 治氣血俱虛煩熱發渴目赤面紅晝

夜不息其脉洪大而虛重按全無若服涼藥必死

黃耆蜜炙一兩當歸酒洗二錢水三鍾煎一鍾

普門醫品

產後發熱

卷七 五

服 東垣方

芩歸調血飲 治產後諸病氣血虛損或惡露不行

或怒氣相冲以致發熱惡寒自汗口乾頭暈眼花不

語昏憤等證

當歸酒洗二錢川芎白朮炒白茯苓熟地黃益母

草各一錢陳皮烏藥香附童便浸炒牡丹皮各八

分乾薑炒黑五分甘草炒六分薑三片棗二枚水

三鍾煎鍾半溫服婦人良方

全生活血湯 治產後發熱自汗盜汗

柴胡當歸酒洗白芍藥酒炒各二錢生地黃炒熟地黃川芎藥本葛根甘草炒各一錢升麻八分紅花五分每用五錢水一鍾煎半鍾熟服婦人良方六味丸治腎虛發熱作渴小便淋秘痰壅失音欬嗽吐血

自製熟地黃八兩山茱萸肉山藥各四兩白茯苓牡丹皮澤瀉各三兩爲末煉蜜丸梧子大每服七八十九空心鹽湯下

八味丸治命門火衰不能生土以致脾胃虛寒飲

普門醫品

產後發熱

卷七 聖

食少思發熱煩躁

卽上六味丸加大附子製五錢肉桂一兩

含化丹治婦人肺熱久嗽身熱如炙肌瘦將成勞

服此卽愈

枇杷葉去毛桑白皮欸炙花木通紫苑杏仁去皮

尖等分大黃減半爲細末煉蜜丸如櫻桃大食後

夜臥含化一九冠定與方

產後身熱如火皮粟粒者

桃仁研如泥同臘猪脂敷之日日易之千金方

羣勞七方

猪腰子粥治產後羣勞發熱虛汗體疼

猪腰子一枚去膜切片用鹽酒拌先用水二升入

葱椒煮滾下腰子灼半熟卽撈出入粳米一合煮

粥將腰子調粥內空心服本類驗方

黃耆建中湯治產後諸虛不足發熱或惡寒腹痛

黃耆蜜炙肉桂各一兩白芍藥酒炒二兩甘草炙

七錢每服五錢薑三片棗二枚水鍾半煎七分服

日二次仲景方

普門醫品

產後羣勞

卷七 聖

自茯苓散治產後羣勞頭目四肢疼痛寒熱如瘧

白茯苓一兩當歸酒洗川芎桂心黃耆蜜炙白芍

藥酒炒人參各半兩自製熟地黃七錢先以水三

盞入切碎猪腎一雙薑三片棗二枚煎二盞去渣

入前藥半兩煎一盞服婦人良方

增減柴胡湯治產後虛弱寒熱如瘧食少腹脹

柴胡人參甘草炙半夏炒陳皮川芎白芍藥酒炒

各等分每服七錢薑三片棗二枚水二鍾煎八分

服日二婦人良方

產後煩熱內虛短氣

竹茹一升。人參。白茯苓。甘草炙。黃芩。各二兩。

水六碗煎二碗半。分三服。婦人良方

產後虛乏不能飲食

六君子湯加當歸一錢。六君子方見本門前

產後虛羸

黃雌雞一隻去毛。背上開破。入生百合三枚。白粳

米半升。縫合。入五味煮熟。開腹取百合并飯和汁

作羹并肉食之。聖惠之方

普門醫品

產後虛勞

六十七 四十二

血崩尿血 七方

固經丸 治產後血崩漏下

艾葉。赤石脂煨。補骨脂炒。木賊。各半兩。附子炮三

錢。爲末飯丸。桐子大。每服二十九溫酒或米飲下

又方

蓮蓬殼五個。香附二兩。各燒存性爲末。每服二錢

米飲下。日二服。婦人良方

又方

葛蒲一兩半。酒二盞煎至一盞去渣分二服。食前

溫服千金方

失咲散 治產婦血崩小腹脹滿

方見本門前

產婦小便出血

頭髮洗淨燒爲末。米飲調服。或以飛過滑石末一

錢。生地黄汁調下。本草綱目

產後尿血

牛膝水煎頻服。熊氏補遺

小柴胡湯 治產後怒動肝火小便尿血

普門醫品

產後血崩尿血

卷五 四十五

方見三十三卷調經門

下痢 十一方

七味白朮散 治產後下痢而渴

人參去蘆。白朮土炒。白茯苓。甘草炙。藿香。乾薑。各

一錢薑三片。棗二枚。水二鍾煎八分入木香末五

分調服

補中益氣湯 治產婦下痢發熱作渴肢體倦怠。飲

食少思

方見本門前

產後下痢或四散浮腫口舌乾燥

冬瓜一枚黃土泥固五寸煨熟絞汁飲古今錄驗

又方

蒼耳葉搗汁溫服半盞日三四服聖惠方

產後下痢赤白裏急後重腹疼

批膠焙乾沉香蒲黃炒各等分為末每服二錢食前茶飲下婦人良方

又方

用大荆芥四五穗於瓦上燒存性不得犯油火入

普門醫品

產後血崩尿血

卷七 四

麝香少許以沸湯些須調下此藥雖微能愈大病不可忽之保神方

又方

蠟二棋子大何限炒二錢當歸酒炒二錢半黃連

炒三錢黃連增一錢先用陳倉米半升水三升煮

汁至一升去米入藥煎至一鍾溫服神効千金方

產後血痢小便不通腹痛者

生馬齒莧拌汁三合煎沸入蜜一合和服產寶

產後下痢日五十行

用桑上蠶糞燒熟黃連酒洗六次之類相類門類之
以屎為度必效方

又方

用紫莧菜一握切煮汁入梗米三合煮粥食之五
瘕瘵老書

二神丸

治脾胃虛弱泄瀉不止不思飲食

破故紙四兩肉豆蔻二兩上為末用大棗四十

九批生薑四兩切研同煮熟去薑取藥肉和泥桐

子大每服五十九粒空心酒下

普門醫品

產後血崩尿血

卷七 四五

〔調治〕 五方

產後頭疼

烏藥川芎酒洗等分為末每服二錢秤鍾燒紅酒

酒調下濟生方

產後因怒哭傷肝嘔血結聚

韭菜一斤取汁入薑汁少許和飲摘玄方

產後口渴

用陳通草煎水調服即止產書

產後諸淋

紫荊皮五錢半酒半水煎服

產後遺毒

取舊燕窩中草燒為末或枯礬牡蠣等分為末俱用酒調服

普門醫品

產後血崩尿血

卷三十八

普門醫品卷之三十八

東武王化貞元起父編輯

門人陳斌憲卿父較閱

乳病門

乳癰乳癰 吹乳 如乳 乳頭綻裂

論經云乳頭屬足厥陰肝經乳房屬足陽明胃經若乳房腫痛結核赤色數日之外嫩痛腫潰稠膿湧出膿盡而愈名曰乳癰易治若初起內結小核或如蠶子不赤不痛積之歲月漸大破內潰

普門醫品

卷三十八

深洞血水淋漓名曰乳巖難治

腫焮痛甚者清肝消毒發寒熱者解散表邪才反膿者疎肝行氣不作膿或不潰托裏為主潰而不斂及膿清者大補血氣

乳癰乳巖 二十四方

神效瓜蒌散 治乳癰初起或未成已成未潰已潰瓜蒌一個爛研生甘草當歸酒洗各半兩酒一碗煎半碗投乳香沒藥末各一錢調服良久再服未成即消已成即潰已潰即斂神效 婦人良方

橘香散 治全上

陳皮湯浸去白晒乾麩炒微黃為末每服二錢麝香調酒下初發者一服見効 張氏方

又方

大黃甘草各一兩為末好酒煮成膏以絹攤貼瘡上仰臥即愈 婦人經驗方

又方

馬鞭草一握酒一碗生薑一塊搗汁服渣敷之 衛生易簡方

普門醫品 乳病

又方

以萱草根搗酒服以滓封之或搗新生地黃搗敷之或以鹽梅杵貼之俱妙 本草綱目

又方

貝母為末水調塗乳上一宿自消 聖惠方

乳癰初起

炙甘草二錢新水一鍾煎半鍾溫服仍令人冷水漱口咽之日三服 直指方

又方

貝母為末酒調服二錢仍令人吮之 仁齋直指

又方

白芷貝母各二錢為末溫酒服 外科精義

又方

蒲公英一兩忍冬花藤二兩搗爛水二鍾煎一鍾食前服睡覺病除治一切腫毒俱効 積德堂方

又方

蔓荊子為末酒服二錢渣敷之 永類方

又方

普門醫品 乳病

又方

脂麻炒黑搗爛以燈盞內油脚調敷即散或以車轄油熬熱塗之 集玄方

又方

用扁竹根萱草根搗末蜜調敷之神効 永類方

又方

不熟瓜萋一枚搗爛以白酒五碗煮取二碗去渣溫服服盡愈 子母秘錄

又方

蔓菁根并葉去土不用水洗以鹽和搗塗之熱即

換。不過三五次瘥。兵部手集

又方

皂角刺。燒存性一兩。蚌粉一錢。和研。每用一錢。酒調下。直指方

又方

穿山甲炮。研末。酒服二錢。單張方

又方

水楊根皮。生搗貼之。其熱如火。再貼即平。永類金方

普門醫品

乳病

卷三八

四

乳癰初發腫疼結硬

以北邊真樺皮。燒存性研末。無灰酒服二錢。即臥覺即愈。靈苑方

乳癰腫疼

桂心。甘草。各六錢。烏頭三錢炮。為末。醋和塗之。紙蓋住。膿化為水。肘後方

乳癰腐爛

靴內年久樺皮。燒灰。酒服一錢。唐璣經驗方

乳癰潰爛見肉

用猫腹下毛。鉗銼內燒存性。入輕粉少許。研末。油調敷之。本草綱目

又方

敗龜板一枚。燒研。酒服四錢。小山方

婦人乳巖。因久積憂鬱。乳房內有核如指頭。不痛不痒。五七年成癰。名乳巖。最難治。

青皮四錢。水盞半。煎一盞。徐徐服之。日一服。或用酒煎。丹溪方

吹乳 十二方

普門醫品

乳病

卷三八

五

栝蒌散。治乳婦因兒含乳。口氣所吹。令乳汁不通。壅結腫痛。名曰吹乳。不急治則成癰。

栝蒌一個。酒鍾半。煎八分。入乳香末二錢。調服。仍用南星末。溫湯調塗。婦人良方

又方

遠志。用甘草製。焙研。酒服二錢。以渣傳之。袖珍方

又方

五月五日糞箸。燒灰。酒服二錢。即散。濟急仙方

又方

赤小豆研末。溫酒服二錢。仍敷之。蘇氏方

又方

蜘蛛一枚。麩暴燒存性。爲末酒服。卽止。本草

又方

牛旁末二錢。麝少許。溫酒調服。袖珍方

又方

陳皮一兩。甘草一錢。水二鍾煎一鍾服。婦人良方

又方

用淘米杓內砂七粒。溫酒送下。更以炊帚枝通乳。

醫門醫品

乳病

卷十八

孔卽愈。莫解其理。李綱湖方

又方

鹿角屑炒黃。爲末酒服二錢。仍以梳梳之。經驗方

又方

葛蔓燒灰。酒服二錢。三服効。或以水調敷亦妙。

治瘡癰。衛生易簡方

又方

穿山甲炙焦。水通。各一兩爲末。自然銅生研半兩。

每服二錢。酒調下。圖經本草

又方

鼠矢七粒。紅棗七枚。去核。包矢燒存性。入麝香少

許。溫酒調下。集要方

妬乳。六方

婦人乳盛。或無兒飲乳。餘乳蓄結。以致腫痛。名妬乳。

不吮通之。必致成癰。

大麥蘖三兩。炒。煎水服。其乳卽散。腫卽消。經驗方

又方

瓜蒌一個。粉草二寸。生薑一塊。切半。生半炒。酒二

醫門醫品

乳病

卷十七

碗煎服。少頃擠去敗乳。再服卽愈。婦人良方

又方

蜂房燒灰研。每服二錢。酒一小鍾調服。濟衆方

又方

香蒲根可織蓆者。搗爛敷之。并煎汁飲。產寶方

又方

皂角刺。蔓荊子。各燒存性。等分爲末。每溫酒服二

錢。袖珍方

又方

槲皮三升。水一斗煮五升。先熏後溫洗之。

乳頭統製 四方

黃連胡粉膏 治乳頭生瘡浸淫

黃連二兩胡粉二錢爲末。水銀一兩同研傅之。并

治丈夫陰蝕。小兒疳瘡

紅粉散 治乳生瘡頭裂

臙脂蛤粉等分爲末敷之。或以丁香爲末敷之。亦

妙 危氏得効方

又方

醫門書品

乳病

卷三八 八

秋茄子裂開者。陰乾燒存性研末水調塗 補遺方

又方

雞矢白炒研酒服二錢。三服愈。亦治吹奶 產寶方

陰病門

腫痛 陰癢 陰冷 陰挺 陰瘡 陰吹 交接傷寒 附

論婦人陰中諸病。皆七情鬱火傷損肝脾。濕熱下

注。其外證挺出如蛇如菌。或如雞冠狀。或生蟲濕

癢。或潰爛出水。或腫悶隆寒。其內證體倦內熱。經

候不調。或飲食無味。嘔熱發熱。或胸脇不利。小腹

痞脹。皆以龍膽瀉肝湯爲主。因其兼證而治之。○

有陰癢。爲蟲在腸胃之間。因臟虛而下蝕陰中。微

則爲癢。甚則爲痛也。○有陰冷。因勞傷子臟風冷

客之。久則不孕。○有陰挺下脫。或因胞絡傷損。或

因子臟虛冷。或因產用力所致。當升補元氣爲主。

○陰中生瘡。肝經濕熱也。名曰蠹。或痛或癢。如蟲

行狀。膿水淋漓。○有陰吹。陰中時常出氣也。

通痛 八方

龍膽瀉肝湯

治肝經濕熱。陰中痒痛生瘡。小便澀

醫門書品

陰病

卷三八 九

滯及兩拘腫痛

龍膽草酒拌炒黃。澤瀉各一錢。車前子炒。木通生

地黃酒拌。當歸酒拌。山梔炒。黃芩炒。甘草各五分。

水二鍾煎一鍾溫服

白礬散 治陰腫堅痛

白礬半兩。甘草半錢。大黃一兩。爲末。水和如棗大

綿裹納陰中。日兩換。以愈爲度 婦人良方

芎藭散 治全上

芎藭。當歸酒拌。各一兩炒。秦艽二兩。每服五錢。入

蔥白二莖。水一鍾煎六分服。婦人良方

婦人陰腫痛不可忍

艾葉一兩。防風六錢。大戟半兩。剉水五碗煮三碗。

去渣熱洗。日三次。避風冷。婦人良方

又方

枳實半斤。碎炒。帛裹熨之。冷即易。或用鹽炒青皮。

亦可。子母秘錄

又方

甘菊苗。搗爛煎湯。先熏後洗。危氏得効方

醫門醫品

陰病

卷之八

又方

牛膝五兩。酒三升。煮取一升半。分三次服。千金方

又方

桃仁燒研敷之。本草綱目

陰癢十方

椒茱湯。治婦人陰癢不可忍

花椒。吳茱萸。各一兩。蛇床子。藜蘆。各五錢。陳茶葉。

一撮。煨鹽二兩。用水五七碗煎數沸。乘熱熏洗。

又方

桃仁研膏。雄黃末等分。綿裹之。仍服龍膽瀉肝湯。婦人良方

又方

墻頭爛茅。剉片。牙皂等分。煎水頻頻熏洗。摘玄方

又方

小薊煮湯。日洗三次。或以蛇床子一兩。白礬二錢。

煎湯頻洗。亦妙。集簡方

又方

炙猪肝納入。當有蟲出。羊肝亦効。肘後方

醫門醫品

陰病

卷之八

又方

蒲黃。水銀。研勻。傳入內。即愈。薛氏方

又方

平胃散四錢。入買象末二錢。以熟猪肝蘸藥內陰

中。薛氏醫案 平胃散方見五卷內傷門

又方

用杏仁去皮。燒存性。杵爛。綿裹炙熱。納入陰中。加

麝香少許更良。食療本草

又方

新桃葉搗爛，綿裹納陰中。日三易之。本草綱目

陰腫作癢

大蒜煎湯洗之，効乃止。永類鈴方

陰冷四方

八味丸 治風寒客於子臟以致陰冷

方見三十七卷產後諸證門

又方

硫黃、枯礬，爲末煎湯頻洗之

又方

陰病

卷三十三

遠志一錢、乾薑、蓮花蕊各一錢半、蛇床子二錢、

用一錢綿裹內陰中，熱爲効

又方

五加皮、乾薑、丹參、蛇床子、熟地黃、杜仲各三兩、

乳粉四兩、天門冬一兩、地骨皮二兩、酒十五斤、漬

三宿，每用一盞，空心飲之

陰挺三方

補中益氣湯

方見產後諸證門。加炒山梔、白茯苓、炒車前子、

炒青皮各一錢煎服。一婦人陰中突出如菌，四圍腫痛，小便重墜，朝服此藥，夕服龍膽瀉肝湯。外用藜蘆末、猪脂和塗之，卽收。本草綱目 龍膽瀉肝方見本門前

又方

草麻仁研塗頂上，自吸入，卽洗去。本草綱目

陰脫作癢

白礬燒研，食前酒服一錢，日三次。千金翼方

陰瘡八方

陰病

卷三十八

加味逍遙散 治肝經濕熱下流，陰中生瘡

柴胡二錢、當歸酒洗、白芍藥、白朮炒、白茯苓、山梔

子炒各一錢、牡丹皮八分、甘草六分、水二鍾煎一

鍾服

又方

杏仁、雄黃、白礬各二分、麝香一分半、研細，傅于陰

中，一方單用硫黃研傅亦妙。本草綱目

又方

官粉二錢、白果仁七個、銅鈔內炒至白果黃色，去

果不用取粉出火毒研擦之効集簡方

又方

枸杞根煎水頻洗永類方

陰蝕瘡

益母草切五升以水一斗煮七升分數次洗之即効千金方

又方

用鯽魚炙油塗之本草綱目

又方

膏門醫品

陰病

卷三八下

用雞肝切片納入引蟲出盡即愈本草綱目

婦人妬精瘡

用青紙以唾粘貼數日愈且護疼也本草綱目

〔陰吹〕一方

髮膏煎 治陰吹神驗

用猪膏半斤亂髮如雞子大三枚和煎髮消藥成分兩服病從小便中出張仲景方

〔附交〕接傷疼

論婦人每交接輒出血作疼此肝火動脾不能攝

血宜用補中益氣湯

〔通治〕六方

交接出血作疼

桂心伏龍肝等分爲末每服錢許酒調下千金方

又方

割雞冠血塗之以赤石脂末搽之五倍子末亦良

又方

用髮灰同青布灰傅之薛立齋方

又方

膏門醫品

陰病

卷三八下

百草霜不拘多少用葫蘆搗汁調塗婦人良方

小戶嫁痛

甘草生薑各一錢白芍藥八分桂心四分酒一盞

煎三四沸服千金方

又方

海螵蛸燒爲末酒服二錢日三服或以小麥甘草煎湯洗之俱効

補中益氣湯 治見論

方見產後諸證門

歸脾湯 治見論

人參去蘆。白朮土炒。黃耆蜜炙。白茯苓。當歸酒洗。龍眼肉。遠志製。酸棗仁炒。各一錢。甘草炙五分。薑三片。棗二枚。水二鍾。煎八分。入木香末五分。調服。

斷產門

論天地之大德曰生。斷產非仁人之用心也。然婦人自有以產為苦者。或每產艱難。或生育太多。而欲斷之。亦非得已。若服水銀蝨蟲之類。恐禍在反。

普門書品

斷產

卷三十六

掌。故集數方以備不得已之用。

附方

絕孕丸

白鶴仙。即玉簪花根。白鳳仙。各用子一錢半。紫葳二錢半。辰砂二錢。各為末。蜜和丸。梧子大。產後月內。以酒半盞服之。不可着牙。恐損齒也。摘玄方

又方

蠶紙一尺。燒為末。產後頓服。終身不產。千金方

又方

水銀二錢。以麻油煎一日。空心服。大一九。永斷其孕。且不損人。婦人良方

又方

零陵香為末。酒服二錢。至一兩。即一年絕孕。益血調香散。醫方集要

又方

白麴麴一升。無灰酒五升。作糊煮至二升半。濾去渣。分三服。候經至前一日。臨臥。次早五更。及天明。各一服。經即不行。則終身不孕矣。丹溪方

普門書品

斷產

卷三十七

夢與鬼交門

論人稟五行秀氣而生。承五臟神氣而養。若陰陽調和。風邪鬼魅。自不能傷。一失調理。氣血損衰。則風邪乘其虛。鬼邪干其正。是以婦人有與鬼交通者。其狀不欲見人。如有對晤。時獨言笑。或時悲泣。是也。亦有夢中相交者。

徐春甫曰。元神既虛。神不守舍。故有夢交。實非邪魅。亦如男子之夢遺。凡婦人患此證者甚多。但不

肯直言耳。診其脉沉絃無力。乍疎乍數。面帶桃紅。四肢無力。倦怠嗜臥。飲食少進。靜躁不常。皆其候也。法當健脾胃。養氣血。以固其本。兼之安神消痰。以治其標。則自愈耳。

薛立齋曰。前證多由七情虧損。心血虛神無所護。而然。宜用安神定志等藥。則正氣復而神自安。若脉來乍大乍小。乍短乍長。亦為鬼祟。宜灸鬼哭穴。

通治 六方

桃仁丸 治婦人與鬼魅交通

醫門醫品

夢與鬼交

卷五 六

辰砂另研。檳榔當歸。桃仁去皮。各三錢。水銀一錢。棗肉一個。研令星盡。麝香阿魏沉香。各錢半。為末。煉蜜丸。桐子大。每服十丸。空心桃仁湯下。

辟邪丹 治全上 能除一切邪魅

虎頭骨二兩。辰砂雄黃雌黃鬼臼皂莢蕪荑仁。各箭羽。藜蘆各一兩。為末。煉蜜丸。彈子大。用絳紗囊盛。一丸。男左女右繫臂上。及用一丸。當病人戶前燒之。一切邪鬼不敢近。 婦人良方

妙香散 治婦人精神恍惚。夢與鬼交。語言錯亂。先

服此以補氣血。鎮心安神。然後以前方治之。

甘草炒。人參桔梗各五錢。遠志山藥薑汁炙。茯苓神黃青蜜炙各一兩。辰砂三錢。另研。麝香二錢。另研。木香煨。二錢。五分。為末。每服二錢。溫酒調服。 婦人良方

八毒赤丸 治婦人與鬼交通

方見第二十卷邪祟尸症門

歸神湯 治婦人夢交盜汗精神恍惚飲食減少

人參白朮炒。白茯苓神當歸身各一錢。酸棗仁炒。陳

醫門醫品

夢與鬼交

卷五 六

皮各八分。龍眼肉七箇。甘草炙。羚羊角末。琥珀末。各五分。二味不見火。水鍾半。薑三片。煎七分。去渣。入二末調服。 集驗方

灸鬼法

將患人兩拇指相並。用線繫緊。當合縫處。牛肉半甲。間灼灸七壯。若是邪祟病者。即乞求免灸。自云我即去。我即去。極驗。

東武王化貞元起父編

門人陳 斌憲卿父校閱

血風門

頭痛 身體痛 癰癤瘡癢 煩悶 虛勞 怔忡驚悸

論婦人血風一病俗醫多不知蓋婦人以血為主或生產去血過多血海虛耗內熱生風或行經之時為風邪所襲總由肝脾虧損積漸所致變生諸病有血風頭疼眩暈昏重或連齒作疼經歲不愈

醫門醫品

血風

卷九

有血風肢體骨節疼痛或歷節走注疼不可忍有血風癰癤瘡癢身發疙瘩或如丹毒癢疼不常有血風煩悶口乾發熱體倦不食有血風心神驚悸怔忡少寐有血風勞四肢因之懶于言動自汗心煩喘滿不安婦人諸病由于血風者甚多宜參各證治之

許學士云婦人患頭風者十居其半每發必掉眩如在車船之上蓋因肝經血虛而風邪襲之耳陳氏曰婦人血風疼痛由氣血不足腠理不密風

冷乘之以致邪正相搏故骨節疼痛肢體發熱且苦咽乾歷節風者風邪隨血而行或淫溢皮膚或卒然掣痛走注如虎嚙狀

婦人癰癤瘡癢五心煩熱乃血風攻注或遍身疙瘩痛癢寒熱或如丹毒遊走不定或搔破膿水淋漓各血風瘡皆宜涼血潤燥如加味道遙散加味小柴胡湯之類不可專用風藥復傷陰血反致筋攣若愈後身起白屑搔則肌膚如帛所隔此氣血虛不能榮于腠理用十全大補湯

醫門醫品

血風

卷九

血風煩悶者由氣血不和風邪乘之以致煩悶不食體倦頭眩四肢疼痛宜急調補脾胃仍審諸經錯雜之邪而治之

婦人血風勞證因氣血素虛或產後勞傷外邪所乘或內有宿冷以致腹中疼痛四肢酸倦發熱自汗月水不調面黃肌瘦當調補肝脾氣血為主

頭疼

調中益氣湯 治氣血俱虛而頭疼

黃耆一錢蜜炙當歸酒洗白朮炒人參各七分

藥八分。甘草六分。五味子七粒。升麻。柴胡。橘皮。各三分。水二鍾。薑三片。棗二枚。煎七分。溫服。

白附子散 治風邪風痰頭眩。逆齒不時舉發。年不愈。

麻黃不去根。白烏頭炮去皮。南星炮。各五錢。白附子炮一兩。全蠍炒五錢。辰砂。麝香。乾薑炮。各一錢。為末。每用五分。酒調服。臥少時。婦人良方。

川芎茶調散 治諸風上攻。頭目昏重。偏正頭疼。

方見十七卷頭痛門。

醫門醫品

血風

卷九 五

又方 治風邪犯腦。頭疼不可忍。不問久近。

消石。人中白。片腦。等分。為末。每用一字。吹鼻中。婦人良方。

又方

用生萊菔汁。仰臥注鼻中。數年之患立愈。經驗方。

四神散 治血風眩運頭疼。寒熱。唾痰。

菊花。當歸酒洗。旋覆花去梗葉。荆芥穗。各一錢。水鍾半。葱白三寸。煎七分。溫服。

都梁丸 治血風頭疼。及產前產後傷風。頭目眩運。

腦門作痛

白芷。新時。黃芩。細辛。各六分。大黃。彈子大。每服一丸。細嚼。荆芥煎湯下。婦人良方。

又方 治血風頭旋。不知人事。

用喝起草。嫩心。即蒼耳。為末。酒服二錢。甚効。薛氏方。

身痛

羚羊角散 治婦人血風。身體疼痛。手足無力。

羚羊角。鈞。酸棗仁。炒。生地黃。檳榔。各一兩。五加皮。

醫門醫品

血風

卷九 四

防風。赤芍藥。當歸酒洗。骨碎。楠炒。海桐皮。川芎。各

五錢。甘草三錢。為細末。每二錢。溫酒調下。薛氏方。

虎骨散 治血風走痛。及打撲作疼。

虎骨酥炙。敗龜板酥炙。當歸酒洗。桂心。牛膝酒洗。

漏蘆。地龍去土。威靈仙。玄胡索。炒。自然銅。碎。共

為細末。每服二錢。熱酒調下。婦人良方。

人參荆芥散 治婦人血風。發熱。身體疼痛。頭昏目

澀。煩渴盜汗。或月水不調。臍腹作疼。法。薛氏方。

塊等證

赤芍藥牡丹皮各一兩柴胡一兩五錢龜甲醋浸

炙黃芩羊角鈎酸黃仁炒枳殼去穢生乾地黄人

參去蘆洲芥穗白朮炒肉桂取心各二錢防風當

歸川芎甘草各八錢共爲粗末每服四錢水一盞

薑三片煎六分溫服不拘時和劑方

當歸浸藥丸 治血風肢體刺疼筋攣骨痺或手足

麻木

當歸五靈脂炒各一兩沒藥五錢爲細末醋糊爲

膏內醫品

血風

卷五 五

九桐子大每服三十九薑湯下

通靈丸 治血風手足疼不可忍

白附子炮僵蠶炒去絲各一兩全蠍炒半兩麝香

二分爲末醋糊丸桐子大每服三十九薑湯下

人良方

麝香丸 治血風歷節走疼或如蟲行

大川烏三個去皮尖生用全蠍二十一一個去毒黑

豆二十一粒炒地龍去土五錢麝香一字爲極細

末用米糊爲丸如綠豆大每服十九溫酒下許學

士云予得此方凡歷節風及不測疼痛一二服便

痊治一貴婦遍身走痛夜如蟲螫三服而愈

醫案

附子八物湯 治歷節血風疼如錐鋸

附子炮乾薑炮芍藥炒茯苓人參甘草炙桂心各

五分白朮一錢五分水一鍾煎七分溫服一方去

桂加熟地黃二錢

四生丸 治骨節作疼或渾身麻

白僵蠶炒去絲地龍去土白附子五靈脂草烏去

膏內醫品

血風

卷六 六

皮尖各等分爲末米糊丸梧子大每服二十九茶

清下或以末酒調服亦可

癰疹瘡

蒼耳散 治女人血風癰疹瘡不止

用蒼耳花葉子各等分爲細末豆淋酒調下二錢

極効

聖惠方

何首烏散 治婦人血風癰疹皮膚癢癢遊走無定

何首烏防風白蒺藜炒枳殼麩炒天麻道蠶胡麻

炒荳蔻子蔓荊子各一錢茵陳五八分半煎七

分溫服

白蜜酒 治血風癰瘡

白蜜不拘多少。調好酒熱服。日服三次。即愈。
丹溪心法

附子酒 治婦人血風遍身瘙癢

生附子重一兩者。不去皮。皂角刺二十一箇。黑薑一合。右咀分爲二處。用好酒二瓶。入上藥慢火熬候熬過半。二瓶合作一瓶。用泥密封。經二宿。每服一匙。溫服。無時病愈則止。
丹溪方

蜂房洗淨。蜜炙。蛇蛻洗炙。魚爲細末。溫酒下。

一錢。日二服。
本草方

又方 治全上

牛蒡子一兩。淨水煮乾。炒令香。浮萍蒸過。焙乾。等分爲細末。每服三錢。食遠葱湯調服。取微汗。
虞世方

又方 治風客于皮膚。搔之不已

蟬退洗淨。大葉薄荷等分爲末。酒調方寸七服。

時方

赤芍藥散

治血風煩悶不食。體倦頭眩。

赤芍藥酒炒。白茯苓各一錢。甘草炙。柴胡各五分。水一鍾。薑三片。棗一枚。煎七分。溫服。

麥門冬散 治婦人血風煩悶。疼痛。飲食不下。

麥門冬去心一兩。前胡赤茯苓各一兩。羚羊角七錢五分。赤芍藥。桑白皮。黃柏各七錢半。生地黄。甘草各五錢。每服一兩。水二鍾。薑三片。煎一鍾。溫服。

丹溪方

麥煎散 治婦人血風攻注四肢。心胸煩壅。悶塞。發熱不止。

龜甲醋炙。大黃煨。常山。赤茯苓。柴胡。白芍藥。當歸。乾漆炒煙盡。生地黄。石膏各一兩。甘草半兩。右咀。咀每服一兩。水二鍾。小麥五十粒。煎至一鍾。溫服。
丹溪方

六君子湯 治婦人胸滿少食

人參一錢。半夏製。白朮。砂。陳皮各一錢。甘草。

八分水香五分水二鍾薑三片棗二枚煎一鍾溫服

越鞠丸 婦人胸膈痞悶不能飲食多由氣鬱宜煮鬱治

香附子童便浸炒蒼朮小片梔子仁炒神麴炒山查各等分爲末神麴丸綠豆大每服六七十九食遠白湯下

虛勞

人參荆芥散 治婦人血風勞證頭昏目澁心忪煩

普門醫品 血風 卷九 九

塊 倦寒熱盜汗頰赤口乾痰嗽胸滿月水不調腹痛癰塊

方見前

油煎散 治婦人血風發熱喘滿多汗口乾舌澁

五加皮牡丹皮赤芍藥當歸酒洗各一兩爲末每

服二錢水一盞將銅錢一文煎入前項藥內同

煎至七分服煎不得攪喚不得吹

地骨皮散 治婦人血風體虛發熱寒熱

柴胡地骨皮各一兩桑白皮紫蘇葉胡黃芩各七

錢半白茯苓五加皮人參甘草官桂白芍藥各一錢右咬咀每服一兩水二鍾薑三片煎一鍾溫服丹溪方

地黃煎 治血虛心忪驚悸

生地黃熟地黃白芍等分爲末用薑汁和水拌杵丸如梧子大每服五十九空心白湯下日三服若臟腑虛寒者酌服

乞力加散 治血風肌熱或脾虛骨蒸寒熱

白朮炒白茯苓白芍藥炒各一錢甘草炒五分水

普門醫品 血風 卷九 十

鍾半薑棗煎服 婦人良方

恒神醫

茯神散 治婦人血風虛弱怔忡驚悸

茯神去水人參白朮龍齒煨另研獨活酸棗仁炒

各三錢防風遠志去心桂心細辛各二錢乾薑一

錢爲末每服一錢水一盞煎七分服

茯神湯 治血風虛弱人忪心神恐畏不能獨臥胸

中煩悶

茯神去水酸棗仁炒黃芩桑白胡黃仁炒白芍藥

炒。五味子杵炒。各一兩。桂心。熟地黃自製。人參。耳草炒。各半兩。每服五錢。薑三片。水一碗。煎服。婦人良方

定志丸 治心神虛怯。所患全前。或語言詭怪。喜笑驚悸。

人參。茯苓。各一兩五錢。菖蒲。遠志。去心。各一兩。爲末。煉蜜丸。如梧子大。每服七八十丸。滾湯下。薛氏醫案

養心湯 治心血虛。怔忡驚悸不寧。或盜汗無寐。發

熱煩躁

黃耆。炙。白茯苓。茯神。去木。半夏。麴。當歸。酒拌。川芎。各半兩。桂心。柏子仁。酸棗仁。炒。五味子。杵炒。人參。各三錢。甘草。炙。四錢。每服五錢。薑三片。棗二枚。水鍾半。煎七分。溫服。婦人良方

朱砂安神丸 治全前

方見十三卷怔忡驚悸門

酸棗仁丸 治膽經實熱。不得睡臥。神思不安。驚悸

怔忡

茯神。去木。酸棗仁。炒。遠志。去心。柏子仁。炒。防風。各一兩。枳殼。麴。炒。生地黃。杵膏。各半兩。青竹茹。二錢五分。爲末。煉蜜丸。梧子大。每服八十九丸。滾湯下。

勞瘵門

論婦人骨蒸。各症皆屬勞瘵。骨蒸者。由積熱附於骨而名也。亦曰傳尸。癰。瘰。復連。無辜。其名不一。皆脾胃虧損所致。症者注也。自上注下。與前人相似。故曰瘵。其瘵有九十九種。故曰各症。其證大率使

骨蒸門

勞瘵

卷九 十二

人沉沉默默。寒熱盜汗。夢與鬼交。遺精唾血。欬嗽下利。日漸羸瘦。有一家互相傳染。至絕戶滅門者。古傳天靈蓋等方。未嘗見効。懶肝丸。猶有効。崔氏四花灸法。蚤用多効。但婦人纏足。難以取穴。恐不准。亦不錄。

前證患之者。其唇內必有白點。爲蟲蝕肺。是以久嗽者。卽反視其唇。若上唇有點。蟲蝕上部。下唇有點。蟲蝕下部。

通治 十一方

神仙取蟲法 治一切勞瘵

青桑枝楊柳枝梅枝桃枝俱向東者每七莖蔥白七莖青蒿一握如無以子代用童便升半煎一升入阿魏一錢再煮數沸入飛過朱砂末檳榔末真安息香末各一錢其麝香末半錢調勻分二服五更并天明各進一服下蟲後以淡粥補之用藥調理三五月再服以除病根此須先擇良日焚香禱祝令病人面向福德方服之蟲白者可治如蟲黑者不可治婦人良方

藥譜

勞瘵

卷九 十三

河車丸 治一切勞瘵虛損骨蒸等疾

紫河車一具初生男胎者佳洗淨蒸爛白茯苓半兩人參去蘆一兩乾山藥二兩爲末麪糊和入河車杵勻丸梧子大每服五七十丸空心米飲下嗽甚五味子湯下婦人良方

又方

獺肝一具陰乾杵末白湯調下一錢日三服未愈再作葛仙翁方

烏雞煎丸 治婦人虛勞及百病亦白帶

人參去蘆三兩黃耆蜜炙六兩白茯苓三兩當歸酒洗六兩生地黄熟地黄香附子製各四兩地骨皮官桂各二兩用烏骨白雞一隻男用雌女用雄籠住將黃耆末和炒麪丸豆大喂雞二七日勒死去腸肚乾擇毛淨入前藥末于內密縫用酒醋各二升煮一宿去骨焙枯研細用原汁打糊丸如梧子大每服五十九鹽湯下

龜甲煎 專治婦人勞瘵欬嗽

雄龜一枚重一斤杏仁去皮尖柴胡貝母去心知

黃門醫品

勞瘵

卷九 十四

母各四兩細剉好酒五升入鍋內將活龜在中以藥圍定上用板子石壓住令其喫酒藥次日用慢火煮候酒盡爲度令患人將龜喫盡將龜甲用醋煮黃入在前項諸藥內焙乾爲細末酒煮麪糊爲丸如梧子大不拘時米飲下三十九

他仙散 治骨蒸肌熱一切勞熱煩燥能生津液

地骨皮二兩防風麥門冬去心各一兩甘草炙半兩剉碎每服三錢薑三片水一鍾煎半鍾溫服

獺肝丸 治骨蒸勞熱或潮熱發熱體瘦煩疼不欲

飲食

獺肝一具。鼈甲酥炙。柴胡各一兩半。朱砂另研。桃

仁去皮尖。麩炒黃。升麻。天靈蓋酥炙。犀角鎊。梔子

仁炒。地骨皮。知母各一兩。黃耆蜜炙。甘草炙各五

錢。為末。麝香一錢。另研。拌勻。煉蜜搗丸。桐子大。每

服三十丸。空心溫水下。婦人良方

補肺湯

治勞嗽五臟虧損。肺熱發熱。盜汗自汗。喘

痰喘嗽

桑白皮炒。熟地黃各一錢。人參去蘆。紫苑。黃耆蜜

養血散

勞瘵 養血 散

炙五味子炒。各五分。水二鍾煎八分。入蜜少許。食

後服。婦人良方

阿膠丸 治勞嗽吐血咯血。發熱。肺熱。口渴。盜汗

阿膠炒。生地黃。菴柝山藥炒。大薊根。五味子。杵

雞蘇各一兩。槓子仁。焙。人參去蘆。防風。麥門冬。去

心。各半兩。為末。煉蜜丸。彈子大。每服一九。細嚼。麥

門冬煎湯下。婦人良方

逍遙散 治血虛。五心煩熱。肢體疼痛。頭重目昏。心

忪。頰赤。口燥咽乾。發熱盜汗。減食嗜臥。月經不調。寒

熱如瘧。肢體羸瘦。漸成骨蒸

柴胡二錢。白朮土炒。白茯苓。白芍藥酒拌。乾薑

歸酒洗。甘草炙。各一錢。水二鍾煎一鍾。清服

桔梗飲子 治心氣不足。倦怠喘嗽吐痰

桔梗炒。甘草炒。黃耆蜜炙。人參。麥門冬去心。各一

錢。青皮醋製。三分。水鍾半煎七分服。婦人良方

癥瘕門

論婦人癥瘕。皆由飲食失節。脾胃虧損。邪正相搏

養血散

癥瘕 養血 散

積于腹中。牢固不動。曰癥。伏現無常。曰瘕。有七癥

八瘕。總之氣滯血凝所致

羅謙甫先生曰。養正則邪自除。必先調養。使榮衛

充實。若不消散。方可攻下。若除之不以漸。則必有

顛覆之悔

通治 五方

大消石丸 治七癥八瘕。當用此藥去之。不令人困

用消石三兩。人參一兩。甘草八錢。為末。醋一升。砂

器中。入大黃四兩。煎膏。和餘藥丸。梧子大。每服三

十九米飲下三日一服當下赤物 婦人良方

穿山甲煎 治癥瘕瘀血心腹作疼

穿山甲炙炒燥薑甲醋炙赤芍藥大黃炒乾漆炒
烟盡桂心各一兩川芎羌花醋炒當歸尾各半兩
麝香一錢爲末每服一錢酒調下 婦人良方

桃仁煎 治血瘕

蜜蟲半兩炒黑大黃炒一兩爲末桃仁去皮尖搗
如泥一兩以醇醋一鍾砂鍋內熬至三分下前藥
不住手攪煎至可丸下朴消一兩搗勻九桐子太

實用醫品

瘕瘕

卷五 七

不喫晚飯五更初溫酒下五丸日午下穢物如未

下再服仍以調氣血藥補之藥頗峻虛人宜酌服

婦人瘕瘕結聚不散及寒疝遶臍疼痛月經淋閉

乾漆杵碎炒令烟盡牛膝去蘆酒浸一宿焙乾各

一兩爲細末用生地黄汁一升入前末於砂器內

火熬候可丸如梧子大每旦空心服二十九溫

酒或米飲下 拔萃方

婦人疝瘕小腹脹痛小水不利益男子謂之疝女子

謂之瘕

枳殼十五個炮山梔子炒山楂去子吳茱萸去核
炒荔枝核炮等分爲末每用二錢長流水調下

繭唇門

論經云脾氣通於口又云脾之榮在唇蓋燥則乾
熱則裂風則皸寒則揭若腫起白皮皸裂如繭
名曰繭唇有腫起重出如繭者有本細末大如繭
如瘡者或胎產崩漏失血或七情火動傷榮或厚
味積熱傷脾大要補腎水生脾血則燥潤而腫消

實用醫品

繭唇

卷五 八

若過用寒涼反成敗證

通治 五方

清胃散 治唇繭因厚味積熱所傷牙齒疼痛

黃連酒炒錢半當歸酒洗生地黃牡丹皮各一錢

升麻二錢水二鍾煎一鍾服實熱便秘量加大黃

柳華散 治熱毒口瘡唇繭

黃蘗炙蒲黃真青黛人中白煨等分爲末油調敷

之 本草綱目

涼膈散 治積熱煩渴面赤內熱口唇燥裂如繭

大黃朴硝甘草梔子炒黃芩酒炒薄荷各一錢連翹二錢水二鍾煎一鍾溫服

四順清涼飲 治臟腑實熱秘結不通口唇生瘡

當歸酒洗赤芍藥甘草大黃各一錢水一鍾煎半鍾溫服

溫中丸 治口唇生瘡不喜飲冷飲食少思

人參甘草炙白朮土炒等分爲末薑汁糊丸桐子大每服五十九白湯下

醫門醫品

滿唇

卷九 九

結核流清

論婦人結核最多皆因鬱怒虧損肝脾或胎前產後失于調養或暴怒觸動膽火火氣鬱結堅硬成核如榛如豆或漸長如桃李有疼有不疼若在頸項久而不散多成瘰癧宜早治之人多忽畧致成痼疾凡獨形而單顆者爲結核連生者爲瘰癧詳見二十七卷瘰癧門

若結于項側耳之前後或胸脇腫疼或發寒熱屬

膽經風熱宜用柴胡清肝散加釣藤山梔若結于肉裏其色不變口噴發熱屬血虛肝火宜用加味逍遙散加龍膽草若結于肢節或累累連貫亦肝

火血燥筋攣所致宜用柴芍參苓散加釣藤佐以六味地黃丸若時發時消者氣滯而痰結也用歸

脾六君子二湯並佐以海藻丸經云形傷則痛氣傷則腫不可輕用行氣破血之劑以復傷之婦人

流注亦因憂思鬱怒勞役損傷所致或結塊或漫腫皆屬虛損濕痰滯血急用葱熨及益氣養榮湯

醫門醫品

結核流注

卷九 九

則未成者自消已成者自潰若漫腫微痛不作膿及膿成不潰或潰而不斂皆宜大補氣血忌用寒涼剋伐

結核

海藻散堅丸 治結核及瘰癧

海藻昆布各洗淨柴胡龍膽草酒拌炒焦各二兩

小麥四兩醋煮晒乾爲末煉蜜丸桐子大每服三

四十九臨臥白湯送嚥化嚥之尤妙

神效開結散 治同上

桐紅四兩沉香木香各三錢珍珠四十九粒入砂
礮內以鹽泥封固煨赤取出去火毒另研猪厥肉
四十九枚生項間如棗大豚猪者佳炙焦爲末每
服一錢臨臥酒調徐徐嚥下重者三五服輕者一
劑可愈切忌酸鹹油膩滯氣之物須用除日淨室
修合

柴胡清肝散 治見論

柴胡山梔炒牡丹皮各一錢茯苓川芎芍藥當歸
牛蒡子炒各七分白朮炒甘草炙各五分水鍾半

醫門醫品

精核流注

卷六 注

煎七分溫服

加味逍遙散 治見論

方見三十三卷調經門

柴芍參苓湯 治肝火血熱筋攣結核及遍身癢癢
或起赤暈

白朮炒人參茯苓各一錢柴胡川芎山梔芍藥當
歸熟地黃各八分甘草炒五分水鍾半煎服 婦人
良方

六味地黃丸 治見論

方見十三卷虛勞門

歸脾湯 治見論

方見三十三卷調經門

六君子湯 治見論

方見三十卷崩漏門

流注

益氣養榮湯 治懷抱鬱抑結核流注或四肢患腫
肉色不變日晡發熱或潰而不斂

人參茯苓陳皮貝母香附當歸酒拌川芎黃耆益

醫門醫品

精核流注

卷六 注

水炒熟地黃芍藥炒各一錢甘草炙桔梗炒各五
分白朮炒二錢水二鍾薑三片棗二枚煎服 婦人
良方

良方

葱熨法 治虛怯人身生腫塊或疼或不疼或四肢
筋攣骨疼及流注跌撲損傷腫疼神効

用葱頭細切杵爛炒熱敷患處冷即易之再熨其
効如神 婦人良方

木香餅 治氣滯結腫流注閃脇作痛

木香五錢生地黃一兩將木香爲末地黃杵膏和

勻量患處大小作餅置于上以熱熨斗熨之腫疼

卽止

豆豉餅 治流注腫硬不潰及潰而不斂一切頑瘡

方見二十七卷瘰癧門

普門醫品

結核流注

卷九 五

普門醫品卷之四十

東武王化貞元起父編輯

門人陳 斌憲卿父較閱

初誕門

論小兒分娩之時口含血塊啼聲一出隨即嚥下毒伏命門遇天行時氣久熱或飲食停滯或外感風寒驚風發熱等因發爲瘡疹須急于未啼時用軟帛裹指空去其血用黃連硃蜜甘草解之後雖

普門醫品

初誕

卷四十 壹

出痘亦輕矣

凡嬰兒初誕因難產或冒風寒而垂危者切不可便斷臍帶急烘綿絮包抱懷中急以胎衣置火中煨燒更用大紙撚于臍帶上往來燎之使暖氣入腹氣復自甦切勿洗浴恐凌理不密元氣發泄而外邪乘之也

小兒洗浴不可先斷臍帶候洗了方斷不致水濕傷臍可免臍風臍瘡等證仍用清油調髮灰敷臍卽臍帶亦不可見水浴湯須溫暖得宜冷熱驚兒

恐生疾病浴時緊護兒背勿令見風

凡斷臍不可用刀割。隔單衣咬斷為妙。用白練柔軟靛新綿包裹緩急得中。斷臍當留六寸。剔去臍帶患及穢汁。免令入腹成疾。并以舊綿燒灰摻之。

〔附方〕

小兒初生

未啼時。用軟帛裹指挖去口中穢血。用甘草硃蜜等法解之。後雖出痘亦輕。亦無他證。保嬰撮要

甘草法

朱砂法

初誕

卷四十二

甘草細切少許。臨產時以綿裹沸湯泡盞內收生之後。以軟綿蘸汁滴兒口中。當吐出腸中惡汁。待兒饑時再與之。令兒智慧。出痘稀少。王璆選方

朱砂法

朱砂一大豆許細研。蜜調一蜆殼抹兒口服之。鎮心定魄解毒辟邪。保嬰撮要

牛黃法

牛黃少許。研細以蜜調與吮能益肝膽定精神止驚熱辟惡氣除小兒百病。保嬰撮要

黃連法

臨月用黃連細切為末。綿裹蘸百沸湯拭口。或以黃連汁一蜆殼灌之。但母氣膏梁積熱者宜服。若滋味淡薄胎氣元弱者不宜用。保嬰撮要

韭汁法

韭汁一匙灌之。即吐出惡血。永無諸疾。四聲本草

安胎散

羚羊角一錢畧炒。亂髮一團燒存性。蜈蚣一寸赤足者炙黃為末。斷臍後敷之。以絹帕緊束。免生臍

風。保嬰撮要

初誕

卷四十二

浴兒湯

以猪膽入湯浴之。永不生瘡疥丹毒之疾。或以益母草煎湯。或以黃連煎湯俱妙。本草綱目

小兒月內

時時以桑樹白汁塗口中。不然多有舌硬撮口之證。保嬰撮要

叉方

用兒本身剪下臍帶燒灰。以乳汁調服。能預解胎

毒祛驚稀痘或入朱砂少許保初大全

小兒初生無乳

以猪乳代之。出月可免驚癇痘疹之患。若月內胎

驚以猪乳調朱砂少許抹口甚妙。張煥方取猪乳

法須令猪兒飲乳便提猪兒後脚起口自離乳急

用手拊之即得乳矣。非此法不可取也。

初生兒舌上有白膜皮裏者或在舌根若不摘去其

兒必啞

用手指甲刮破令血出以枯礬末半字敷上即愈

普濟醫書

初誕

卷四

藥和衆方

小兒百日內常視其齒齦有泡急以布裹指擦破

真白僵蠶爲末蜜調塗口內免生撮口噤風等證

保嬰撮要

小兒初生七日宜助穀神導達腸胃

研粟米煮粥如飴每哺少許姚和衆方

初生兒遍身如魚肝又如水晶破則成水流滲又生

用蜜陀僧生研摻之救急方

小兒初生胎熱或身黃者

真牛黃豆許研入蜜調膏乳汁化開時時滴兒口

中形色不實者勿多服錢氏小兒方

初生日開由胎中受熱也

熊膽少許化水洗之一日七八次如三日不開用

四物湯加甘草天花粉服全幼心鑑

噤風臍風撮口

論小兒初生噤風者因胎中受熱毒留心脾生下

復爲風邪所搏致眼閉口噤啼聲不出舌上如粟

普濟醫書

噤風

卷四

口吐白沫

臍風者因斷臍之後爲水濕風邪所傷致腹脹臍

腫四肢柔直啼不吮乳甚者發搐若臍邊青黑手

拳口噤是爲內搐不治

撮口因浴後拭臍風邪所入而作凡風入心脾俱

能撮口證候甚惡若不速與利下無可收療視以

爲常少緩則斃矣以上三證七日內患者百無一

生

凡斷臍帶不盈尺者多患臍風齒齦有泡如粟者

即生撮口。宜以帛裹指蘸溫水擦破即愈。

（藥風） 十一方

小兒口噤不開。不能乳者。

以東走蜈蚣去足炙研末半錢。用猪乳一合調勻。分三四次溫水灌之。圖經本草

又方

蟬蛻洗去土。全蠍去毒。各二七枚爲末。入輕粉末少許。乳汁調灌。全切心鑒

又方

普門醫品

藥風

聖惠方

用水銀米粒大。與之下咽即愈。聖惠方

又方

鬱金。藜蘆。瓜蒂。爲末。水調搐鼻中。聖惠方

又方

驢乳猪乳。各半鍾。煎數沸。候溫服之。千金方

南星散 治全上

天南星末一錢。片腦少許。以指蘸薑汁粘藥。擦牙立開。凡小兒常視其齦上有泡。亟擦破。口既開。用真白僵蠶爲末。蜜調塗口內。

小兒噤口。面赤屬心。面白屬肺。

雞矢白如棗大。綿裹。以水一合煮減半。分二服。金方

小兒面赤氣喘。舌強唇青。聚口發噤。

真僵蠶二枚。去嘴畧炒。爲末。蜜調傳唇中。聖惠方

七日口噤。
牛黃爲末。以竹瀝化一字灌之。更以猪乳滴之外。臺秘要

取猪乳法。見本卷前初誕門。

小兒初生十日內口噤者

普門醫品

藥風

聖惠方

牛嚼草絞汁。灌之。聖惠方

又方

蜘蛛一枚。去足。炙焦研末。入猪乳一合和勻。分作三服。徐徐灌之。神効無比。聖惠方

（臈風） 十八方

小兒百日內。眼閉口噤。啼聲不出。舌上如粟。口吐白沫。名爲臈風。

赤足蜈蚣去足。炙爲末。以猪乳調五分。徐徐灌之。丹溪方

又方

用壁虎後半截焙爲末。男用女乳。女用男乳。調勻入稀雞矢少許。搽舌根及牙關。仍以手蘸摩兒額。汗出卽愈。筆峯雜錄

又方

釣藤鈎。朱砂。直僵蠶。蠅稍。各一錢。赤脚蜈蚣半條。麝香一字。爲末。每服一字。竹瀝調下。本草綱目

又方

雀甕有蟲者。直僵蠶炒。各一枚。輕粉少許。研勻。以

瘡用膏品

瘡風

聖惠方

薄荷自然汁調灌之。取下毒物。神効。

聖惠方

又方

艾葉燒灰。填臍中。以帛縛定。候口中有艾氣卽愈。簡便方

又方

獨頭蒜切片。安臍上。以艾灸之。口中有蒜氣卽止。黎居士方

又方

杏仁去皮。研敷。千峰秘錄

又方

葛蔓燒灰一字和乳汁滴咽中。卽愈。聖惠方

又方

全蠍二十一箇。無灰酒塗炙爲末。入麝香少許。每用金銀煎湯調半字服之。全効心鑒

瓜蒂散 治全上

瓜蒂七個赤小豆。秫米。各七粒。爲末。用少許吹兩鼻。令出黃水。仍以米飲調服少許。吐黃水卽瘥。仲景方

瘡用膏品

瘡風

聖惠方

小兒臍中出汁。或赤腫。不治卽成臍風。

當歸。胡粉。等分爲末。敷之。聖惠方

小兒臍瘡

蟻糟焙乾。研末敷之。不過數次。千金方

小兒臍瘡出汁。或膿血。久不瘥者

蝦蟆燒末。敷之。日三次。一方加牡蠣等分。外臺方

又方

龍骨煨研敷之。或以髮燒灰敷之。聖惠方

又方

海螵蛸乾膽脂等分爲末。油調搽之。聖惠方

又方

白石脂煨爲末。炒溫撲之。日三度。勿揭動。常山獨行方

又方

車轄脂。燒灰敷之。或以蜂房燒敷。亦妙。本草綱目

初生小兒臍腫

緋帛燒灰。研敷。藏器本草

撮口 十一方

聖門醫品

撮口

卷四十一

初生兒。七日不乳名撮口。其證舌上有瘡如粟米狀。

用僵蠶四個。去嘴畧炒。衣芩少許。爲末蜜調敷兒

口內。保嬰撮要

又方

蜈蚣斷去頭尾。用中腰兩頭肉擦之。卽愈。須先將

瘡粒刮破。子母秘方

又方

壁魚研末。每以少許塗乳。令兒吮之。或以鼠婦蟲

杵絞汁少許。灌之。聖惠方

又方

搗鹽貼臍上。麝園艾灸之。子母秘錄

又方

烏驢乳一合。以東引槐枝三寸長十根。火煨一頭

出津。拭淨。浸乳中。取乳滴兒口甚良。先灸兩乳中

間三壯。聖惠方

又方

生甘草一錢。水煎濃汁。以綿毯蘸與兒吮之。令出

痰涎。却以猪乳點入口中。卽瘥。保嬰撮要

聖門醫品

撮口

卷四十一

又方

朱砂末。安小瓶內。捕活蠍虎一個。入瓶中。待月餘

體赤。取陰乾。爲末。每薄荷湯調服三分。方廣附錄

小兒口緊不能開合及飲食啼哭。不速治卽死

蛇蛻燒灰。拭淨敷之。或以雞矢白研敷之。聖惠方

又方

蟾蜍尾上炙乾。研末猪脂和敷之。極効。千金方

又方

棘科上天漿子。卽雀兒瘻。敲破取內物和汁。研灌

之聖惠方

又方

天漿子五枚。赤足蜈蚣一條。燒存性。研勻。每服一字。乳汁調下。聖惠方

天鈞內釣盤腸

論天鈞者。發時頭目仰視。如魚之上鈞。故曰天鈞。其證驚悸。壯熱。兩目反張。淚出不流。手足搐掣。甚者爪甲皆青。

醫門醫部

天鈞

卷五

內鈞者。腹痛多喘。唇黑囊腫。偃僵反張。眼尾赤。皆痰熱鬱滯。外挾風邪。及驚觸所致。

盤腸氣者。痛則曲腰乾啼。額上有汗。皆肝經風邪所搏。肝居下。故痛則曲腰。風燥其液。故無淚。風木助心火。故額上有汗。肝木乘脾。故下利青糞。脾氣頓衰。故口閉足冷。皆由產下。澡洗受風冷所致。

天鈞九方

天竺黃散 小兒目睛鈞上四肢瘳癢

天竺黃臘茶甘草炙各一錢。全蠍生薄荷葉裹煨。

七個。綠豆半生半炒四十粒。荆芥穗。雄黃水飛。枯礬各二錢。為細末。每服半錢。人參煎湯調服。

釣藤飲 治小兒天鈞潮熱

釣藤人參各半錢。犀角三分。甘草炙二分。全蠍一分。天麻四分。為末。每一錢水半盞。煎減半溫服。

天鈞驚風翻眼向上

全蠍一個。瓦炒。好朱砂一錢。為末。飯丸綠豆大。外以朱砂少許。同酒化下一丸。頓愈。聖惠方

天鈞頭目仰視。痰寒內熱

醫門醫部

天鈞

卷五

蟬蛻去足嘴。以漿水煮。二日。曬乾。為末。每服一字。

冷水調下。衛生易簡方

又方

壁魚五個。乳汁和研。灌之。聖惠方

又方

蟬蛻子。生烏頭去皮尖。各二錢。為末。每服一錢。水調塗頂上。聖惠方

調塗頂上

天鈞驚風。竄視眼白。及角弓反張。聲不出者

大蜈蚣一條。去頭足。酥炙。竹刀批開。記定左右。各

收明。又以麝香一錢亦分左右配定研末包收每
用左邊者吹左鼻右邊者吹右鼻各少許不可過
多若眼未下再吹些須眼下即止 直指方

又方

猪乳飲之甚良 仁齋直指方

又方

桑東行根取研汁服金治驚癇客忤 聖惠方

內釣 六方

桃符丸 治小兒內釣腹痛氣喘唇黑眼赤

驚門書品

內釣

卷中 古

銀朱半錢乳香一錢研末蒜煨一瓣和研丸如黍

米大半歲兒五丸量兒大小加減薄荷煎湯化下

乳香丸 治內釣腹疼驚啼

乳香半錢沒藥沉香各一錢蠟稍十四個雞心楨

榔一錢半爲末蜜丸梧子大每服二三錢菖蒲釣

藤鈎煎湯化下

又方

乳香沒藥木香等分水煎服 阮氏小兒方

又方

蔥湯洗兒腹仍以炒蔥搗貼臍上良久尿出疼止
嬰兒寶鑑

又方

卮子仁半兩草烏頭少許同炒過去草烏入白芷

一錢爲末每服半錢茴香葱白酒下 普濟方

魏香散 治全上

蓬莪朮半兩用阿魏一錢化水浸一日夜焙研每

服一字紫蘇湯下或只以炮熟爲末酒服亦可

保切大全

驚門書品

內釣

卷中 古

盤腸 六方

盤腸氣疼曲腰乾嘔額上有汗

蘿蔔子炒黃研末乳香煎湯服半錢 仁齋直指方

又方

沒藥乳香等分爲末以木香磨水煎沸調一錢立

効先煎蔥湯淋洗其腹仍揉蔥熨臍間良久尿自

涌出其疼自止仍服此藥 阮氏小兒方

又方

延胡索茴香等分炒研空心米飲量兒大小與服

衛生易簡方

釣藤膏 治盛腸內釣腹疼或嘔

乳香沒藥木香黃芩各一分水煎于三個去油為

末蜜九皂角子大釣藤釣煎湯磨半丸入蜜服未

止再服魏香散保嬰撮要魏香散方見前

盤腸內釣腹痛不止

阿魏為末大蒜半瓣炮熟研爛和丸麻子大每艾

湯服五丸効總微錄

盤腸天釣

盤腸

驢背前交脊中毛一拊指大以乳汁和于砂器中

慢炒焦入麝香少許為末乳汁和灌之千金方

客忤門

論小兒客忤由外人帶來穢惡之邪氣所中是為

客忤即父母家人遠來外至或經歷神廟喪門或

飲酒騎馬乍至汗腥穢氣冲觸于兒皆為客忤使

兒面變五色狀若驚癇但目不上視或口吐青白

沫喘息腹疼反側痠癢與驚無異切不可作驚治

宜補心安神仍視其口中左右有小泡即以指甲

刮去之為妙○又有中惡者謂卒中惡邪之氣而

為病也其證唇青厥逆心腹刺痛悶亂欲死宜辟

邪膏

通治十六方

小兒客忤因見生人所致

即取來人顙上髮十根斷兒衣帶少許合燒研末

傳乳頭飲兒即愈千金方

小兒客忤卒中者

客忤

燒母衣帶三寸并髮灰少許乳汁灌之外臺秘要

又方

驢膊上旋毛一彈子大炒研末乳汁調服外臺方

又方

常山左顧牡蠣各一錢漿水煎灌之吐痰即愈氏小兒方

又方

葛蒲根搗汁含之立止肘後方

小兒客忤口不能言

細辛、桂心等分爲末。以少許內口中。外臺秘要

又方

真珠末。用雞冠血和。丸小豆大。以三四粒納口中。
肘後方

又方

朱砂爲末。以雄猪心血和。丸麻子大。米飲下七丸。
直指方

伏龍肝散 治客忤驚啼

竈心黃土二兩。研雞子一枚同和勻。入水少許。塗

普濟醫品

客忤

卷八

五心及頂門

辟邪膏 治小兒卒中惡毒。心腹刺疼。喘悶欲死。

降真香。白膠香。沉香。虎頭骨。鬼臼。龍膽草。人參。白

茯苓。各二錢半。爲細末。人雄黃二錢。麝五分。煉蜜

爲丸。麻子大。每服十九丸。乳香湯下。

客忤中惡。心腹刺疼。氣衝脹滿。

真黃丹一錢。蜜水調合灌之。

中惡客忤。項強欲死。

麝香少許。乳汁塗兒口中。取効。廣利方

又方

壁魚十枚。研傅乳上。吮之立愈。或以二枚塗母手
中。掩兒臍。吐下卽愈。仍摩項強處。本草綱目

忤惡卒死

銅器。或瓦器。盛熱湯。隔衣熨其腹上。冷卽易之。立
甦。藏器本草

又方

取蔥白納下部。及兩鼻孔中。氣通或嚏。卽活。陳氏

經方

卷八

卷八

麝香暴絕

竈心土研末。一錢。水調服。更以少許吹鼻。千金方

東武王化貞元起父編輯

門人陳 斌憲卿父較閱

驚風門

通治 急驚 慢驚 慢脾

論錢仲陽云。急驚者。因聞大聲。或驚而發搐。搐止如故。此熱生于心。身熱面赤引飲。口中氣熱。二便黃赤。甚則發搐。蓋熱甚生風。陽盛而陰虛也。宜以利驚丸除其痰熱。

晉門醫品

驚風

卷五

一

慢驚因病後。或吐瀉。或藥餌傷損脾胃。肢體逆冷。口鼻氣微。手足痠癢。昏睡露睛。此脾虛生風。無陽之證也。溫白丸主之。

保嬰集云。急驚屢發而屢用涼瀉之藥。則脾陰愈消。而變為慢驚。至于慢驚。脾虛已極。無風可驅。無痰可祛。若不審其因。泛用祛風化痰之劑。脾氣益傷。陰血益損。變為慢脾。頭垂昏憤。四肢厥冷。而益不可救藥矣。急回其陽。九死一生。

通治

十三方

天麻散 治小兒急慢驚風。其効如神

半夏七錢。天麻二錢五分。白朮炒。白茯苓。甘草炙。各三錢。水一盞。入生薑三片同煮。候乾去薑為末。每服一錢五分。薑棗煎湯調下。王機微義

小兒驚風不拘急慢

蠅一個。頭尾全者。以薄荷四葉裹定。火上炙焦。同研為末。分四服白湯下。經驗方

又方

乳香。甘遂。各半兩。同研末。每服半錢。童便調下。王

晉門醫品

驚風

卷五

二

氏博濟方

又方

生半夏一錢。皂角半錢。為末。吹少許入鼻。得嚏驚散。直指方

又方

五月五日取紅蚯蚓。竹刀截作兩段。急跳者作一處。慢跳者作一處。各研爛。入朱砂末和作丸。記收分明。急驚用急跳者。慢驚用慢跳者。每服七丸。薄荷湯下。應驗方

探生散 治急慢驚風諸藥無効吹鼻定生死

沒藥雄黃各一錢乳香五分麝香一字各爲細末和勻用少許噴鼻如涕淚俱出者可治 金嬰方

驚風不醒

白烏骨雞血抹唇上及心窩即醒 集成方

驚風口噤不開

天南星一枚煨熟紙裹斜包剪一小孔透氣口中牙開自開也 本草綱目

急慢驚風吊眼撮口搐搦不定

驚風

驚風

驚風

代諸石火燒醋淬十次細研水飛曬乾每服一錢或半錢真金煎湯調下連進三服兒脚脛上有赤斑卽是驚氣已出病當安也無斑點者不可治

急慢驚風痰涎壅塞命在須臾服此卽愈乃利痰瀉

驚之聖藥

真礞石焰消各一兩同煨過爲末每服半錢或一

錢急驚壯熱薄荷湯入生蜜調下慢驚虛熱木香

湯入熟蜜調下 嬰兒寶鑑

驚風悶亂煩懊拘急啼叫

乳香半錢胡粉一錢研勻以白頸蚯蚓生捏去土

搗爛和丸麻子大每服十九蔥白湯下 普濟方

麝香餅 治小兒急慢驚風進退不定荏苒累日生

靜乍動嘔吐痰涎潮搐甚者宜此

南星製川烏炮各五錢蜈蚣二條蠍尾二十四個

乳香鉄粉朱砂牛黃麝香各一錢白花蛇酒浸取

肉焙五錢各爲末酒煮糊丸芡子大捻作餅子三

歲兒一餅薄荷湯下量兒大小爲加減 玉機微義

白口驚風

普濟方

驚風

驚風

蚱蟬去翅足炙赤芍藥黃芩酒炒各三分水一盞

煎半盞溫服 聖惠方

急驚 十二方

萬全散 治小兒急驚

全蜈蚣一條去足炙爲末丹砂輕粉等分研勻陰

陽乳汁合丸綠豆大每歲一丸乳汁下 聖惠方

又方

生蚯蚓一條研爛入五福化毒丹一丸同研薄荷

湯下 普濟方 化毒方見四十六卷頭面門

小兒急驚啼哭暴絕

川椒左顧牡蠣各一錢以酸漿水一碗煎七分作

三四次灌之千金方

開開散 驚風牙關緊急

蜈蚣一條炙直僵蠶炒南星各一錢麝香一字猪

牙皂角一挺各燒各爲末研極細少許噴鼻或以

生薑蘸藥擦牙上經驗方

驚風喉閉牙緊

鉛白霜一字蟾酥少許爲末烏梅肉蘸藥于齦上

普濟方

驚風

五

指之仍吹開關散即開普濟方

利驚丸 治急驚痰盛潮熱發搐

青黛輕粉各二錢牽牛末半兩爲末麪糊丸綠豆

大每服十丸薄荷湯下保嬰撮要

又方

白僵蠶蠍稍天雄尖附子尖各一錢炮爲末每服

一字或半錢薑湯調灌甚効本草衍義

又方

遠年白田螺殼燒灰入麝少許水調灌之普濟方

急驚搐搦

丹砂半兩天南星一個約重一兩者酒浸炮乾全

蠍三個爲末每服一字薄荷湯下聖濟錄

急驚涎潮

鐵粉二錢朱砂一錢爲末每服一字薄荷湯調下

楊氏家傳方

小兒月內驚風

朱砂爲細麪新汲水調塗五心最驗斗門方

又方

普濟方

驚風

六

某子油貼頂顙上引氣上出即愈本草綱目

慢驚十二方

溫白丸 治慢驚驅風豁痰定驚

人參防風白附子生用直僵蠶焙全蠍焙各一錢

南星湯泡七次焙天麻各二錢爲末水糊丸小綠

豆大每服十五丸薑湯下保嬰撮要

天南星丸 治全上

南星一個重八九錢者掘地深尺許先用炭五斤

燒通紅以好米醋一碗酒坑中即投南星以火灰

密蓋用盆覆住一時許取出爲末入琥珀全蠍各一錢每用二字生薑防風煎湯調下

保嬰撮要

烏沉湯 治慢驚驅風助胃

天麻二錢人參真川烏生用全蠍焙南星焙木香沉香各一錢甘草炒半錢爲末每服三五分薑一片煎服

保嬰撮要

慢驚痰癎

血竭半兩乳香一錢半同搗成劑火炙溶丸如梧子大每服一丸薄荷煎湯化下夏月用人參湯下

驚風

御藥院方

慢驚虛風

平正附子去皮臍生研爲末以白頸蚯蚓于末內滾之候定刮蚓上附末九黃米大每服十九米飲下

百一方

小兒慢驚及天吊夜啼

蝙蝠一枚去腸翅炙焦人中白乾蠍焙麝香各一分爲末煉蜜九綠豆大每服三九乳汁下

聖惠方

慢驚風口眼喎斜搐搦痰盛

雀甕內蟲生用三枚乾蠍生用七枚朱砂一錢研勻飯九粟米大每服二九荊芥湯送下

聖惠方

又方

雀甕有蟲者白僵蠶乾蠍三物各三枚微炒搗末煎麻黃湯調服一字日三服量兒加減

圖經本草

太乙保生丹 治慢驚尚有陽證者

全蠍青者十四個白附子生用僵蠶牛膽南星蟬退琥珀防風朱砂各一錢麝五分爲末米糊丸桐子大金箔爲衣每二九薄荷湯下

保嬰撮要

普門醫品

驚風

卷之八

釣藤散 治吐利脾胃氣虛成慢驚風

釣藤鈎二錢蟬蛻天麻防風蠍尾去毒人參各五錢麻黃僵蠶炒甘草炙川芎各二錢五分麝香五分爲末每服二錢水煎虛寒加附子一錢

攝要

小兒過驚後瞳人不正者

人參阿膠糯米炒成珠各一錢水一盞煎七分溫服日再服

直指方

世傳通關散 治驚風愈後聲啞不能言

大南星一個炮爲末每服二分猪膽汁調下便能

言語 保嬰撮要

慢脾 三方

小兒久病後或吐瀉後生驚轉成慢脾

蠍稍一兩爲末以石榴一枚剝空無灰酒調末填入蓋定炭火上熬時時攪動待稠取出放冷每服一字金銀薄荷煎湯調下 本事方

黑附子湯 治慢脾風四肢厥冷

附子炒去皮三錢木香人參各一錢五分白附子一錢甘草炙五分爲末每服三錢薑五片水煎若

驚風

驚風

驚風

手足既溫即止後服

辰砂膏 治慢脾冷痰壅滯手足厥冷微搐

黑附子一枚重一兩以上者去皮臍頂上空一孔入辰砂末一錢仍用附子塞之炭火燒存性牛膽煉蜜丸桐子大每服二三丸生薑汁泡湯下

發搐門

論錢仲陽云驚癇發搐男左視無聲右視有聲女

右視無聲左視有聲此金木相勝也若握拳握指

在內女爲順握指在外男爲順順則易治逆者不

治吐瀉後變證者亦不治如手足冷汗搐眉搐肚

日夜不止名真搐傷風發搐口中氣熱呵欠手足

動者名假搐傷食後搐身熱困睡嘔吐不思乳食

者當先定搐後用白餅子下之百日內發搐真者

內生風二三次必死假者外生風雖頻發不死

凡搐順則無聲逆則有聲故男子搐左視左女子

搐右視右男眼上竄女眼下竄反則爲逆其指

驚門醫品

驚風

卷四十一

形勢彎入裏者爲順出外者逆出入相半者難痊

熱盛生驚驚盛生風風盛發搐治搐先于截風治

風先于利驚治驚先于豁痰治痰先于解熱

通治 十二方

塗頤法 治發搐

麝香一字蠍尾去毒薄荷葉三分蜈蚣牛黃青黛末各二分同研用熟棗肉調膏新綿上塗勻貼頤上四圍各出一指許火上炙手頻熨百日內外小兒發搐可用此 保嬰撮要

浴體法 治全上

天麻末二錢。蜈蚣尾朱砂末各五分。烏蛇肉酒浸焙為末。白礬各三錢。麝香一字。青黛三錢。以上研勻。每用三錢。水二碗。入桃枝葉一握。煎數沸。候溫洗之。勿浴背。凡小兒週歲上下。一切風搐。用以上二法。得汗立解。殊勝火灸。保嬰撮要

定搐中分散 治全上

螳螂一個。蜥蜴。赤足蜈蚣。各一條。各中分之。隨左右分研記定。男用左。女用右。每以一字吹鼻內。搐

驚風

發搐

驚風

之。吹左即左定。吹右即右定也。普濟方

擦牙通關散 治風搐。關竅不通。痰塞中脘。留滯

百節

南星二錢。麝香一字。牙皂二挺。燒存性。赤脚蜈蚣

一條。僵蠶一錢。為末。用薑汁蘸藥。少許擦牙。或調

服少許。涎自出。保嬰撮要

四聖散 治小兒風熱痰滯。竅視搐搦

全蠍去毒炒七個。僵蠶去嘴炒四個。天南星去皮

臍七錢。半生用。川烏去皮臍三錢。生用。將南星研

末。水調作餅。裹全蠍。僵蠶。川烏外。用水濕紙重包。

慢火煨赤色。放在地上。一伏時。取起。研為極細末。

用少許吹鼻中。仍以薑汁服一字。保嬰撮要

小兒驚氣。吐逆。發搐。痰涎壅塞。手足掣癇。眼睛斜視。

枳殼去穢。麩炒。淡豆豉等分為末。每服一字。甚者

半錢。急驚。薄荷湯下。慢驚。荊芥湯下。入酒二三匙。

每日三服。陳文仲方

驚驚丸 治心肝二經風熱。驚搐不定。潮熱流涎。牙

關緊急。手足搐搦

驚風

發搐

驚風

黃連五錢。龍膽草酒拌炒黑。防風。青黛各三錢。鈎

藤鈎二錢。片腦一錢。牛黃。麝香。一字。各另為末。麩

糊丸。粟米大。每服十丸。兒大量加煎金銀湯下。保

嬰撮要

瀉青丸 治肝經風熱。發搐。目劄項急。尋衣搶物。甚

則身反張

當歸酒洗。龍膽草酒炒。川芎。防風。大黃炒。羌活。山

梔仁。各等分為末。煉蜜丸。芡實大。每服一九。沙糖

湯化下

抑肝散 治肝經虛熱發搐或發熱咬牙驚悸少食睡臥不安

軟柴胡甘草各五分川芎八分當歸酒洗白朮炒白茯苓鈞藤鈎各一錢水一盞煎六分子母同服導赤散 治心經蘊熱發渴抽搐有力喜仰面睡小便秘赤

生地黃木通甘草等分爲末每服一錢入淡竹葉十片水一鍾煎半鍾服嬰童百問風搐掣癱

普門醫品 發搐 卷五 五

人參蛤粉辰砂等分爲末以豬心血爲丸綠豆大每服三十九金銀湯下衛生寶鑑

白餅子 治見論

方見四十三卷傷食門

胎驚門

論巢氏曰小兒在胎因母忿怒驚悸有所觸撲驚氣入胎子乘母氣降生之後其兒精神不爽顏色虛白初則溫溫微熱其後頰赤多驚物動則恐聲

響則悸印堂青色壯熱嘔乳睡中不寧手足微掣是爲胎驚久則生風成痼

錢氏曰小兒壯熱吐乳心神不寧手足抽搐身體強直眼目反張則是胎驚風證

通治 十方

青龍丸 治小兒胎驚

人參天麻茯神白附子炒膽南星各五錢甘草炙青黛各一錢朱砂水飛麝香各五分各爲細末和勻煉蜜爲丸如小綠豆大每服二十九鈞藤鈎化

普門醫品 胎驚 卷五 五

下不拘時 保嬰撮要

麥蠍散 治小兒胎驚定心安神

雀兒癭中蟲炒焦天竺黃人參天麻各一錢朱砂五分全蠍蟬蛻各四分麝香少許爲末煉蜜爲丸如桐子大每服一九金銀煎湯化下保嬰撮要

又方

蠍一枚薄荷葉包炙爲末入朱砂麝香少許麥門冬煎湯調下一字湯氏寶書

至聖保命丹 治胎驚及內鈞盤腸急慢驚風眼上

視手足抽搐。不省人事

全蠍十四個。去毒。防風二錢。白附子。南星炮。蟬蛻。白礬。去脂炒。天麻。朱砂。水飛。各一錢。麝香五分。金箔四張。為末。米糊為丸。分作四十九丸。每服一丸。白湯化下。有熱者以膽星易南星。保嬰撮要

小兒身熱多驚

釣藤一兩。朴消半兩。甘草炙一錢。為末。每服半錢。溫水下。日三服。聖濟錄

貼額法 定驚除熱

普門醫品 胎驚

養聖 圭

方見本卷發搐門

小兒多驚燥熱。夜啼不安

朱砂三錢。牛黃一分。為末。犀角磨水調服。一字。連

二三服効。普濟方

又方

天竺黃二錢。雄黃。牽牛末各一錢。研勻。麝粉九厘。米大。每服三五丸。薄荷湯下。錢乙方

又方

琥珀。防風。各一錢。朱砂半錢。為末。猪乳調。一字。連

口中 直指方

小兒胎驚口噤不乳

白棘燒末水服一錢。聖惠方

癇證門

論內經云。癇為神不守舍。謂神亂也。千金方云。小兒之癇有三。曰驚癇。風癇。食癇是也。○驚癇謂起于驚怖。大啼大駭而作也。○風癇絲衣蓋過厚。熱則生風。初起時屈指如數物者是也。○食癇因乳

普門醫品 癇證

養聖 圭

食太過。鬱積熱壅。不思乳食。嘔吐發熱。後作癇者是也。古方有五癇。謂發時其聲如牛馬猪羊雞。不同有五也。

薛氏曰。若發熱抽掣仰臥。面色光澤。病在腑為陽。易治。身冷不搐。覆臥面色黯黑。病在臟為陰難治。凡有此證。宜看耳後高骨間。先有青脈紋。抓破出血。可免其患。皆元氣不足之證。

通治 二十五方

五癇丸 治一切癇證

雄黃真珠各二錢半朱砂水飛一錢二分半水銀六分半用鉛一錢溶化入水銀結砂候令為末煉蜜丸麻子大每服二三丸金銀煎湯下保嬰撮要

代赭石散 治全上

代赭石煨醋淬研為末水飛過晒乾再研每服半錢以金銀煎湯合金箔銀箔調連進二服脚脛上有赤斑乃邪氣發出可治無則難治小兒直訣

又方

雄黃朱砂各用水飛等分為末每服一錢豬心

醫門書品

癩瘡

卷五 十七

血入蠶水調下 直指方

又方

鼈甲炙研乳服一錢日二蜜丸服亦可子母秘銀

又方

釣藤甘草炙各二錢水五合煎二合作四五次服一日服盡聖惠方

蠍虎散 治驚癇

生蠍虎一個搗爛入朱砂末麝香末少許同研用薄荷湯調作一服數年者亦効繼服二陳湯若無

蠍虎以初取雄豬心血代之入代赭石散尤妙保嬰撮要

又方

冬蟄蝙蝠一個入成塊朱砂三錢在腹內以新瓦合煨存性冷為末空心分四服兒小分五服白湯下醫學集成

又方

虎睛細研水調灌之經驗方

又方

醫門書品

癩瘡

卷五 十八

荊芥穗二兩白礬半生半枯一兩為末糊丸黍米大朱砂為衣每薑湯下二十九日二服醫學集成

又方

青黛量見大小水調與服生生編

又方

刺白犬血灌之并塗心下顙上及背脇萬氏方

錢氏蛇黃丸

治驚癇因震駭恐怖叫號恍惚是也

蛇黃真者三個火煨醋淬釐金七分俱為末麝香五分另研入再研勻飯丸梧子大每服一二丸煎

金銀磨刀水化下

虎睛丸 治驚癇邪氣入心

虎睛細研。遠志薑汁浸。犀角鎔屑。大黃濕紙包煨。石菖蒲。麥門冬去心。各等分。蜣螂去翅足三枚。炒

爲末。米糊丸。桐子大。每服一二丸。竹葉煎湯。或金

銀。或薄荷煎湯下。俱可。保嬰撮要

驚癇迷悶

牛黃豆許研。和蜜水灌之。廣利方

驚癇發熱

驚門醫品

癇證

卷一 十九

用鋼鐵飛煉成粉。研細。水調少許。服之。聖惠方

驚癇腹滿大便青白

栢子仁末。溫水調服一錢。聖惠方

驚癇嚼舌仰目者

犀角濃磨水服之。立効。爲末亦可。廣利方

雌黃丸 治驚癇搐掣惡聲嚼舌

雌黃。黃丹。各五錢。微炒。麝香五分。爲末。用牛乳三

合熬膏。丸。麻子大。每服二三丸。溫酒下

守宮膏 治多年驚癇

守宮一個。剪去四足。連血研爛。入真珠末。麝香末

龍腦末。各一字。研勻。以薄荷湯調服。先須或吐或

下去痰涎。後用此。大有神効。奇効方

小兒風癇

蠍五枚。以大石榴制頭剝空。入蠍於中。以頭蓋之。

紙筋和黃泥封裏。微火炙乾。漸加火煨赤。候冷去

泥。取中焦黑者細研。乳汁調半錢灌之。便定。兒稍

大。以防風湯調服。篋中方

又方

驚門醫品

癇證

卷一 二十

棘科上雀糞。取其蟲。研汁灌之。聖惠方

妙聖丹 治食癇。因驚停食吐乳。大便酸臭

代赭石三錢。火煨醋淬。巴豆三個去心油。雄黃飛

蠍稍。朱砂飛。各一錢。輕粉。麝香。各一匙。杏仁去皮

尖二錢。微炒。爲末。棗肉丸。桐子大。每服一二丸。木

賊草煎湯下。保嬰撮要

小兒胎癇

琥珀。朱砂。各少許。全蠍一枚。爲末。麥門冬湯調服

一字。直指方

小兒發癰。瘡不能言

南星濕紙包煨爲末。猪膽汁調服二字。全切心鑒

蜜陀僧散 治心癰不語及諸驚失音

蜜陀僧爲末。每服一匙。米醋湯調下。大人服一錢

熱酒下 保嬰撮要

普門醫品

癰腫

卷五十一

普門醫品卷之四十二

東武王化貞元起父編輯

門人陳 斌憲卿父較閱

發熱門

論小兒之熱。有心肝脾肺腎五臟之不同。虛實溫壯四者之各異。心熱者。額上先赤。心煩。掌中熱。而噦。或吐熱飲水。巳午時甚。肝熱者。左額先赤。便難轉筋。尋衣捻物。多怒多驚。寅卯時甚。脾熱者。鼻上

普門醫品

發熱

卷五十一

先赤。怠惰嗜卧。身熱飲水。過夜益甚。肺熱者。右額先赤。手搯眉目。喘欬寒熱飲水。日西時甚。腎熱者。頰下先赤。兩足極熱。骨蒸。蘇蘇不能起于床。夜間益甚。若面赤氣粗。口燥唇腫。作渴飲冷。大小便難。或掀衣露體。煩啼暴吐。伸體而臥。睡不露睛。手足指熱。此謂實熱。宜用表下。若面色青白。恍惚神緩。口中氣冷。噓氣緩弱。喜熱惡寒。泄瀉多尿。或乍涼乍溫。屈體而卧。睡時露出。虛汗。手足指冷。此爲虛熱。宜用調補。壯熱者。肢體大熱。熱不已。則發驚癰。溫

熱者肢體微熱。熱不已則發驚搐。陰虛則內熱。陽盛則外熱。以手輕捫之則熱。重按之不熱。此皮毛血脉之熱。熱在表也。重按之筋骨之分則熱。輕手則不熱。此筋骨之熱。熱在裏也。不輕不重按之而熱。此肌肉之熱。熱在表裏之間也。小兒變蒸亦令發熱。其候體熱虛驚耳冷微汗唇生白泡三日可愈。重者五日愈。此小兒所必不免者。雖勿藥可也。其餘五臟之熱各求其屬而治之。

普用醫品

發熱

卷三 二

無變證若乳下嬰兒當兼治其母仍參諸熱證治之。或因別證而作者當從其重者而論。

通治 十六方

瀉青丸 治肝熱發搐眼赤睛疼

抑肝散 治肝經虛熱發熱咬牙或寒熱驚悸嘔吐

痰涎睡臥不安

導赤散 治小腸實熱小便秘赤

以上三方俱見四十一卷發搐門

瀉心湯 治心熱

黃連一兩微炒爲末溫水調二三分量見大小與服錢氏方

生犀散 治心經虛熱

地骨皮赤芍藥柴胡乾葛各一兩甘草五錢犀角結二錢爲末每服錢半水二酒鍾服量兒大小爲加減錢乙方

瀉黃散 治脾熱吐舌

藿香葉甘草各七錢五分山梔仁炒一兩石膏煨五錢防風二兩右用蜜酒拌微炒爲末每服錢半

普用醫品

發熱

卷三 三

煎法全上 錢乙方

異功散 治胃經虛熱作渴飲湯睡露睛手足並冷

人參白朮炒白茯苓甘草陳皮各一錢薑一片棗二枚水一鍾煎半鍾服

二枚水一鍾煎半鍾服

瀉白散 治肺經蘊熱發熱喘嗽

地骨皮桑白皮炒各一兩甘草一錢爲末每服二錢人粳米百粒水半鍾煎三分服錢氏方

四順散 治實熱氣脉壯實臟腑熱結大便秘澀

當歸川芎大黃甘草各等分每服一錢水半鍾煎

三分食前服

小兒蓄熱在下身熱狂躁昏迷不食

梔子仁七枚豆豉五錢水一盞煎七分服之或吐或不吐立効集効方

補中益氣湯 治脾肺虛弱體疲少食或發熱煩渴潮熱自汗等證

人參黃耆蜜炙各八分白朮土炒甘草炙陳皮各五分升麻柴胡各二分當歸酒洗六分薑二片棗一枚水一鍾煎四分午前服東垣方

普門醫品

發熱

卷四

六味地黃丸

治肝腎血虛燥熱作渴小便淋瀝痰

氣上壅四肢發搐眼目瞶動或肢體羸瘦五遲五軟目睛多白一切諸虛皆宜服此以滋化源其功甚大

用熟地黃八錢梓膏山茱萸肉乾山藥各四錢澤瀉牡丹皮白茯苓各三錢為細末入地黃膏量加米糊為丸綠豆大每空心溫水下十九

小兒身熱

苦參煎湯浴之外臺秘要

地骨皮散

治潮熱壯熱

地骨皮柴胡知母人參甘草赤茯苓半夏製各等

分每用一錢加薑一片水半鍾煎三分服因驚熱加蟬蛻天麻黃芩減半保嬰撮要

柴苓散 治壯熱來去不已

柴胡麥門冬去心人參赤茯苓甘草各半兩黃芩酒炒一兩為末每服二錢竹葉三片小麥十二粒水一鍾煎五分服保嬰撮要

嬰兒十五歲以下遍身如火日漸黃瘦益汗欬嗽煩渴骨熱

普門醫品

發熱

卷五

柴胡二兩丹砂水飛一兩為末豬膽汁拌和盛于飯上蒸熟丸綠豆大每服十九粒桃仁烏梅湯下日三服聖濟總錄

欬嗽門

論錢仲陽云欬者肺感微寒八九月間肺氣正旺若面赤身熱其病為實當用葶藶丸下之久嗽不宜下若在冬月乃傷風嗽麻黃湯汗之面赤飲水欬嗽濃痰咽喉不利以甘桔湯清之先欬後喘面

腫身熱。以湯白散平之。嗽而唾痰涎乳者。以白餅子下之。

通治 十三方

惺惺散 治外感風寒。鼻塞痰嗽發熱。

桔梗。細辛。人參去蘆。白朮炒。甘草。瓜蒌根。白茯苓。等分爲末。每服二錢。入薄荷五葉。薑一片。水半鍾煎三分服。撮要方

葶藶丸 治傷風欬嗽。面赤痰盛。身熱喘促。

葶藶子隔紙畧炒。防已。黑牽牛畧炒。各一兩。杏仁。

普門醫品

欬嗽

卷三

去皮尖及雙仁一兩。麪炒棉膏。入藥末拌勻。蒸棗。

取肉搗和。丸麻子大。每服五七丸。淡薑湯下。量兒。

加減。嬰撮要

參蘇飲 治嬰兒感冒風寒。發熱頭疼。欬嗽痰涎。

人參去蘆。紫蘇葉。葛根。前胡。半夏。麪白茯苓。陳皮。

枳殼。麪炒。桔梗各五分。甘草炙三分。薑二片。棗一。

枚。水一鍾煎五分溫服。

紅綿散 治傷風欬嗽。鼻塞。或流清涕。

全蠍五個。麻黃去節。僵蠶。白芷。川芎。桔梗。天麻。各。

二錢。甘草。蘇木各一錢。爲末。每服一錢。加紅綿。即。

麻黃湯 冬月傷風欬嗽。頭疼發熱。無汗惡風。

甘草炙五錢。麻黃去節一兩半。桂枝一兩。杏仁去。

皮三十五個炒。每服三錢。水一鍾煎半鍾熱服。保

嬰撮要

又方

生薑四兩煎溶之。千金方

小兒風欬久不止

普門醫品

欬嗽

卷三 七

蜂房二兩洗淨燒研。每服一字。米飲下。勝金方

貼顙法 治小兒傷風欬嗽。身熱多驚。

蔥頭三五莖細切搗爛攤紙上。以兩掌護熱貼顙。

門良久其邪自解。諸病自退。乃去其蔥。以段帛寸。

餘塗糊仍貼顙門護之。春夏常用絹帛。秋冬用絨。

絲護貼永無傷風之患。薛立齋方

小兒痰喘欬久不瘥

瓜蒌一枚去子爲末。以寒食麪和作餅子。炙黃。

研末。每服一錢溫水調下。日三服。宣明方

白餅子 治小兒欬嗽吐涎及乳

滑石飛。半夏製。南星製。各一錢。輕粉五分。巴豆二
十四粒。去皮。水一升。煮水盡為度。先將巴豆研勻。
後入眾藥。以糯米糊丸。綠豆大。捏作餅子。三歲以
上五枚。以下三枚。蔥白煎湯。臨臥服。嬰童百問

小兒熱嗽

甘草二兩。猪膽汁浸一宿。慢火炙乾。研末。蜜丸綠
豆大。食後薄荷湯化下。十五丸。聖惠方

瀉白散 治小兒肺熱。欬嗽漸喘。面浮身熱

普門醫品

欬嗽

卷四十五 八

方見本卷發熱門

井桔湯 治心臟欬嗽。喉中如梗。甚則咽喉腫痺

生甘草。桔梗。各一錢。水半鍾。煎三分。食後服。攝要

喘急門

論喘急之證。有因暴驚觸心者。有因寒邪壅盛者。
有因風邪外客者。有因鹹酸痰滯者。有因膏梁積
熱。薰蒸清道者。喘與氣急。有輕重之別。喘則欲言
不能。隘于胸臆。氣急但息短。心迷悶耳。

凡喘嗽之證。若小便利。則必生脹。脹則必生喘。
要分標本先後。先喘而後脹者。主于肺。先脹而後
喘者。主于脾。主于肺者。清金降火為主。行水次之。
主于脾者。健脾行水為主。清金次之。

通治八方

天麻定喘飲 治喘嗽

天麻。防風。羌活。甘草炒。人參。桔梗。白朮炒。川芎。半

夏。麴。各等分。每服二錢。水半鍾。煎三分。服。攝要

人參胡桃湯 治小兒痰喘不能乳食

普門醫品

喘急

卷四十五 九

人參寸許。胡桃仁連皮一枚。煎湯。一蜆殼許。灌之

又方

巴豆一粒。杵爛。綿裹塞鼻。男左女右。痰下喘止

半夏丸 治欬嗽喘滿。痰涎壅塞。嘔吐惡心

枯白礬一兩半。半夏湯泡七次。薑汁拌晒三兩。為

末。生薑自然汁九赤豆大。每服十丸。薑湯下

梅花飲 治五臟積熱。氣逆喘急。目赤欬嗽。喉中有

痰。或因驚發喘

硼砂。馬牙消。片腦。人參去蘆。各五錢。甘草炙二錢

半。芒消一錢半。辰砂水飛一錢。麝香五分。各另研爲末。磁罐收貯。每服半匙。麥門冬湯調服。氣急喘嗽。桑白皮湯下。保嬰撮要

雄朱化痰定喘丸 治因驚發喘。虛煩沉困

雄黃。朱砂各一錢。水飛。蛇蛻去土。全蠍去毒。各五分。白僵蠶炒。南星製。白附子炮。各二錢。輕粉五分。爲末。粥九麻子大。每服五七丸。茶清下。保嬰撮要

三拗湯 治感冒風邪。鼻塞聲重。語音不出。胸滿氣急。欬嗽多痰

普門醫品

喘急

卷四十一

麻黃不去節。杏仁不去皮尖。甘草生用。各等分。每服二三錢。薑一片。水半鍾。煎三分服。鹽傷助喘

柏樹皮去粗皮。搗汁飲之。龔氏醫鑑

夜啼門

論夜啼之因有二。曰脾寒。曰心熱也。夜屬陰。陰盛則脾臟之寒愈盛。脾爲至陰。喜溫而惡寒。寒則腹中作痛。故曲腰而啼。其候面青白。手腹俱冷。不思

乳食是也。亦曰胎寒。用釣藤散。若見燈愈啼者。心熱也。心屬火。見燈則煩熱內生。兩陽相搏。故仰身而啼。其候面赤。手腹俱煖。口中氣熱是也。用導赤散。若面色白。黑睛少。屬腎氣不足。至夜陰虛而啼也。用六味地黃丸。

通治十八方

燈花散 治小兒夜啼

燈花二三顆。研細。用燈草煎湯。調塗口中。乳汁送下。日三服。一法用燈花研塗乳上。令兒吮之。無燈

普門醫品

夜啼

卷四十一

花用燈草燒灰。入辰砂少許。亦妙。或用燈花七枚。研砂一字。辰砂少許。蜜調塗唇上。立安。保嬰撮要

又方 蟬蛻四十九個。去前截及足翅。只用後截爲末。分四服。釣藤鈎湯調灌之。全幼心鑑

又方

用本兒初穿毛衫兒。放瓶內。自不哭。生生編

又方

雞窠草安席下。或用白雄雞翎安席下。並無令

又方

乳香一錢。燈花七枚。爲末。每半字乳汁下。聖惠方

又方

五倍子末。滓調填于臍內。楊啓簡便方

又方

本家厨下燒殘火柴頭一個。削平。焦處向上。用朱

砂書云。撥火杖。撥火杖。天上五雷公差來作神

將。捉住夜啼鬼。打殺不要放。急急如律令。書畢勿

普門醫品

夜啼

卷五

十一

令人知。安立床前脚下。男左女右。岫巖神書

又方

取井邊草。着母薦下。勿令人知。即止。徐氏醫案

又方

以饒帶懸戶上。即止。子母秘錄

碧雲散

治夜啼。渾身壯熱

栢葉二分。南星製。僵蠶炒。金。雄黃飛。各

一錢。爲末。每服一字。薄荷湯入蜜調服。保嬰撮要

又方

牛黃一豆許。乳汁化服。仍書田字於臍下。聖惠方

又方

虎睛一隻。爲末。以竹瀝調少許。與服。燒和仲方

又方

馬蹄燒末。敷乳上。吮之。聖濟總錄

夜啼腹痛面青

蒜一枚。煨研。日乾。乳香五分。搗和丸。如芥子大。每

服七丸。乳汁下。危氏得効方

六神散

治腹痛面青。口中氣冷。四肢俱冷。曲腹而

普門醫品

夜啼

卷五

十一

啼。泄瀉不乳

人參去蘆。山藥炒。白朮炒。各五錢。甘草炒二錢。白

茯苓。扁豆炒。各一兩。爲末。每服二錢。薑二片。棗一

枚。水半鍾。煎三分。溫服。保嬰撮要

釣藤散

治見論

方見四十卷驚風門

導赤散

治見論

方見四十一卷癰瘡門

六味地黃丸

治見論

方見本卷發熱門

悲哭門

論悲者肺之聲。淚者肝之液也。多因乳母怒火遺熱于肝。肝火炎肺。傷肺金。金木相擊。故悲哭有聲。宜用六君柴胡山梔以補脾清肺。用六味丸以壯水生木。有因過服祛風燥血之藥而致者。有因吐瀉內亡津液而致者。及稟父腎陰不足不能生肝者。治各審之。若小兒忽然大叫作聲者不治。用

普門醫品

六味丸亦有生者

通治 七方

涼膈散 治小兒內熱煩躁啼哭二便秘赤

大黃煨。桔梗。連翹。梔子炒。黃芩。酒炒。各半錢。薄荷四分。甘草三分。水半鍾。煎三分。入芒消五分再煎一滾。溫服

小兒啼而不哭煩也。哭而不啼躁也。

蟬蛻十四枚去翅足為末。入飛過朱砂末二字。蜜調與吮之。活切口義

小兒煩躁狂啼夜臥多驚係心肺積熱

鉛霜。牛黃。各半分。鐵粉一分。研勻。每服一字。竹瀝調下。聖濟方

小兒驚啼

雞矢白燒灰。米飲服二字。千金方

龍齒散 治小兒拘哭肚疼驚熱

龍齒。蟬蛻。鈎藤。鈎。羌活。白茯苓。等分為末。每服一錢。酒半鍾煎三分服。保嬰撮要

六味丸 治見論

普門醫品

方見本卷發熱門

六君子湯 治見論

人參。白朮。土炒。白茯苓。各六分。甘草四分。半夏製。陳皮。各五分。水一鍾。薑二片。棗二枚。煎四分。食遠

東武王化貞元起父編輯

門人陳斌憲卿父較閱

傷寒門

論錢仲陽云小兒傷寒者謂感冒寒邪壯熱頭痛鼻塞流涕畏寒拘急是也有夾驚者因驚而又感冒有夾食者先感冒而又停滯飲食或先停滯飲食而又感冒以致發熱氣粗噎氣腹脹頭疼身熱

普門醫品

傷寒

卷三

一

大便酸臭先用解散而後消導凡小兒傷寒夾食者多其傳變諸證及治療之法皆與大人無異但小兒臟腑脆弱用藥分劑或減半或三分之二中病即止不可過劑

小兒感冒口不能言致病之由脉不可診惟以虎口三關脉紋紅色為驗稍長則以一指按其三關以左手緊盛為驗其喘急增寒氣熱呵欠煩悶項急者是也假人則為惡寒藏身則為惡風出瘡疹之候與傷寒亦相似但耳後冷為異

通治 十三方

葛根解肌湯 治發熱惡寒頭疼項強

葛根四分桂皮一分黃芩酒炒甘草白芍藥酒炒

各三分麻黃二分薑二片棗一枚水半鍾煎三分

服

升麻葛根湯 治小兒感冒發熱增寒壯熱肢體疼痛

鼻乾不得眠兼治痘疹欲發皆可服

甘草白芍藥酒炒升麻乾葛各一錢水一鍾煎半

鍾服

普門醫品

傷寒

卷三

二

羌活湯 治傷寒及非時感冒

羌活七分川芎各半炒黃芩酒洗生地黃白芷各

五分防風甘草酒辛各四分薑二片葱白一根水

一鍾煎七分溫服

中和湯 治全前

羌活八分白朮炒川芎白芷黃耆蜜炙各五分黃

芩酒炒生地黃防風細辛各四分甘草二分薑二

片葱白一根水一鍾煎七分溫服

小兒頭熱鼻塞

天南星爲末水調貼顙門炙手熨之危氏得効方

小兒感冒身熱

白芷煮湯浴之取汗避風子母秘錄

又方

苦參煎湯洗之外臺秘要

又方

蘿蔔子生研一錢溫蔥酒服之微汗効易簡方

又方

淡竹瀝葛汁各半鍾細細與服千金方

普門醫品

傷寒

卷三 三

惺惺散 治感傷風寒發熱鼻塞

參蘇飲 治感冒風寒發熱欬嗽

二方俱見四十二卷欬嗽門

小兒發熱不拘風寒飲食時行痘疹並宜用之

蔥涎入香油內手拈摩擦小兒五心頭面項

背諸處最能解毒涼肌指方

小兒感冒風寒煩熱有痰精神昏瞶

荆芥穗三錢焙麝香片腦各一字爲末每茶服半

錢普濟方

小兒鼻乾無涕腦熱

黃米粉生礬末各一兩每以一錢水調顙上至日

再易之普濟方

驚觸門

〔論〕小兒神氣未定觸物易驚或乍見非常之物或

驟聽奇異之聲及顛仆失墜皆能致驚驚入心則

面赤夜啼入肝則面青眼窵入脾則面黃嘔吐虛

汗嗜臥入肺則面白喘急入腎則面黑齒搖牙

普門醫品

驚風

卷三 四

此爲外來之驚久而不治則熱鬱于內而驚風之

證作矣

小兒受驚多瀉瀉多青色或發搐蓋青乃肝之色

搐乃肝之證也法當平肝補脾慎勿用峻攻之藥

脾氣益虛肝邪彌甚凡遇驚證卽宜用四君六君

異功等方加白附子定風柴胡平肝以祛其漸則

自無風搐之患矣

〔通治〕八方

防風導赤散 治初驚

生地黃木通去節防風甘草炙各等分每服三錢

竹葉三片水煎服發熱加黃芩赤芍藥羌活

加味異功散 治驚觸安心定魄神妙

人參白朮炒白茯苓陳皮甘草炙釣藤鈎各八分

山梔炒四分木香分半薑二片棗一枚水一鍾煎

半鍾服

神妙奪命丹 治諸驚卒中客忤風癇

七月內取青蒿節內蟲搗爛入朱砂麝香末爲丸

麻子大每服三五丸薑湯下

驚門醫品

驚風

卷五

清心丸 治驚熱煩燥

人參茯神防風朱砂水飛梨胡各三錢金箔十片

爲末煉蜜丸桐子大每服一二丸竹瀝調下

抱龍丸 安神鎮驚亦治痘疹壯熱及瘟疫發熱氣

粗痰嗽壅塞

牛膽南星一兩天竺黃雄黃辰砂各水飛各二錢

麝香少許爲末煮甘草汁丸櫻桃大陰乾每服一

丸薄荷湯化下氣喘有痰加枯礬

太乙丹 常服安神鎮驚止夜啼

桔梗炒一兩藿香葉白扁豆炒各半兩白芷

各二錢五分爲末蜜丸芡實大辰砂爲衣每服一

丸薄荷湯磨下糞青者棗湯下夜啼燈心釣藤湯

下加炒白朮白茯苓酒炒白芍藥尤妙

四君子湯 治見論

人參白朮土炒白茯苓各八分甘草炙六分水一

鍾煎半鍾服

六君子湯 治見論

方見四十二卷悲哭門

驚門醫品

驚風

卷六

傷食門

論東垣云傷食則惡食小兒飲食傷脾脾氣不能

健運故乳食不化噎腐吞酸胸膈脹滿或吐或瀉

腹痛按之益痛者所停滯之物尚未消也用保和

丸腹痛按之不痛者乳食已消也用異功散脾氣

傷而未復不思飲食者用六君子湯所傷生冷之

物及喜熱者並加木香乾薑瀉不止者用補中益

氣湯

通治 八方

平胃散 治傷食飽脹不消

蒼朮炒厚朴姜製陳皮去白甘草炙各六分薑一片水半鍾煎三分服

保和丸 治飲食停滯胸膈痞滿噯氣吞酸或吐瀉腹痛

神麴炒山楂肉半夏製白茯苓各一兩陳皮去白

連翹蘿蔔子各五錢為末粥丸綠豆大每服三四

十九白湯送下 東垣方

審門藥品

傷食

卷三 七

香橘餅 治傷冷食作瀉

木香青皮醋炒各一錢陳皮去白二錢半厚朴薑

汁炒神麴炒麥芽炒各五錢為末蜜丸作餅每用

一枚米飲調下 保嬰撮要

小兒傷乳腹脹煩悶喜睡

生芡麥麴水調服一錢 保幼大全

白餅子 治傷食嘔吐腹疼噯氣先用此藥一服推

下後用別藥調理

滑石半夏膽南星各一錢輕粉五分巴豆二十四

粒去皮膜用水一升煮乾研爛先將三味為末入

巴豆輕粉研勻飯丸綠豆大每服二三丸兒大量

加紫蘇湯下

異功散 治見論

人參白朮炒白茯苓陳皮去白甘草炙各八分水

一鍾煎五分溫服

六君子湯 治見論

即異功散加製半夏八分

補中益氣湯 治見論

審門藥品

傷食

卷三 八

方見四十二卷發熱門

嘔吐門

論嘔吐皆主脾胃古人謂脾虛則嘔胃虛則吐是

也嘔者有聲無物吐者有物無聲也蓋乳哺過飽

則胃不能受而溢出食乳多睡則脾不能運而作

噯脾胃漸傷疾病纏綿而慢驚之患由此起矣若

手足溫而喜飲熱湯或睡而露睛者皆胃氣虛弱

也用異功散若手足指熱喜飲冷或睡不露睛屬

胃經實熱。用瀉黃散。乳母飲食停滯。亦能致兒作嘔。不可不知。

通治 十四方

初生吐乳

蓬莪茂少許。鹽綠豆大乳一合。煎三五沸。去粗入牛黃一字。服之甚効。作切大全

小兒虛寒吐乳面青黃色

白豆蔻仁。縮砂仁。炙甘草各二錢。為末。時搽兒口中。危氏得効方。

普濟醫品

嘔吐

卷三 九

瀉黃散 治吐乳色黃胃經有熱

方見四十二卷發熱門

消乳丸 治傷乳不化嘔吐

香附子炒。縮砂仁。陳皮去白。甘草炙。神麴炒。麥蘖炒。等分為末。米糊丸黍米大。每服二十九丸。薑湯下。

小兒吐乳及欬嗽久不愈

石燕子火煨醋淬七次。為末。蜜調少許。塗唇上。日三五次。衛生寶鑑

小兒百日內吐乳或糞青色

年少婦人乳汁一盞。入丁香十枚。陳皮去白一錢。砂器中煎二十沸。以綿毯泡乳內吮服。陳文仲方

幼兒吮乳不止服此立効

輕粉一錢。鹽豉七粒。去皮研勻。九麻子大。每服三九。蜜香湯下 嬰童百問

又方

丁香。生半夏各一錢。薑汁浸一夜。曬乾為末。薑汁打糊為丸。黍米大。量兒大小用薑湯下。全幼心鑒

又方

普濟醫品

嘔吐

卷三 十

用舊臥竹簞燒灰少許。同人乳二合。搗半豆許。煎沸。入牛黃粟許大。與服。外臺秘要

茯苓半夏湯 治嘔噦

半夏製五錢。白茯苓一兩。橘紅三錢。每服三錢。薑一片。水半鍾。煎三分服。保嬰撮要

異功散 治小兒胃虛乳食不消嘔吐

方見本卷傷食門外加木香二分

小兒吐逆不進乳食手足心熱

陳皮紅麴三錢半。白朮麴炒一錢半。甘草炙一錢。

爲末每服五分米湯煎棗子調下 經驗方

保和丸 治傷食嘔吐及瀉

方見本卷傷食門外加土炒白朮一兩

口內流涎脾熱也胸膈有痰

桑根白皮搗自然汁塗之甚効乾者煎水 聖惠方

泄瀉門

論小兒泄瀉有冷有熱有食有驚有霍亂冷者瀉利清白手冷面青水穀不化用益黃散加減治之

青門醫品

泄瀉

卷三十一

熱者口乾煩躁小便赤少大便黃赤有沫當用四苓散右腿赤喜飲冷胃經實熱也用瀉黃散喜吐胃經虛熱也用七味白朮散食瀉惡食暖腹吞酸膈脹滿宜保和丸驚瀉因驚而瀉色青發搐精神不定宜朱君散霍亂瀉多得之暑月暴瀉如注或吐壯熱不食宜二順散凡泄瀉腹痛按之哭者食積痛也宜白餅子下之按之不痛者脾胃虛也宜異功散補之月內嬰孺不勝藥餌宜調治其母用釀乳法

通治 二十方

小兒一切泄瀉

紅棗十二枚去核將官粉入內以陰陽瓦焙乾去棗研粉每服三分米湯下 孫真人集効方

又方

巴豆十個針串燈上燒過黃蠟一豆大燈上燒滴水同杵丸黍米大每五丸燈心湯下并治吐得効方

又方

梳泥如豆許溫水服之 千金方

又方

棗肉搗爛黃丹白礬等分梗米飯和丸彈子大每用一九鉄線穿于燈上燒過爲末米飲下 橘玄方

四苓散 治暴瀉如水煩燥發渴

白朮土炒白茯苓澤瀉等分每服二錢水半鍾煎三分服

三神丸 治脾虛作瀉

補骨脂四兩肉豆蔻二兩生用爲末用紅棗四十

九枚生薑四兩水一鍾煮乾取棗肉和丸桐子大
每服三三十九白滾湯下

異功散 治全上

方見本卷傷食門

益黃散 治脾虛吐瀉不食米穀不化困倦少力滑

腸夜起利下清白

陳皮一兩丁香二錢訶子炮去核青皮醋炒甘草

炙各半兩爲末每服一錢水半鍾煎三分溫服錢

氏方

醫門醫品

泄瀉

卷三十三

小兒久瀉脾虛米穀不化不進飲食

白朮炒半夏麴各二錢半丁香半錢爲末薑汁調

麴打糊爲丸黍粟大量兒大小米飲下全切心鑒

銀白散 治胃虛作瀉及吐

糯米炒二兩半扁豆蒸三兩白朮土炒一兩丁香

藿香各二錢甘草炙三錢爲末每用二錢米飲調

下係嬰操要

七味白朮散 治胃中虛熱吐瀉作渴

人參去蘆二分白茯苓白朮土炒乾葛藿香葉各

四分木香二錢甘草一分薑一片棗一枚水半鍾

煎三分人木香末分半調服瀉者倍乾葛湯甚去

木香腹疼加白芍藥四分東垣方

瀉黃散 治胃熱作瀉面赤飲冷

方見二十四卷發熱門

胃苓湯 治腸胃受濕傷食嘔吐泄瀉

白朮土炒白茯苓猪苓澤瀉厚朴製陳皮去白甘

草炒各二錢官桂五分爲末每服二錢薑水燂心

煎湯調下若停食腹脹作痛用此分利更服六君

醫門醫品

泄瀉

卷三十三

子湯 方見本卷傷食門

二順散 治中暑霍亂吐瀉煩悶燥渴小便赤澀便

血肚痛

猪苓澤瀉白朮土炒白茯苓甘草炙杏仁去皮尖

及雙仁炒各五錢桂皮乾薑煨各三錢爲末每一

錢或半錢不拘時白水調下

朱君散 治小兒受驚吐瀉黃青

人參去蘆白朮土炒白茯苓甘草炙各二錢釣藤

鈎一錢半辰砂五分麝香二分爲末每服一錢燈

心煎湯調下

玉露散 治吐瀉黃色

寒水石石膏各半兩生甘草二錢爲末每服半錢

白滾湯調下

香橘餅 治傷食作瀉

白餅子 治全上

保和丸 治全上

三方俱見本卷傷食門

醱乳法 治見論

醫門醫品

泄瀉

卷三十五

使乳母飲藥急擠去乳待藥行乳生卽以哺兒

痢疾門

論錢仲陽云瀉痢黃赤黑皆熱也瀉痢青白米穀

不化皆冷也東垣云白者濕熱傷于氣分赤者濕

熱傷于血分赤白相雜氣血俱傷也手足指熱飲

冷者爲實熱用香連丸手足指冷飲熱者爲虛寒

用異功散送香連丸久痢不愈用補中益氣湯倍

升柴瀉痢兼嘔或腹中作痛者脾胃虛寒也用異

功散加炮薑木香仍須兼治其母

通治三十一方

香連丸 治一切痢疾不拘赤白神効

黃連十兩用吳茱萸五兩水拌濕入磁器頓滾湯

中半日炒焦黑去茱萸入木香二兩同黃連爲末

糊丸如綠豆大每服七八丸白湯化下 保嬰撮要

又方

宣黃連濃煎和蜜日服五六次 子母秘錄

又方

醫門醫品

痢疾

卷三十六

麻子仁三合炒香研細每用一錢漿水服 經驗方

又方

蜂房燒末米飲服五分 子母秘錄

又方

半牛角鯢燒灰水服二錢 千金方

又方

鹿角灰髮灰等分水服三錢日二 千金方

又方

巴豆煨熟去油一錢百卓霜二錢研末飛羅麤煮

糊丸黍米大量兒大小用之赤用甘草湯白用薑湯赤白用米湯下全切心璧

地榆飲 治下痢腹痛赤白頻併

地榆五分甘草赤芍藥枳殼麩炒各三分水半鍾薑一片煎三分服保嬰撮要

小兒洞痢

栝葉杵汁代茶飲之經方

下痢口渴

冬瓜絞汁飲之千金方

香門醫品

小兒秋痢

以粳米煮粥熟時入乾柿末音末再煮三兩沸食之

乳母並食食療本草

小兒赤痢

搗小藍汁一盞分四服子母秘錄

訶子散 小兒下痢純血腹痛

訶子五錢燒去核梔子仁炒一錢五分爲末二歲以下兒用五分空心米飲調下全嬰方

胃風湯 治風冷客于腸胃乳食不化泄痢腹痛或

下如豆汁或瘀血日夜無度

白芍藥酒炒白木土炒肉桂人參當歸酒洗川芎

白茯苓爲末每服二錢入粟米水煎空心熱服

小兒久痢

桂剉太粗皮以薑汁炙紫黃連用萊萸炒過等分爲末每用二錢以紫蘇木瓜煎湯調服全切心璧

又方

沒食子二個炒黃研末作餛飩食之官氣方

補中益氣湯 治小兒久痢不止

香門醫品

方見四十二卷發熱門

石蓮散 治小兒噤口痢嘔逆不食

石蓮肉炒去心爲末每服一錢陳倉米飲調下或

加薑汁一匙

又方

人參石蓮肉去心胡黃連各一錢煎濃常以一匙

着口中一下咽卽思食矣醫鑒

又方

砂仁炒五分沙糖三錢五分細茶二錢五分生薑

三片水一鍾煎八分露一宿次早面北溫服仍用
木鼈子仁麝少許共搗置臍中即思食徐元濟傳

異功散 治見論

方見本卷傷食門

瘧疾門

論經云夏傷于暑秋必痃瘕小兒之瘧皆因乳母
抱時解脫不避風寒又因觸冒暑濕致令邪氣客
于皮膚痰積留于臟腑陰陽偏勝邪正相攻而作

晉門醫品

瘧疾

卷三十九

往來寒熱也陽盛則熱陰盛則寒先寒而後熱者
陽不足也先熱而後寒者陰不足也寒熱間發者
陰陽交爭也有一日一發有二日一發三日一發
有間一日連二日發有日與夜各發有上半日發
下半日發及發于夜者有有汗有無汗大抵小兒
瘧多自飲食上得之須先與消導然後隨其得病
之由而調理之始為良法

通治 十方

常山飲 治一切瘧疾

常山製人參草果煨知母炒甘草炙厚朴薑汁浸
一宿炒黃色只母半夏麴白茯苓等分為末每服
二錢薑一片棗一枚水半鍾煎三分空心服忌雞
魚牛羊肉張氏方

又方

以蛇蛻寒兩耳即止徐氏醫抄

鬼哭飲 治瘧久不止

常山大腹皮製白茯苓鼈甲酥炙甘草炙各六錢
桃柳枝各五寸每用三錢水半鍾煎三分服

晉門醫品

瘧疾

卷三十九

四獸飲 治陰陽相勝痰飲結聚為瘧

半夏製白茯苓人參白朮炒草果炮橘紅各三錢
甘草炙錢半烏梅三個生薑三大片棗五枚濕紙
裹煨香熟焙乾入藥共為末每服二錢水半鍾煎
三分服保嬰堂方

小兒瘧瘧壯熱不寒

黃丹二錢蜜水和服寒者酒服思過方

清脾飲子 治瘧瘧但熱不寒或熱多寒少膈滿不

食口苦舌乾

青皮醋炒厚朴薑製白芍煨熟身壯步健白茯苓
半夏湯泡七次黃芩酒炒并草炙等分每用三錢
薑二片水一合煎半合服

小兒邪瘧

麝香研墨書去邪辟魔四字于額上經驗方

百日兒瘧

仙人歌曰瘧是邪風寒熱攻直須術治免成空常
山刻作人形狀釘在孩兒生氣宮金命人釘已上
木生命釘亥上火命人釘寅上水土命人釘申上

醫門醫品

瘧疾

卷五 三

水鑒方

又方

雞脰胫黃皮燒存性爲末每用一錢乳調服男用
雌女用雄千金方

又方

鹿角生研爲末先發時乳調一字服之千金方

醫門醫品卷之四十四

東武王化貞元起父編輯

門人陳斌憲卿父較閱

諸瘧門

論錢仲陽云小兒諸瘧皆因病後脾胃虧損或用
藥過傷不能傳化乳食內亡津液虛火妄動或乳
母六淫七情飲食起居失宜致兒爲患五藏之瘧
不同○心瘧者咬牙舒舌舌上生瘡愛飲凉水唇

醫門醫品

諸瘧

卷五 一

紅面赤喜臥濕地是也○肝瘧者目多眵淚白膜
遮睛泄瀉清水如苔色者是也○脾瘧者肢體黃
瘦皮膚濫多生瘡疥腹大食土髮稀作穗是也○
肺瘧者口鼻生瘡口腥鼻黑喘嗽不已是也○腎
瘧者兩耳內外生瘡脚如鶴膝頭縫不合齒遲牙
疳遍身瘡疥或不能行是也○凡熱瘧多在外鼻
下臭爛頭上有瘡透耳不結痂是也○冷瘧多在
內目腫腹脹痛色無常或瀉青沫削瘦是也此外
又有○蟲瘧腹中作痛皺眉多啼嘔吐青沫肚脹

青筋唇口紫黑頭搖齒癢○有無辜疳腦後項邊有核如彈丸按之轉動軟而不疼其內有蟲不速針出則內食臟腑肢體癱疽便利膿血壯熱羸瘦頭露骨高相傳兒衣夜露為鴟鳥羽所污能致此證○有下痰疳手足極細項小骨高尻削體癢腹大臍突號哭胸陷○有哺露疳虛熱往來頭骨分開翻食吐蟲煩渴嘔噦○有走馬疳牙齒蝕爛口臭齲黑皆虛火上炎所致○又有疳勞潮熱往來五心煩熱盜汗骨蒸喘嗽枯癢渴渴飲水肚硬如

普門醫品

諸疳門

卷之二

石蓋疳者乾也因脾胃津液乾涸而患摠以調補脾胃為主

通治

四十三方

肥兒丸 治諸疳因兒少乳喫食太早或病久胃虛脾弱生蟲日漸黃瘦肚大青筋不能行立髮豎發熱口臭牙疳

川黃連薑炒神麴炒麥芽炒使君子煨肉豆蔻煨各半兩檳榔二枚木香二錢為末神麴糊為丸麻子大每服三十九米飲下

保嬰撮要

川黃連肥兒丸 治諸疳黃瘦大泄瀉瘦弱及疳塊川黃連炒木香檳榔三錢醋煮義術煨青皮醋炒各一兩使君子去殼香附子製人參白茯苓胡黃連各五錢為末以神麴麥芽麵各一兩打糊為丸綠豆大空心米飲下三四十九如無熱去胡黃連

保嬰撮要

六味肥兒丸 治疳化蟲退熱

黃連炒陳皮去白川棟子去核神麴炒麥芽炒各一兩白蒸黃仁半兩為末糊丸麻子大每服三十

普門醫品

諸疳

卷之三

九空心米飲下 薛立齋云此方治脾疳飲食少思肌肉消瘦肚大頸細髮稀成穗項間結核發熱作渴精神倦怠大便酸臭嗜食泥土或口鼻生瘡肚上青筋齒齲下利洩白神効加乾蟾炙焦一兩蕪荑五錢尤妙

保嬰撮要

四味肥兒丸 治腹脹成疳泄瀉嘔吐目生雲翳口舌生瘡牙齲腐爛發熱瘦怯遍身生瘡小便澄白腹大青筋一切疳證

即上方去陳皮川棟子

噎痺散 治全上

盧會黃連炒各一錢瓜蒂猪牙皂角蝦蟆灰各五分麝香少許爲末吹鼻噎則可療

一切痺疾

自死蟬殼七枚皮薄色黃白者洗極淨日乾納酥蜜于殼中以瓷盞盛之紙糊盞面置炊飯上蒸之出飯時卽坐籠中俟再入飯仍裝上蒸之二次取出研如水淀與吃一日令盡卽効

又方

諸門醫品

諸痺

卷四

川棟肉川芎等分爲末猪膽汁九米飲下

又方

六月取糞坑中蛆淘淨入竹筒中晒之待乾研末每服二錢入麝少許米飲服之

聖濟總錄

諸痺羸瘦

熊膽使君子末等分研勻瓷器蒸溶蒸餅九麻子大每服米飲下二十九

保幼大全

脂連丸

治五疳潮熱腹脹髮焦

胡黃連五靈脂等分爲末豬膽汁爲丸麻子大

每用三十九米飲下

五疳入痢面黃肌瘦好食泥土不思乳食

大乾蟾蜍一枚燒存性皂角去皮茲燒存性麝香

各一錢蛤粉水飛三錢爲末糊丸粟米大每食前

米飲下三四十九日二服

子母秘錄

又方

取好黃土煎黃連汁和之晒乾與食

童子秘訣

又方

白礬末猪膽汁九綠豆大米飲下七九

保幼大全

諸門醫品

諸痺

卷四

又方

輕粉一分炒糖和丸麻子大空心米飲下十九

良

又方

使君子盧會等分爲末米飲服一錢

衛生易簡方

大蕪荑湯治疳病髮黃脫落鼻下斷作瘡能乳喜

食土面黑色大便青褐色或黃色

山梔仁炒柴胡各三分黃蘗

音

炒甘草炙羌活各

二分大蕪荑白朮白茯苓各五分黃連麻黃根

風各一分當歸四分水半鍾煎三分服東垣方

痺病有蟲。憔悴發熱服此克肥

蕪荑仁焙黃連炒各一兩爲末猪胆汁七枚和入
盆內飯上蒸九次入麝香半錢蒸餅爲丸綠豆大
每服十九至二十九米飲下小兒直訣

化蠱丸 治痺痼諸蟲不時啼哭嘔吐清水肚腹脹
痛唇口紫黑肛門濕蠱

蕪荑蘆會青黛飛過曬乾川芎白芷稍胡黃連川
黃連炒蝦蟆灰各等分爲末猪膽汁浸蒸餅爲丸

普門醫品 諸痺 卷四 六

麻子大每服二十九食後或臨臥杏仁煎湯下其
鼻常用熊膽煎湯筆蘸洗之保嬰撮要

下蟲丸 治同前

苦楝根白皮酒浸焙貫衆木香桃仁去皮尖焙蕪
荑焙檳榔各二錢鶴虱炒一錢輕粉五分乾蝦蟆
炙焦三錢使君子五十個取肉麪包煨爲末米糊
丸麻子大每服二十九平旦清肉汁下保嬰撮要

神効換肌丸 治心痺驚痺

白茯苓盧會琥珀川黃連炒赤茯苓釣藤鈎遠志

肉蝦蟆灰各三錢石菖蒲一錢麝少許爲末粟米
汁丸麻子大每服三十九薄荷湯下保嬰撮要

小兒冷痺面黃腹大食即吐
母丁香七枚乳汁拌蒸三次爲末每薑湯服五分
易簡方

黃連丸 治痺勞

黃連猪膽汁浸晒石蓮肉瓜蒌根杏仁去皮尖焙
烏梅四各二錢爲末牛膽汁浸蒸餅爲丸麻子大
煎烏梅薑蜜湯下三十九保嬰撮要

普門醫品 諸痺 卷四 七

龍血煎 治痺勞潮熱五心煩燥盜汗欬嗽

龍血一盞川黃連炒胡黃連各一兩吳茱萸一兩
同入內浸一夜炒乾去茱萸入柴胡川芎蕪荑各
一兩人參半兩使君子仁二十個爲末粟米粉糊
爲丸粟米大每月熱水下二十九日三全切心鑑
蒸雞丸 治小兒疳勞骨蒸潮熱盜汗瘦弱腹急面
黃不生肌肉

黃連二兩柴胡使君子仁焙秦艽知母紫苑各一
兩蕪荑仁鶴虱各五錢爲末用黃雄雞一隻重一

斤者。以大豆子飼五日去毛。剝淨入煎末。縫先以黑豆鋪底。三寸安雞干上。仍用黑豆捲。蒸一日。取肉切碎。並藥和搗入酒糊為丸。如小豆大二歲二十九。量大小加減。米飲下。忌猪肉。機微義

蚬皮丸 治小兒無辜諸疳。一服熱退。又一服止瀉。

用蠟蝦蟆一枚。不鳴不跳者。打死投尿桶中。入大

糞蛆一杓。俟蛆食蝦蟆盡。然後以布囊盛蛆于急

流水中漂一日。取起鋪石板上。日中晒死。新瓦焙

香門醫品

諸疳

卷四 八

乾為末。入麝少許。飯和搗為丸。黍米大。每服二三十九。米飲下。此方活幼之功不可勝紀。聖濟總錄

無辜疳下痢赤白

胡粉熬熟炒令色變。米飲服半錢。子母秘錄

木香丸 治疳痢

川黃連炒三錢。木香厚朴製。夜明沙隔紙炒各二

錢。訶子肉炒一錢。為末。飯糊丸。麻子大。乾艾生薑

煎湯食前下三十九

又方

蝦蟆燒存性研末。米飲服二錢。子母秘錄

又方

地榆煎汁。熬如飴粥。與服即愈。用後方

疳痢垂死者

益母草嫩葉同米煮粥食取足。二三日愈。廣利方

又方

雄白搗如泥。以梗米粉和蜜作餅炙熟與食。數日

愈。楊氏產乳

又方

香門醫品

諸疳

卷四 九

擣白皮搗粉。如水和棗肉捻成餅子。圍棋子大。日晒少時。又搗如此三遍。煮熟空心服七枚。重者不過七服。忌油膩熱麵。外臺秘要

香薷丸 治疳瀉

川黃連炒三錢。肉豆蔻木香。訶子肉煨砂仁炒。白

茯苓各一錢。為末。飯丸。麻子大。米飲下三十九

又方

胡黃連半兩。乾薑炮一兩。為末。每服半錢。甘草煎

湯下。總微論

小兒疳積不止

白藥子一兩。甘草半兩。為末。猪膽一具。批開。摻末。五錢。煮熱食之。直指方

又方

搗白皮。日乾。二兩。為末。以粟米淘淨。研濃汁。和丸。梧子大。十歲以下。三四丸。量大小。加減。仍以一九。送入鼻內。十母秘錄

又方

赤石脂。為細末。米飲調服。半錢。立瘥。斗門方

香門醫品

諸症

卷十

十全丹 治丁奚哺露

青皮醋炒。陳皮去白。川芎。五靈脂。白豆蔻。檳榔。盧會。各五錢。木香。使君子。焙。蝦蟆灰。各三錢。為末。猪膽汁。米粉。打糊。丸。麻子大。每服二十九。米飲下。或薄荷湯下。保嬰秘要

疳氣久治不愈

皂礬煨。赤醋淬。三次。為末。煮肉。和丸。綠豆大。每服十九。溫水下。日再服。集驗方

小兒久疳。體虛。少食。及病後。天柱骨倒。

白藥子。炒。每服半錢。連酒下。鄭氏方

小兒疳積。身面上生瘡。爛成孔。白。如大人。湯梅。瘡。用。糯米。醃。四邊。滴下。氣水。以。礬。磨。取。掃。瘡。上。不。數日。即。效。百藥。不。愈。者。用。之。神。妙。集簡方

又方

生嚼。藥子。敷之。外臺秘要

小兒急疳瘡

蚌蛇膽。水調敷之。聖惠方

又方

香門醫品

諸症

卷十

青黛。黃檗。枯礬。五倍。等分。為末。米泔。嗽。過。敷之。

癖積門

論錢仲陽云。癖塊者。僻于兩脇。痞結者。否于中脘。皆因乳哺失調。飲食停滯。邪氣相搏。而成。或乳母六淫七情所致。古人多用剋伐。痞癖既久。飲食減少。脾氣必虛。必先以固胃氣為主。養正則積自除。若欲直攻其結。不惟不能善消。抑亦損其脾土。脾土一虧。變證百出矣。不可不慎。

阿魏膏 治一切癰疽瘡結

羌活獨活各半官桂各半藥穿山甲生地黄兩頭尖大黃白芷天麻各五錢槐柳桃枝各三錢紅花四錢木鼈子十枚去殼亂髮如雞子大一團用香油二斤四兩煎黑去粗入髮煎化仍濾去粗徐下黃丹煎軟硬得中入苦消阿魏蘇合油乳香沒藥各末五錢麝香三錢調勻即成膏攤貼患處內服黃連丸凡貼膏藥先用朴消隨患處鋪半指厚以

普門醫品

癰疽

癰疽 十二

紙覆上用熨斗熨良久如消耗再加熨之二時許方貼膏藥片疳積加盧會末同熨妙 保嬰撮要

黃連丸 治全上

黃連五錢牛膽汁浸晒八晝根烏梅肉杏仁去皮焙石蓮肉去心各二錢糯米半膽汁浸丸麻子大每服二十九煎烏梅薑蜜湯下 保嬰撮要

小兒癰積

蒼朮去皮四兩為末羊肝一具竹刀批開摻末于內沙鍋煮熟作丸綠豆大每服二十九米飲下生

生編

又方

急慢子水紅花子大黃各一兩俱生研末各取五錢外用及消一兩拌勻將白鴨腸一個白鴨更好去毛及腸勿犯水以布拭淨將末裝入內用線繫定沙鍋內入水三碗重湯煮以小火煮乾將腸取出調點黃色冷定後食之日西時疾軟三日大便下血病即愈忌冷物百日 集效方

普門醫品

癰疽

癰疽 十二

又方

黃牛肉一斤恒山三錢同煮熟食肉飲汁癰必自消 筆峰雜興

又方

真阿魏酒化五錢脂炒煙盡等分用黃狗膽汁和丸黍米大空心飲下三十丸 同前方

拔瘡丸

治乳癰殺癰腹中結塊

代赭石火煨醋淬研細青皮去穢醋炒木香蓬莖朮煨生地黃各三錢巴豆去油膜淨六錢為末醋糊丸麻子大每服二三丸食後薑湯下 保嬰撮要

食癥乳癖痞結及乳食不消心腹脹滿

巴豆霜當歸米泔浸炒朱砂飛代赭石醋煨淬七

次以鹽炒木香各一錢磨一分為末糊丸麻子

大麥服一二九溫水送下量兒加減

治小兒驚風發熱

柴胡一兩黃連一兩各半兩乾薑一兩各七錢

枳實麩炒木香青皮醋炒各半兩乾薑七錢為

末以棕豬肚一個去油鹽水蒸熟同搗和為丸綠

豆大每服二十九煎人參湯下食後服本草細目

普門醫品

癖積

卷四 五

枳木丸 消積健脾

白朮炒四兩枳實麩炒二兩為末荷葉煨飯為丸

桐子大每服四五十丸空心白湯下保嬰撮要

耳遂破結散 治癖現

耳遂煨黃二錢五分青皮醋炒黃芩酒炒大黃炒

各半兩為末每服一錢水煎服仍量兒加減利後

以粥補之保嬰撮要

小兒痞塊腹大肌瘦面黃

使君子仁三錢木鼈子仁五錢為末水丸龍眼大

每一丸用鷄子一個破頂入藥在內飯上蒸熟空

心食之簡便單方

溫脾化積丸 治小兒膈下硬俗名奶癖宜服此不

可輕瀉

黃鳳黃連上硫黃各一錢蜜陀僧一兩丁香二十

一個為末每服一字三歲以上半錢用乳汁調下

一伏時取下青黑物後服補藥本草細目

化鐵丹 治食積肚硬熱渴泄瀉宿食不化

烏梅肉八個巴豆十六粒去油膜青皮去穰醋炒

普門醫品

癖積

卷四 五

陳皮去白各半兩為末醋糊丸麻子大每服七丸

米飲或淡薑湯下醫統

積聚痰飲不下食嘔逆及腹內諸疾

續斷子仁研碎酒服不過三粒當下惡物蜀本草

腹脹門

論東垣云寒脹多熱脹少皆主于脾胃虛者宜用

六君子湯若喘而氣短者脾肺氣虛也用異功散

補之若服尅伐之類而喘脹益甚者脾肺之氣復

傷也用前湯加半夏升麻病久小便不利或四肢浮腫者脾肺之氣虛不能通調水道也用金匱腎氣丸主之手足逆冷睡而露睛脾胃虛寒也用六君子湯加炮薑手足不冷睡而露睛脾胃虛弱也用六君子湯更當調治乳母節其飲食悉藥餌過劑復傷胃氣故也

楊子九 治小兒腹脹

蘿蔔子微炒一兩陳皮青皮醋炒黃芩五靈脂蓬

香門醫品 腹脹

莪朮煨黑牽牛頭末半炒半生赤茯苓各五錢木

香二錢五分爲末麴糊爲丸每服十五丸

紫蘇湯下 作散服

又方

胡粉同搗炒色變以手摩腹上 子母保錄

小兒腹脹黃瘦

雞矢白一兩丁香一錢爲末蒸餅丸小豆大每米

湯下十九丸 三服 活兒全書

五苓散 治腹脹氣喘小便不利

白朮土炒白茯苓猪苓澤瀉各分官桂減半爲末每服二錢水半鍾煎三分服

紫霜丸 治小兒腹脹面赤痰喘大便秘壯熱飲食

方見本卷懸病門

金匱腎氣丸 治脾腎 損腫脹喘急

白製熟地黃四兩乾山藥白茯苓各二兩澤瀉山

茱萸肉牡丹皮各一兩五錢肉桂附子炮車前子

炒牛膝酒洗微炒各五錢另爲末米糊丸小豆大

每服三四十九空心白湯下 東垣方

香門醫品 腹脹

溫脾散 治小兒脾胃不和虛脹不食增寒壯熱困

倦無力

訶子炮取肉人參去蘆各七錢半甘草炙二錢半

白朮土炒木香白茯苓霍香陳皮黃耆蜜炙桔梗

各半兩爲末每服三錢薑二片棗一枚水一鍾煎

半鍾服 陳氏方

六君子湯 治脾虛腹脹不能飲食

方見四十二卷悲哭門

異功散 治脾肺氣虛腹脹而喘

方見四十二卷發熱門

保和丸 治飲食停滯腹脹

方見四十三卷傷食門

普門醫品

腹脹

卷四十五

普門醫品卷之四十五

東武王化貞元起父編輯

門人陳斌憲卿父較閱

虛羸門

論錢仲陽云小兒虛羸因脾胃不和不能乳食使肌體瘦弱或大病後脾氣尚弱不能消化穀氣所致若冷者時時下利唇口青白熱者身溫壯熱肌體微黃更當審其形色察其兒證若腹痛瀉利清

普門醫品

虛羸

卷四十五

白不渴喜熱此屬寒證雖在夏月宜永香丸身熱煩燥瀉利焦黃作渴喜冷此屬熱證雖在冬月宜黃連丸凡小兒諸病皆先調脾胃脾胃固則諸病自退非藥所能盡祛也

通治 乙方

參苓白朮散 治脾胃虛弱飲食少思中滿痞噎心忪氣喘嘔吐泄瀉

白扁豆薑汁浸去皮微炒人參去蘆白茯苓白朮土炒甘草炙山藥炒各一兩半蓮肉去皮心桔便

炒黃色薏苡仁炒縮砂仁炒各一兩二錢爲末每服一錢薑湯調下

六味地黃丸 治小兒肝腎虛弱發熱潮熱自汗盜汗便血溺血又治腎疳腦熱消渴寒熱往來消渴腹脹瘰癧結核等證其功不能盡述

補中益氣湯 治中氣虛弱發熱自汗盜汗消渴等證

異功散 治脾胃虛弱飲食少思吐瀉不食凡虛冷證先與數服以正胃氣

普門壽品 虛癆

以上三方俱見四十二卷醫門

四君子湯 治脾氣虛弱飲食少食肌肉羸瘦

人參去蘆白朮土炒各六分甘草炙四分薑一片棗二枚水一鍾煎四分服

木香丸 治陽氣虛寒羸弱

木香青黛檳榔肉豆蔻各一錢續隨子六錢

去油蝦蟇三個煨存性爲末蜜丸綠豆大每服五

丸薄荷湯下

四味肥兒丸 治小兒發熱口乾肢體消瘦二便不

調食積五疳頭項結核及疳積寒熱等症

方見本卷諸疳門

小兒尸疰瘰癧或疳寒熱

龍頭一校燒灰新汲水服半錢

黃連丸 治見論

方見本卷諸疳門

癰病門

論巢氏曰小兒癰病者婦人懷妊時有鬼神觸胎

普門壽品 癰病

所致其狀微利寒熱往來毛髮聳動情思不悅宜

服龍膽湯又小兒未斷乳母復有胎兒飲其乳羸

瘦骨立髮黃壯熱大便不調亦名癰病宜用紫霜

丸下之益黃散補之令兒斷乳仍服消乳丸異功

散海藏云癰病者因母有妊兒飲其乳致病如癰

下痢腹大或愈或發日漸羸瘦是也治法速與斷

乳溫平胃氣調和血脉自然而愈

(通治) 七方

龍膽湯 治小兒癰病

甘草炙各一錢人參五分白芍半錢服二錢水一鍾煎四分食前服仍用紅紗袋盛夜明砂與兒日夜佩之即愈

紫霜丸 治乳哺失節宿滯不化腹痞嘔吐或大便秘臭

代赭石煨醋淬七次赤石脂煨各二兩杏仁五十個麴炒巴豆仁去膜心油先將杏仁巴豆研成膏入代赭石脂末研勻湯浸蒸餅爲丸粟米大每服

寶門醫品

疳積

卷五

三五丸米飲下

保嬰撮要

又方

取伯勞鳥羽令兒帶之可愈

海藏方

小兒魘病寒熱如痺

冬瓜扁蓄各四兩水二升煎湯浴之愈

千金方

益黃散 治見論

方見四十三卷泄瀉門

消乳丸 治見論

方見四十三卷嘔吐門

異功散 治見論

方見四十二卷發熱門

解顛門

論錢仲陽云小兒解顛或久不合者因腎氣有虧腦髓不足故兒多愁少喜目睛多白而身瘦蓋人腦髓不足如木無根有數歲而成廢人者服錢氏地黃丸更用南星微炮爲末米醋調勻緋帛烘熱貼之其栢子仁散三辛散并解顛散俱効若食乳者

寶門醫品

解顛

卷五

當無補其母更以軟帛緊束其首使其易合當調補脾胃爲善顛顛顛陷亦因所稟腎氣不足及乳哺失宜脾胃虧損所致夫脾主肌肉氣逆上衝則爲顛脹元氣下陷則爲顛陷也並用補中益氣湯六味地黃丸

通治

栢子仁散 治顛門不合

防風白及栢子仁去油取霜等分爲末以乳汁調塗一日一換

養生主論

玉乳丹 治全上

鍾乳粉法製熟地黃自製杵膏。栢子仁研膏當歸。

各半兩防風補骨脂各一錢另為末入二膏加煉

蜜丸黍米大每服二十九煎茴香湯下

封頤散 治全上

麝香一字。蠍尾一個去毒薄荷三分。蜈蚣牛黃青

黛末各一字同研用熟棗肉和為膏新帛上塗勻

貼之四方各出一指許火上炙手頻熨

又方

普門醫品 解頤

丹雄雞冠血和赤芍藥末傳之良

又方

黃狗頭骨炙為末雞子白和塗之

又方

用蟹螯同白及末搗塗以合為度

小兒解頤不合鼻塞不通

天南星炮去皮為末淡醋調緋帛上貼頤門炙手

頻熨之立效

小兒頤顛頤陷因臟腑壅熱氣血不榮

烏雞骨一兩酥炙黃生地黃二兩焙各為末每服

半錢米飲調下

三辛散 治腦角骨大顛門不合

細辛桂心各五錢乾薑一錢為末乳汁調塗顛上

乾時再塗

補中益氣湯 治見論

六味地黃丸 治見論

二方俱見四十二卷發熱門

白及散 治解頤

普門醫品 解頤

白及研末敷之用絹帛緊束仍服八物湯即合

赤遊丹毒

論遊風赤者多亦有白者俱屬風熱蓋血得熱而

遊走耳白屬氣分赤屬血分因腠理不密風熱相

搏拂鬱而成或乳母過食膏粱厚味所致若片片

如胭脂腫而壯熱者名川毒因胎熱蘊毒或乳母

食酒麪煎炙等物過度與夫烘衣與兒不候冷即

着多成此疾或發于頭面或發手足胸背令兒躁

悶如火痛不可言。古人云從四肢起入腹裏者皆不治。當急令人隨患處遍吮毒血。令聚一處。砭出之。急服真人活命飲。百日内忌砭。以其肌肉難任也。

通治三十四方

犀角解毒散 治小兒赤白遊風及丹毒。壯熱狂躁。睡臥不安。胸膈否悶。咽喉腫痛。

牛旁子一兩。荆芥半兩。防風甘草各二錢半。犀角錢半。爲末。每服三錢。竹葉五片同煎。食遠服。醫統

普門醫品 赤遊丹毒

卷五 八

赤白遊風及丹毒

水蛭十餘枚。竹筒盛。合腫處。使啞之。啞飽自脫。更用饑者皮皺肉白爲効。治一切癰腫俱効。藏器方

白玉散 治赤遊丹毒

滑石寒水石各一兩。爲末。米醋調。傳腫處。若外腎有破處。只用水調。醫統

又方

慈菇葉搗爛塗之。卽消。蘇頌方

柴胡梔子散 治赤遊丹毒及頭面生瘡

柴胡梔子炒牡丹皮白茯苓川芎白芍藥酒炒當歸酒洗牛蒡子炒各七分。甘草三分。水鍾半煎八分。母子並服。

砭法 治丹毒赤色遊走不定

細磁器擊碎。取有鋒芒者一塊。以筋頭夾之。用線縛定。兩指輕振。筋消。令正對懸半寸許。再用筋一根。頻擊筋頭。令毒血遇刺皆出。輕者止。用口吮出毒。用神功散敷之。如患在頭額。不用砭。止以臥針刺患處。出毒血。其赤自退。保嬰撮要

普門醫品 赤遊丹毒

卷五 九

小兒丹證遊走入腹則死

白芷寒水石爲末。生葱汁調塗。全幼心鑑

又方

薊菜煎汁洗之。或以葉曬乾搗末敷之。子母秘錄

又方

栝蔞仁爲末。二兩。醋調塗。集驗方

又方

銀朱調雞子清塗之。并搗丹毒亦治。李樓怪證方

又方

石膏煨為末。以水塗之。集玄方

又方

藍澱敷之。或青黛入蜜。井水研敷。子母秘錄

又方

煮大豆汁塗之甚良。或以桑根白皮煮汁浴之。
水者棘根汁洗之亦効。千金方

又方

馬齒莧搗汁塗之。廣利方

又方

普門醫品 赤遊丹毒

卷五 十

柳葉煮汁。楊洗赤處。日七八度。或以浮萍搗汁遍
塗之。子母秘錄

碧綠散 治丹毒

綠豆粉半兩。大黃末二錢。和勻。生薄荷汁入蜜。調
塗患處。本草綱目

又方

胡荽搗汁塗之。譚氏方

又方

渠中水藻葉細如絲者。搗之。厚三分。乾印易。其

効無比。集玄方

又方

竈心土細研。新汲水調塗。乾則易之。急救方

火焰丹毒

赤小豆為末。雞子白時時塗之。即消。小品方

又方

鯉魚腦髓塗之。蘇恭方

又方

龍葵葉入醋細研敷之。醫經本草

普門醫品 赤遊丹毒

卷五 十一

又方

庖子搗末。水和塗之。梅師方

又方

大黃末。水泡頻刷之。急救方

火焰丹毒從頭起者

生蔥汁塗之。本草綱目

丹從臍起

檳榔末醋調傳之。本事方

丹毒從兩足起

乳香爲羔羊脂調塗

勿勿新書

羅蛇丹毒

糯米粉和鹽醋全之

濟急方

小兒丹毒作瘡出水

豆豉炒煙起爲末油調敷之

姚和衆方

防風升麻湯 治小兒丹毒赤腫

防風升麻山梔炒麥門冬去心木通甘草炙各八

分竹葉七片水一鍾煎五分服

冰黃散 治全上

普門醫品

赤遊丹毒

卷五 十二

芒消五錢大黃一錢爲細末新汲水調塗患處

神功散 治全上

黃蘗音相炒草烏炒血竭各等分爲末津調敷患處

又方

麻仁搗末水和敷之

千金方

真人活命飲 治見論

穿山甲蛤粉炒黃白芷防風甘草節赤芍藥當歸

尾天花粉貝母皂角刺各六分金銀花陳皮各一

錢半酒水各一鍾煎八分去渣入乳香沒藥末各

五分調服

發斑門

論潔古云斑與疹不同微腫于外者爲斑屬少陽相火小紅隱隱于皮膚之中者謂之疹屬少陰君火二者首尾俱不可下宜安裏之藥多發表之藥少小便利則微疎之身溫者順身涼者逆大忌外敷寒涼內用疎通無此二者可保無虞

治斑忌用發表藥蓋表虛裏實若發其汗重令開

普門醫品

發斑

卷五 十三

泄更增斑爛表虛故也凡斑赤者易治黑者難愈

通治 六方

玄參升麻湯 治斑疹已發未發或身如錦紋甚則

煩躁喉閉腫痛

玄參升麻甘草等分每服二錢水半鍾煎三分服

人參敗毒散 治發斑疹增寒壯熱

人參去蘆白茯苓川芎羌活獨活前胡柴胡枳殼

麩炒桔梗甘草炒各等分每服二三錢水半鍾煎

三分服

犀角消毒散 治斑疹發熱喉痛及升毒等證

牛旁子耳草各五分犀角鎊二分金銀

花五分水半鐘煎三分服

葛根橘皮湯 治發斑煩悶嘔吐清汗

葛根陳皮杏仁去皮尖麻黃去節知母炒甘草炙

黃芩炒各半兩每服二三錢水半鐘煎三分服

化斑湯 治發斑煩悶嘔吐清汗

人參石膏煨知母甘草各二錢每服二三錢入糯

米半合水煎米熟為度去相溫服

普門醫品

孫氏

卷五 十四

人參安胃散 治斑疹因服峻厲之劑脾胃虛熱泄

瀉嘔吐飲食少思等證

人參去蘆一錢黃耆蜜炙一錢甘草一錢半炙半

生白芍藥酒炒七分白茯苓四分厚皮二錢五分

炒二分為末每服二錢水半鐘煎三分溫服

普門醫品卷之四十六

東武王化貞元起父編輯

門人陳斌憲卿父較閱

頭面瘡

風熱 禿瘡 肥瘡

論人身諸陽之氣會于首而聚于面其患瘡疾者

因風熱不和氣血凝滯于諸陽之經或稟腎虛肝

火父母胎毒或乳母六淫七情醇酒厚味毒氣熏

蒸以致生瘡瘻痛浸淫不絕名曰頭瘻當辨其經

普門醫品

頭面瘡

卷五 一

絡審其所因而治之○頭上生瘡不絕或成片白

痴瘡瘻或起白屑皆因積熱而生名曰禿瘡○又

有厚痴流黃汁汁流處又成瘡者名曰肥瘡若不

早治漸成滿頭其勢蔓延遂成光禿並不生髮不

可不早治也○又有眉煉謂眉間生瘡如疥癬係

肝膽經積熱或乳母醇酒厚味及鬱怒所致○又

有時毒因感四時不正之氣頭面耳項間腫赤作

痛或咽喉閉塞寒熱不寧狀如傷寒五七日間亦

能殺人宜用托裏消毒之藥

風熱 三十一方

荆防敗毒散 治頭面生瘡

荆芥防風人參白芷白茯苓川芎羌活獨活前胡枳殼麩炒柴胡桔梗甘草炒各等分爲末每服三錢水煎服

又方

脂麻生嚼敷之 普濟方

柴胡梔子散 治肝膽風熱頭面及遍身生瘡膿水

淋漓或發寒熱一名梔子清肝散

普門醫品

頭面瘡

卷二

柴胡梔子炒牡丹皮白茯苓川芎白芍藥酒炒當歸酒洗牛蒡子炒各等分甘草減半爲末每服三錢水煎母子並服 聖惠方

五福化毒丹 治胎毒及痘後頭面生瘡眼目腫疼

用熟地黃白製研膏天門冬麥門冬俱去心生地黃玄參各三兩甘草酒洗即此消製淨者各二兩

青黛一兩五錢爲末煉蜜丸芡實大每服一九白

漆湯化下 保嬰最要

小兒頭面瘡及月蝕瘡

蛇蛻燒灰臘猪脂傅之 聖惠方

小兒頭面生瘡手爬處即延生謂之胎癬

先以熱湯洗淨用桑木蛙屑燒存性入輕粉等分油和敷之 聖惠方

小兒頭瘡

黃蜀葵花大黃黃芩等分爲末泔水洗淨香油調搽或以黑豆炒存性研末水調搽之亦妙 普濟方

又方

兔絲一握煮湯頻洗之 子母秘錄

普門醫品

頭面瘡

卷二

又方

麻子二升研水絞汁和蜜傅之 千金方

又方

烏梅燒灰生油調塗 聖濟方

又方

以草鞋鼻子燒灰香油調傅之 聖濟方

又方

舊皮鞋面燒灰入輕粉少許生油調傅 聖惠方

又方

羊屎煎湯洗淨仍以羊屎燒灰同屋上掛灰清油

調塗 普濟方

又方

乾桃奴燒研入膩粉減半麻油調擦或以枳實燒

灰猪脂調塗亦効 聖惠方

又方

糯米飯燒成灰入輕粉清油調敷 普濟方

又方

熟雞子黃炒出油入麻油調輕粉末塗之或以葱

普門醫品

頭面瘡

卷六 四

汁調敷之亦妙 事林廣記

又方

龜甲燒灰傅之並治月蝕耳瘡 聖惠方

又方

海螵蛸白膠香各二錢輕粉五分爲末先以油潤

淨乃搽末二三次卽愈 衛生易簡

又方

皂礬淡豉各一兩炒黑膩粉二錢研勻以桑灰湯

洗淨搽之 保嬰撮要

又方

吳茱萸炒爲末輕粉少許猪脂醋搗塗之 聖惠方

又方

蠶蛻紙燒存性入輕粉少許麻油調傅 聖惠方

又方

野外陳乾牛屎燒灰入輕粉麻油調塗 普濟方

胎毒頭瘡

水邊烏柏樹葉晒研入雄黃末少許生油調搽經

驗良方

普門醫品

頭面瘡

卷六 五

小兒頭瘡久不愈

胡桃和皮燈上燒存性益蓋出火毒入輕粉少許

生油調塗一二次愈 保幼大全

頭瘡因傷水成膿出水不止

肥皂燒存性入膩粉麻油調塗 海上方

小兒頭瘡蓋開出膿夜卽復合

鯽魚長四寸一放去腸大附子一枚去皮研末填

入炙焦研敷棉蒜封之 聖惠方

小兒頭瘡浸淫成片名曰頭煉

先用皂角湯洗次以側耨灰炒令烟盡和油搗下

小兒頭煉瘡

杏仁燒研敷之林廣記

又方

慈濟湯官粉塗之本草綱目

又方

水磨橫斷脂取粉和生油塗之或以田螺殼燒存性清油調敷亦妙聖惠方

普門醫品

頭面瘡

卷六

小兒頭煉脚煉有蟲在內

榆皮煨爲末和猪脂油塗之蟲出瘡

禿瘡十九方

小兒禿瘡

鯽魚去腸入皂礬燒研搽之千金方

又方

冷泚洗淨以羊角葱搗如泥入蜜和塗之楊氏方

又方

韶腦一錢 一錢脂麻二兩爲末以退猪湯洗

後搽之良方

又方

以鹽湯洗淨蒲葦燒灰敷之聖濟總錄

又方

麥子爲末蜜和雞子白同塗之藥性論

又方

蔓青葉燒灰猪脂和敷或以子研末醋調敷之千金方

又方

普門醫品

頭面瘡

卷七

松香五錢猪油一兩煎稠搽之一日數次簡便方

又方

榆白皮爲末醋和塗之蟲出卽愈楊氏產乳方

又方

大蜈蚣活者一條搥一分入油內浸七日取油搽之極効

小兒禿瘡及髮不生

楸葉心搗汁頻塗卽効千金方

梨頭瘡不拘大人小兒

獨核肥皂去核入沙糖少許巴豆二枚札定泥包

煨存性入檳榔輕粉各五錢研勻香油調搽先以

灰汁洗過溫水再洗拭乾搽藥一宿見効普濟方

小兒白禿瘡

紫草煎濃汁塗之

聖惠方

又方

馬齒莧煎膏塗之或燒灰猪脂和塗

聖惠方

又方

瓠藤同荷葉裹鹽于中煎濃汁洗數次愈

聖濟錄

普濟醫品

頭面瘡

卷八

又方

切蒜日日搽之

子母秘錄

小兒白禿

猪蹄甲七枚每個入白礬一塊棗兒一個燒存性

研末入輕粉麻油調搽不過五次即愈

本草綱目

又方

虎骨末油調塗之

普濟方

又方

桑椹入甕中曝七日化為水洗之神効

聖濟錄

小兒赤禿

以赤馬皮白馬蹄燒灰和脂猪脂傳之

聖惠方

肥瘡 七方

立効散 治頭面肥瘡膿水浸淫

定粉黃香黃礬黃連枯礬各一錢為末用清油

燭調搽

拔毒散 治全上

黃芩黃連白礬俱生用雄黃各五錢銅綠二錢瘡

甚加入松香三錢各為末乾搽患處或用油調搽

普濟醫品

頭面瘡

卷九

加枯礬三錢可治疥

又方

紅麴嚼之甚効

百一選方

三黃散 治頭面風熱生瘡濕水沙淫處處便爛

松香五錢蚊蛤黃連黃丹海螵蛸各一錢輕粉雄

黃各少許為末搽之乾者油調敷

每則最要

小兒甜瘡即黃水瘡

大棗去核填入皂礬燒存性研末敷之効

拔毒方

甜瘡生頭面耳邊連引流水極癢

蛇床子一兩。輕粉三錢。爲細末。油調搽之。普濟方

又方

嚼粳米臥時塗之。不過三五次愈。本草綱目

(附煉)

小兒眉煉癰瘡

兔絲子炒研。油調敷之。山醫四要

又方

百藥煎五錢。白礬二錢。爲末。油調搽之。外科精義

又方

普濟醫品 頭面瘡 卷六 十

鯪鯉前膊肉。炙焦爲末。清油和輕粉調傅。直指方

又方

小麥麩炒黑研末。酒調敷之。本草綱目

又方

卮子燒研。油調敷之。保嬰大全

又方

黑驢屎燒研。油調塗之。聖惠方

金銀散 治全上

煨銀鍋一個。輕粉五分。研細。麻油調傅。保嬰撮要

青金散 治小兒眉煉癰瘡。或延及遍身。膿水淋漓。經年不愈。

松香二兩。真蛤粉五錢。青黛二錢五分。爲末。用燭

油調傅。或加輕粉枯礬各三錢。尤効。並

治胎毒癰瘡

牛黃解毒散 治眉煉癰瘡。頭面生瘡。或延及遍身。

浸淫不愈

金銀花。生甘草。各一兩。牛黃一錢。爲末。每服五七

分。乳汁調服。或甘草煎膏爲丸。芡實大。每服一丸。

普濟醫品 頭面瘡 卷六 十一

白湯化下

(時毒) 五方

通氣散 治時毒瘡。咽喉不利。取嚏以泄其毒。

玄胡索。豬牙皂角。川芎。各一錢。藜蘆五分。羊躑躅

花三分。爲細末。紙捲蘸少許。紅鼻內取嚏。爲妙。保

嬰撮要

葛根牛蒡子湯 治時毒腫痛

葛根。黃芩。甘草。江西豆豉。牛蒡子。牛生半炒。研碎。

各等分。每服三五錢。水一鍾煎六分服。保嬰撮要

梔子仁湯 治時毒腫痛大便秘結

鬱金。枳殼麩炒。升麻。山梔子仁炒。牛蒡子炒。研大黃炒。各等分。爲細末。每服二錢。蜜水調服。

犀角升麻湯 治疔腮時毒頰腫痛

犀角鎊二錢。升麻。防風。羌活。川芎。白芷。各五錢。黃芩。甘草。各一錢。白附子四分。爲末。每服五錢。水一鍾煎六分服。保嬰撮要。

梔胡梔子散 治全上

方見本門前

普門醫品 頭面瘡

卷之十二

鼻瘡 四方

澤瀉散 治小兒肺經積熱。鼻上生瘡。鼻下赤爛。

澤瀉。鬱金。山梔仁炒。甘草炒。等分。爲細末。用甘草煎湯。食後調服。每服一錢。重兒加減。保嬰撮要。

鼻頭兩旁人中生瘡。濕爛癢潰。名曰鼻齧。瘡汁流處。

隨即成瘡。浸淫不已。

枯礬。海螵蛸。雄黃各一錢。赤石脂。鉛粉。黃丹炒。各

二錢。輕粉。孩兒茶。各五分。爲末。搽之。不粘者油調。

傳秘驗方

鼻下爛瘡

銅青。白礬各一錢。爲末。傳患處。經驗方。

又方

熊膽。泡汁。以鷄翎掃上。奇効方。

耳病門

論小兒耳聾耳鳴者。稟賦虛也。宜六味地黃丸。腫痛或膿瘻者。肝腎風熱及濕熱也。宜梔子清肝散。亦有沐浴水入耳中而釀成者。若因乳母膏粱積。

耳病

養真堂

熱而致者。宜治其母。并與兒服。有月蝕瘡。耳根生瘡。每月一發不絕。有耳底痛。耳內腫痛。出膿汁也。

通治 十六方

田氏紅玉散 治耳內腫痛。後有膿出。名曰聾耳。

枯礬。麝香。乾胭脂。各等分。爲末。研勻。先以綿杖擦。

令膿淨。搽入少藥。經驗方。

湯氏龍黃散 治全上

枯礬。乾胭脂。黃丹。各一錢。龍骨煨。一錢半。麝香一

字。照上法用之。本草綱目。

又方

桃仁炒研。綿裹口。塞之。千金方

又方

硫黃末和鹽作柱。插之。日二易。千金方

耳底腫痛。出汁不絕

輕粉一錢。麝香一分。爲末。摻之。簡便方

又方

穿山甲燒存性。麝香少許。研末吹之。鮑氏小兒方

耳內濕瘡

普門醫品

耳病

卷六 十四

蛇床子。黃連各一錢。輕粉一字。研搽。全幼心璧

又方

輕粉。灰等分。研細。調敷。摘玄方

小兒月蝕瘡

官粉和土研敷之。或以黃連末敷亦効。子母秘錄

又方

旋覆花燒存性。研羊脂和塗之。集簡單方

又方

五月五日蝦蟆燒灰爲末。猪膏和敷。外臺方

耳根後生瘡。如刀割狀。俗名鑲耳。小兒多患之。

地骨皮。研細。篩出粗末。煎湯洗淨拭乾。如出水以

細末乾敷。瘡乾油調敷。本草綱目

六味地黃丸 治見論

方見四十五卷虛羸門

梔子清肝散 即柴胡梔子散 治見論

方見本卷頭面瘡門

百蟲入耳

生香油。研銅綠滴之。衛生家寶方

普門醫品

耳病

卷六 十五

蚰延及蛆入耳

以皂漿末吹之。卽化爲水。摘玄方

目病門

論經曰。目者五臟六腑之精。榮衛魂魄之所常營

也。又曰。五臟六腑精氣皆上注于目。白睛屬肺。黑

睛屬肝。瞳人屬腎。上下胞屬脾。兩眦屬心。內眦又

屬膀胱。小兒目無睛光。及白睛多。黑睛少者。肝腎

俱不足也。宜用六味地黃丸。加鹿茸。晝視通明。夜

視同見者。目裏陽氣衰。遇夜陰盛。則目愈衰。故不能視也。目閉不開者。因乳食失節。或遇風寒涼之藥。使陽氣下陷。不能升舉。故目不開。然亦腹痛者。肝火熾盛也。若生下目黃。壯熱大小便結。乳食不化。面赤眼閉者。皆由在胎時感母熱毒所致。兒服瀉黃散。母服六味地黃丸。若乳母膏粱積熱。致兒目黃。乳母服清胃散。若肢體而目爪甲皆黃。小便如屋漏水者。難治。

通治三十四方

普門醫品

目病

卷六 十六

眼赤暴腫

防風羌活黃芩酒炒黃連酒炒等分爲末。每服一錢。水煎。食後服。如大便秘。加大黃三分。痛甚加川芎。當歸。生地黃各二分。煩躁不得臥。加梔子仁三分。保嬰撮要

赤眼眵淚

水調黃連末貼足心。胡黃連更妙。全切心鑑

又方

淡竹歷點之。古今錄驗

痘風赤眼

初生小兒。胎帶血毒。熱點之妙。海上方

黃連羊肝丸。治目中赤翳眵淚

黃連酒炒爲末。白羯羊肝一具。先將竹刀刮淨。去筋膜。搗爛。入黃連丸。桐子大。每十九食後茶清下。保嬰撮要

昏翳赤痛

當歸頭酒浸。黃連酒炒。各二錢。防風二錢五分。細辛五分。甘草一錢。用水一大碗。文武火熬。滴水中。

普門醫品

目病

卷六 十七

不散爲度。入燕蜜少許點之。保命集

翳膜遮睛

防風白蒺藜各一兩。羌活一兩半。菊花三兩。爲末。每服二錢。入鹽少許。食後白沸湯點服。保嬰撮要

五秀重明丸。治翳膜遮睛。隱澁昏花

甘菊花五百個。荆芥五百穗。木賊五百根。去節。楮實五百枚。爲末。蜜丸。桐子大。每服五十九。食後白湯化下。謹前方

湯化下

小兒目翳。或來或去。潮紅侵睛。

雪白通少許研細燈心蘸點目三五次不痛不礙

又方

羚羊角散 治冰翳久不去

羚羊角鎊升麻細辛等分甘草減半為末蜜丸桐

子大每服五十丸食後白湯下

保命集

煮肝丸 治肝眼翳膜羞明及大人雀目甚効

夜明沙蛤粉穀精草各一兩為末每服二錢以猪

肝批開摻藥于內麻線定米泔水半碗煮肝熟取

出湯傾碗內熏眼候湯溫將肝分三次嚼喫以肝

新門醫品

日病

卷六 十八

湯送下

保嬰撮要

小兒雀盲至晚不見

羯羊肝一具不見水竹刀剖開入穀精草一撮瓦

礮煮熟日食之忌鐵器或炙熟搗作丸綠豆大每

服三十九食後茶下

衛生家寶

又方

夜明沙炒研猪膽汁和丸綠豆大每服五丸食後

米飲下

又方

地黃子五兩煨明子一升為末米飲和丸每服二

三十九食後茶清下

薛氏醫按

又方

蒼朮四兩米泔浸切焙為末猪肝二片批開摻藥

在內用麻線定粟米一合水一碗沙鍋內煮熟熏

眼候溫臨臥服三錢大効

世傳方

補肝散 治目失明

青羊肝一具去膜薄切新瓦炙乾決明子蔓花各

一合炒香為末每一錢食後水下日二服

薛氏方

新門醫品

日病

卷六 十九

石南散 治小兒誤跌或打着頭腦受驚致傷肝系

瞳人不正觀西則見東觀東則見西

用石南葉一兩藜蘆三分瓜蒂五七個為末每吹

少許入鼻一日三度內服牛黃清心丸或抱龍丸

普濟方

凡小兒因初生艱難血淤睪眥濺滲其睛不見瞳人

輕則胞腫上下弦爛

杏仁二枚去皮尖研爛乳汁三五匙入膩粉少許

蒸熟絹包頻點重者加黃連朴消良

金切心醫

小兒胎赤眼

烏雄雞胆汁以燈心蘸點之

嬰兒赤目在膜內者

乳浸黃蘗音汁點之小兒方

月內目閉不開或赤腫羞明名慢肝風

甘草二兩猪膽汁浸一夜慢火炙乾研末蜜丸綠

豆大溫水少許化開點之幼則黃書

痘疹入目成翳

仙靈脾威靈仙等分為末每服五分食後米湯下

普門醫品

目病

痘疹便覽

痘後目翳

直往山中東西地上不許回顧尋鬼尿十四粒雌

雄橫擲各一個同研末以不落地片華水調服其

効如神蘭氏經驗方

又方

兔尿日乾為末每服一錢食後茶下普濟方

又方

蟬蛻研末每用一錢食後羊肝湯下日二服

小兒方

又方

蟬蛻洗淨白粉等分每服一二錢水八分加蜜

少許煎四分不令溫服普濟方

又方

以黃鯉魚血點少許入目即愈普濟方

又方

黃丹輕粉等分為末吹少許入耳內左患吹右右

患吹左普濟方

普門醫品

目病

痘後目翳隱遮淚出久而不退

穀精草為末以柿餅或猪肝蘸食或加蛤粉等

分同入猪肝內煮熟日日食之普濟方

又方

天花粉蛇蛻洗焙等分為末羊石子研入藥在

內縛緊米泔煮熱切與食之普濟方

斑毒生翳

白菊花穀精草綠豆皮等分為末每用一錢以乾

柿餅一枚粟米泔一盞同煮泔盡食之普濟方

校淺者五七日淺者半月見効

六味地黃丸 治見論

方見四十五卷虛癰門

瀉黃散 治見論

方見四十二卷發熱門

清胃散 治見論

方見本卷喉痺門

喉痺門

普門醫品

喉痺

卷六 五

論小兒喉痺積熱內蘊二便不利者當疎利之風邪外客而發寒熱者當發散之感冒風邪大便閉

結煩渴痰盛者當內疎外解若乳母膏粱積熱者

母服清胃散乳母悲怒動火者母服加味逍遙散

大藥當用輕和之劑以治其本切不可用峻利之

藥以傷真氣也

凡小兒發熱煩躁不能吮乳視口內無患捫其喉

則哭者喉中腫痛也

通治

甘桔湯 治風熱上攻咽喉疼痛喉痺妨悶

苦桔梗一兩生甘草二兩每服二錢水半鍾煎二

沸食後服

牛蒡子湯 治風熱上攻咽喉腫痛或生乳蛾

牛蒡子炒研碎玄參升麻桔梗半兩黃芩酒炒木

通草各等分每服一二錢水半鍾煎二沸食後

服

玉鑰匙 治風熱喉閉及經喉風

煅消一兩硼砂五錢片腦一字白僵蠶一錢炒研

普門醫品

喉痺

卷六 五

勻用半錢吹入喉中立愈

又方

棘針燒灰食後水服半錢

又方

杏仁炒黑研爛含嚥

小兒飲乳不快似喉痺者

取牛角燒灰塗乳上嚥下即瘥

小兒喉疼不乳

牛蒡根搗汁細嚥之

清胃散 治見論

升麻一錢生地黃當歸酒浸牡丹皮黃連酒炒各

八分水一鍾煎七分徐徐服 東方

加味逍遙散 治見論

方見三十三卷調經門

口瘡門

論小兒心脾二經有熱則口舌生瘡察面色部位分經絡虛實而治之若元氣無虧暴病口生白

毒門醫部 口瘡

屑或重舌者用亂髮纏指蘸井華水指之或刺出

毒血敷以柳花散牙膠腫脹或有泡者並刺破敷

前散或以青黛搽之刺後又生又刺若唇裂破裂

者用當歸膏調柳花散敷之若元氣虧損或服寒

涼之藥作嘔少食者此虛熱也用五味異功散泄

瀉作渴者脾胃虛弱也用七味白朮散若腹痛惡

寒者脾胃虛寒也用六君子湯加薑桂若泥定降

火必變慢脾風矣

小兒舌微露而即收者名弄舌屬心脾虧損用溫

胃散補之舌舒長良久不收者名重舌乃心脾積

熱用瀉黃散主之或煮口舌生瘡作渴飲冷屬胃

經實熱亦用前散作渴飲熱屬胃經虛熱用四君

子湯口角流涎或腮頰腫者胃虛風熱也用人參

安胃散

通治 四十二方

小兒口瘡

寒食麴五錢消石七錢水調半錢塗足心男左女

右 普濟方

毒門醫部

又方

細辛末醋調貼臍上 衛生家寶

又方

蜜陀僧煨研醋調塗足心瘡愈洗太 蔡氏博方

又方

烏頭天南星各一個研末薑汁和塗足心男左女

右不過二三次愈 本草綱目

小兒口瘡糜爛

生硫黃末水調塗足心効即洗去 危氏得效方

又方

黃丹一錢生蜜一兩合和蒸黑以雞毛蘸擦甚効
普濟方

小兒月內生口瘡不能吮乳

沒食子炮三分甘草一分研末搽之并以少許抹
乳上吮之入口即啼不過三次愈
聖惠方

柳花散 治熱毒口瘡

黃礬細炒蒲黃真青黛人中白煨等分為末搽之
又方

醫門醫品

口瘡

卷八 五

磨鐵鏽水傳之 集簡方

又方

勃腴燒存性研末搽之 楊超簡便方

又方

桑皮中白汁拭淨塗之便愈 本草綱目

小兒滿口白爛

枯礬一錢朱砂二分為末每以少許傳之日三次
神効 普濟方

又方

馬牙消瘡 上日五度 醫要濟衆方

小兒口舌生瘡

黃芩蜜花為末一錢入黃丹五分研勻傳之無花
用子無子用根或不用黃丹亦効 聖惠方

又方

黃連煎酒時令呷之 本草綱目

絳雪 治口舌生瘡及咽喉腫痛

冰片半字蓬砂一錢辰砂三錢馬牙消寒水石各
二錢研極細末每用一字搽舌上嚥之不妨瘰癧

醫門醫品

口瘡

卷八 五

吹入喉內 徐氏醫統

五福化毒丹 治熱毒蘊積咽乾口舌生瘡

方見本卷頭面瘡門

貼臍膏 治虛陽上攻口舌生瘡不已

吳茱萸醋炒乾薑炒各五錢木鼈子五枚去殼為
細末每用五分水調紙攤貼臍 徐氏醫統

小兒口瘡

白礬末入五倍子內燒過同研搽之或以鹿皮燒
存性搽之亦効 醫要濟衆方

又方

人中白煨。黃藥。蜜炙焦為末。等分入冰片少許。以青布拭淨。搽之。屢効。許氏經驗方

嬰兒驚口自厚如紙

乾胭脂。乳汁調塗。一宿。甚効。男用女乳。女用男乳。集簡方

小兒驚口不食乳者

丹黍米研糊塗之。子母秘錄

又方

普門醫品

口瘡

聖惠方

生天南星。去皮。臍研末。醋調塗。足心。男左女右。集簡方

又方

白僵蠶。炒黃。拭去毛。研末。蜜和敷之。聖惠方

又方

地雞研水。塗之。即愈。聖惠方

又方

雞肫黃皮。為末。乳服半錢。聖惠方

又方

赤小豆。為末。醋和塗之。聖惠方

又方

鹽。帶燒灰。傅舌下。聖惠方

口吻瘡。一名燕吻瘡

胡粉。炒黃連。等分。敷之。普濟方

又方

鹽。灰。和猪脂塗之。聖惠方

又方

黃連。黃藥。黃丹。等分。為末。竹瀝調。傅。全。切。心。瘡。聖惠方

普門醫品

口瘡

聖惠方

口吻瘡。經年不愈

葵根。燒研。傅之。聖惠方

小兒流涎。脾熱也

鹿角屑。為末。米飲服一字。聖惠方

小兒流涎不止

取東行牛口中涎沫。塗兒口及頤上。自愈。并治口

噤。吐沫不能食乳。聖惠方

當歸膏。治見論

方見三十一卷湯火門

五味異功散 治見論

方見四十二卷發熱門

七味白朮散 治見論

方見四十三卷泄瀉門

六君子湯 治見論

方見四十二卷發熱門

四君子湯 治見論

方見四十三卷發熱門

人參安胃散 治見論

普門醫品 口瘡

方見四十五卷發熱門

溫胃散 治見論

丁香人參半夏肉豆蔻白朮乾薑甘草各二錢為

末每服一錢薑一片煎服

瀉黃散 治見論

方見四十二卷發熱門

牙疳門

論小兒疳積熱上蒸于齒齦腫生瘡亦有胎毒

臟熱及母食膏粱或七情鬱火所致者須調其母

若發熱作渴額間赤色者屬心經用導赤散清心

火用六味地黃丸滋腎水若寒熱作渴左頰青赤

為肝經用柴胡梔子散清肝火用六味地黃丸生

肝血若兩腮黃赤牙齦腐爛大便酸臭為脾經用

四味肥兒丸治脾火以異攻散補脾氣又有走馬

牙疳因脾胃氣血傷損虛火上炎或痘疹傷寒餘

毒上攻其患甚速急用銅絲散大煎黃湯輕則牙

齦腐爛重則透頰穿腮若飲食不入喘促痰涎頻

普門醫品 牙疳

腮黑腐不知痛者此胃氣虛甚而肉死也俱不治

(通治)二十方

神效無比散 治口內諸疳如神大人小兒皆効

用雀兒糞 治口內諸疳如神大人小兒皆効

個各入珍珠一粒糊少許塞口紅瘡用紅粉白瘡

用白粉以棘針二個簽住下炭火上燒存性為極

細末先以米泔漱淨傳上神効

雞內金散 治小兒牙根臭爛黑色有蟲作痛

雞脆內黃皮炙乾為末一兩銅青一錢麝香一字

白芷五錢為極細末用鹽水漱口傳之

立効散 治牙疳

青黛黃礬^音枯礬五倍子各等分為極細末先用米泔漱口貼之保嬰撮要

又方

黃連^{盧舍}等分研敷走馬疳入蟾灰等分敷之青黛減半麝香少許簡便方

又方

膽礬燒烟盡研末摻之二三日愈集簡方

普門醫品

牙疳

卷五 三

又方

麻子嚼傳之日六七度子母秘錄

又方

鴨嘴膽礬一錢匙上煨紅麝香少許研勻傳齦上

立効活幼口疳

真黃散 治走馬牙疳

雞胞內黃皮不拘多少油燈上燒存性研極細末入黃礬枯礬末少許麝一字用米泔漱過傳之

又方

蟬子連肉燒存性研末傳之

燒鹽散 治走馬牙疳肉潰黑爛

橡斗大者兩個合為一個人指填滿共五六個安炭火上煨鹽煨透取出放地上以瓦器定時火毒候冷取為末入麝香少許同研極細末泔漱口敷貼用磁罐盛勿用紙裝以鹽作潤也

走馬牙疳侵蝕口鼻

乾蚶殼黃泥固煨黃連各二錢五分黃礬一錢為末入麝少許和研傳之鄭氏小兒方

普門醫品

牙疳

牙疳鼻疳

梔子不拘紅黑燒存性白礬枯尿桶白城燒過等分為末研勻搽之神効簡便方

又方

熊膽半分湯化抹之聖惠方

導赤散 治見論

方見四十一卷發摘門

異功散 治見論

方見四十二卷發熱門

四味肥兒丸 治見論

大熱黃湯 治見論

二方見四十四卷諸病門

六味地黃丸 治見論

方見四十五卷虛癰門

紫胡梔子散 治見論

方見四十六卷頭面瘡門

銅綠散 治見論

銅綠三錢 膽礬一錢 生白礬五分 麝一分 為細末

青門醫品

牙痛

養天 活

擦患處

舌病門

論舌下腫出如舌謂之重舌又謂之子舌皆心脾

二經熱壅所致蓋心脉系舌本脾脉絡舌旁一云

肝脉絡舌本肝熱則舌腫而硬謂之木舌忽然腫

起透巡間即能殺人惟砭鉞刺去血為上法

通治 十方

小兒重舌

馬牙消瘡 塗舌上下日三次 如手泉方

又方

黃蘗煎浸竹瀝點之 千金方

又方

桑根白皮取汁塗乳上吮之或以黃丹一豆大安

舌下 子母秘錄

又方

以亂髮灰半錢調傅舌下時時用之 簡要集衆方

重舌涎出水漿不入

青門醫品

舌病

養天 三

太陰玄精石二兩牛黃朱砂龍腦各一分為末以

針刺舌上去血鹽湯漱口擦末嚥津神効 聖惠方

小兒重舌驚口

竹瀝同焰消點之 普濟方

又方

桂末和薑汁塗之 楊氏寶書

重舌木舌

僵蠶為末吹之吐痰甚妙或以僵蠶一錢黃連蜜

炒二錢為末擦之涎出即愈 續德堂方

小兒本舌

黃芩末化爲末一錢黃丹五分傳之直指方

馬牙消丸 治木舌腫腹

馬牙消三錢鉛霜寒水石太陰玄精石大黃炒各

半兩麝香少許白礬枯甘草炙各一錢各研煉蜜

丸雞頭子大每用一九食後薄荷湯研化徐徐服

又方

蛇蛻燒灰乳和服少許千金方

舌腫滿口不能出聲

普門醫品

舌病

卷五 三

用真蒲黃末摻之良徐氏醫鏡

舌腫脹出口外

用紙捲蘸蓖麻油燈上燒煙熏之即消千金方

重齕

蛇蛇醋調傳之聖惠方

普門醫品卷之四十七

東武王化貞元起父編輯

門人 斌憲卿父較閱

大便秘

論要百問云小兒大便不通乃肺與大腸有熱

以致秘結不通用四順清涼飲之類若飲食夾驚

及積滯而不通者用大連起湯驚風積滯而不通

者用掩臍法此皆治實熱之例也若乳母背梁厚

普門醫品

大便閉

卷五

味所致宜用清胃散以治其母兒亦服一二匙

通治 十三方

掩臍法 治小兒大小便閉

螺螄二十一個黑豆七粒葱根七個鹽少許搗如

泥作餅烘熱掩臍上以帛勒之真玉方

小兒大小便不通并驚熱痰食欲得清動者

大黃酒浸煨郁李仁去皮研各一錢滑石末一兩

搗和丸黍米大二歲小兒三丸量人加減白湯下

錢乙直訣

大柴胡湯 治小兒飲食停滯大便不通腹痛發熱

用柴胡枳實麩炒各二錢二分生夏製一錢五分

赤芍藥一錢八分黃芩酒炒二錢大黃製三錢半

每用二錢薑一片棗一枚水半鍾煎三分服

大連翹湯 治胎熱黃熱大小便不通

連翹麥門冬各二錢通草一錢黃芩酒洗防風柴胡

滑石飛大黃甘草各一錢山梔子炒黃芩酒炒各

五分爲末每服二錢加紫草三分水半盞煎三分

熱服

普門醫品 大便閉

四順清涼飲 治小兒血脈壅實臟腑蓄熱煩赤作

渴大便不通小便赤澀

赤芍藥當歸酒洗甘草大黃製各等分每服一錢

水半鍾煎二沸作兩服

神芎丸 治全上

大黃生黃芩各一兩生牽牛末五錢滑石飛二兩

連翹薄荷葉川芎各三錢爲末糊力梧子大每服

五丸水化下

小兒大便虛閉

葱白三根煎湯調生蜜煉膏服仍以葱白末

塞插入肛門內少頃即通

大便不通至急者

烏梅十枚湯浸去核煎藥大油珠納入肛門少時

即通

小兒初生鎖肚證

由胎中熱毒結于肛門生後閉而

不通至三日者

急令婦人嘔兒前後心手足心并臍七處四五次

以輕粉半錢蜜少許溫水化開時與飲少許以通

爲度

小兒初生大小便不通

真香油一兩皮消少許同煎滾冷定徐徐灌入口

中

又方

甘草枳殼煨各一錢水半盞煎三分

又方

慈汁入乳各半調勻抹口中同乳哺下即通

清胃散 治見論

小便閉門

附遺尿

論東垣云小便不利有在氣在血之分在氣分則必渴宜用淡滲之藥茯苓燈心之類在血分則不渴宜用氣味俱厚之藥黃藥地黃之類故大便泄利而小便澀少者為津液滲于大腸宜急利若熱蘊下焦津液燥而小便不行者宜滲泄肝虛不能傳送肺虛不能生化者宜用補中益氣湯滋其

醫門醫品

小便閉

卷五十四

化原

通治

十二方

掩臍法 治小兒大小便閉神効

連翹葱白三莖帶土生薑一塊俱不洗淡豆豉四十九粒搗二匙同研爛作餅銚內烘熱掩臍中帛札定良久氣通自利不然再換一劑無有不通

嬰機要

捻頭散 治小兒小便不通

玄胡索炒苦楝子太核等分為末每服半錢以捻

頭湯

即食子

食前調下如無捻頭滴油數點于內

小兒直訣

又方

用大蔥白切四片入乳汁半盞同煎片時分作四服即通不飲乳者服之飲乳若臍四旁有青黑色及口撮者不可治 全幼心鑒

又方

芫荽二兩葵根一兩水二碗煎一碗入滑石末一兩再煎滾分三四次服 聖濟總錄

醫門醫品

小便閉

卷五

小便不通脹急欲死

苦瓠子三十枚炒螻蛄三枚焙為末每以冷水調服一錢立通 聖濟總錄

水通散 治小便不通小腹作疼

水通滑石各一兩牽牛半兩炒為末每用二錢加燈心十根葱白一莖水半鍾煎二湯空心服

梔子仁散 治小便不通臍腹脹悶心神煩熱

梔子仁五枚草根冬葵子各半兩甘草炙二錢為末每服一錢水半鍾煎二湯空心服

八正散 治臨熱咽乾口躁心忪面熱目赤尿赤

咽生瘡小便赤同及熱淋血淋

車前子炒薤白大黃煨山梔滑石飛扁蓄木通耳

草炙等分爲末每服二錢入燈心十根水半鍾煎

二沸食前服

初生小兒尿澀不出

車前草搗汁入蜜少許灌之 全幼心鑒

初生小兒七日不小便

葱白三寸人乳三匙同搗如泥傅兒口內卽與乳

普門醫品

小便閉

集卷七 六

吮保嬰撮要

又方

安爐于臍中以艾灸之 素性論

補中益氣湯 治見論

方見四十二卷發熱門

附遺尿

論小兒遺尿爲腎與膀胱之氣虛寒不能約制故

睡中遺尿內經謂膀胱不約爲遺是也

通治

湯氏雞腸散 治小便不禁睡中遺出

雞腸草一兩切爲三分三錢龍骨煨麥門冬去心白

茯苓桑螵蛸各半兩爲末每服一錢茶一杓水

半鍾煎三分服

破故紙散 治全上

破故紙爲末每夜臥時服五分熬湯下 嬰童百問

又方

大甘草頭煎湯夜夜服之 危氏得効方

又方

普門醫品

小便閉

集卷七 七

小豆葉搗汁溫飲 本草綱目

又方

用紙一張鋪席下待尿于上取紙晒乾燒研酒服

卽止 集簡方

又方

五倍子炒焦爲末每服半錢白湯調下或糊丸綠

豆大米湯送下二十九

又方

桂末雄雞肝等分搗丸小豆大溫水送下二三十

九日二服念

淋證門

論小兒諸淋者腎與膀胱熱也膀胱熱則津液內
澀水道不通腎氣熱則小便淋漓或少腹引臍而
痛亦有因姪母肝熱及乳母悲怒者當無調其母
仍參小便不通治之不可輕用滲泄寒涼之藥損
其胃氣

通治 十一方

淋痛 卷七 八

五効散 治小兒諸淋莖中作痛

木通甘草王不留行胡荽滑石飛海金砂山梔子
炒檳榔各等分每服一錢水半鍾煎三分空心服

小兒石淋

取特牛陰頭毛燒灰漿水服二錢日再 張文仲方

小兒血淋

雞矢矢白如粉者炒研糊丸綠豆大每服三五丸

酒下四五服効 本草綱目

金砂散 治小便淋漓不通

鬱金海金砂滑石飛海金砂各等分每服一錢煎

地膚子湯調下燈心木

五淋散 治膀胱有熱水道不利小腹腫脹

赤茯苓赤芍藥各五分山梔子炒當歸各三分甘

草二分燈心十根水半鍾煎二沸服

又方

冬瓜煎水時與食之並治內熱口渴小便不通

又方

大蒜淡豆豉等分蒸餅搗丸綠豆大溫水下三十

淋痛 卷七 九

丸三日病已 談夢

導赤散 治心經蘊熱淋瀝多驚

方見四十一卷發摘門

小兒尿血

甘草一兩二錢水一瓊煎四分一歲兒此藥一日

服盡 姚和衆方

又方

升麻五分水半鍾煎三分服之 姚和衆方

又方

兒茶爲末一錢。薑黃煎湯送下。

脫肛門

論巢氏云。實熱則大便閉結。虛寒則肛門脫出。此多因吐瀉後。脾氣虛。肺無所養。故大腸之氣虛。脫而下陷也。若脫出。緋赤或作痛者。血虛而有熱也。用補中益氣湯。佐以四物。牡丹皮。微赤。或作痛者。氣虛而有熱也。佐以四君。牡丹皮。大凡手足指熱者。屬胃氣熱。手足指寒者。屬胃氣寒。

普門醫品

脫肛

卷五

肛門癢者。或濕熱壅滯。或濕毒生蟲。而蝕肛門。凡小兒齒齬無色。舌上盡白。四肢倦怠。其上唇內有瘡者。此蟲在上食臟。若下唇內有瘡。此蟲在下。熱肛門。若蝕肛透肉者。不治。

通治 十三方

小兒脫肛

五倍子爲末。以艾鋪紙。同倍子。捲成筒。尾感放便桶內。以炭火點燒。使煙氣熏肛門。其肛自上。隨以白礬末搽肛門。則不復脫。

又方

防風。荆芥。煎湯洗。用蜜陀僧。白礬。水片少許。傳之。

又方

蓖麻子研成膏。貼肛門。即收。上急以水洗去。

又方

五倍子煎湯。入明礬末熏洗。即縮上。用苦參湯洗。亦効。

又方

荆芥。皂角。等分。煎湯洗之。以鐵漿塗上。亦治子宮。

普門醫品

脫肛

脫出神効 經驗方

又方

縮砂仁炒研。以猪腰子一個。破開。摻末在內。縛定。煮熟。食。次服白礬丸。如喘腫者。不治。

白礬丸 治全上

括婆一個。白礬五錢。在內。固濟。煨存性。爲末。糊丸。

綠豆大米。下二十五丸。

龍骨散 治嬰兒大腸虛。肛門脫出。

龍骨一錢半。訶子煨太核。沒食子忌銅。赤石脂火。

煨醋淬罌粟殼太筋醋炒各二錢為末每用二錢

米飲調化食前服

滋腸散 治小兒久瀉腸頭脂出

訶子炮去核赤石脂火煨醋淬龍骨煨等分為末

臘茶少許和藥摻服頭上頂帛探入 係與神聖

化蟲丸 治小兒濕熱生蟲用門作瘰

方見四十八卷諸蟲門

補中益氣湯 治見論

方見四十二卷發熱門

香門醫品

服法

卷五 七

四物湯 治見論

方見三十三卷調經門 各減半用

四君子湯 治見論

方見四十五卷虛癰門

煩渴門

論仲景云火入于肺則煩入于腎則躁煩者心中煩擾為內熱故陽躁者或煩躁或躁身欲入井中為外熱故陰外熱者無根之火也是以為

虛凡小兒當辨其嘔煎不安是煩嘔嘔不定是躁

嘔煎者心經有熱煩滿生驚嘔嘔者心經有風煩

躁驚搖也煩而口乾咽燥不渴者虛也用四君加

芩歸煩而不得眠者酸棗仁丸血虛發躁當歸補

血湯

百問云小兒舌紅如丹即發渴紅甚焦黑則危篤

暑熱及傷寒後焦渴者用白虎湯下痢脾虛作渴

者用七味白朮散小便秘渴者用五苓散并證及

發熱渴者各詳本證若誤用寒涼降火脾胃復傷

香門醫品

煩渴

卷七 三

則腹脹而為敗證矣

通治 七方

竹葉石膏湯 治小兒煩躁作渴

石膏半生半煨一錢半夏製三分甘草人參各二

各二分麥門冬各心十粒竹葉一握水半鍾煎二

沸入生薑汁一匙溫服

小兒熱渴煩躁不止

葛根半兩水煎服或以葛粉作粥服 聖惠方

瀉心湯 治心經實熱口舌生瘡煩躁發渴

用黃連犀角各一錢水半鍾煎二沸服

絳雪丹 治小兒陽盛狂躁不安目赤煩渴

芒消朱砂各一兩為末蒸餅為丸雞頭子大三歲

見一九沙糖水下

當歸補血湯 治肌膚燥熱目赤面紅煩渴晝夜不

息為血虛發躁候服曰虎湯必死宜此主之

黃耆蜜炙當歸酒洗各一錢水半鍾煎三分服

清熱解毒散 治五疳積熱咽痛眼赤唇乾口燥兩

頰生瘡怔忡悶亂煩躁而渴飲食不下

普門醫品

煩渴

卷之七

寒水石石膏各四兩半生半煨為末黃芩二兩飛

過晒乾再研和勻水浸蒸餅為丸如蒸餅大每服

一丸食後新井水化下一切中毒并宜服之

白虎湯 治傷寒或吐下後邪毒不解熱結在裏舌

燥發渴及中皆汗出身熱而渴

知母一兩半甘草炙五錢石膏四兩半生半煨另

研糯米一大合為末每服二三錢水煎米熟為度

橘皮湯 治煩燥發熱而嘔

橘皮一兩甘草二錢二分人參去蘆一錢竹茹二

錢半麥門冬去心一錢半每服四錢水一鍾煎四

分服

小兒病時飲水不已

桑葉不拘多少細切入蜜少許煎汁代茶時時飲

之勝金方

五苓散 治多飲水而渴不止小便不利

白茯苓白朮土炒各一兩猪苓澤瀉各六錢官桂

二錢每服二錢水半鍾煎三分服

小兒面赤唇乾咬牙口渴小水短赤

普門醫品

煩渴

卷之七

木通生地黃炙甘草各五分竹葉七片水半鍾煎

二沸服錢氏方

酸棗仁丸 治見論

茯神酸棗仁炒遠志製柏子仁炒防風枳殼麩炒

各半兩生地黃枳實半兩竹茹二錢五分各研細

蜜丸黍米大每服七八丸白湯下

四君子湯 治見論

方見四十五卷虛癰門

七味白朮散 治見論

方見四十三卷泄瀉門

雜證門

論小兒諸病可與大人科通用者各有專門不復一一具錄其有一二方原爲小兒設者總綴于此以備檢用

通治二十八方

小兒盜汗

麻黃根爲末三分故蒲扇燒灰一分爲末以乳服

普門醫品

雜證

卷七

十六

之日再仍以炒乾薑三分同爲末撲之古今錄驗

小兒出汗不止

雷丸四兩米粉半斤研細撲之千金方

小兒自汗盜汗潮熱往來

胡黃連柴胡等分爲末蜜丸艾子大每用一大水化開入酒少許重湯煮一二沸溫服保幼大全

小兒黃腫

韭根搗汁用滴鼻取黃水効子母秘錄

小兒黃疸

青瓜萆薢研每服一錢水半盞煎三分服五更瀉下黃物卽愈普濟方

又方

生括萆薢搗汁一小鍾蜜二大匙和勻溫服一日一服黃利方

小兒浮腫

絲瓜燈心葱白等分煎濃汁服并浴之普濟方

小兒頭面陰囊俱浮

使君子仁一兩蜜五錢炙之蜜盡爲末每食後米

普門醫品

雜證

卷七

十七

湯調服一錢簡便方

小兒下血

五倍子末艾湯調服一錢鄭氏方

又方

甌帶燒灰塗乳上與兒啞之外臺秘要

小兒陰腫

以葱椒湯暖處洗之唾調地黃末敷之或加牡蠣

末少許危氏方

小兒陰腫赤疼日夜啼哭數日退皮愈而復作

老杉木燒灰入膩粉清油調傳効危氏新方

又方

蜥蜴一枚燒灰酒服外臺秘要

小兒陰腫多因坐地風濕及蟲所吹

蟬蛻半兩煎水洗仍服五苓散腫消痛止危氏方

五苓散方見本卷煩渴門

小兒卵腫

地龍糞以薄荷汁和塗之危氏得効方

小兒腎囊乃物生受寒所致

醫門醫品

雜證

卷之六

吳茱萸硫黃各半兩同大蒜研塗其腹仍以蛇床

子燒烟熏之聖惠方

小兒卵癰

桃仁炒香爲末酒服一錢仍傳之外臺方

膀胱氣痛

蕪荑食鹽等分搗和以綿裹如棗大納下部或下

惡汁及下氣佳外臺秘要

臍汁不乾

物生臍帶燒研當歸頭末各一錢麝香一字搽之

生切心

小兒風癆作瘡

白礬燒灰熱酒中以馬尾作團藥擦之子母秘錄

小兒遍身瘡癩

生薑搗爛布擦之即止小兒秘要

風癆癰瘡作瘡成瘡

蘆沙一斤水二斗煮一斗去渣避風洗浴或以白

僵蠶焙研酒服一錢立効聖惠方

小兒皮膚如蛇皮魚鱗之狀

醫門醫品

雜證

卷之六

白僵蠶去嘴爲末煎湯浴之或加蛇蛻保幼大全

小兒四五歲不語者

赤小豆末酒和傳舌下千金方

二聖散治小兒風痰癰閉語音不出氣促喘悶手

足動搖

訶子半生半炮太核大腹皮製各一錢水半鍾煎

三分服全嬰心鑑

小兒三歲不能行者

五加皮五錢牛膝木瓜各二錢半爲末每服五分

米飲入酒二匙調服全切心璧

小兒龜背龜胸

以龜尿摩其胸背久久即瘥孫真人方

小兒夜間狂語

竹瀝夜服二合姚和衆方

普門醫品

雜證

卷之四十八

普門醫品卷之四十八

東武王化貞元起父編輯

門人陳斌憲卿父較閱

諸蟲門

論巢氏曰。蛭蟲者九蟲之一也。長尺許。或五六寸。因臟腑虛冷。及食甘肥而動。動則腹中攻痛。或作或止。口吐涎水。用使君子丸之類下之。

錢仲陽云。吐沫心痛者蟲痛也。安蟲散主之。

普門醫品

諸蟲

卷之四十八

田氏云。蟲痛者啼哭俛仰。坐臥不安。自按心腹。時時大吐。面青唇白。目無精光。口吐涎沫。此蟲蝕下部下唇有白點。蟲蝕上部。上唇有白點。蟲在腹中。望前蟲頭向上。望後蟲頭向下。如用打蟲藥。先以猪肝油炙香。或以煎肉食之。令蟲聞香。頭向上。用藥乃効。若中氣虛而蟲不安者。但調補脾胃則安。冬月吐蛭。多是胃氣虛寒。用白朮散加丁香二枚。許叔微云。五臟蟲皆上行。惟有肺蟲下行。最難治。當用獾爪炒為末。子初四初六日米飲調服。蓋惟

此二日肺蟲上行也

治二十方

一切蟲病

狼毒杆末每服一錢用鹽一皂子大沙糖少許以

水化開臥時空腹服次早蟲即下

集効方

又方

生蕪荑生煨榔等分爲末蒸餅九梧子大每服二

十九白湯下

本草方

蛇蟲

普問醫品

諸蟲

卷八

二

苦楝皮二兩白蕪荑半兩爲末每用二錢水半鐘

煎二沸服

又方

露蜂房燒存性酒服一匙蟲即死出

生生編

又方

雷丸水浸去皮切焙乾爲末五更初食炙肉少許

以稀粥飲服一錢須在上半月服方効

經驗方

又方

酸石榴東引根一握洗剉水三升煎取半碗五更

溫服至明取下蟲一大團食粥補之

本草綱目

又方

苦楝根皮同鷄卵煮蒸空心食次日蟲下

集簡方

又方

馬齒見水煮一盞和鹽醋空心食之少頃蟲盡出

食療本草

寸白蛇蟲

胡粉炒燥一錢入肉湯空心調服大効

備急方

又方

普問醫品

諸蟲

卷八

三

日食榧子七顆滿七日蟲化爲水

方

又方

先食炙熟猪肉一片乃以沙糖水調黑鉛灰四錢

五更服之蟲盡下食白粥一日再服病錯雜服

此下二蟲長二尺五寸節節有斑文

事方

小兒蟲嚙心腹疼

鴉風研末以肥猪肉汁下之五歲每服二分蟲出

即止

李時集

便君子丸 治腹中蛇蟲文痛或作或止口吐涎水

安蟲散 治心口蟲痛吐沫

二錢半爲末，煎服三五分，米飲調下。

使君子仁爲末五更米飲調服一錢

正門限品

諸君

卷四

四五十忌酒肉

白蕪莫乾漆燒存性等分爲末米飲調服半錢多

者一錢杜玉方

蛻蟲上行出于口鼻

烏梅煎湯頻飲并食之卽安

凡腸頭作癢卽有蟲

用生艾川棟根煎湯熏洗

胡粉苦楝根各半面明礬二錢五分半

此藥爲末。麪糊丸。綠豆大三歲以上三十丸。熱

小蟲皆化爲水。大蟲自利下。

異功散調理 保嬰撮要 異功散方見四十一

大學

慢吞馬螻腹痛

用田中泥爲丸。水吞下。其蟲隨吐瀉出。

白朮散
治見論

普門醫品

清遠

卷之五

人參去蘆白朮炒白茯苓藿香乾葛甘草炙各五
分水一鍾煎四分入木香二分調勻服

諸瘡問

論癰疽腫毒業有專科大人小兒可以互用其有

小兒之瘡與大人異者俱錄于此以便考

通治三十二方

小兒諸瘡惡瘡九瘡癰疽疥癩

棟樹皮或枝灰煎之

四味肥兒丸 治小兒發熱身生瘡疥少瘰癧

方見四十四卷諸疳門

肥兒清肝散 治頭面遍身生瘡疥癰腫水淋漓或發寒熱

方見四十六卷頭面疳門

小兒爛瘡遍身破爛赤腫者

生鐵燒淬水中五七遍浴之 本草綱目

又方

桃仁研爛敷之 子母秘錄

醫門醫品

諸瘡

卷八 六

小兒爛瘡

艾葉燒灰敷之 子母秘錄

又方

牛屎燒灰封之止滅瘰癧 千金方

小兒濕瘡

地榆煮濃汁日洗三次 千金方

小兒頭上肥瘡或瘰癧成瘡膿水不止

細茶三錢入水銀一錢研牙皂花椒各二錢油敷

小兒遍身膿瘡不乾

黃檗音爲木入枯礬少許研勻搽之 楊起簡便方

小兒遍身生瘡有蟲久不愈

真柏油化塗舊絹衣上與兒穿次日蟲皆出別以柏衣與穿更易數次以蟲盡爲度 集簡方

小兒面生瘡如火燒狀

以黃梁米研粉和蜜水調塗以愈爲度 外臺方

小兒熱瘡蔓引半身晝夜啼號

鷄子五枚煮熟去白取黃又亂髮如鷄子大相和於鐵銚中炭火炒之粉甚乾少頃髮焦即有液出

醫門醫品

諸瘡

卷八 七

旋取置碗中以液盡爲度取塗瘡上即以苦參爲末傳之 劉禹錫傳信方

小兒瘰癧一名火爛瘡

吳茱萸煎酒拭之良 兵部手集

小兒臍腫

荊芥煎湯洗淨以煨葱出火毒貼之即消 海上方

小兒臍腫出汁不止

枯白礬爲末敷之 聖惠方

小兒臍瘡

以伏龍肝研細敷之聖惠方

又方

既帶燒灰傳之子母秘錄

臍瘻不乾

綿子燒灰敷之傳氏活嬰方

小兒瘰癧

冬葵根燒末敷之外臺方

又方

嚼澤蘭心封之愈子母秘錄

普門醫品

諸瘡

卷八

小兒瘰癧

榆皮取白者裏一層生搗如泥封之頻易必效方

小兒熱癰

以竈心土花椒末等分醋和塗之千金翼方

又方

油麻炒焦乘熱嚼爛敷之譚氏小兒方

小兒楊梅起于口內延及遍身

用土茯苓為末乳汁調服月餘自愈外科發源

小兒疥癬

用藥水煎湯浴之并浣衣

小兒瘰癧

白膠黃蘗音輕粉等分為末羊骨髓和敷之儒門事親

又方

猪脂和輕粉研勻搽之直指方

又方

蟾蜍燒灰猪脂和傳外臺方

小兒風癰

普門醫品

諸瘡

卷九

蛇床子為末和猪脂塗之千金方

牛皮惡癬

五更食炙牛肉一片少刻以輕粉半錢溫酒調下直指方

預免瘰癧

每年六月六日照年歲吞皂莢子可免瘰癧之患

大人可吞七枚或二十一枚扶壽方

瘰癧門

辟穢附

麻疹附

論瘡二科。幼科中之最難者也。非閱全書。不足以盡其變。今錄其試驗。而可通用者耳。

治六十方

痘毒發熱三四日。隱隱將出未出色。赤便閉。煩燥不寧者。

紫草一兩。剉以百沸湯一盞。泡封不泄氣。待溫時服小半盞。瘡出自輕。大便澹者不用。經驗活方

痘出不快

煎荔枝殼湯飲之

本草綱目

普門醫品

痘疹

卷八 十

又方

以乾葡萄食之。或泡水飲。甚効。蘇頌

又方

山查爲末五分。湯點服之。立出紅活。危氏得効方

又方

揀經霜老絲瓜。取近蒂三寸。燒存性。入硃砂末。蜜

水調服甚効。多者令少。少者更稀。直捷方

又方

乳香研細。猪心血和。九莢子大。每一丸溫水化下。

內托散 治瘡毒內陷伏而不出。或出而不快。

黃耆蜜炙。人參當歸各錢半。川芎防風。桔梗白芷。各半。各八分。厚朴六分。赤芍三分。水煎服。瘡生

紅紫。加紫草紅。白者加丁香官桂。

消毒快斑湯 治發熱一二日。痘即一齊湧出。爲毒

氣太盛。無所制。伏宜解毒救裏。方免黑陷。

桔梗甘草。節荊芥穗。牛旁子。防風。當歸。尾酒洗。赤

芍藥。天花粉。黃芪。蜜炙。連翹。前胡。木通。各七分。用

水鍾半煎八分溫服。

普門醫品

痘疹

卷八 十一

痘瘡不起發

烏雞冠血和酒漿服。發痘最佳。痘疹正宗

又方

韭根煎湯服之。海上方

又方

用李樹上津膠。少許。熬水飲之。即起。補遺秘方

小兒血氣虛弱。瘡疹不起。及黑陷。

紫草甘草。炙黃耆。炙糯米。各錢半。水一鍾煎四分

服。陳文中方

痘疹已出未盡煩燥不寧吐腹疼

白芍藥一兩酒炒爲末每服一匙糯米湯調下
枝湯亦可陳文中方

痘毒治法白泡忽插入腹漸作紫色無膿日夜啼

川芎金一錢甘草二錢半水半盞煮乾去其草

片焙研爲末入片腦少許每用一錢猪心血數滴

新汲水調下不過二服麗安方

痘出數日頂陷漿滯不行或風寒所阻者

用水楊枝葉無葉只用枝亦可約五斤長流水一

普門醫品

痘疹

卷八 主

鍋煎湯于避風處熱熏溫浴之如冷添湯良久照

見雲起有暈者是漿行也如不滿再浴之力弱者

只洗頭面手足如屢浴不起者氣血敗矣不可再

浴初出及癢塌者皆不可浴蓋痘不行漿乃氣滯

血滯腠理固密或風寒外阻而然浴之令暖氣透

達和暢鬱蒸氣血通徹隨暖氣而發行漿貫滿功

非淺也若內服助氣血藥藉此升之其效更速風

寒亦不得而阻之矣曾見一姬在村中用此有驗

即得此方用之百發百中慎勿易之時珍方

紫背荷葉散 治風寒外感痘出不長或變黑色

爲爛身疼四肢微厥宜溫肌散邪則熱氣復行而

毒自出萬無一失

霜後荷葉貼水紫背者炙乾白僵蠶直者炒去絲

等分爲末每半錢用胡荽煎湯或酒調下痘疹方

凡痘瘡變黑或青紫平陷者爲倒靨

人齒以瓦礫固濟煨過出火毒研末出不快而頂

陷獐猪血調下一錢因服涼藥或風寒外襲倒陷

者入麝香少許溫酒服之神效痘疹論

普門醫品

痘疹

卷八 主

痘瘡倒靨

刺猪尾取血一匙調龍腦少許新汲水服時珍方

又方

人牙猪牙猫牙狗牙等分火煨研末蜜水調服一

字痘疹論

又方

乾膳脂三錢胡桃燒存性一箇研末胡荽煎酒調

服一錢頃之再服取效救急方

又方

用狗一隻餓二日。餵以生粟米。候下屎取未化米爲末。入麝香少許。新汲水服二錢。保幼大全

又方

狗蠅七枚去翅足研爛。入酒少許調服。卽時起發紅潤。時珍方

又方

胡桃肉一枚燒存性。乾胭脂半錢。研勻。胡荽煎酒調服。儒門事親

又方

諸門醫品

痘疹

卷八 痘

牛黃一字。硃砂二分研末。蜜浸臙脂取汁調搽。一日一上。王氏痘疹方

又方

臘月收人中黃。火煨爲末。溫水服三錢。陷者自出。儒門事親

痘疹變黑

穿山甲蛤粉炒爲末。每服五分。入麝香少許。溫酒服。卽發紅色如神。直指方

痘疹乾黑危困者

山查爲末。紫草煎酒調服一錢。全幼心鑑

痘疹倒陷。毒氣壅遏于裏。便血昏睡。其證最惡。

抱出雞子殼去膜。新瓦焙研。每半錢熱湯調下。嬰兒以酒調抹唇舌。金風池胸背 本草綱目

痘疹黑陷

沉香。檀香。乳香。等分。燒于盆內。抱兒于上熏之。卽起。鮮于權鉤立

又方

臘月收獾猪心血。瓶內陰乾。每用一錢。入龍腦少

諸門醫品

痘疹

卷八 痘

許。研勻。酒服。須臾紅活。神効。如無乾血。卽用生血。沈存中方

痘疹復陷

十二月老鴉左翅。辰日燒灰。用獾猪血和。在茨子大罇服一丸。貴州尾山同溫水化服卽出 痘疹方

四聖丹 治痘中有疔。或紫而大。或黑而臭。或中有

黑線。此證十死八九。牛都御史秘傳此方。點之最妙。

用豌豆四十九粒。燒存性。頭髮燒灰三分。真珠十

四粒。炒研爲末。以油臙脂同研成膏。先以銀簪挑

疔破令乳母以口吮去惡血淨用少許點之即時

變紅活色本草綱目

痘瘡入口

豬蹄甲燒灰浸湯濾淨洗之甚妙普濟方

又方

豬懸蹄三兩瓦礫固濟煨存性蟬蛻一兩羚羊角

一錢各爲末每歲一字三歲以上二錢溫水調服

一日三服錢氏小兒方

又方

普門醫品

痘疹

卷八 十六

鷄心檳榔以水磨汁燈心蘸點之聚奎南方

痘瘡入目羞明生翳

畢燈茄研吹少許入鼻中三五次効飛鴻集

又方

番木鱉半個輕粉銀硃各五分片腦麝香枯礬少

許各研細每用一字吹耳左患吹右右患吹左鴻方

又方

又方

浮萍陰乾爲末羊子肝半個水半盞煮熱搗爛絞

汁調服甚者不過三服已傷者十服見効危氏方

又方

白柿音日日食之良本草綱目

防痘入目

新綠豆一合用新汲水三盞浸一晝夜去豆不用

以浸豆水入紅花一兩煮落一盞濾淨入黃檗音

一兩甘草二兩俱細末慢火熬成膏子每用眼眶

上下厚塗之則痘毒自不入眼經驗秘方

又方

普門醫品

痘疹

卷八 十七

用臘脂汁點之集簡方

痘疹入喉

牛旁子二錢桔梗一錢半粉甘草節七分水煎服

痘疹要訣

痘瘡稠密煩渴

用生犀角于磁器中以新汲水磨濃汁冷飲之錢氏方

又方

痘瘡脹疼

白芍藥酒炒爲末酒服半錢痘疹方

痘疹煩熱

人中白研末自湯調服二錢 痘疹便覽

痘疹煩熱發渴不止宜用七味白朮散勿服涼藥

方見四十三卷泄瀉門

痘瘡煩燥

大豆煮汁飲之佳 子母秘錄

痘瘡狂躁心煩氣喘妄語或見鬼神瘡色未透者

龍腦一錢細研以猪心血丸芡子大每服一丸紫

草湯下少時心神便定得睡瘡發 經驗方

普門醫品

痘疹

卷四十八

痘瘡便閉

肥猪肪臙水煮熟切如豆大與食自然臟腑滋潤

瘡痂易落 陳文中方

痘瘡作癢

蟬蛻二七枚甘草炙各一錢水煎服之 全幼心鑑

痘疹作癢難忍搔成瘡及欲落不落

上等白蜜沙和時時以絹掃之其痂易落自無癢

痕 全幼心鑑

痘瘡潰爛

野外臥久乾牛尿色白者燒灰敷之或摻於席上
臥之即易結痂而無癢痕 本草綱目

又方

蕎麥粉頻敷之 痘疹方

又方

黑大豆研末敷之 本草綱目

暑月痘瘡潰爛不能著席臥者

用夾梘盛懸簾臥性涼而軟甚妙 時珍發明

痘瘡汗蝕服水不絕

普門醫品

痘疹

卷四十八

蛻空蠶繭以生白礬末填滿煨枯研細搽之甚効

陳文中方

痘爛生蛆

嫩柳葉鋪席上臥之蛆盡出而愈也 李橫奇方

痘痂不落

羊飼骨隨煉一兩輕粉一錢和膏塗之 陳文中方

又方

沙糖調新汲水一盃服之白湯調亦可日二服 劉

提點方

痘後癰毒

赤小豆為末。鷄子白調敷。或加綠豆黑豆等分為末。醋調時時搽塗。即消。本草綱目

附錄 十方

預解胎毒可免出痘

三伏日。剪壺盧鬚如環子。脚者。陰乾。除夜煎湯浴兒。則可免。一連三年作之。終身不出。唐孫經驗方

又方

除夕黃昏時。用大黑魚一尾。小者二三尾。煮湯浴

普門醫品

痘疹

卷八 二十

兒遍身七竅俱到。若嫌腥。另以清水洗去。不信但留一手不洗。遇出痘時。未洗處偏多。乃異人所傳。不可輕易。醫方摘要

又方

五六月取絲瓜蔓上卷。曬陰乾。至正月初一日子時。用二兩半煎湯。父母只令一人知。溫浴小兒身。面上下。以去胎毒。永不出痘。縱出亦少。體仁彙編

又方

白鴿卵一對。入竹筒封置。貯坑中。半月取出。以州

白和飛過辰砂三錢。九綠豆大。每服三十九。三豆湯下。毒從大小便出。未不出痘。或出亦稀。滿江方

又方

臘月八日。取兔頭煎湯浴兒。令出痘稀。飲膳正要

又方

用橄欖一箇。燒研。朱砂飛五分。和勻。嚼生脂麻一口。吐唾和藥。絹包如棗核大。于小兒落地時。塞兒口中。待啞一時頃。方可與乳。此藥取下腸胃穢毒。令兒少疾。及出痘稀少也。孫氏集驗

普門醫品

兔血丸 小兒服之。終身不出痘。即出亦稀。

臘月八日。取生兔一隻。刺血。和蕎麥麴少。加雄黃四五分。候乾研末。水丸如綠豆大。初生小兒。以乳汁化下二三丸。遍身發出紅點。是其微驗也。兒長成。常以兔肉啖之。保壽堂方

三豆飲 天行痘瘡時。預服此。疎解熱毒。能令輕少。綠豆。赤小豆。黑豆。各一升。甘草節二兩。以水八升。煮極熟。任意食。豆飲汁。七日乃止。扁鵲方

又方

時行暄暖。恐發痘瘡。用香油一小盞。水一盞。童便更佳。旋旋傾下。調內。柳枝攪稠。如蜜。每服二三塊。穀。大人二合。臥時服之。三五服。大便快利。瘡自不生矣。外一室方

又方

初發時。或未出時。以朱砂末半錢。蜜水調服。多者可少。重者可輕。丹溪方

附麻疹

輪麻疹係肺胃

因時氣毒發於外狀如蚊蚤

町咬赤則十生一死黑則十死一生大抵宜用清解滋陰之藥如發熱過期不出毛孔盡閉皮膚乾燥毒氣拂鬱于內急用麻黃散發之

麻黃散

升麻酒洗二錢麻黃蜜酒全炒錢半人中黃牛旁子熟蟬蛻去足翅淨各一錢水一鍾煎七分服

疹出不快

胡荽二兩切以酒二大鍾煎以物益定勿令泄氣候冷去滓微匕含噴從項背至足令遍勿藥而

經驗方

又方

紅花子紫草茸各三錢蟬蛻一錢半水一鍾酒半鍾煎減半服量見大小加減龐安常傷寒論

又方

蘿蔔子生研末米飲服二錢最良衛生易簡方

麻疹煩躁

水研山豆根汁服之經驗方

普門醫書

卷四十八

痘疹門

二十一

蟬蟬堂

醫品補遺敘

普門醫品一書集古良方可謂備矣今復思有以益之不幾贅乎雖然醫者意也聰明間出何代無之古人既以意舛方流傳於世則繼起者豈遂乏人故醫品而外更有奇方或舛自名醫或得之海上或出於仙傳皆屢試而輒效者寧得不推廣播傳以普濟斯世歟方在揀羅間而永司馬樸菴史公即出其手錄新集以示予其間歷書舛傳治效不少簡畧採擇精而註釋明知其究心活人有素矣今乃不自珍藏俾補遺敘

予壽梓以福世其仁厚之心寧有既哉予既喜得是書復檢舊時藏本併博採諸同人所得者以益之凡四卷額曰醫品補遺集中諸方有古所未聞今所罕觀而其實皆人所已試者誠希世之珍濟人之寶筏也故於醫品告竣之後復綴是編以佐其未逮者使人益知所未知庶予心不無少快焉至於虛實寒熱仍在病者叅看前論而用之茲不再及

康熙甲戌桂月廣寧郎廷模題

醫品補遺目錄

卷之一

延壽

種子

調經

育嬰

痘症

卷之二

頭面

醫品補遺

咽喉

心腹

手足

卷之三

中風

傷寒

咳嗽

諸氣

失血

卷一 目錄

娛揮堂

娛暉堂

娛暉堂

研白雲苓三兩以人乳拌晒重至六兩妙虎脰骨
一對照鹿茸製用皮酒洗晒乾三兩牛膝去蘆酒
洗蒸晒三兩肉桂油紫者去粗皮不見火一兩澤
瀉去毛切片三兩人參去蘆切片以人乳拌蒸過
五兩川附子童便浸軟再換清水拔去臭味切片
用生甘草相間蒸六時晒乾一兩共爲細末用金
櫻子去刺毛及子淨一斤半水洗換水熬至味淡
去渣再熬成膏拌藥加煉蜜二十四兩石臼內杵
千餘下丸如梧子大每早空心服三五錢以淡薑

湯送下 娛暉堂主人早服

既濟丹 此丹交心腎令火下降水上升

熟地黃四兩生地黃酒洗四兩天冬去心三兩人參去蘆人乳拌蒸五兩白茯苓神去皮水人乳拌蒸二兩麥冬去心三兩礞石忌鉄研極細二兩硃砂水飛一兩沉香另剉一兩共爲細末用生神麴末一兩炒神麴末四兩以淡生薑湯煮麴成糊和前藥杵爲丸如菉豆大臨卧每服二三錢用燈心湯或白湯或人參湯送下 娛暉堂主人晚服

醫品補遺

卷一 延壽

二

娛暉堂

益壽健陽丹 此丹烏髮美容顏壯筋骨

白雲苓一觔用頭生男乳每日拌晒重二斤止赤茯苓一觔用黑牛乳每日拌晒重二斤止赤白何首烏大者各一斤整箇用糯米泔水浸洗放柳木甑中用小黑豆鋪底蓋面周圍揆定蒸五炷香令定取出何首烏以竹刀刮去粗皮切片晒仍照前用黑豆蒸晒九次後以人乳拌蒸或用青塩水潤蒸甘枸杞去蒂淨八兩以乾菊花瓣八錢用酒拌過一夜晒乾微焙破故紙八兩用塩酒拌一夜晒

乾微火炒香先將黑芝蔴四兩炒研乘破故紙炒

蕪拌勻大便燥連芝蔴用大便溏者稀篩羅去芝

蔴兔絲子水淘晒乾八兩以酒浸三日夜加酒慢

煮有絲爲度晒乾大當歸酒洗晒乾八兩如大便

溏者用四兩懷牛膝去蘆八兩照前何首烏蒸晒

乾白蒺藜揀去油黑者搗去刺簣淨入砂鍋炒約

一斤磨取頭末六兩蒼朮米泔浸軟竹刀刮去皮

毛切片晒乾四兩用桑椹搗汁拌蒸晒三次共爲

末俱忌鉄器煉蜜丸如菉豆大每服三錢空心酒

醫品補遺

卷一 延壽

三

娛暉堂

下午間薑湯下臨晚塩湯下每服藥卽以隻手摩胸腹按丹田存想片時藥力行到更效忌牛肉燒酒酸物 娛暉堂原集

萬壽酒 此酒通調血脉補腎固精

杜仲塩水浸炒斷絲四兩續斷三兩熟地四兩仙

靈脾去邊筋淨六兩頭紅花三兩牛膝二兩枸杞

六兩蛇床子二兩沉香五錢當歸二兩巴戟二兩

肉蓯蓉去甲洗淨四兩川木瓜二兩虎骨八兩鹿

角膠四兩五加皮二兩白茯苓二兩肉桂五錢水

香五錢母丁香五錢人參四兩附子五錢酥油四兩羯羊油四兩白蜜八兩核桃肉四十小紅束六十圓眼一斤糖瓜半斤其以絹袋裝懸鐺內煮酒一百斤過數月服極妙娛暉堂十人常服

効

頭紅花十六兩揀淨入絹袋枸杞二兩淫羊藿去邊莖爭十六兩用羯羊油一斤熬化熱拌甘草去皮炙紅五錢杜仲去皮童便浸一宿拌麩炒去絲

醫品補遺

卷一 延壽

四

娛暉堂

焙乾一兩地骨皮蜜水浸晒乾一兩天冬酒浸去心晒乾一兩生地乳浸透焙乾二兩肉從容河水洗淨酒浸去甲晒乾火焙一兩熟地酒浸晒乾二兩白茯苓牛乳浸二兩牛膝去蘆酒浸透晒乾一兩當歸酒浸二兩破故紙酒浸一宿焙乾一兩人參一兩其菊童便浸晒乾一兩附子製五錢白芍一兩白豆蔻云皮五錢砂仁薑汁炒五錢五加皮四兩白朮米泔水浸去皮以陳壁土炒四兩蒼朮米泔水浸晒乾四兩母丁香五錢沉香五錢川椒去

醫品補遺

卷一 延壽

娛暉堂

焙乾五錢木香爲末五錢前藥除紅花羊藿不爲末外其餘俱爲細末以糯米四斗淘三次淨將第一次水留用其米後以清水浸一日夜漉米如造酒蒸法爲飯取出候冷用第三次淘米清水二十觔入鍋內將葱白一斤切寸許于水內滾沸去葱候溫用水合飯拌入細麴末四斤粗麴二斤同前藥末和均先將紅花羊藿二味入絹袋置于甕底方將此飯入甕拍極實用乾燒酒十斤蓋面如春月發三日夏月發一日夜秋月發二日冬發四日後再加乾燒酒八十一斤將甕邊封固過二七日開釀用木爬打三四百下若喜用醪酒加紅末一斤去核再煮糯米三升入內又從底下打起至二三百下再過二七日榨出清酒入鐺內固封重湯煮三炷香埋地中三日去火毒如秋冬不煮亦可若遇夏不煮恐變酒味取頭酒起其藥渣糟再加糯米三升煮粥紅末三斤加燒酒五十斤又從底打二三百下過二七日榨出酒入鐺內或單用或摻入頭酒亦妙娛暉堂原集

內府秘傳摩腰萬福丹 治男婦勞傷下元虛冷痰

痺腰痛痼氣崩帶併効

母丁香薤香乾薑肉桂沉香和黃芩朱砂杏仁硃砂五加皮木香生白礬川附子用童便浸極透再以清水浸拔去塩味去皮臍切二分厚大片用柳木甌以生甘草切片鋪底鋪附片一層再將甘草片蓋上又鋪附片仍以甘草片蓋而蒸七炷香要極透候冷取出如有白點再以麪包火煨熟用之硫黃揀極淨者鐵杓內溶化淬于豆腐漿水內五

醫品補遺

卷一 延壽

六

煨暉堂

童便集

萬壽膏 此膏固精益氣神妙兼治風癰

合歡樹葉俗名馬纓花樹於四月四日或五月五日采之方效采取連枝帶葉者陰乾不可見日時常翻動防其黧壞俟乾摘取淨葉去枝梗如收茶葉一般盛蒲包內經數年不變色青綠可愛用烏磁罈一個可盛酒二十餘斤者外用竹篾絡紮上兩耳以便提携將前藥懸裝入八分滿用上號燒酒浸藥過一分爲度罈口用雙層綿紙紮外再加箬葉緊防其衝泛放入鍋內隔水煮以罈內藥香氣爲度趁熱取出即埋土中其土須蓋過罈頭次日取起再煮再埋又取起開罈看則其原酒已耗去四分仍用好燒酒添至九分滿又照前紫緊又入鍋煮又土埋再四次後開罈加上好米白糖不可用味酸者三斤枝間肉半斤又照前紫緊再煮埋三次開罈將布絞出藥渣將酒仍入罈內隔水煮一次不用土埋聽用前後共計煮十次埋九次訖每日空心或臨卧用磁盞盛膏七分重湯頓服効如神

醫品補遺

卷一

延壽

七

煨暉堂

衛生膏 此膏滋陰生精大補元氣

人參去蘆切片十六兩天冬去心淨十七兩六錢
生地先以水洗用酒浸一宿曬乾二十五兩二錢
砂鍋另熬麥冬去心淨一十七兩五錢枸杞揀去
梗蒂淨十九兩六錢圓眼肉白厚者什黑肉揀去
淨十七兩六錢黃芪切片蜜水拌透曬乾十五
兩 錢牛膝去蘆切碎淨十七兩六錢比五味揀
去梗蒂及枯者石器中搗碎十五兩六錢另熬石
九味如法製過熬至水淡濾去藥渣看無水氣盛
貯銀鍋或錫鍋內配入後藥鹿角要取成對好角
以河水浸三日每日換水用細鐵絲扎帶刷洗角
上浮垢鋸成寸段再以河水浸一日每日換水腥
盡為度熬三日夜去渣成膏淨十六兩龜板揀去
黑板及腥臭者鋸去邊背刮去筋肉河水浸三日
熬二日二夜去渣成膏淨十六兩牛肉揀無病黃
牛腿肉挑去筋骨及油切成薄片河水浸至血盡
為度須早晚換水熬一日一夜去渣成膏淨十六
兩虎骨揀去骨節河水浸三日三夜刮去黑膜

醫品補遺

卷一

延壽

八

煥輝堂

微煮一滾刷淨油鹽熬三日三夜去渣成膏淨十

六兩雪梨揀嫩甜好梨削去外皮及中心河水煮
一日去渣成膏十六兩右五膏各熬至紙試無水
氣為度秤准加入前草藥膏內隔湯再煎以柳木
棍攪勻用上好白蜜三十二兩熬至滴水成珠收
之罐內盛貯用蠟封固每以磁盃盛膏七分重湯
頓化早晚任服如遇霉天藏於炒米罇內 煥輝堂
原集

神仙萬寶膏

此膏填精補髓益壽多子又治腰膝

醫品補遺

卷一

延壽

九

煥輝堂

疼痛虛損勞傷女人崩帶等症神効

第一下真麻油二斤半第二下甘草四兩搥碎先
熬五六滾第三下天冬麥冬生地熟地已戟仙茅
石斛遠志肉用甘草湯泡官桂牛膝蛇床子兔絲
子破故紙川續斷白果杏仁紫稍花木鱉子大附
子虎骨鹿茸谷精草肉蓯蓉以上粗末各四兩熬
黑瀝去渣第四下松香四兩黃丹飛過一兩六錢
第五下龍骨硫黃赤石脂細末各四錢第六下乳
香沒藥煨母丁香木香細末各四錢第七下麝香

蟾酥真陽起石細末各二錢第八下黃蠟六錢熬滴水成珠為度每貼用膏四五錢攤布上貼腰眼二穴一箇可貼六十日極妙史璞卷傳

荳液大丹 此丹益氣健陽

黃芪一兩五錢用防風三錢水二鍾煎至一鍾去防風不用存汁將芪拌曬汁盡為度人參一兩去蘆芋切片人乳拌蒸一次曬乾白朮米泔水浸刮去毛陳壁土炒一兩肉苁蓉一具重十兩或一斤

大者更妙先用酒浸半日刮去鱗甲及心內筋膜

醫品補遺

卷一 延壽

煥輝堂

曬乾或用酥油微炙或用酒拌蒸半炷香用竹刀切片曬乾用三兩餘者密藏罐內俟再用右四味如法炮製聽用甘枸杞 兩五錢破故紙一兩微炒研大茴香五錢醋炒研甘草蜜炙五錢此四味用片水三碗入銀磁罐內忌銅鐵器以文武火熬至半碗去渣將前四味入藥汁內拌曬汁盡再用上好火酒三碗又拌又曬酒盡為度曬乾研為極細末再用頭生男乳三碗如多更妙入銀磁罐內熬如粒入前四藥末在乳內用文武火頻如珠以

文火畧熬加入白茯苓末一兩蜂蜜十數匙取如如梧子人用飛過硃砂為衣密藏磁瓶內每早用淡鹽湯下或酒下一錢中年者可七十一服年老及陽痿者宜常服極效煥輝堂原集

種子門

經驗煥輝種子膏 此膏固精氣壯元陽兼治女人赤白帶下神効

當歸川芎白芍川牛膝巴戟杜仲熟地肉從蓉兔

醫品補遺

卷一 種子

煥輝堂

絲子蛇床子虎脰骨細辛破故紙各五錢真香油一斤四兩桑柴煎兩滾次下甘草四兩官粉八兩再熬兩滾方下餘藥文武火熬待群藥焦色瀝去渣再用文武火熬槐條不住手攪熬至滴水不散入倭硫黃三錢離火再入乳香沒藥兒茶血竭各三錢後入真麝香二錢其攪勻入磁器內黃蠟封固入地埋七日去火毒每用一塊火炙軟入麝香少許作丸雄黃為衣填臍內外用紬攤一帖即愈待半月後遇女人經淨一交成胎必生男煥輝堂

神秘種子方 治女人血虛有熱久不孕育神效

當歸生地各一錢五分乃藥貴多則皮石東肉各一錢知母杜仲薑汁炒各一錢玄胡三錢香附米一錢五分陳皮七分破仁三分北五味七粒川芎八分如新水紫色乃血熱將香附用童便製如經水淡色乃血寒用醋製之水二鍾燈草一丸淡竹葉十四片煎八分半飽服宜經期之前三日服之如向來經期腹痛服此不痛或向來腹不痛服此作痛是其效也三月必如每次不過二三劑不可

醫品補遺

卷一

種子

十

娛聊堂

加戒照依本方極妙更堪卷傳

廣嗣丸 男子服 此丸煖精補腎極効

兔絲子五斤用水淘淨酒煮七次去壳成餅聽用楮實一斤洗淨酒煮何首烏一斤要一個者妙赤者尤妙笊刀切片九蒸九曬枸杞一斤去蒂酒蒸晒白雲苓一斤要一個者去皮切片乳拌蒸三次魚膠二斤自有住用荷葉包裏水煮一柱香去荷葉石上搗成餅切炒成珠其為細水煉蜜為丸如梧子大每服一丸空心淡鹽湯或溫酒送下休

弱者以人參湯下忌食烏魚鯉魚龜蟹之類 娛聊堂

毓清丸 婦人服 此丸順氣生血易孕神効

陳皮四兩分四分乳酒甘草汁艾汁浸一宿晒乾山藥肉去核酒蒸二兩地黃四兩分二分一分酒浸五日煮一日一分薑汁浸一宿晒乾元胡索微炒二兩香附八兩分四分童便醋酒鹽水浸五日取出晒乾當歸四兩分二分一分酒浸炒一分人參三錢煎汁拌晒乾白朮四兩米泔浸二宿切片

醫品補遺

卷一

種子

十

娛聊堂

陳壁土炒去土條芩二兩酒蒸炒覆盆子炒二兩破仁去壳微炒一兩川芎三兩酒洗其為末用山藥粉打糊丸如桐子大每早白滾湯服五十九臨卧服六十九最妙 娛聊堂

千金種子丹 此丹服之多子并治虛損夢遺

沙苑蒺藜取淨末四兩再以重篩羅之取二兩極細末餘二兩粗末用水一大碗熬膏連髮極細末四兩金色者佳山藥肉去核淨細末三兩覆盆子去核及梗細末二兩雞頭米細末二兩龍骨五錢

五色者佳火煨法以小砂鍋入龍骨鍋內連鍋火煨通紅去火毒方用以好蜜一斤煉滴水成珠止用四兩將前藥先以蒺藜膏和作一塊再入煉蜜石臼內搗千餘下丸如菉豆大每服三十九空心塩湯送下忌慾事二十日効 婦科聖藥原集

調經門

崩帶 姙娠 催生
產後 雜症

加味十珍香附丸 治經血不調腰脇脹痛困倦食少日晴寒熱最效

醫品補遺

卷一

調經

十四

婦科聖藥

香附子去毛打碎取淨米十四兩作七分製一分酒浸一分醋浸一分塩水浸一分童便浸一分小茴香二兩水浸炒乾去茴香不用一分益智仁二兩同浸炒乾去益智一分蘿菔子二兩同浸炒乾去蘿菔子凡浸春秋三日夏一日冬五日製完淨米同入砂鍋加蘆艾四兩無灰酒隨煮隨添色黑爲度用淨末七兩當歸身酒洗熟地黃薑汁拌焙乾生地酒洗薑汁拌焙乾白芍酒浸炒各四兩川芎三兩酒浸人參一兩白朮陳土炒白茯苓酸棗

仁炒各二兩并草炙九錢天冬去心二兩七錢益母草酒洗四兩山茱肉酒洗橘紅各二兩元胡索醋炒一兩五錢阿膠蛤粉炒成珠二兩條芩酒炒二兩五錢砂仁炒一兩五錢共爲細末酒煮神麴糊爲丸桐子大每早服三錢白湯下 婦科聖藥原集

百子歸附丸 此丸平肝補脾調經易孕

香附米一斤先用米泔水浸一日煮一次晒乾又川芎便酒醋各浸一次照上四製益母草葉半斤忌鐵器當歸酒洗川芎生地白朮白茯苓各四兩白芍三兩微炒元胡索條芩各二兩大并草一兩共爲細末煉蜜丸如梧子大每服七十九早晚各一服酒水任下効 王駁公傳

至旋丹 治經水不調腰脇痛令久不孕育

香附米八十一兩作九分以丹麥生地白芍當歸澤蘭葉各四兩五錢各煮取汁蘆艾四兩五錢醋煮取汁杜仲四兩五錢鹽煮取汁白朮四兩五錢水煮取汁小川芎二兩七錢酒煮取汁以九味汁各煮香附九兩至無心爲度晒乾爲末煉蜜丸桐

醫品補遺

卷一

調經

十五

婦科聖藥

大佳服百大淡酒或淡醋酒一服二服三服

月經不通

生蒲黃乾漆炒各三錢為末紅花煎酒調服立通

經逆行從口鼻中出

先以京墨磨升服止之即川歸尾紅花各錢半水煎服其經自順便方

乾血氣痛

醫品補遺

卷一 調經

十六

羅暉堂

錦文大黃酒浸晒乾四兩為末好醋一升放膏九

茨子大目時消化三九服大便利一有經自調集驗方

調經育嗣丸

蘄艾八兩塩水童便酒醋製當歸酒洗四兩通胡

索一兩白芍酒炒四兩阿膠炒珠二兩香附米童

便塩酒醋製四兩烏藥酒炒一兩白木土炒四兩

條芩酒炒四兩續斷炒二兩川芎四兩生地四兩

共為細末蜜丸如梧子大每三錢酒水任下或飯

酒晚服更效 羅暉堂集

勝金丹

此丹和經益精補虛種子兼治一切雜證

香附子一斤要個個圓爭者第一次童便浸二次

酒浸三次塩水浸四次醋浸須按春七日夏五日

秋八日冬十二日期足取出晒乾為末揀麥一兩

五錢熟地四兩五錢赤芍一兩五錢粉草七錢五

分白芍一兩五錢白芷一兩五錢川芎一兩五錢

當歸身一兩五錢藥本一兩五錢白茯苓二兩五

錢桂心二兩五錢白薇去蘆四兩川皮二兩五錢

醫品補遺

卷一 調經

十七

羅暉堂

牛膝一兩五錢除人參香附另切外其十三味俱

用好酒按春五夏三秋七冬十日浸過淘洗淨晒

乾為末赤石脂一兩白石脂一兩二味酒浸三日

煨七次淬七次乳香去油一兩沒藥去油一兩沉

香一兩辰砂一兩飛琥珀五錢此七味為末用前

泡藥酒細研成膏以前藥用白蜜三斤煉去浮沫

具合為丸如彈子大金珀為衣晒乾收貯磁器內

封固勿令泄氣每用時取一丸入磁罐內以好酒

一碗淺匙綿紙隔口浸至定更時候用重湯慢

煮之至滿室聞香取出以金簪攪勻服之量大多飲更妙少坐片時身體怠倦卽厚被蓋之出汗卽愈常服者不必取汗若婦人行經作痛服一丸下月行經則腰腹不痛矣每覺經行五日前卽服起至經盡如此三月卽孕大病一料小恙十數丸無不效 媛暉堂原集

崩帶

如聖散 治血崩

櫻櫚烏梅肉各一兩乾薑一兩五錢併燒存性爲

醫品補遺

卷一 崩帶

十八

媛暉堂

細末每服二錢烏梅酒調下食前服久患不過三

服卽愈 女科方

又方

加味歸脾湯加熟地地骨皮車前子檮白皮紅棗

二枚引水煎熟入鹿角屑研極細末三匙攪勻服

神效 黃雷問傳

又方

當歸白芍乾薑櫻櫚各等分煨存性爲細末醋調

以有郎朱簪左攪勻十九轉食前服効 媛暉堂原

集

檮皮丸 治赤白帶有濕熱者

白芍五錢良薑三錢燒灰存性黃柏二錢炒成灰

椿根皮一兩五錢爲細末以粥丸如梧子大每服

三五十九空心米飲下効 媛暉堂原集

固精川 治下元虛寒帶下或如泔或如凝脂腹重

牡蠣煨粉兔絲子酒蒸焙韭子炒龍骨比五味伏

苓桑螵蛸酒炙白石脂各等分共爲細末酒糊丸

如梧子大每服七十九空心鹽湯下効 媛暉堂原

醫品補遺

卷一 崩帶

十九

媛暉堂

牡蠣散 治帶下

牡蠣煨龍骨煨赤石脂肉苁蓉酒浸切焙石斛去

根烏賊骨去甲黃芪各剉一兩五錢牛角鰓灰阿

膠炒燥熟地焙芍藥炒以上各二兩乾薑炮當歸

切焙人參白朮桑耳各一兩二錢杜心去粗皮川

芩附子炮去皮艾葉炒各一兩共爲細末每服三

錢平旦米飲調服日再服効 媛暉堂原集

又方

沙參爲末每用二錢米飲調下効 媛暉堂原

又方

陳壺盧瓢燒存性蓮房假存性等分研末每服二錢熱水調服有汗為度即止服者五服必止最妙忌房事發物生冷海上方

（如）

通氣散 治如娠腰痛

破故紙二兩煨香為末先嚼胡桃肉半筒空心溫酒調下二錢神效良方

如娠心痛不可忍

醫品補遺

卷一

如娠

如娠

塩燒赤酒服產寶方

如娠浮腫

羌活蘿蔔子同煨香只取羌活為末每服二錢溫酒調下一日一服二日二服三日三服効本方

如娠咳嗽

貝母去心麩炒黃為末砂糖拌九次子大每含嚥一九神效救急方

如娠患淋熱痛酸楚手足煩疼

地膚子十二兩水四升煎二升半分服秘錄方

如娠子煩因服藥致胎氣不安煩不得眠者

知母一兩洗焙為末炙肉九彈子大每服一九人參湯下効驗方

子痼昏冒

縮砂和皮炒黑熱酒調下二錢不飲者米飲下此方安胎止痛皆效溫隱居方

胎氣上冲不安腹中脹痛

紫蘇陳皮共為細末砂仁葱白煎酒服神効急救方

醫品補遺

卷一

如娠

如娠

如娠偶因所觸或跌墜傷損致胎動不安痛不可忍

縮砂熨斗內炒熱去皮用仁搗碎熱酒調下二錢須臾覺腹中胎動極熱即胎安矣神效孫尚藥方

孕中有癰

薏苡仁煮粥頻飲補遺方

孕胎散 治孕婦傷寒大熱煩渴恐傷胎氣

用嫩捲荷葉焙半兩蚌粉二錢半為末每服三錢新汲水入蜜調服並塗腹上鄭氏方

如娠風寒孕中不音人事狀如中風

用熟艾三兩米醋炒極熱絹包熨臍下良久即愈
良方

二香散 治姙娠惡阻胎氣不安嘔吐酸水起食不
便飲食不進

香附子一兩霍香葉甘草各二錢為末每服二錢
沸湯入鹽少許調下 聖惠方

姙娠下利赤白痢疾絞刺疼痛

雞子一枚烏雞者更良破孔去清留黃入黃冊一
錢攪勻紙糊好塩泥固濟火焙乾為細末末飲服

醫品補遺

卷一 如娠

三

聖惠堂

二錢一服愈者是男二服愈者是女大全方

安胎萬全神應散 治孕婦三月前後或經惱怒或

行走失跌損傷胎氣腹痛腰脹一服即安倘遇前次

先三四月內曾經半產者將前月分畧帶腰骨酸脹

即服一劑安之過此萬全

熟地八分薑汁浸川芎六分當歸一錢酒浸白芍

七分酒炒白朮土炒一錢黃芩一錢砂仁研碎五

分黃芪蜜炙七分阿膠一錢杜仲薑汁炒七分白

茯苓七分并草三分胸前作脹加紫蘇六分陳皮

六分紅白帶淋加阿膠一錢地榆一錢艾葉一錢
見紅者加續斷一錢引用糯米百粒酒水各一盞
同煎空心服若疼急即將銅鍋煎一鐘服神効如
暉堂原集

保胎無憂散 治胎時不安雖見面而不腹痛者皆
可保全

黃芪炙七分白朮土炒七分阿膠炒七分桑寄生
八分川芎六分艾葉三分白茯苓七分大熟地一
錢條黃芩七分并草炙五分川續斷七分人參七

醫品補遺

卷一

如娠

三

聖惠堂

分水二鍾糯米一撮濃煎服效如暉堂原集

胎產金丹 治婦人諸虛百損胎前產後應效如神

當歸酒洗二兩白茯苓乳浸白朮土炒人參乳浸

以上各二兩生地四兩酒浸煮焙白薇二兩洗淨

乳浸延胡索二兩酒拌煮乾透桂心一兩二錢斬

艾二兩醋煮川藥本二兩洗淨粉草二兩二錢酒

炒赤石脂煨醋淬川芎各二兩酒浸洗冊皮二兩

水洗晒乾酒浸沉香六錢沒藥一兩二錢土油

益母草取上半截童便煮二兩監甲醋炙四兩香

醫品補遺

卷一

婦人

經期

附米四兩童便醋塩米泔水四製北五味一兩淨
 其為末柴河車一具盛竹籃內放長流水浸半日
 洗淨入鉛罐內用黃柏四兩入罐內將黃柏放河
 車下用白酒浸滿煮爛為度搗入藥末內內熱加
 青蒿二兩再川煉蜜九每一九重三錢五分砂砂
 為衣婦人臨產米湯化服一九助精神壯氣力分
 娩自然順利產後童便酒服一九神清體健無崩
 帶之患每日服過五九氣血完固無他病無子者
 行經後常歸川芎湯服一九每日止服一九三月
 必然而有妊胎動欲墮白湯服一九睡半日其胎自
 安每月常服二三九保全足月分娩無憂產後血
 崩童便好酒服一九即止血帶者當歸川芎湯服
 一九即解經風防風湯服一九即解兒枕痛山查
 砂糖湯服一九即止胎衣不下乾薑炒黑煎湯服
 一九即下血快者當歸川芎湯每日服一九服至
 十九愈產後諸症俱加好酒童便服立効其功不
 能盡述家有孕婦宜早備之娛暉堂原集
 嘉寶丹 治婦人胎前產後經水不調一切逆難等

醫品補遺

卷一

婦人

經期

症神效

川烏四兩每個重七八錢者佳用草紙打濕包裹
 火煨切片草烏四兩無蘆者用滾水泡將瓦鋒刮
 去皮切片同川烏酒煮試不麻口為度當歸四兩
 酒洗人參四兩乳拌生地四兩酒浸晒乾熟地
 四兩薑汁拌透晒乾兩頭尖二兩無蘆者用滾湯
 泡瓦鋒刮去皮蒼朮四兩米泔水浸刮去皮忌鐵
 器白芍二兩酒洗淨麻黃去節童便煮二兩細辛
 去土二兩木香二兩血竭二兩白芷二兩酒浸明
 天麻二兩煨荊芥穗二兩微炒白朮炒二兩粉
 草炙四兩大茴香四兩微炒何首烏二兩防風二
 兩桔梗二兩撫芎二兩酒洗香附米製四兩黃芪
 二兩蜜炙其研為極細末蜜九每九重二錢二分
 經水不調死胎不下氣滯血塊產後惡血不盡腹
 痛寒熱交攻俱用桃仁七粒炒去皮尖當歸紅花
 各一錢酒煎服之臨盆易產蘇木當歸紅花煎酒
 服若虛弱用人參一兩煎湯服易產且產後無他
 症久不受孕嘔吐惡心煩悶胃口呆不聞飲食無味

面赤唇焦手足麻痺遍身酸痛遠年沙淋赤白帶

下俱用紅花當歸煎酒服有孕只用酒胎動不安

用帶壳砂仁研碎二錢人參二錢煎湯服胎衣不

下蘇木紅花當歸煎酒下產後吐血羸弱煎湯下

咳嗽臨卧蘇子貝母煎湯下產後頭目暈眩川芎

煎酒下癰瘰寒濕等症麻黃煎湯下懷胎近產四

肢無力遍身虛腫砂仁木香煎湯下產後傷寒中

風生斑牙關不開麻黃湯下寒氣冲心食積不消

肚腹作痛好酒下俱妙 娛暉堂原集

醫品補遺

卷

催生

廿六

娛暉堂

催生

保產無憂散 治婦人難產橫生逆產甚至七八日

不下及血暈陰脫無乳並治

當歸一錢五分酒洗川芎一錢三分貝母去心一

錢黃芪八分荆芥穗八分枳壳六分麩炒厚朴七

分薑汁炒艾葉七分川羌活五分兔絲子一錢四

分製并草五分白芍一錢二分薑三片水二大鍾

煎至一大鍾空心服如生有艱難臨產時一服即

生若月足數日之中可預服四貼臨產一貼尤效

史璞菴傳

治一切產難橫生逆產及死胎不下神效

當歸酒浸三兩車前子二錢川芎二兩牛膝三錢

冬葵子五錢炒研益母草二錢枳壳五錢石用水

二碗無灰好酒一碗共煎碗半溫服如死胎不下

加急性子二錢炒研入內 史璞菴傳

又方

冬瓜皮母論乾鮮一兩牛膝三錢水一碗煎八分

于腹痛時服之即產 史璞菴傳

醫品補遺

卷一

催生

廿七

娛暉堂

橫生倒產

車前子為末酒服 錢氏錄方

腹滿產難

以水入醋少許喫而即下神效 聖惠方

產後

呂和傳牡丹十三方 治婦人產後一切諸症俱效

當歸川芎生地元胡索益母草澤蘭香附製以上

為主方胃風加防風天麻煨血暈加五靈脂醋炒

延胡索荆芥炒黑產後三四日發熱加當炭延胡

索醋炒人參黃芪蜜炙敗血上行心口作脹加大黃酒炒桃仁搗碎我水醋炒四散逆冷加肉桂乾薑心膈逆悶加陳皮枳實越炒破仁研而用加地榆山梔當汁炒黑用皮嗽嗽加杏仁桑白皮枯梗死血不行加桃仁紅花根實不思飲食加山查麥芽脾胃作脹加白茯苓白朮土炒蒼朮炒黑厚朴薑汁炒陳皮枳殼破仁心神不寧恍惚驚悸不安加茯神遠志胎衣不下加甘硝三錢娛暉堂原集血暈身癱直口目向上卒急不知人事

醫品補遺

卷一 產後

八

娛暉堂

取鷄子一枚去壳取清以荆芥末二錢調服即安

甚捷烏鷄子尤佳 家方

產後鼻衄

荆芥焙研末酒服二錢良方

產後血暈心悶煩熱痛硬午寒午熱

結新皮一握水三升煎二升分三服如人行里

吐服無所忌此藥救產後垂死秘錄方

產後惡血不止

乾地黄搗末每食前熱酒服一錢連進三服効瑞

勿堂方

產後血痛有塊

薑黃桂心等分爲末酒服方寸七血下盡即愈產實方

產後消血塊

香附童便浸炒桃仁去皮晉尖等分爲末醋糊丸每服一錢五分淡酒下効丹溪方

墮胎下血不止

當歸焙一兩每服五錢慈白五根酒一盞半煎入

醫品補遺

卷一 產後

九

娛暉堂

分溫服愈總錄方

產後腹脹不通轉氣急坐臥不安

以麥芽一合爲末和酒服良久通轉神効 兵部手集方

女人服草藥墮胎腹痛者

生荷豆去皮爲末米飲服方寸七或濃煎汁或丸服俱効 雜方

產時子腸先出產後不收者名盤腸產

以半夏末頻嗅鼻中可上良方

乳汁不下

木蓮二箇猪前蹄一箇爛煮食之并飲汁盡一日即通無子婦人食之亦有乳也集簡方

又方

白蠟蚕末二錢酒服少頃以脂麻茶一盞服之梳乳頭數十遍奶汁如泉經驗方

婦人乳少脂麻炒研人鹽少許日常服唐氏方

婦人雜症

錐痛散 治婦人血氣刺痛

醫品補遺

卷一 雜症

娛暉堂

用荔枝核燒存性半兩香附子炒一兩每服二錢鹽湯米飲任下効良方

婦人骨蒸體倦虛勞寒熱

用青蒿八九月間將成實時采去枝梗將蒿童便浸三日晒乾爲末烏梅一個煎湯調服二錢極効大千方

婦人忍小便轉肝困篤欲死

滑石二兩亂髮灰一兩共爲末取桃白皮一斤搗爛入水三盞絞汁不拘時溫半盞調服一錢効大

全方

婦人久積虛寒小便白濁滑數不禁

鹿角屑炒黃爲末每服二錢溫酒調下効女科方

陰痛

青椒炒熱裹熨范氏方

陰痔自肉突出如茄子

牛根充爲末煎湯熏洗以澆絹包納陰中即漸消女科方

陰脫

醫品補遺

卷一 雜症

娛暉堂

用吳椿根皮五倍子赤石脂煎湯熏洗即入或用淡竹根煎湯洗以五倍子白礬爲末乾摻立効女科方

陰挺

鹽水洗軟用五靈脂燒烟熏次用草麻子研爛塗上即收進入則洗去女科方

育嬰門

小兒初生未可便與硃砂蜜服

用甘草一搗即長灸碎水三合煮取一合以綿絮

點兒口中可一蜆殼當吐出胸中積惡此後待兒

飢渴更與飲盡令知慧無病出痘稀少遠方

小兒初生無反色赤有紅筋乃受胎未足也

用早白米粉撲之肌肉自生普濟方

小兒初生便閉

甘草枳殼煨各一錢水半盞煎服即通心鑑方

初生尿澀不通

車前搗汁入蜜少許灌之心鑑方

醫品補遺

卷一

育嬰

世

煨脾堂

小兒初生月內目閉不開或腫羞明或出血者各慢

肝風

用甘草一截以猪胆汁炙為末每用米泔調少許

灌之普濟方

小兒飛口滿口白爛

枯礬一錢硃砂二分為末少許頻敷之普濟方

重舌

皂角刺燒灰入朴硝冰片少許搽舌下自消普濟方

小兒懸胎

綿烏頭附子並去皮臍二錢雄黃八分為末葱根

搗和作餅貼陷處心鑑方

秘傳抱龍丸 治小兒一切痰熱驚風嗽潮熱發搐

及傷風驚發身熱昏睡氣粗痰盛並痘疹時行皆可服之

白附子水浸炮一兩胆星陳久者佳一兩川羌活

一兩細辛水洗去石灰薑汁拌炒一兩薄荷微炒

一兩前胡一兩天麻用粗紙打濕包煨兩天竺

黃真者一兩廣陳皮去白取紅二兩青皮醋炒二

醫品補遺

卷一

育嬰

世

煨脾堂

兩全蝎去尾足再洗去塩同糯米炒一兩黃芩生

用一兩天花粉四兩黃連生用一兩為細末用

生甘草二斤以雪水熬成膏和九重五分以硃砂

為衣週歲小兒每九分作一次服未滿週歲者作

三四次服發搐枳殼鈎藤木通各等分煎湯化服

咳嗽甘草桔梗前胡湯化服傷風防風蘇葉生薑

湯化服瘟疫時行羌活乾葛黃芩湯服昏睡不省

石菖蒲胆星橘紅煎湯化服喘急桑白皮蘇子橘

紅湯化服急驚金箔三片鈎藤木通甘草湯化服

痘疹時行洗去外面硃砂以羌萎心一根鮮箕尖

二片煎湯化服 痘疹原集

屢驗定神神膏

真備紅陳胆星白附子麝包煨半爇通靈茶煎餘

者淨洗香灰煨羚羊角尖細剉以上各二錢真琥

珀研碎二錢真牛黃五分天竺黃一錢天麻煨一

錢南薄荷五分人中黃一錢川黃連酒炒一錢沉

香五分大黃酒炒一錢白茯苓神一錢川貝母去心

一錢共爲細末煉蜜爲丸如小指頭大乘濕以硃

醫品補遺 卷一 育嬰 痘疹原集

砂三錢飛淨爲衣每用一九入好金箔一張淡薑

湯化下有熱加竹葉煎湯下 痘疹原集

仙傳神効定驚散 治急驚風痰最妙

生石膏十兩辰砂五錢共研細末和勻每服一錢

生薑湯調下累用累驗急救方

驚風口噤

生南星末同薑汁擦之自開 急救方

小兒驚風

同前法洗淨口裏急同薄出火而貼之即驗海

上方

見生三五日鼻塞氣急飲乳啼叫不止

慈葉猪牙皂角去皮爲末各七條共搗成膏貼顙

門 刻利方

小兒胃寒吐乳

白豆蔻仁十四個砂仁十四個生甘草二錢炙甘

草二錢爲末常摻入兒口中得效方

小兒驚啼

黃芩人參等分爲末每服一字水飲下即止 外臺

醫品補遺 卷一 育嬰 痘疹原集

方

小兒胎熱

甘草一錢黑豆二錢淡竹葉七莖燈心七莖水煎

不拘時服 勿科方

小兒傷寒發熱昏迷服合不開諸藥不效用此有驗

取多年糞坑中瓦片洗淨以大碗碗上架柴片二

條將瓦片燒紅放柴片上用滾水衝瓦片上滾流

入碗之水與小兒服之即眼開熱退鼻涕流通而

神清矣再用慈葉湯清頭淋洗 普濟方

小兒熱眼

南星四分大黃六分爲末醋調勻左眼敷右脚心
右眼敷左脚心縛住俟口內聞藥氣即愈簡易方

又方

水調黃連末貼足心甚效心鑑方

耳膿不乾

山羊角燒存性爲末每吹二三分入內一日二次
三日全愈勿科方

口水流不絕

醫品補遺

卷一

育嬰

六

煥輝堂

用熱水一盆入白礬一勾將兒兩足頻頻洗之立

瘥急救方

又方

釜底墨時搽普濟方

口瘡

黃柏蜜炙赤半兩青黛一分爲末類摻患處湯液

方

走馬疳蝕透骨穿腮

生南星一個當心剉空入雄黃一塊麝香燒候雄

黃作汁以蠶子蓋定出火毒去麝爲末入麝香少

許拂瘡甚效經驗方

小兒疳瘡腎疳鼻疳頭瘡耳瘡久不瘥者

石綠白芷等分爲末先以甘草水洗瘡拭淨敷之
一日愈集方

小兒鼻蠱鼻下兩道赤色有疳

以米泔洗淨用黃連末敷之口三四次秘錄方

鼻疳蝕爛

胆礬燒盡烟研末摻之一二日即愈集簡方

醫品補遺

卷一

育嬰

七

煥輝堂

白禿癩瘡

石灰窰內燒紅流結土渣四兩百草霜一兩雄黃
一兩胆礬陸錢榆皮三錢輕粉一錢爲末猪胆汁

調剃頭後搽之神効積德堂方

小兒軟癰

大枳壳一個去白磨口平以麝糊抹適合癰上自
出濃血盡更無痕也得効方

又方

大半頭一個搗如泥敷于瘡上自乾簡便方

頭耳諸瘡眉癬燕窩瘡

並用肥皂煨存性一錢枯礬一分研勻香油調塗
摘玄方

小兒瘰癧

脂麻連齋等分為末白湯調類類食之簡便方

小兒肝瘤遊走入腹必死初發即以截風散截之

白芷寒水石為末葱汁調塗全幼方

小兒赤遊風行於上下至心即死

苳硝一兩滾湯兩酒盞溶硝拭冊上妙聖惠方

醫品補遺

卷一

育嬰

四八

經聖堂

又方

棗豆五錢大黃二錢為末川薄荷汁和蜜塗全幼方

小兒月內疳瘡滿頭及渾身脫皮者

多年尿肌內紅色磚焙乾為末香油調搽神効急

救方

小兒毒氣攻腮赤腫可畏

皂角去核二兩生南星二錢糯米一合為末薑汁

調塗立效本方

小兒瘡疾

代赭石五枚煨紅醋淬硃砂五分硃霜一豆大同

以紙包七重打濕煨乾入麝香少許為末香油調

一字塗鼻尖上及眉心四肢神應保幼方

焦餅方 和中健脾去積溫胃小兒常服可無疳疾

水紅花子炒四兩雞肫皮不見水焙刷淨二兩白

朮五錢米泔水浸去澁水切片晒同麥芽拌炒去

麥芽不用山藥乳拌透晒微炒五錢白茯苓一兩

用砂仁同合碗內飯上蒸熟去砂仁不用陳皮用

老米先炒黃色方入同炒微燥勿焦三錢白豆蔻

醫品補遺

卷一

育嬰

四九

經聖堂

去壳二錢人參三錢炙甘草二錢蓮肉去心五錢

小紫蘇蜜拌透晒乾微蒸片時連梗葉二錢人參

三錢共為細末用白麵二兩芝麻去皮炒香

四兩同藥末令一匙拌極勻用白糖八兩化水和

務使不稀不稠烙成極薄焦餅食用臨和時再入

香油一茶盃取其酥脆更妙經聖堂原集

瘰癧

水紅花熬膏每膏一碗加生大黃末一兩米片三

錢乳香沒藥各二錢半磨香二分攤貼熱即退瘰

漸消王駿公傳

小兒嘔吐及吐瀉不止水穀不納

用多年灶心赤土為細末每服一錢米飲調下効
秘方

小兒傷寒吐瀉煩渴

穀精草燒存性用器覆之放冷為末每冷米飲服

半錢保嬰方

陰積腫大不消

礪砂一分水研塗之奇效 集玄方

醫品補遺

卷一 育嬰 四

慎卿堂

小兒脫肛

猪脂二兩煉入蒲黃末 兩成膏塗腸頭上即縮

入切料方

小兒脾濕

胡粉入麝香少許搽之保元方

小兒聲啞

井草薄荷各五分桔梗冬各一錢水煎服 心鑑

小兒久瀉不愈

五倍子焙焦為末和陳醋 貼臍上効 微順堂

痘疹門

附麻疹 聶久吾著

加味升麻葛根湯 治初起增寒壯熱咳嗽鼻流清

涕多因於外感不可不發散也凡體氣素壯實者

宜用此

白粉葛一錢升麻八分赤芍六分甘草桔梗去蘆

各三分蘇葉五分小川芎四分山查淨肉八分準

牛旁子棟淨炒香研碎伍分生薑三片熱服取微

汗

醫品補遺

卷一 痘疹 四

慎卿堂

加味參蘂飲 治痘同前此體氣素弱者宜用此

人參三分紫蘇葉五分桔梗前胡各四分陳皮二

分甘草二分白茯苓去皮五分粉葛八分製半夏

三分牛旁子製同前四分山查肉六分生薑三片

熱服取微汗以上二方即是傷感而非痘疹服之

發汗無妨

升消平胃散 發熱之際有偶感風寒飲食停滯而

作痛者宜用此

炒香附蒼朮紫蘇葉淨炒厚朴各五分霍香砂仁

研碎白芷去白陳皮各三分炙甘草二分炒麥芽
六分山查肉一錢生薑三片同煎帶熱服其痛即
止

傷食痛者其痛多急疾而啼叫必甚多在臍以上痛
面必青白唇淡手足冷毒氣痛者痛稍延緩而有
作有止多在臍以下或連臍而痛面或紅色而唇
紫手足不冷此二者必分辨明白方可用藥

參砂和胃散 治胃氣弱而有寒嘔吐不思飲食或

食下即吐其吐多頻快而無聲面青白唇淡神倦

腎品補遺 卷一 痘症 四十二 娛聯堂

人參四分砂仁研碎製半夏各四分白朮去蘆刮

去皮炒白茯苓去皮各五分霍香陳皮各五分炙

甘草三分煨薑去皮三片同煎

朮苓調脾散 治脾氣虛弱飲食不化而瀉泄者其

瀉滑利而色帶白宜用此方

白朮白茯苓製俱同前各七分酒炒白芍真神麴

炒炙甘草各五分白扁豆薑汁浸去壳八分砂仁

炒香附米製厚朴各三分煨薑三片大棗一枚去

核同煎或加入人參三分

或有毒氣作吐瀉者其吐必酸刺而有聲神氣不甚
困倦其泄必黃色臭穢雖或吐泄交作腹多不痛
此則毒氣由吐泄而發洩所謂吐瀉為煩候而不
必止者惟此一症耳

清解散 身熱至二三日後痘欲出不出或煩悶癢

摘或狂言譫語此毒氣壅盛于內而致者宜用此

方

防風荆芥蟬蜋桔梗小川芎各四分前胡乾葛升

麻各五分酒炒黃芩黃連紫草木通各六分牛旁

腎品補遺 卷一 痘症 四十三 娛聯堂

炒礪連喬去心葦山查各八分甘草三分生薑三

片煎溫服

蘇解散 內毒本盛外為風寒所束滯而不得出而

癢搔狂燥者宜用此

即前方去參連加紫蘇白芷各五分川羌活五分

生薑三片帶熱服

溫中益氣湯 治氣血虛弱送毒榮不出而癢搔狂

燥者宜用此

人參白朮製同前各五分黃芪生用八分當歸半

酒洗白茯苓各六分炙甘草川芎各四分白芷防風各四分南木香二分官桂二分山查肉六分用薑一片大棗一枚同煎一服中病即止切不可過服

調元化毒湯 發熱至三四日報豆形如粟米口鼻腮耳年壽之間先發數點淡紅潤澤者最吉不可服藥若身熱一二日即出痘先發於天庭司空印堂等處者或一齊出而稠密者或乾枯而紫黑者或成片不分顆粒者皆氣血凝滯而毒氣肆行是

醫品補遺

卷一

痘症

四

煥輝堂

為可憂宜用此

綿黃芪生用八分人參四分白芍生用酒洗當歸酒洗各六分牛旁製連喬各七分酒炒芩連各八分防風荆芥枯梗前胡木通各五分紫草茸酒洗各六分紅花生地俱酒洗各三分甘草蟬蛻各四分山查肉八分生薑一片同煎溫服腹痛者去參芪加炒枳殼八分大便秘者參芪不用加酒炒大黃一錢五分微利之大便秘仍除之若血氣與毒氣俱旺而脈洪數者歸芍減三之一去參芪

加減參蘇飲 鼻塞聲重咳嗽惡寒而痘出不快此風寒蔽之也宜用此

蘇葉六分人參陳皮小川芎羌活防風荆芥各四分桔梗白芷甘草各三分或寒月加麻黃五分薑三片同煎帶熱服不可發汗

平和湯 或有因邪穢所觸而出不快者其痘必癢宜用此湯解之外燒蒼朮沉檀紅束等燒碎其氣人參四分當歸桔梗白芍紫蘇黃芪各四分防風白芷甘草各三分官桂沉香檀香乳香霍香各四分

醫品補遺

卷一

痘症

四

煥輝堂

分薑一片同煎溫服

薑附湯 痘正出時忽然傳風眼直視牙關緊者此調護不謹而為風邪所襲也且勿輕用驅風峻藥宜用此

白附子二錢老生薑二錢切細二味濃煎湯灌下一二酒杯出微汗即愈

清毒和血湯 毒氣熾盛則血燥而凝故不能運化而成膿痘色紅紫乾枯或帶焦黑不能成膿者宜用此並治紫陷

紫草茸當歸俱酒洗前胡牛旁子木通各六分生
地黃生白芍俱酒洗連喬枯梗各五分酒炒芩連
各七分非草四分山查肉八分人參三分生黃芪
八分生薑一片同煎煩渴者去參芪加麥門冬酒
炒花粉各八分

參歸鹿茸湯 元氣虛弱則血寒而縮不能運化而
成膿痘色淡白疱不尖圓無紅暈者氣虛而血縮
也必不成膿宜用此並治灰陷白陷

鹿茸酒塗灸去毛勿用酥灸恐其蠶也三錢嫩綿

醫品補遺

卷一

痘症 四六

娛暉堂

黃芪蜜炙一錢五分歸身酒洗錢五分炙甘草六
分人參一錢二分生薑一片好龍眼三個同煎去
渣入好酒一盃溫服見有能飲酒者濃煎藥汁與
酒相半和服若虛弱未甚者服此一二劑其痘即
轉紅活行漿因倦手足冷飲食少者加木香三分
丁香五分官桂五分寒戰泄瀉者再加桂附各三
分另用參朮散止瀉方見後托膿之劑莫妙于此
方以鹿茸補血力峻與草木諸補藥不同然恐鹿
茸未必得故又錄千金方備用

千金內托散

人參一錢當歸身蜜炙黃芪各一錢五分酒炒白
芍大川芎各六分炙甘草山查肉各五分南木香
防風白芷炒厚朴各三分官桂五分生薑一片龍
眼肉三個同煎入好酒和服隨症加減法同上
參芪湯 一種豆瘡顆粒通紅成血疱而不成漿者
此氣虛不能統血而血溢妄居氣位也名曰不治
參成血隨宜用此

人參五錢蜜炙黃芪五錢炙甘草一錢官桂五分

醫品補遺

卷一

痘症

四七

娛暉堂

生薑一片同煎溫服此此胞即轉白而成漿血疱
失治則氣愈虛而為血陷然治之亦不外此方血
陷與紫陷相類但血陷雖紅而不紫紫陷屬熱身
熱氣粗血陷屬虛身涼氣少
參麥清補湯 一種出痘稠密毒火既盛然元氣虛
血氣弱津液枯竭不能制火以致虛火炎蒸或煩
或渴或咽喉痛或鼻時出血難任溫補痘必不能
成漿結痂大凡年長之男女嗜慾既開血氣既耗
者多有此症最為難治不可率用清涼之藥以致

氣血愈虧毒氣肆行宜用此

人參八分麥冬去心酒蒸晒乾一錢二分白芍粉
酒蒸晒乾生黃芪各一錢前胡牛旁子各五分炙
甘草生甘草各三分酒炒白芍生白芍各四分當
歸酒洗八分紅花酒洗三分大川芎生地黃酒洗
各三分桔梗三分山查肉五分生薑一片龍眼肉
三個同煎溫服遇此症者此藥當頻頻服
梔連二陳湯 吐而酸苦有聲吐訖反快者毒火上
騰也此痘色必紅紫

醫品補遺

卷一 痘症 四八

娛輝堂

薑汁炒黃連薑汁炒梔子各五分白茯苓八分製
半夏四分去白陳皮炙甘草各二分生薑一片同
煎服

吐而有物無聲不酸不苦困倦不思飲食者胃氣損
也痘色必淡白參砂和胃散主之方見前

加味四苓散 泄瀉臭黃臭穢小便赤澀者痘色必
紅紫宜用此

朱苓木通各四分澤瀉赤茯苓各七分車前子炒
黃芩黃連俱乾炒牛旁子製見前各五分燈心一

丸食前服

參朮散 泄瀉糞青白滑利者虛寒也痘色必淡白

宜用此

白朮用裏白無油者去蘆刮去皮一兩人參白茯
苓去皮砂仁炙甘草去皮蘆改仁炒熟揀淨家蓮
子去心炒真神麴炒山查肉各五錢柯子煨取肉
去核廣陳皮洗淨去筋膜晒各四錢肉豆蔻麴包
煨熟去麴切細用火昏包打去油南木香三錢以
上共為細末每用二錢清米飲調食前服凡有不

醫品補遺

卷一 痘症 四九

娛輝堂

肯服者入稀粥內和服亦可

七味豆蔻丸 治虛滑不止

柯子肉豆蔻製同前砂仁南木香白龍骨煨各五
錢赤石脂煨枯白礬各七錢麴糊為丸如菉豆大
每用清米飲下三十九或二十九量凡大小與之
不能吞者將藥研碎入粥內服之亦可

起脹灌濃時或有六七日不大便而塞悶作痛者毒
盛而秘也用前清毒和血湯去參芪加懷牛膝紫
草當歸各加至二錢煎藥熟去渣入生蜜半酒杯

服之如又不通用前藥加酒炒大黃錢半微利之
若仍不通用猪胆汁滴入穀道中即通終不可用
硝黃大下恐下變生他症則危矣

身涼而汗不止者歸芪湯主之

當歸身五錢蜜炙黃芪三錢東仁炒研三錢水煎
服

有痰用白附子熱水磨服切不可用二陳湯恐燥陽
明孤陽無陰不能施化也

養胃開痰湯 痘出八九日稠密而膿不甚滿此時

醫品補遺

卷一

痘症

五十

娛暉堂

飲食多減痰液多盛宜用

人參白朮炙甘草白茯苓山查肉山藥炒家蓮子
去心炒各五分去白陳皮三分製半夏枯梗各三
分淮膿時忌用朮苓半夏恐其燥乾津液膿聚不
能行也至此漿騰時可用以上十味用生薑一片
同煎服湯者去半夏加麥冬去心八分北五味研
碎九粒吐逆者加藿香砂仁各三錢

此時有欬逆者俗呼呃絡胃氣上越也取真黃土鼻
邊聞之立止

此時漿滿或為寒所薄一時痘俱紫黑如紫葡萄色
不必驚恐急以上好肉桂磨湯或煎服之立見如
舊有咬牙寒戰者此真氣外發而內虛寒也宜用
建中湯

人參揀去蘆二錢蜜炙黃芪三錢白朮當歸各一
錢五分大川芎八分大附子製乾薑炮帶黑色肉
桂炙甘草各一錢丁香五分生薑一片同煎溫服
一服立止甚者不過二服收靨後寒戰咬牙者同
此方調治

醫品補遺

卷一

痘症

五十

娛暉堂

溫表調中湯 元氣虛不能及時回水當靨不靨此

虛寒症也身涼而手足冷須大補氣血宜用此

黃芪蜜炙二錢白朮白茯苓官桂大川芎當歸身
炙甘草炒乾薑各一錢防風八分白芷丁香附子
各五分生薑一片同煎溫服

清表散毒湯 發熱熏蒸當靨不靨者毒氣未解也
退其熱則痘自收宜用此

地骨皮麥門冬去心酒炒花粉各八分牛旁連翹
當歸各五分朱苓澤瀉酒炒黃芩木通生甘草各

四分水煎溫服

痘屬時有外潰而膿水淋漓者謂之水靨宜用新瓦爲末篩令極細絹袋包撲患處若乾痂堆積不落內又膏膿卽以瓦粉用鴨蛋調敷之立收而落

消毒散血湯 當靨時或忽然腹痛着在中脘此熱毒凝滯瘀血作痛也宜用此

牛旁生白芍酒洗桃仁炒去皮尖研爛酒炒大黃各一錢紅花酒洗沒藥乳香俱用燈心同研細煎藥將熟投入各五分水煎溫服一服立愈結痂厚

醫品補遺

卷一 痘症

五十二

娛暉堂

實無他症者不必服藥

大連翹飲 結痂後發熱盛胸腹手足頭面俱熱大便閉小便澀餘毒盛也若解毒遲則痂落後必發癰毒宜用此

連翹牛旁柴胡去蘆當歸赤芍防風各八分木通車前子荆芥酒炒山梔酒炒黃芩滑石甘草蟬退各五分生薑一片同煎服大便閉者加酒炒大黃一錢五分

補中益氣湯

熟稍緩頭熱而不熱手心腳心熱

手背腳背不熱精神困倦大小便利者虛熱也宜用此

人參八分蜜炙黃芪一錢白朮當歸身各八分柴胡升麻川芎各四分炙甘草五分陳皮四分生薑一片同煎溫服湯加麥冬一錢五味九粒

痘有夾斑而出者有紅赤點而無顆粒多隨出而隨沒又有夾丹而出者紅赤成片如雲頭而空起此皆毒火浮遊散漫於皮膚之間也遇此者不必驚惶但用玄參升麻湯一二劑散其遊火其班丹自退

醫品補遺

卷一

痘症

五十三

娛暉堂

退

玄參升麻湯

玄參去蘆升麻去小根各二錢甘草八分防風荆芥牛旁子各六分水煎溫服

有夾麻痘疹而出者用前方加桔梗酒炒黃芩各六分令其麻疹先退痘瘡自當起發

參芪實表湯 痘養表虛也此爲危症急用此

蜜炒黃芪一錢五分人參一錢炙甘草官桂防風白芷各八分當歸川芎桔梗厚朴各六分南木香

三分生薑一片溫服

參歸大補湯 痘出齊後有面目腫脹而痘不脹者此血氣虛弱不能拘攝毒氣以成膿故其毒散漫妄行肉分也此為危候宜大補氣血以收攝其毒則痘灌膿而肉脹自消矣宜用此

人參膏歸蜜炙黃芪各一錢二分川芎桔梗山查肉炙甘草各八分防風白芷薑炒厚朴紫草茸各六分南木香三分生薑一片同煎溫服

四聖膏 痘出齊後其間有紫黑脹硬獨大而無根

醫品補遺

卷一

痘症

五十四

娛齋堂

暈者痘疔也用此膏填入或拔毒散點之

珍珠豌豆亂髮俱燒存性等分水片半分用油脂調成膏先將金銀簪撥開疔口將藥填入瘡內

卽轉紅活

拔毒散 雄黃一錢研細脂濃浸水調點疔頭上

卽時紅活

生肌散 痘瘡原多潰爛收結後或手足等處仍作熱臭爛出膿水不止者宜用此

地骨皮黃連炒黃柏炒五倍子生甘草等分爲細

末乾摻之卽熱退結痂而愈其有仍作熱作膿而不卽愈者內毒猶未盡也仍用大連香飲解之綿薑散 餘毒流注各處出清水宜用此

出蛾綿繭不拘多少用生白礬填在內燒令汁盡成灰爲末乾摻之

髮灰散 鼻中衄血毒氣上衝于肺也宜用此

用少壯無病人亂髮不拘男女肥皂洗淨垢氣又用溫湯洗淨皂角氣焙乾量髮多少用新瓦罐一個將髮填入內令滿淨瓦片蓋口鹽和泥封之

醫品補遺

卷一

痘症

五十五

娛齋堂

又全封瓦罐晒乾用木炭火圍罐一半煨一柱香久取出候冷其灰成塊研令極細每用二錢童便七分酒三分調服立止輕者只用灰吹鼻亦止

清肺湯 治同前

潮洗花粉麥門冬去心天門冬去心皮酒蒸甘草桔梗膏歸酒洗各五分酒浸生白芍酒炒片芩酒洗牡丹皮蜜炒知母各四分生薑一片同煎一二服立止或加髮灰一錢調服

清上飲 口舌生瘡色紅紫湧盛者熱毒也宜用

此

薄荷防風甘草各四分白粉葛牛旁連喬桔梗酒
炒芩連酒炒花粉麥門冬各六分生薑一片同煎
溫服如痘色淡白口舌生瘡者虛火也川參麥清
補湯主之方見前

起瘧散 薄荷葉黃柏各等分爲細末入青黛水許
和勻搽口瘡處

利咽解毒湯 治咽喉腫痛外用玉鎖匙吹之

麥門冬玄參桔梗牛旁子各一錢防風甘草各五

醫品補遺

卷一 痘症 五十六

娛暉堂

分山豆一錢生薑一片同煎食久溫服每藥一煎
分二三起緩服

玉鎖匙

礪砂一錢朴硝五分燂金一條片腦半分右爲細
末以竹管吹之

導赤散 小便赤色者用

赤茯苓去皮麥門冬各八分車前子微炒生地各
四分甘草人參各二分木通八分燈心一團如龍
眼大同煎服時服

清毒撥翳湯 餘毒上攻眼目生翳疼痛宜用此

酒炒黃連當歸酒洗天花粉酒蒸牛旁子草決明
桔梗五分甘草五分真甘菊花蜜蒙花穀精草白
蒺藜炒研去刺五分川木賊白粉葛各四分川芎
羌活柴胡防風薄荷生地黃酒炒山梔各三分生
薑一片同煎食後良久服大便秘塞者加酒炒大
黃一錢五分服一二劑後仍去之此方毒輕者不
滿十劑而愈毒重者服數十劑然後可獲全効

麻疹

醫品補遺

卷一 麻疹 五十七

娛暉堂

宣毒發表湯 治初熱麻欲出未出時宜用此

升麻白粉葛各八分防風桔梗各五分荆芥薄荷
甘草各三分牛旁子炒香研細連喬去心蒂研碎
前胡枳殼炒木通淡竹葉各六分炙甘草熟地
化毒清表湯 麻已出面紅腫太甚宜用此

牛旁子製同前連喬天花粉地骨皮黃連黃芩山
梔炒知母乾葛各八分桔梗前胡木通各六
分甘草薄荷防風各三分口渴加麥冬去心一錢
白石膏服亦三劑 便澀加酒炒大黃一錢二分

清熱解毒湯 有瘡氣流注而成痼者宜用此

黃連條芩白芍炒枳殼山查肉各一錢厚朴薑汁
炒青皮檳榔各六分當歸甘草牛蒡子連翹紅參
者加紅花三分地榆五分泌瀉甚者加酒炒大黃
一錢二分

卷一 麻疹 五十八

醫品補遺卷之二

廣寧郎廷模貞君父彙集

男 文炳 女 文燾 仝較

頭面門

鬚髮 耳目 鼻病

口舌 齒病

歸芳定痛湯 治血虛頭痛神效

白芷防風北細辛甘草當歸川芎熟地薄荷各等
分薑三片棗一枚酒水各一鍾半煎七分食後溫
服頭頂痛甚加萊本一錢 王駿公傳

醫品補遺

卷二 頭面

一 經緯堂

大頭病

蠶蚕二兩蟬蜋薑黃各二錢半大黃四兩共為末
薑汁糊為丸一錢一丸大人一丸小兒半丸蜜水
調服 王駿公傳

破腦風

南星末醋調貼 王駿公傳

兩腮紅腫

百合一個山芝麻根去皮貝母玄明粉各一錢銀
硃七分加麝少許濃調敷一二次即消 王駿公傳

治冬春風寒頭疼

羌活七分防風六分川芎七分藁本七分蒼朮五分薄荷五分蔓荊子研五分陳皮七分半夏七分枳殼六分元參八分連翹五分炒梔仁八分薑三片水煎服娛暉堂原集

治夏秋火鬱頭疼

大黃酒炒一錢石膏煨一錢滑石一錢柴胡七分黃芩酒炒七分知母七分胆草五分川芎六分藁本七分元參八分枳實六分梔仁七分薑三片竹

醫品補遺

卷二 頭面

二

娛暉堂

葉十片水煎入玄明粉一錢調服娛暉堂原集

偏頭痛

黃蠟三兩溶化以白紙調二寸長五寸在蠟上拖勻真蘄艾揉軟薄攤蠟上箸捲爲筒插耳中一頭火燃烟氣透腦其痛即止不發左疼插右耳右疼插左耳至重不過二次或硝石末吹鼻亦愈急救方

又方

藁本細辛各五分白芷一錢辛夷八分爲細末分

作四劑用紙條捲實將火點以烟薰鼻吸入即愈濟世方

又方

新羅荷取自然汁入生龍腦少許調勻昂頭灌入鼻孔左痛灌右右痛灌左俱痛併灌目赤少時即愈王駿公傳

痰厥頭痛

牛旁子炒旋覆花等分末臘茶清服一錢日二服聖惠方

醫門補遺

卷二

偏頭痛

三

娛暉堂

一切血勞風氣頭痛及頭旋目眩眼疾

荆芥穗爲末酒服三錢龍樹方

又血風攻腦頭旋悶絕忽死倒地不知人事者

蒼耳草嫩心陰乾爲末酒服一錢其功甚速此物

善通頂門連腦斗門方

頭風鼻流清涕

辛夷仁枇杷花各一兩爲細末醋酒調服二錢或搗服亦可濟世方

頭目重閉疼痛

葱葉揀入鼻內二三寸并耳內氣通卽便清爽

珍方

烏鬚方

何首烏黑豆生地黃各一斤爲末加蜂蜜一斤入淨錫內重湯煮如砂糖樣埋土中一七出火氣不拘時服濟世方

又方

紫茄初生子留一先結者餘俱摘去俟長足於近

醫品補遺

卷一

鬚髮

四

熙寧堂

蒂刺一孔入好京墨一錢仍掩好茄老藥成內化黑水磁器收貯將鬚稍浸染則黑至根永不變白如茄透出藥水以磁器接之染之亦黑急救方

又方

川烏二兩切片用生薑片相間鋪于碗內童便浸七日每日換童便一次去薑將川烏揀出全小茴香四兩炒微黃各揀出另碾生地二兩用酒浸七日勿經鉄器搗爛白茯苓二兩懷山藥二兩蒼朮二兩米泔浸過俱爲末川椒二兩生礬爲末以上

七味用麴糊入酒和勻爲丸如梧子大每服三十丸早晚二次不拘茶酒白水送下效

史璞菴傳

烏鬚固齒

大瓜蒌一個開頂入青鹽二兩杏仁去皮尖三七粒原頂合紫定煎爛泥和塩固濟炭火煨存性研末每日揩牙三次令熱百日有驗如先有白鬚援去以藥擦之卽生黑者其治口瘡之功未易具陳普濟方

眉毛脫落

醫品補遺

卷二

鬚髮

五

熙寧堂

用橄欖核火煨存性爲細末麻油調置火上微熱以手蘸油于兩眉處不住揩抹一夜卽生急救方

又方

芥菜子半夏等分爲末生薑自然汁調搽數次卽生集效方

髮槁不澤

木瓜浸油梳頭聖惠方

又方

生麻油以桑葉煮過去渣沫髮令長尺許普濟方

頭風白屑

王不謂行香白芷等分爲末乾摻一夜飽去聖惠方

耳病

耳閉

此細辛菖蒲木通各一錢麝香二厘共爲細末蠟丸綿裹塞耳卽通王駿公傳

膿耳

枯礬龍骨黃丹胭脂燒灰各一錢麝香少許爲末

醫品補遺

卷二 耳病

六

煨礬堂

摻入王駿公傳

又方

輕粉一錢麝香一分爲末摻之簡便方

耳邊生瘡

黃丹松香入分各研合勻香油調搽王駿公傳

又方

五倍炒黃連官粉雄黃滑石枯礬各一錢水銀五分錫灰共爲末香油調搽王駿公傳

聾耳

乾葫蘆子一分黃連五份爲末以綿先微淨吹入

半字効海上方

又方

枯礬頭髮瓦上煨等分爲末吹之濟世方

病後耳聾

生石菖蒲汁滴之聖惠方

耳鳴不止

生地黃截塞耳中日數易之或煨熟尤妙附後方

耳流膿水

醫品補遺

卷二 耳病

七

煨礬堂

青黛黃柏末乾敷用後方

凍耳成瘡

白欬黃柏等分爲末生油調搽坐翁方

螞蝗入耳

取田中泥一盞乾耳間氣卽出候吞入腹者酒和

泥一二升服當利出附參方

水入耳中

薄荷汁滴入立効外臺方

目病

加味四物龍胆湯 治風熱上壅眼暴赤神效

當歸酒洗一錢川芎酒洗芍藥酒浸炒家菊黃白
耆各入分生地黃酒洗五分羌活防風防己各水
洗山梔仁炒黑六分龍胆草枳殼蔓荊子各四分
麝加蟬蛻六分有障加木賊白蒺藜六分亦二鍾
煎八分食後服 王駿公傳

佛授羊肝丸 治赤眼成內障

夜明沙水淘淨當歸蟬殼木賊艸去節一兩爲細
末羊肝四兩白水煮熟搗爛如泥入前藥丸梧子

醫品補遺

卷二 目病

八

煨犀堂

大食後溫水下五十粒百日效 王駿公傳

雲翳疼痛

白菊花白芍藥白蒺藜炒去刺荆芥連翹各一錢
蜜蒙花川羌活當歸白朮黃連黃柏蟬蛻去翅足
白茯苓草決明并草各五分水二鍾煎一鍾食後
溫服 王駿公傳

治時行害眼并風眼有淚

皮硝六錢水一鍾煎七分候冷洗 王駿公傳

暴赤眼初起

黃連三分洗淨切碎明礬一豆大許紅棗肉裹蒸
以礬化爲度去棗用人乳浸點效 王駿公傳

風紅爛眼方

水片五厘銅綠五分艾葉七枚香油七滴清水一
碗將藥入內以碗合住鍋內頓三滾取出洗之
甚效 王駿公傳

治一切目疾火眼不論新久洗三日卽愈屢試屢效

當歸黃連各一錢朴硝二錢銅青并草石燕火煨
紅各五分共爲細末每日用一錢以白絹袋裹入

醫品補遺

卷二 目病

九

煨犀堂

磁碗中以滾水浸之乘熱洗水冷另頓熱再洗日
數次 王駿公傳

月發眼方

歸尾白芍黃芩黃柏梔子各四分黃連五分杏仁
一個防風三分荆芥二分銅青生礬燒塩各一豆
許盛磁鍾內滾水滾過煮三四滾用白綿紙一層
加銅錢二文壓之用清藥水洗效 王駿公傳

决明丸 治中年眼目昏花早晚二服妙
蔓菁子煮熟炒晒乾切去油爲末草决明微炒爲

末各十二兩沙苑蒺藜半斤熬膏共爲丸每服七十丸食遠白湯下主駿公傳

治眼昏花

當歸熟地沙苑蒺藜玄參忌鐵白芍酒炒各一錢川芎知母塩水炒忌鐵天冬各八分防風七分菊花五分水二鍾煎八分食遠服王駿公傳

暴赤人眼腫痛

大雪梨一個去皮核用指頂大明礬一塊同搗如泥入碗內上以綿紙掩蓋捺一窩候汁滿窩用指

醫品補遺

卷二 月病

煥輝堂

蘸汁抹眼三度即愈急救方

又方

瓦松同白礬搗爛敷太陽上即愈急救方

又方

蘆葦石火煨童便淬風化硝等分爲末以新汲水化一粟點之效御藥院方

又方

白礬煨過三錢爲末以生薑去皮取自然汁調和膏抹紙上令患人閉目將藥貼眼上燒一炷香重

痛即止用溫水洗去腫消立效保元方

又方

大黃末新汲水調塗兩眉正上頭兩腦水潤之須臾腫消痛止保元方

紫金錠

銅綠五分輕粉二錢官粉三兩爲細末用川黃連四兩剉粗末并水十鍾浸二三日煎至三鍾去渣再煎至半鍾下水膠一錢二分溶調藥爲錠陰乾用時并水磨點風熱火眼神效加熊膽五分水片

醫品補遺

卷二 月病

十一

煥輝堂

二分尤妙陳省齋方

又方

小紅束去皮核將皂礬入束內紫佳火煨通紅冷定爲末生張豆一撮水煎一滾取汁調藥以絹隔藥指蘸汁洗眼三五次立效有翳者洗兩三日後以指搽眼其翳即落急救方

又方

皂礬不拘多少瓦器盛于三伏內晒之至白色須臾十餘日方好入黃連末十分之一每用少許水

和紙隔洗爛弦風眼立効保元方

目中翳膜

穀精草防風等分爲末米飲服甚驗明目方

目中浮翳遮睛

白鹽生研少許頻點屢驗小兒亦宜直指方

逃風流淚

川羌活柴胡防風甘草等分爲末每服一錢薄荷

湯食遠溫服蜜丸亦可急救方

青盲雀目

醫品補遺

卷二 目病

十三

經聖堂

馬蹄尖明一升地膚子五兩爲末米飲九梧子大

每米飲下二三十丸普濟方

龍膽丸 治眼兩胞粘睛腫痛赤爛成瘡

苦參龍膽草牛旁子等分爲末煉蜜丸梧子大每

服二十九食後米泔送下急救方

赤脉貫瞳

玄參爲末米泔煮猪肝日蘸食之 濟急方

傷眼青腫

紫荊皮小便晨七日曬乾研用生地黃汁蘆汁調

敷永類方

一緣散 治打撲損傷眼胞赤腫疼痛

芙蓉葉生地黃等分搗爛敷眼胞上或爲末雞子

清調服急救方

物傷睛陷努肉突出

地膚草洗去土二兩搗絞汁每點少許冬月以乾

者煮濃汁聖惠方

飛絲入眼令人舌上生泡

紫蘇葉嚼爛以白湯嚥之得效方

醫品補遺

卷二 鼻病

十三

經聖堂

眼紅

用葶薺汁塗上卽好急救方

明目枕

苦蕎麥皮夾明子菊花同作枕至老目明雜興方

(鼻病)

辛夷清肺散 治鼻中生瘰肉結成如橘子漸大下

垂閉塞孔竅

辛夷六分黃芩山梔麥冬百合石膏知母各一錢

甘草五分枇杷葉三片去毛升麻二分水二鍾煎

八分食後服 王駿公傳

礪砂散 照炮肉

礪砂一錢輕粉三分水片五厘雄黃三分共為細末用草枯咬毛蘸藥日點五六次漸化為水效 王駿公傳

又方

藕節有毛處一節燒灰存性為末吹患處立瘥保元方

鼻淵又名腦漏 鼻流濁涕或流黃水不止

醫品補遺

卷二

鼻病

山

經輝堂

辛夷仁五錢蒼耳草炒二錢半白芷一兩薄荷五分為末每服二錢清茶調食後服 王駿公傳

鼻塞不通

菖蒲皂角等分為末每用一錢以綿包裹塞鼻仰臥少頃即效 急救方

又方

我不食草搽塞鼻中即通 急救方

鼻面赤皴

雄黃硫黃各五錢水粉二錢用醋生乳汁調敷不

過三五次愈 攝生方

又方

白欬白石脂杏仁各五錢為末鷄子清調夜塗旦洗 御院方

又方

苦參四兩當歸二兩為末酒糊丸梧子大食後熱茶下七八十九丸 保元方

又方

大黃芒硝枳榔等分為末水調敷患處三四次洗

醫品補遺

卷二

鼻病

十五

經輝堂

爭以新白果去壳嚼爛搽鼻不過五七次復舊 保元方

鼻痔爛通鼻孔

鹿角明礬各一兩俱放瓦上隔火煨過人髮五錢燈火上燒過共為末先以花椒湯洗爭搽三四次即愈如瘡不收口瓦松燒存性研末乾搽之 雲林方

老人鼻流清涕不能乾

獨蒜四五個搗如泥貼足心紙護即止 急救方

腦漏一服除根

馬兜鈴五錢麻黃三錢五味子甘草各二錢水二鍾煎七分加黑砂糖半小鍾歸時溫服急救方

又方

荔枝一個開孔將髮垢填滿埋微火內將厚匕住上接一筒引烟入鼻熏之慢吸其烟燒過二枚即愈急救方

又方

石首魚燒灰為末吹入鼻內即愈急救方

醫品補遺

卷二

口舌

十六

熙暉堂

又方

縛木頭紅皮藤燒有性為末每酒服三錢服後覺有一線從鼻至背脊而下股其腦漏隨愈急救方

(口舌)

蘆薈散 治口疳

蘆薈胡黃連孩兒茶薄荷各五分青黛三分硼砂

二分冰片半分為細末吹患處王駿公傳

神效黃芪湯

治口唇麻冷甚効

黃芪蜜炙二錢五分人參陳皮各一錢芍藥一錢

五分炙甘草八分蔓荊子七分木鍾半煎入分食遠服王駿公傳

加味清胃散 治熱甚口瘡

升麻六分黃連酒炒生地丹皮連翹赤茯苓赤芍木通各一錢石膏三錢薄荷六分甘草三分水煎食遠熱服王駿公傳

口瘡日久不愈

胆礬五錢入銀鍋內火煨赤出毒一夜細研每以少許敷之吐出酸涎水二三次即瘡勝全方

醫品補遺

卷二

口舌

十七

熙暉堂

又方

五倍子一兩黃柏蜜炙五錢滑石五錢為末漱淨搽之便可飲食滯塞方

又方

黃連乾薑青黛兒茶等分為末少許搽患處立效保元方

又方

白礬生一錢硃砂二分為末敷上立愈徐杏庄方

口吻生瘡

編砂壳煨研擦之即愈簡易方

太陰口瘡

甘草二寸白礬一粟大同嚼嚥汁効保命方

又方

石膏香附蘇梗大黃各二錢煎水溫漱口瘡疼痛

立止濟世方

舌卒腫大塞口

釜底墨和酒塗之千金方

又方

醫品補遺

卷二 口舌

十八

懷輝堂

井草煎濃湯瀦漱頻吐聖濟方

舌忽脹出口外

雄雞冠血盞盛浸舌嚥下即縮王駿公傳

舌腫

蒲黃末摻之又用白草霜爲細末醋調敷王駿公傳

又方

亂髮燒灰水調下王駿公傳

舌長過寸

研水片敷之即收保元方

舌腫硬

用百草霜海鹽等分爲末井草水調敷保元方

又方

白礬一錢雄黃五分水片二厘爲末吹舌上效濟世方

牙疼

牙疼按經分治方

生地丹皮軟石膏煨青皮防半荆芥甘草各一錢

醫品補遺

卷二 口舌

十九

懷輝堂

爲君四門牙上屬心加黃連麥冬下屬腎加知母

黃柏兩邊牙上屬胃加川芎白芷下屬脾加白朮

白芍左盡頭上屬膽加羌活龍胆草下屬肝加柴

胡山桅右盡頭上屬大腸加大黃枳殼下屬肺加

黃芩桔梗此方屢驗如神凡加藥只五分水煎溫

服忌魚腥王駿公傳

擦牙散

法製鮮旱蓮草不拘多少水洗淨每草一斤川食

鹽二斤鹽一月或半月化成水入鍋內煎乾再炒

黑色揀去草枝研細聽用細辛去土細研聽用香
附米打碎炒黑餅末聽用骨碎補要鮮而肉白者
刮去毛切片鍋內炒至黑帶色研細聽用配合法
製塩一斤大黃末一兩五錢香附米一兩五錢細
辛末一兩骨碎補末二兩共和勻每早用手指蘸
藥擦牙以齒齦熱方佳能使動搖者堅風火虫痛
立止吐水洗眼大能烏髮明日效不可言 娛暉堂
主人常用

又方

醫品補遺

卷二

牙疼

止

娛暉堂

白茯苓白芷細辛熟石膏以上各一兩研細末五
倍子牙皂以上各一兩各火焙存性青塩三兩黃
泥包燒以上三味研細和前末每早擦之止牙疼
史璞菴傳

同齒妙方

浸石子一錢青塩四兩熟地一兩酒浸三日焙乾
研末槐角子一兩細辛二錢破故紙一兩炒地骨
皮一兩百藥煎一錢共爲末每日清晨漱擦用開
水嚥下不可間斷 史璞菴傳

風熱牙齦腫痛

薄荷二錢羌活三錢大黃一錢水二鍾煎至一鍾
去渣溫漱吐出 濟世方

又方

細辛猪牙皂白芷各一錢防風五分爲末用柳枝
蘸湯漱過擦之立效 濟世方

風熱牙痛

百年石灰爲末四兩蜂蜜三兩拌勻塩泥固濟火
煨一日研末擦之神效 三才方

醫品補遺

卷二

牙疼

止

娛暉堂

又方

剉松樹上脂滾水泡化一漱即止試驗集簡方

又方

使君子煎湯頻漱効 集簡方

又方

化蠟少許攤紙上鋪艾以箸捲成筒燒烟隨左右
熏鼻吸令滿口同氣閉止 普濟方

齦常出血漸至崩者 吳極効

大黃米泔浸軟生薑黃各切一片合定貼上一夜

未愈再貼忌說話恐引風 本事方

腎虛牙腫痛

杜仲青鹽大黃炒牛膝炒為細末擦之立效 濟世方

又方

井松硫黃等分為末泡湯漱之吐出神效 經驗方

又方

木耳荆芥等分煎湯頻漱 普濟方

又方

醫品補遺

卷二

牙疼

廿二

吳郡堂

青荷葉剪取錢帝七個以濃米醋一盞煎半盞去

渣熬成膏抹之甚驗 經驗方

又方

蠶蚕直者生薑同炒赤黃色去薑為末以皂角水

調搽即止 普濟方

齒搖動及打傷

白蒺藜去角生研五錢淡漿水半碗入鹽調溫漱甚效或以根燒灰貼牙即牢固也 御醫方

牙動欲脫

生地綿裹嚥令汁漬牙根并嚥日五六次 千金方

又方

五倍子取一孔以白礬填滿煨過為細末擦之效 急救方

齒挺長分許

常咋生地黄妙 備急方

黃齲疳爛宣露臭敗

胡黃連五分膽礬兒茶各五厘細研搽之立愈 普濟方

醫品補遺

卷二

牙疼

廿三

吳郡堂

又方

五倍子炒焦一兩枯礬銅青各一錢為末先以米

泔漱爭搽之絕妙 集簡方

又方

瓦松白礬等分水煎漱 摘玄方

食蟬齲腫肉努出者

生地汁一碗以猪牙色藥炙汁盡為末敷之或以朴硝敷之即消 永類方

咽喉門

附骨哽

奪命無憂散 治咽喉腫痛熱痰壅盛

寒水石三兩煅玄參貫仲砂仁去壳滑石研黃連
去毛茯苓山豆根甘草炙荆芥各五錢礞砂三錢
爲細末每服一錢乾摻舌下新汲水研嚥不拘時
服效 王駿公傳

武侯行軍散

硃砂三錢雄黃三錢麝香五分礞砂五分火硝三

醫品補遺

卷二 咽喉

品

娛暉堂

錢冰片二分共爲細末磁器密收每用少許吹之
咽痛立止 娛暉堂原集

又方

膽礬白礬各等分生川其研極細初覺痛時用簪
筒吹入痛處閉口切勿嚥下火時口涎下流用溫
水漱之如此一二次卽消如遲覺已成形可日加
數次亦能消忌生冷物 王駿公傳

神効吹藥 治喉風閉塞及乳蛾喉痺等証

薄荷僵蚕青黛朴硝白礬火硝黃連礞砂各五錢

爲細末臘月朔取雄猪膽八個剖出膽汁少半和
藥拌勻復灌膽壳以線紮頭膽外用青紅紙包裹
將地掘一坑潤深一尺竹竿懸空橫吊上用板鋪
泥密蓋候立春日取出掛風處陰乾去膽皮青紙
磁器密收每築一兩加水片三分同研極細吹患
上神效 王駿公傳

丹砂立効散 專治一切喉嚨牙齒腫脹并點眼

礞砂一錢五分人熊膽三分牛黃三分冰片二分
半麝香二分火硝三錢五分黃丹一錢五分共爲

醫品補遺

卷二 咽喉

品

娛暉堂

細末按時節合成效要緊淨將磁罐收貯每用少
許吹點效 娛暉堂原集

化類下左邊痰核

橘紅五錢白茯苓五錢牡礞煨八錢撫芩四錢海
石煨一兩白附子煨五錢昆布醋煮三錢海藻醋
煮三錢僵蚕洗淨炒七錢川貝母去心七錢沉香
三錢蒼朮醋炒四錢共爲細末用半夏麴一兩爲
末淡薑汁打糊爲丸菜豆大每臨卧時白滾水服
二錢效 娛暉堂原集

治喉痺

馬啼香草取根搗井華水調下卽効三月方

又方

土牛膝春夏用莖秋冬用根一把青礬五錢同研
點患處吐痰涎卽愈或單用土牛膝連根葉搗汁
鵝翎掃入去痰最妙蘊要方

又方

燈心一錢黃柏五分並燒存性白礬七分煨過水
片三分爲末每以一二分吹患處極效集簡方

醫品補遺

卷二

咽喉

廿六

縣輝堂

又方

益母草搗爛入新汲水一碗絞濃汁頻飲隨吐愈
冬月用根易簡方

又方

絡石草一兩水一升煎一大盞細呷之少頃卽通
神效外臺方

又方

蒼耳根一把老薑一塊研汁入酒服聖濟方

咽中結塊不通水食危困欲死

百草霜蜜丸芡實子大新汲水化服一九灌下甚
者不過二丸名百靈丸普濟方

急喉痺

皂角生研末每以少許點患處外以醋調厚封頸
須臾便破出血卽愈或拔水灌之亦良集簡方

雙單乳蛾喉癰風腫吐衄不下死在須臾

山豆根爲末熊膽和丸用不落木鷄膽皮陰乾研
末爲衣丸如菴豆大每用一九放舌下徐嚥立愈
保元方

醫品補遺

卷二

咽喉

廿七

縣輝堂

又方

鳳凰衣微火焙黃橄欖核毛上火煨存性孩兒茶
等分爲末每一錢加水片半分吹入喉內卽能進
飲食濟世方

又方

玄明粉吹入喉中用井華水噙嚥卽愈神效濟世方

又方

覓頭上紅光瘡用針挑破卽愈急效方

喉痺失音不能言語

瓜蒌皮白蠟蚕炒甘草各二錢半為末每服三錢
半薑湯下或以綿裹五分含嚥一日二服即愈御
院方

又方

蘿蔔生搗汁薑汁同服 普濟方

又方

真蘇子百藥叟各二兩阿子三個杏仁三十個為
末熱酒調下二錢效 保元方

醫品補遺

卷二

咽喉

廿八

娛輝堂

又方

甘草烏梅烏藥桔梗等分水煎溫服 濟世方

喉痺口禁不開

猪牙皂一條用蜜調和水煎如急立服緩則露一
宿尤妙口禁幹開灌之重危立甦 保元方

又方

馬蘭根或葉搗汁入米醋少許滴鼻孔內或口灌
取痰自開 試效方

又方

青魚膽七枚入大黃末拌勻竹筒盛之待乾細研
吹入鼻內或喉中立效 保元方

神應散

雄黃枯礬藜蘆生用牙皂炙黃等分為末每用豆
許吹入鼻內吐痰神效 保元方

諸骨節之咽

一切骨哽

地菰馬鞭草各一握去根白梅肉一箇白礬一錢
搗作彈丸綿裹含嚥骨自軟下 普濟方

醫品補遺

卷二

咽喉

廿九

娛輝堂

又方

米醋煎白藥細嚥之在上即吐出在下出 普濟

又方

楮實煎湯服之 濟生方

又方

桑螵蛸醋煎呷之 經驗方

定痛散

真孕婦指甲二錢不見水鷄肫皮陰乾二錢熊膽
二分水片一分研極細磁罐收貯簫筒吹喉骨化

腫消痛即止 急救方

又方

人指甲燒存性為末吹入喉中立效 急救方

又方

山查水煎膏投入鷄骨即化為度能消一切骨哽
急救方

又方

芋藤根搗汁以匙挑灌之立效 試驗方

又方

醫品補遺

卷二 咽喉

冊

娛暉堂

車麻子仁研爛入百藥煎搗丸彈子大井華水化服半丸即下 聖濟方

鷄鵝骨哽

赤堇威靈仙五錢井中水煎服即軟如綿自下甚

效 聖濟方

又方

米糖如指大蘸燈心置喉中勿沾牙糖化鷄魚骨自下 保元方

又方

皂角末吹鼻取嚏 聖惠方

候吞稱臣

類食飴糖自效簡便方

心腹門

痞積 嘔吐 噎膈
黃疸 鼓脹

靈應丹 治心腹疼痛胸膈停滯及水泄癰疾皆可服

人參為末大紅棗去核各三錢巴豆二粒去壳將

巴豆入束肉內紙包十餘層水濕入炭火煨束熟

醫品補遺

卷二 心腹疼

冊 娛暉堂

去皮同豆搗爛入參末再搗百餘下丸如黃米大每服五丸或十除丸燒酒送下黃酒薑湯亦可水

泄用細茶生薑燒酒同煎湯送下小兒二三丸瘧疾白湯下立愈 王駿公傳

胃腕痛

傳

五靈脂廣木香等分研末黃酒調服即止 王駿公

傳

失笑散 治胃氣疼痛神效

良薑切片炒厚朴薑汁炒延胡索醋炒五靈脂去

砂上各等分爲細末大人服三錢小兒服一錢入
陳醋些須調服止後飯半日卽愈孕婦忌之 娛暉
堂原集

治傷食胃痛

陳皮三錢香附一錢五分檳榔半隻神麴厚朴青
皮蒼朮各八分木香三分薑三片水鍾半煎七分
食遠溫服 王駿公傳

絞腸沙痛 陽沙腹痛手足暖陰沙腹痛手足冷身
有紅點

醫品補遺

卷二 心腹疼

三

娛暉堂

好明礬三錢滾水調服陽沙以針刺其手指近爪
甲處分半許出血卽愈仍先自兩脅將其惡血令
聚指頭陰沙以燈草入油點火燒其身 王駿公傳
肚腹寒冷

良薑一兩五錢吳茱萸四兩胡椒一兩神曲三兩
五錢生用共爲細末用神麴三兩打糊爲丸如茱
豆大每服一錢白湯或淡醋湯下 娛暉堂原集
和中丸 最能強胃消食化滯

蒼朮五兩米泔浸一宿洗淨色紫者薑汁炒三兩

甘草二兩青皮三兩炒烏藥三兩香附米三兩一
兩酒浸一兩童便製一兩薑汁製山查肉三兩蒸
枳殼麩炒二兩生薑淨洗切片四兩白豆蔻去壳
二兩炒用大紅棗一百二十枚去核同前藥入砂
鍋內水二十碗煮乾取出晒乾再入砂仁神麴各
二兩炒黃色白酒麴一兩研碎炒黃色共爲細末
水丸如黍米大每服二三錢白滾水送下中寒薑
湯下糟雜米飲下水泄車前子三錢煎湯下 娛暉
堂原集

醫品補遺

卷二 心腹疼

三

娛暉堂

艾附丸 治氣痛

香附子二兩蘼艾葉半兩以醋湯同煮熟去艾炒
爲末米醋糊丸梧子大每白湯服五十九粒集備
方

凡男女心口一點痛者乃胃腕有積多因怒及受寒
兩致

用良薑酒洗七次香附子醋洗七次各焙研因寒
得者用薑末二錢附末一錢因怒得者用附末二
錢薑末一錢寒怒兼有各一錢半以米飲加生薑

汁一匙搥一捻服之立止 醫道方

又方

石菖蒲十兩一寸九節者佳良薑十兩乳香一兩
沒藥五錢共爲細末每服二錢重者三錢小兒一
錢清米湯調下心胃氣疼神效 急救方

鬱火所致胃脘諸痛

肥梔子去壳十五枚豈汁燉黑香附童便炒撫芳
各一錢水煎三滾入薑汁三四匙再煎一滾去渣
入百草霜二匙調和服 保元方

醫品補遺

卷二

心腹疼

調

娛暉堂

胃脘鬱熱當心而痛皆因多食煎炒或嘔吐不已漸

成翻胃

黃連六錢甘草一錢水煎溫服 保元方

虫痛口吐清水

苦練根皮洗淨水煎露一宿次早先以燒猪肉一
塊嗅其氣然後服之須上半月用其重自下 保元

卒心急痛牙關緊閉欲絕

老葱白五莖去皮鬚搗汁以匙送入咽中再灌麻
油四兩但得下即愈少頃蟲積皆化黃水下水

不發屢救人 瑞芳堂方

神翼散 治緊沙肚疼

雄黃一錢麝香一分爲細末以一二厘點眼角上
卽止兼治赤眼吹鼻立效 急救方

陰毒腹痛

露蜂房三錢燒存性葱白五寸同研爲末男左女
右着手中握陰煖出汗卽愈 聖濟方

三仙 治蟲痛

雄黃白礬檳榔等分爲末飯丸黍米大食遠白木

醫品補遺

卷二

心腹疼

調

娛暉堂

下五分 保元方

心脾作痛

玄胡檳榔良薑各一錢半陳米百粒同以水煎服
之效 五指方

諸心氣痛

五靈脂一錢枯礬二錢共爲末溫酒調下效 急救
方

括 括

消滯丸 化痰利氣去飲食積

香附米醋炒二兩五靈脂水飛黑牽牛各一兩水
香五錢共爲細末醋打麪糊九梧子大過飲食所
傷薑湯下五六十丸或七八十九量人虛實加減
極効 王駿公傳

丁沉透膈丸 消胸膈積滯止嘔吐吞酸

沉香一錢五分丁香小粉各一錢木香二錢青皮
橘紅半夏麪川黃連三錢醋煮莪朮醋煮以上各
三錢巴豆仁二錢滾湯泡去皮膜及心砂鍋醋泡
豆慢火煮乾烏梅肉爲末一錢五分醋調膏火上

醫品補遺

卷二

痞積

廿六

煥輝堂

焙乾共爲極細末飛羅過一錢醋打糊九黍米大
每服十五丸或十七十九 一 九空心白滾水
下神效量老弱強壯加減孕婦忌 王駿公傳
百應丸 治全前

上好大黃一斤川黃柏當歸槐花金銀花蒼朮牙
皂各四兩分作四劑每一劑用水三斤銅鍋煮汁
一半去渣將大黃投入浸晒乾再將渣復煎浸晒
共八次爲九梧子大每服一錢半茶水下量人
虛實加減 張鼎遺傳

大腸冷積

威靈仙蜜丸梧子大一更時薑湯下二十九効

治男婦小兒蟲積

白礬五錢入上白慢頭內火煨礬紅爲度研末空
心好酒下五分一次見効二服愈急効方

食魚膾及生肉在胸膈不化成癥瘕

馬鞭草搗汁飲一升卽消千金方

酒積年久但飲腸卽痛及吐者

桃奴不拘多少爲末酒服三錢效急効方

醫品補遺

卷二

痞積

廿七

煥輝堂

酒肉過多腹脹不快

藍花擦牙溫水漱下三次如湯沃雪 簡便方

脾積結塊

鷄子五個阿魏五分黃蠟一兩共溶化分作十服
每空心細嚼溫水送下諸物不忌腹痛無妨十日
後大便下血乃積化也 經驗方

又方

艾揀去梗揉如綿四兩捏如患大川椒四兩拌入
艾中粗草紙包安痞積上以湯壺熱熨內有响聲

即消急救方

癥瘕血塊

砂仁一錢五靈脂醋煮焙乾一錢共為末白水服之急救方

黃病好食泥土

用黃泥一斤砂糖四兩同炒乾為末黃連膏丸如

梧子大空心糖湯下五六十丸保元方

男子好食生米

蒼朮米泔水浸一宿焙切為末蒸餅丸梧子大每

醫品補遺

卷二 痞積

州八

娛暉堂

服五十九食前米飲下日三服家藏方

好食茶葉面黃者

每日服樵子七枚以愈為度兼治寸白蟲便方

治痞仙方

三稜莪朮砂仁研各五錢川大黃三錢真阿魏五

錢爭皮硝二兩用核桃一百個入砂鍋內以陳醋

浸過核桃一指慢火煮乾乘溫拭去外藥晾乾隨

意每食一二枚以砂仁湯送下積消為度極効娛

暉堂原集

又方

皮硝一兩獨蒜一大個大黃末八錢搗作餅貼患處以酒為度經驗方

神效消痞方

沉香五錢廣木香三錢小茴香四錢真阿魏三錢

青皮五錢礞砂五錢黃牛膽不落水者焙乾存性

乙兩鷄內金不落水者焙乾存性一兩錦紋大黃

三錢檳榔五錢黑丑頭末五錢川山甲六錢土炒

水紅花子三兩炒香共為末煉蜜丸桐子大空心

醫品補遺

卷二 痞積

州九

娛暉堂

人參湯服四五十丸娛暉堂原集

嘔吐吞酸

嘔吐不已

真橘皮去白為末五更安五分於掌中舐之即睡

三日必效皮不真不驗胃虛加人參半裏薑汁製

各一錢五芩川黃連薑汁炒一錢五分枳實薑炒

一錢藿香丁香各六分生甘草二分竹茹一錢薑

一片連一枚水鍾半煎八分吐止即勿服

嘔吐不已兼惡心

生薑一大塊直切勿令折斷每層搯在內水濕
苧麻密纏外用紙包水濕火熨令熱去麻紙取薑
搗爛和稀米飲服之効急救方

聞藥即嘔百藥不下

伏龍肝水先塞兩鼻孔服藥不再吐保元方

虛寒嘔噦飲食不下

細辛去葉五錢丁香一錢五分爲末柿蒂湯下

錢效聖濟方

冷涎作吐陰症乾嘔

醫品補遺

卷二 嘔吐

單

煥暉堂

吳茱萸湯泡炒生薑各一兩五錢人參二分大棗

五個水煎食前服保元方

胃熱嘔吐手足心皆熱者是

半夏薑製乾葛竹茹甘草各等分薑枣煎服保元方

又方

黃連薑汁炒一錢石膏煨二錢爲末滾水下保元方

梔逆

柿蒂七枚燒存性爲末用黃酒調服立止保元方

又方

生薑搗汁砂糖等分調勻重湯煎熱徐服保元方

病後嘔逆不止聲聞隣家

刀豆子燒存性白湯調服二錢即止普濟方

食後吐酸水

乾薑吳茱萸各一兩爲末酒調服方寸七日二服

胃冷者立效保元方

噎膈反胃

秘治噎膈神效

醫品補遺

卷二 噎膈

單

煥暉堂

用陳倉米一斗同黃土炒令米熟去土爲末以粟

米煎湯調下再用白木牛喉骨一條去兩頭節并

筋膜脂肉節上取丁如阿膠片以米醋一碗浸之

類翻動令勻微火炙乾醋淨再炙再淬醋乾爲度

勿見太陽只宜火焙研細末厚紙包收或遇陰濕

時連紙微火烘收藏如遇前症每服一錢食前陳

米飲調下輕者一服立效普濟方

又方

乾柿三枚連蒂搗爛酒服立效切勿以他藥雜之

食療方

又方

用真正熊膽一分碎研黃酒送下立愈不發瘰癧

卷傳

(黃痘)

男子酒疸

茵陳蒿四根梔子七個大田螺一個連壳搗爛以

酒沸白水一大盞沖汁飲之效外

濕熱黃痘

醫品補遺

卷一

黃痘

四十一

娛暉堂

燈草根四兩酒水各半入瓶內煮半日露一夜溫服集玄方

逐黃散 治酒疸及小兒黃痘服黃脾熱

青瓜萎煨研每服一錢水一盞煎七分卧時服五

更瀉下黃物立效普濟方

黃痘取黃法

扛連紙一張裁為四條筆管捲如爆竹式口上糊粘固外用黃蠟一兩鐵杓溶化將紙筒四圍澆勻不可使蠟入內患人仰卧筒套臍上外以麪作圈

護定勿倒頭上點火燒至起所剪斷另換新筒看

臍中有黃水如鷄子餅者取出輕者四五根重者

六七根取盡黃為度急救方

食勞黃痘身日俱黃

青礬鍋內安炭煨赤為末米醋拌束肉和丸梧子

大食後薑湯下二十九急救方

癰黃如金

茵陳蒿白鮮皮等分水鍾煎日二服聖惠方

黃痘

醫品補遺

卷二

黃痘

四十二

娛暉堂

山查一味或生食或蜜饒多食愈王駿公傳

酒疸舌黃立効

苦瓜蒂二分研細末吹鼻孔男左女右即流黃水

神效又管搗汁服王駿公傳

治五種痘方

用土牛膝又名鼓槌頭風草不拘多少鮮者連根

枝搗搗汁乾者研末黃酒下史璞菴傳

又方

用白化茵陳一二兩煎茶不喝服之要忌油鹽醬

醋六七日即愈史璞庵傳

鼓脹

治水鼓

用商陸根赤者搗碎貼臍心綿縛定病自小便出
王駿公傳

治腫脹

用真水銀粉三錢巴豆肉研去油四錢生硫黃一錢共研成餅先以新綿一片鋪臍上次以藥餅掩之外用綿縛如人行三五里自然瀉下黃水待三

醫品補遺

卷二 鼓脹

四十五

史璞堂

五度除去藥以溫粥補之久患者隔一日取一次
王駿公傳

治五般鼓病方

黑牽牛末一兩巴豆四十粒俱為末白礬雞翅五錢長流水五錢共為丸如小米大每服三十九淡薑湯五更時服待大便下黃水七八次以粥補之俟腫消完即止九藥戒塩百日另方開之

開塩方

大鯽魚一個五加皮為末一兩塩一兩將魚開腹

入藥與塩在內用線扎住以火煨焦酥為末每服一厘至一分一分至一錢食完此塩肉食內方許吃炒過之塩史璞庵傳

治水鼓方

千金子去皮去油淨仁一錢五分葶藶子水蘼藋子青木香各一錢用燈草外葉湯下忌油塩醬醋腥冷足一百日又零一日少者必死史璞庵傳
治氣鼓飲食不能下者如神

綿大戟一錢木香六分共為末加白糖一錢滾白

醫品補遺

卷二 鼓脹

四十五

史璞堂

水空心一服後約半日腹中作楚作熱連瀉一二三次則病愈矣忌塩醬菜豆一百日史璞庵傳

黃病神丹

皂礬八兩麵一斤和作餅入火內煨焦為度將水米泔浸厚朴薑汁炒陳皮甘艸各六兩川椒去目並閉口者十兩共為末用好棗三斤煮熟去皮核胡桃三斤去壳去皮同搗成膏和藥梔子大每服七八十九酒服初覺此藥香服至病愈即覺臭矣史璞庵傳

草靈丹 治鼓脹

四五月黃牛糞陰乾微火炒黃香為末每服一兩煎半時濾清服之不過三服全效臨死亦可回生急救方

綠礬丸 治黃腫最捷

五倍子炒黑神麴炒各入兩綠礬薑汁炒白針沙醋炒紅各四兩為細末生薑汁煮紅束肉為丸梧子大每服六七十九溫酒下不能飲酒者米湯下終身忌食蕎麥麴保元方

醫品補遺

卷二 鼓脹

四六

煥輝堂

血積黃腫

綠礬四兩百草霜一升炒麴半升為末沙糖和九梧子大每服三四十丸食後薑湯下 鄭時舉方

氣脹成鼓

蘿蔔子研以水濾汁浸綿砂仁一兩一夜炒乾又浸又炒凡七次為末每米飲服一錢神效 集驗方

牛即丸 治氣急水腫兼治虫取積

黑牽牛五錢檳榔二錢半為末每服一錢氣脹紫蘇湯下虫積及水腫用酒下 普濟方

大腹水腫小便不利

蒼耳子灰葶蘆末等分水下二錢日二服 聖惠方

金東仙方

治腫脹

紅芽大戟一斤紅棗三觔水煮一日夜去戟用棗晒乾食之立消 保元方

手足門

附腰痛

二便閉

腦癰祛風丸 治左癱右瘓最效

白花蛇頭帶頸三寸烏梢蛇連尾三個長七寸俱

醫品補遺

卷二 手足

四七

煥輝堂

酒浸炙川烏尖七個附子底四個俱去黑皮角星

炮半夏薑製白附子防風細辛天麻全蝎去毒炒

經蚕桑去絲嘴草烏炮各半兩片脂一分研為細

末薑汁糊丸梧子大每服五十九丸小續命湯下 王

駿公傳

舒筋保安散 治左癱右瘓筋脉拘攣

木瓜五兩草薢五兩脂牛膝酒浸續斷白蠟桑炒

松節白芍烏藥去皮威靈仙黃芪當歸防風虎骨

酒浸各兩無灰酒一斗浸藥三七日緊封罈口

待日足取藥焙乾為細末每服二錢藥酒半盞調

下效王駿公傳

藥酒方 治十指麻木忌發風動氣物

歸身川芎白朮炒蒼朮天麻南星半夏各一兩防

風羌活烏藥白芷威靈仙黃芪桔梗陳皮枳殼斷

蛇各五錢草烏炒焦沒藥各三錢桂枝二錢作粗

末絹袋懸酒瓶中入酒十四斤紙封固重湯煮三

炷香入地三日夜出火毒任意飲王駿公傳

順氣化痰湯 治手大指麻且京此痰滯經絡

醫品補遺

卷一 手足

四八 娛暉堂

烏藥陳皮燂蠶炒川芎枳殼各一錢白芷桔梗各

八分甘草三分水半盞三片煎八分食遠服加

水香三分磨汁兒入穀王駿公傳

加味補中益氣湯 治手足麻木

人參柴胡升麻黃芪蜜炒八分白朮土炒陳皮當

歸威靈仙炙甘草半夏各一錢大附子製一小片

薑三片水二杯煎八分食遠溫服王駿公傳

手足麻木不知痛癢 此屬濕痰死血

桶紅一觔逆流水五碗煮爛去渣再煮至一碗頗

服探吐不吐加瓜蒂末王駿公傳

治臂痛

南星蒼朮各一錢五分羌活威靈仙獨活各八分

川芎枳殼防風各一錢桂枝五分烏藥七分甘草

炙三分薑三片水半盞煎七分食後服王駿公傳

黃蠟膏 治冬月手足拆裂

清油半兩慢火煎沸入黃蠟一塊同煎光粉少許

熬紫色為度先以熱水洗火烘乾傳藥紙貼之其

痛立止入水亦不落粉多則硬旋以火炙動挑傳

醫品補遺

卷二 手足

四十九 娛暉堂

不妨王駿公傳

四斤丸 治脚氣等症神效

木瓜牛膝肉苁蓉去甲膜明天麻各一斤加枸杞

鹿角膠各一斤煉蜜丸梧子大空心黃酒下百丸

王駿公傳

治脚氣并中寒濕

用老松印油者煮湯入水桶中先薰後洗王駿

公傳

又方

用川椒三斤斬艾檳榔破開各一斤盛以陳布囊置火箱上日踏之有奇効再用川木瓜煎湯日日飲之 王駿公傳

神烏丸 遠年近日乾濕脚氣並治

川烏炮去皮臍切片炒變色虎脰骨酥炙海桐皮川華解各二兩川牛膝去苗酒浸肉蓯蓉酒浸各一兩半金毛狗脊燎去皮毛五錢爲末木瓜煎湯爲丸桐子大每服七十九空心酒下 王駿公傳

治兩腿紅腫驗方

醫品補遺

卷二 手足

辛

娛暉堂

木通五錢防己丹皮赤芍生地大腹皮金銀花一錢五分并草三分酒水各一杯煎八分食前服 王駿公傳

治腿酸

熟地生地酒洗曬乾白朮土炒當歸酒洗牛膝酒洗續斷酒洗虎脰骨酥炙獨活酒洗蒼朮米泔水浸炒薏苡米炒各二兩防己大川芎各一兩白芍炒一兩五錢共爲細末蜜丸如梧子大每服八十丸空心淡鹽湯下 王駿公傳

脚氣冲心

白礬三兩煎水浸洗兩足良久自愈 保元方

脚氣腫痛及鶴膝風不能動履

生薑汁一碗入牛膠一兩熬成膏加乳香沒藥各一錢攪勻絹帛貼腫消痛止 保元方

寒濕脚氣腿膝疼痛行步無力

胡盧巴酒浸一宿焙破故紙炒香各四兩爲末以木瓜切頂去穢安藥在內令滿用頂合住簦定蒸

爛棉九梧子大空心溫酒服下七十九 楊氏家藏

醫品補遺

卷一 手足

五二

娛暉堂

熱毒足腫作痛飲脫

苦參煮酒浸之 集驗方

腰痛

導滯散 治腰脇痛

青皮五錢玄胡三錢蘆薈白芥子炒各二錢柴胡

一錢并艸一錢當引水煎夜服如加減一味不效

王駿公傳

腰腿痛 因風濕而致者

獨活桑寄生當歸川芎赤芍熟地牛膝防己秦艽

杜仲故紙炒烏藥各七分人參八分肉桂六分

一杯半酒一小杯食塩八分空心服王駿公傳

羊腎粥 治腰脚疼痛

枸杞葉半觔米三合羊腎一個切碎葱頭五個同

煮粥少加塩食王駿公傳

又方

以猪腰子數枚不去筋切碎煮粥食以栗塞七枚

送之連服七日効栗塞即大栗中瓣者煮暉堂原

集

醫品補遺

卷二 腰痛

五十三 娛暉堂

腎虛腰痛

人參白朮當歸各三分爲末用不落水槌猪左腎

一枚竹刀剖去皮膜將藥摻入粗紙厚墨水濕火

煨熟至重服七次全愈濟川方

又方

魚膠炒成珠好酒淬入稍溫通口服神効保元方

又方

杜仲薑酒炒三錢故紙五分小茴香塩酒炒人

參各三分爲末猪腎二枚切開去筋膜入藥蒸熟

食之或加青塩濕紙包煨空心酒下尤効急救方

腰脊脹痛

芥子末酒調貼之立効急救方

瘀血腰痛

大黃半兩生薑半兩同切如小豆大鍋內炒黃投

水二碗煎好五更初頓服天明取下瘀血如雞肝

樣痛即止保元方

閃挂腰痛不能屈伸

牙硝一厘雄黃麝香各半厘共研極細末少許點

醫品補遺

卷二 腰痛

五十三 娛暉堂

入眼中令人執患者周圍行數次其疼如失未效

再點再行神妙急救方

（二便閉）

大便不通

食塩生薑各二錢淡豆豉三十粒搗爛貼臍上即

通王駿公傳

又方

猪尿胞一個入香油及熱小便半碗用細竹管插

胞內紫紫留光者一頭納肛門灌入即通王駿公傳

又方

黑芝麻細茶各一大合和嚼熱水徐徐嚥下如急只將二味共搗爛水調服王駿公傳

又方

葵菜子研末人乳一碗和服立通聖惠方

虛秘不通

松子仁栢子仁麻子仁等分研泥溶化白蠟和九

梧子大每服五十九黃芪湯下宗輿方

小便不通

醫品補遺

卷二 二便

五十四

煥輝堂

猪膽調熱酒服即通王駿公傳

又方

棕皮毛燒灰存性薄酒調服二錢即通攝生方

又方

滑石一錢五分車前子瞿麥篇蓄梔仁各一錢青

皮八分水通四分甘草三分木香二分竹葉三十

片水半煎八分食後服王駿公傳

又方

皂角燒研粥飲下三錢立通千金方

又方

白礬末填滿臍中以新汲水滴之覺冷透腹內自然即通臍平者以紙圍環之經驗方

水腫尿澀

茯苓皮椒目等分煎湯日飲取效普濟方

虛後水腫以飲水多小便不通

用白茅根一大把小豆三升水三升煮乾去茅食

豆水隨小便下極效用後方

醫品補遺

卷二 二便

五十五

煥輝堂

醫品補遺卷之三

廣寧郎廷模貞若父

男 文燭 文燾



中風門

附風痺

中風不省

半夏末少許吹鼻效奇世方

舌大不能言

青黛礪砂各一錢水片三分牛黃三分南薄荷二

醫品補遺 卷三 中風 一 娛暉堂

錢為末先以鹽水洗舌上後用薑汁擦之將藥蜜

水調稀搽石

失音

用韭菜汁灌或以白蠟蠶末酒服保元方

手足拘攣不伸

牙皂水香等分水煎一服立效保元方

烏荊丸 治諸風縱緩言語蹇澁偏身麻痺皮膚癢

癢及婦人血風頭痛目眩者服之俱妙有痛風痺搗

願領不收者服六七服即效

川烏頭炮去皮臍一兩荊芥穗二兩為末醋打糊

九梧子大溫酒或白湯下二十丸和濟方

立效散 治一切風痰危急湯水不下一服立解

膽紫一錢水香三錢麝香一分葱汁調幹口灌下

即愈急效方

痰厥氣絕顛中風狀心頭尚溫者

千年石灰一合水 蠶魚淡去清水再用一盞煎

極滾澄清灌之少頃痰下自愈集玄方

風痺

醫品補遺 卷三 風痺 二 娛暉堂

風寒濕痺四肢急脚腫不可履地

紫蘇子二兩杵碎水三升研取汁煮粳米二合作

粥和葱椒薑豉食之聖惠方

萬靈膏 治麻木疼痛

并遂二兩草麻子仁四兩樟腦一兩作餅貼之內

飲甘草湯摘玄方

腰脚冷痺風痛

川烏頭三個牛去皮臍為末醋調塗帛上貼之須

速止痛聖惠方

皮裏作痛不問何處

何首烏為末薑汁調成膏塗之帛裹熱鞋底熨之
經驗方

筋絡拘攣血脈凝滯肢節疼痛行步艱難

玄胡索炒當歸煉乳等分為末酒服二錢保元方

傷寒門

按經分治須 附時疫 暑症 濕症 燥症 霍亂 痧症 痢疾

救苦散 治傷寒不照藥

川芎 藿香 藜蘆 各三分 元胡索 丹皮 雄黃 硃砂 各

醫品補遺

卷二 傷寒

三

娛暉堂

一分白芷皂角各四分為細末每用此須以竹筒

吹入兩鼻隨飲熱葱茶一碗蓋覆出汗即効 王駿

公傳

發汗藥 此在途急與之藥

藁豆粉麻黃甘草各一兩共為細末每服一錢冷

水調下即時汗出 駿公傳

藥茶仙丹 治感冒神效

六安茶一觔或湘澤茶亦可鮮紫蘇葉四兩鮮薑

綠四兩石膏蒲二兩陳皮四兩右於五月五日午

時拌勻封貯凡遇感冒等症每服三錢煎一滾熱
服取汗效 娛暉堂原集

傷寒舌出不收

冰片少許搽舌上收進如忽然服出者以雄雞冠

血盛酒杯將舌浸就嚥下即縮急救方

陰毒傷寒四肢厥冷

吳茱萸一升酒拌濕絹袋二個包蒸極熱互熨足

心候氣透痛即止屢效 聖惠方

陰毒腹痛厥逆

醫品補遺

卷三 傷寒

四

娛暉堂

黃熟熱雞子放臍腹上一時一換四五換即愈陰

氣盡收於內 急救方

厥逆危篤者

用黑豆炒熟投酒熱飲或灌之吐則復飲汗出為

度 居家必用

傷寒無汗

代赭石乾薑等分為末熱酒醋塗兩手心合掌握

定夾于大腿內側溫覆汗出乃愈 靈驗方

心熱尿赤而赤唇乾咬牙口渴

川木通生地黄炙甘草等分入竹葉七片水煎服

聖氏方

舌胎語塞

薄荷自然汁和白蜜薑汁擦之

集成方

傷寒勞後因交接者腹痛卵腫

用葱白搗爛苦酒一盞熱服千金方

時行瘧

天行時疾

生牛蒡根搗汁五合空心分二服服訖取桑葉一

醫品補遺

卷三 時行

五

娛暉堂

把炙黃以水一升煮取五合頓服取汗無葉取枝

食忌方

時行發狂

芭蕉根搗汁服日華方

時行不染

車前子隔紙焙為末水服二錢即不染

王候公傳

熱瘧昏迷煩悶飲水不止至危者一服見效

生地黄根生薄荷葉等分搗爛取自然汁入麝香

少許井華水調下覺心下頓涼勿再服

普濟方

山嵐瘴氣

生熟大蒜各七片共食之少頃腹鳴或吐血或大

便泄即愈

攝生方

辟瘴不染

生葛根搗汁一小盞服去熱毒氣

聖惠方

預辟瘴癘

桃仁一觔吳茱萸青鹽各四兩同炒熟以瓶密封

一七取出揀去茱萸鹽將桃仁去皮尖每嚼一二十

枚山居尤宜

選奇方

醫品補遺

卷三 時行

六

娛暉堂

暑症

救生散 治中暑毒死

用新胡麻一升微炒令黑攤冷為末新汲水調服

三錢或丸彈子大水化下

經驗方

熱暈昏沉

生地黄汁一盞服之

聖惠方

中暑及一切卒暴之病

用薑汁與童便服立可解散

附錄方

六合散 治暑證

蒼朮七錢砂仁八錢蘇葉五錢霍香五錢陳皮八錢白茯苓八錢川厚朴七錢滑石七錢色砂另研一兩白扁豆生用一兩滑石六錢半夏薑製七錢川黃連五錢每服大人二錢小兒一錢厚婦禁用腹痛吐瀉泄惡心霍亂傷食傷冷痰多兩脇刺痛傷濕手足懶動足浮腫以上俱用薑湯下發熱頭暈濃茶下心神不寧皆附濃茶微入薑汁下傷風感冒下水瀉燈草湯下轉筋木瓜湯下傷暑酸梅湯下娛暉堂原集

醫品補遺 卷三 暑症 七 娛暉堂

參歸益元湯 治初夏頭疼脚軟食少體弱是名注夏宜用此

人參五分當歸白芍熟地白茯苓麥冬去心各一錢黃柏酒炒七分甘草三分陳皮五分五味子十粒知母酒炒七分用葱二枚烏梅一箇炒米一撮水煎服飽悶加砂仁白豆蔻惡心加烏梅逆肉炒米噦加竹茹煩燥加辰砂及冬仁竹茹瀉加貝母木山藥砂仁烏梅去熟地黃加母黃柏小水煎加木通山梔胃脘不開不思飲食加厚朴白豆蔻

益智砂仁蓮肉去熟地黃柏知母腰痛加杜仲故紙茴香腿酸無力加牛膝杜仲皮焦加地骨皮頭目眩帶加川芎虛汗加黃芪白朮酸寒仁夢遺加牡蠣山藥辰砂椿根皮虛癢煩熱加辰砂冬仁竹茹口苦舌乾加山梔烏梅乾葛湯又吾方

獨勝湯 治中濕通身疼痛不能轉側及皮肉痛難忍者

白朮土炒一兩好酒煎溫服保元方

醫品補遺 卷三 濕症 八 娛暉堂

防己黃芪湯 治風濕相搏客在皮膚關節煩痛汗出惡風

黃芪四錢防己三錢白朮二錢甘草炙一錢束三枚薑三片煎服王時公傳

濕氣作痛或腫或脹或黃或泄

蒼朮米泔浸刮去黑皮切片水熬成膏白湯調服如暴發紅腫痛甚者以臘糟敷之保元方

濕氣骨節疼痛

生薑帶皮取汁一碗葱汁一碗牛膠半斤慢火熬

威膏入麝香一錢布帛攤貼水出即愈保元方

濕氣腰痛

車前草連根七利葱白連鬚七利束七枚煮酒一瓶常服終身不發簡便方

燥症

黃連湯 治心火舌上生瘡或舌腫燥裂或舌尖出血或青硬

黃連山梔生地麥冬去心當歸芍藥各一錢薄荷

犀角并草各五分水煎食後服久吾方

醫品補遺

卷三 燥症

九

熙暉堂

柴胡湯 治肝火盛水氣實或脇痛或氣從左邊起者或目紅腫

柴胡芍藥川芎龍膽草當歸青皮山梔連喬各一

錢并草三分水煎服久吾方

黃芩湯 治肺火咳嗽吐血吐痰鼻血咽喉腫痛乾燥生瘡或鼻痔

黃芩山梔桔梗芍藥桑白皮麥冬荆芥薄荷連喬

各一錢并草三分水煎服久吾方

芍藥湯 治脾火或消穀易飢或胃熱口燥煩渴或

唇生瘡

芍藥梔仁黃連石膏連喬薄荷各一錢并草二分水煎服久吾方

黃連解毒湯 治三焦實火內熱煩渴口瘡小便赤

黃連黃芩梔子黃柏連喬芍藥柴胡各一錢大便

秘者加熟大黃二錢水煎服久吾方

鬱症

木香調氣散 治氣鬱腹脇脹滿刺痛不舒

木香另研五分烏藥香附枳殼麩炒青皮各一錢

醫品補遺

卷三

鬱症

熙暉堂

砂仁五分厚朴薑炒陳皮各一錢官桂二分撫芎

蒼朮米泔水浸各一錢并草三分生薑三片水煎

磨本香同服久吾方

當歸活血湯 治血鬱能食便紅或暴吐紫血痛不

移處

當歸芍藥撫芎桃仁去皮尖各一錢牡丹皮香附

烏藥枳殼青皮各八分官桂黑乾薑炒極黑并草

各三分血結硬痛加大黃連同煎服久吾方

香砂平胃散 治食鬱噎氣作酸胸腹飽悶作痛惡

食不思

蒼朮米泔製厚朴薑汁炒陳皮各一錢香附一錢
砂仁五分枳殼炒山查肉麥芽炒神麴炒乾薑
炒黑各五分甘草三分雞內子炒銀一錢五分薑
三片水煎服食前入成塊去乾薑加大黃方
瓜蒌枳實湯 治痰鬱動則喘滿氣急痰嗽不出胸
脇痛

瓜蒌去壳枳實麴炒枳殼撫芩蒼朮杏仁去皮尖
香附片芩貝母去心陳皮各一錢砂仁五分木香
腎品補遺 卷三 簡方 十一 煨礬堂

另研三分甘草三分生薑三片同煎入竹瀝薑汁
少許磨木香調服方

火鬱湯 治火鬱小便赤澀五心煩熱口苦舌乾

山梔仁柴胡各一錢乾葛五分撫芩五分白芍連
喬各一錢甘草三分地骨皮一錢麥冬去心一錢
生地入多熟大黃一錢車前子七分用竹葉十五
皮燈心一元水同煎服方

（瘧疾）

加味柴平湯 治瘧疾百發百効食粥忌葷腥

柴胡八分黃芩一錢五分人參五分半夏製一錢
甘草三分厚朴八分蒼朮六分陳皮紫蘇葉乾葛
各五分午前後發屬陽虛加白朮黃芪各八分午後
發屬陰虛加當歸川芎熟地各六分有食加神麴
麥芽枳實炒黃連各六分甚則加大黃一二錢下
之當發日平明先服一劑將發前一時再服一劑
王駿全傳

又方

用硃砂三分巴豆仁一粒研為末飯為丸分十九
腎品補遺 卷三 瘧疾 十三 煨礬堂

於未發前一時取一九貼眉心一過時揭去效黃
晉同傳

伸效截瘧方

常山一錢小檳榔切片一對川貝母去心一錢柴
胡八分寒多者加小丁香五分打碎陳皮七分以
黃酒一杯水一杯共藥入一碗重湯煮一時上川
綿紙蓋好露一宿發日五更溫服忌婦人見睡至
辰已時起用稀米粥一二碗忌雞魚數日永不再
發午前發者易截午後發者難截必先用提入陽

分藥一二劑方可截 娛暉堂原集

提入陽分藥

當歸南芎柴胡陳皮各七分熟地一錢紅花五分
何首烏製一錢知母七分鹽甲醋炒一錢檳榔七
分半夏七分當三凡寒二枚煎早晚服熱多加
黃芩八分虛加人參六分汗多加黃芪炙七分地
骨皮一錢再加浮麥一撮為引渴甚未發時以童
便調蜜煎沸頓服 娛暉堂原集

又方

醫品補遺

卷三

并疾

十三

娛暉堂

常山一錢半檳榔一錢丁香五分烏梅一個酒一
盞浸一宿五更飲之一服便止永不復發如神
學方

脾寒瘧疾

石胡荽一把杓汁半碗和酒服效 集簡方

又方

木香檳榔九截瘧神效方見本卷後痢疾條

霍亂

定痛湯

百沸湯半碗好黃土泡新汲水澄清半碗萊豆粉
水糖各五錢調服立効 生生編方

止腹疼急症切忌飲米湯

食塩一茶杯炒極熱布包臍上滾水一壺熨之效
王駿公傳

治轉經霍亂上嘔下泄

香附米霍香半夏木瓜小茴香炒白茯苓甘草各
五分白朮陳皮砂仁厚朴蒼朮各九分薑三片酒
二杯煎一林加烏梅三分尤效 王駿公傳

醫品補遺

卷二

霍亂

十四

娛暉堂

治霍亂轉筋入腹痛不可忍

皂角末吹豆許入鼻取嚏即愈 王駿公傳

霍亂上不得吐下不得利冷汗欲絕各乾霍亂

鹽一大抄炒令黃入童便一盞溫服少頃吐下即
愈 保元方

煩悶

蘆根三錢麥冬一錢水煎服 聖惠方

脹痛

蘆根一升生薑一升橘皮五兩水八升煎三升分

服聖惠方

水壺湯 治霍亂嘔甚不止

良薑生剉二錢大棗一枚水煎冷服立定 聖惠方

霍亂吐瀉

韭菜搗汁一盞重湯煮熱服之立止 急救方

又方

肉豆蔻爲末薑湯服一錢 普濟方

又方

屋下倒挂塵滾湯澄清服 易簡方

醫品補遺

卷三 霍亂 十五

娛暉堂

伏暑霍亂或吐或泄小便赤煩渴欲死

用滑石燒四兩霍香一錢丁香一錢爲末白湯調

服二錢 普濟方

轉筋欲死者

生薑三兩搗酒一升煮三四沸服仍以薑搗貼痛

處 外臺方

咳嗽門

咳嗽

蘇解湯 治風寒咳嗽

紫蘇六分防風六分陳皮七分杏仁去皮尖研碎

七分桑白皮七分薄荷五分前胡七分枳殼五分

茯苓七分甘草五分半夏薑製七分生薑三片葱

白三寸熟服 娛暉堂原集

理肺湯 治實火咳嗽

黃芩玄參各一錢枳殼七分知母八分山查一錢

梔子八分熟大黃一錢石膏煨一錢花粉八分連

橋五分甘草二分薑二片竹葉十片水煎服 娛暉

堂原集

醫品補遺

卷三 咳嗽

十六

娛暉堂

治虛熱咳嗽

天花粉一兩人參三錢爲末每服一錢米湯下集

簡方

又方

沙參五錢水煎服之 易簡方

治酒痰咳嗽

瓜蒌仁青黛等分研末薑汁蜜九次子大每嚥一

九 卅溪方

止嗽解鬱

貝母去心一兩厚朴薑製五錢蜜九梧子大白湯
下五十九鄧筆峯方

銀杏膏 治久嗽不瘥

陳細茶四兩客焙為細末銀杏肉四兩一半去白
膜一半去紅膜搗爛胡桃肉四兩搗爛加蜜半斤
煉成膏不拘時服 保元方

又方

五味子一兩真陳茶四錢肺乾為末以甘草五錢
煎膏九菴豆大沸湯下三十九數日愈 攝生方

醫品補遺

卷二 咳嗽

十七

娛暉堂

又方

橘皮神麴生薑焙乾等分為末蒸餅和九梧子大
每服三五十丸食後夜卧各一服效 衍義方

嗽久語音不出

真蘇子二兩訶子肉三兩杏仁三十個百藥煎二
兩為末熱酒調服二錢 保元方

老人久嗽不能開者

猪板油四兩蜂蜜水糖各四兩熬化成膏時挑一
匙口中噙化三五日嗽止 保元方

咳逆短氣

紫蘇葶藶二錢人參一錢水一鍾煎服 普濟方

痰喘

竹瀝達痰丸 此丸能行痰從大便出不損元氣

半夏湯泡七次薑汁浸透曬乾微炒大黃酒浸透

蒸熟曬乾陳皮白朮米泔浸切微炒白茯苓黃芩

酒炒各二兩甘草去皮微炒人參各一兩五錢沉

香五錢青礞石一兩打碎同煨硝一兩五錢拌勻

放銀鍋內瓦盆蓋泥封固曬乾炭火煨過如金

醫品補遺

卷三 痰喘

十八

娛暉堂

色者佳共為細末用竹瀝一大碗薑汁三鍾和為

丸如桐子大每服五七十丸食後白湯送下連服

一二日行三五次以米飲止之 王駿公傳

靈砂丹 專治一切痰迷痰喘急症神效

白明礬二十兩用半夏二斤先以清水浸洗去半

夏上石灰務要潔淨然後將礬以滾水泡浸半夏

一日夜次日取出礬水澄去泥用新銅盆隔水

煎如溫粉皮式逐漸將礬水添入收乾仍是白礬

細研篩過聽用硃砂用整塊者拌入猪心孔

醫品補遺

卷三 痰喘 十九

娛聊堂

內外以燈草塞口綦什用柳樹屑并許放入磁
罐內加水四五升微火慢煮五炷香取出硃砂以
皂角洗去油錫鉢研萬匝清水飛淨聽用海石白
色者佳炭火煨紅淬入醋內再煨如此七次研細
聽用配合法白礬一兩硃砂一兩海石一兩以二
味藥末共和一處糯米蒸糕趁軟將藥末搜入捏
至藥完可丸為度如葶豆大每服五六分或八分
滾薑湯送下或白滾水亦可無製半夏礬水即以
透明白礬用之外加陳膽星五錢牛黃一錢真沉

香三錢琥珀末二錢各半黃靈砂丹煨暉堂原集

千金定喘丸 治一切痰喘咳嗽生卧不安

人參一兩五錢沉香紫苑各五錢紫蘇葉枳殼炒
各二兩甜葶麻炒桔梗各四兩桑白皮二兩方錢
比五味三兩款冬花一兩烏梅肉四兩為細木麻
黃五斤去根剉細水三斗浸一宿淨鍋慢火熬成
膏合藥末搗干杵杵九彈子大用粗碗磨化白湯
約半鍾煎熟何患者腫濃喚覺便與服之仰卧即
愈神效 上驗公傳

又方

款冬花石膏甘草各三錢礬砂七厘為末吹入喉
內用細茶漱下即好 保元方

肺虛短氣喘咳劇者

取胡頹子葉焙研米飲服二錢有人患喘三十年
服之頓愈其者服藥後身上生小癰瘡作癢則癢
也虛甚加人參等分各清肺散胡頹子即黃蘗奶
李時珍方

濕痰作喘

醫品補遺

卷三 痰喘 廿

娛聊堂

甜葶麻炒為末束肉和丸白湯服 補玄方

上氣喘逆

真蘇子入水研濾汁同梗米煮粥食 簡便方

痰飲膈脹

砂仁搗碎以蘿蔔汁浸透焙乾為末服一二錢食

遠沸湯服 簡便方

寒痰氣喘

青橘皮一片展開人已豆一箇紫定火上燒存
性研末薑汁和酒一鍾即服神效 補玄方

哮喘喘氣或塩水磨肺

小薊一把猪精肉四兩入水同煮令熟食肉併湯

飲之立愈 似方

哮喘痰喘遇厚味即發者

萊菔子淘淨蒸熟舂碎薑汁浸蒸餅丸萊菔大每

服三十九以薑湯少許慢嚥下日三服 集成方

停痰宿飲胸膈喘急

香附皂莢水浸半夏製各一兩白礬五錢爲末

薑汁麵糊丸梧子大每服三四十九薑湯隨時下

醫品補遺

卷三 痰喘

二 娛暉堂

仁存方

胸中痰滯頭痛不欲食

白礬一兩水二升煮一升納蜜半合類服須臾大

吐未吐飲少熱湯引之 外臺方

諸氣門

水香化滯湯 因氣食結于中脘腹皮微痛心下痞

滿不思食

半夏一錢陳皮草豆蔻各五分柴胡四分水香三

分枳實當歸各五分芩根三分甘草一分薑引水

煎服王駿公傳

走注氣痛

芥菜子爲末雞子白調傳 王駿公傳

鬱金丸 治男婦諸氣及一切雜症神效孕婦忌服

鬱金湯明圓小者二兩二錢明雄乳香沒藥俱去

油巴豆去皮心油各二錢二分莪朮五錢五分共

爲細末麝香九菰豆大每服十二三丸或八九丸

或三四丸量大小虛實加減急心痛艾醋湯下慢

醫品補遺

卷三 諸氣

三 娛暉堂

心痛白滾湯下白痢生薑湯下赤痢甘草湯下膨

脹生薑湯下惡心脹悶乳香湯下追蠱取積檳榔

湯下霍亂吐瀉霍香湯下脚氣疼痛木瓜湯下遍

身疼痛霍香湯下損傷核桃湯下噎食紫丁香湯

下黃病陳皮湯下水瀉陳皮生薑湯下小腸氣小

茴香湯下咳嗽生薑湯下月經不調紅花酒下大

便不通雞子湯下鬱結積聚大黃皮湯下脇痛

水香湯下小便不通車前子湯下 張昭遠傳

治諸氣噎塞胸脇刺痛

青皮陳皮三稜煨莪朮醋炒香附童便炒各一兩

神麴麥芽白丑頭木槿榔鬱金蘿蔔子炒黃連各

五錢枳實二錢皂角白草霜各二錢半共為末麴

糊丸如菜豆大每服三十九視疾之上下為食之

先後熱酒薑湯任下攝久古方

治冷氣脹悶不可忍

乾薑炒官桂蒼朮米泔浸炒半夏薑汁炒加生薑

水煎服保元方

又方

醫品補遺

卷二 諸藥

三

煨暉堂

莪朮二兩醋煮木香一兩煨為末每服半錢淡醋

湯下家寶方

又方

陳香圓燒灰存性好酒和服二錢即愈濟世方

又方

草豆蔻一兩去皮為末木瓜生薑湯調服半錢全方

又方

用飴糖漿溫服一二碗急救方

諸氣刺痛

木香一兩皂角炙一兩為末糊丸梧子大薑湯服

五十九其效如神方

失血門

清陽活血湯 治陰虛火動卒暴吐血不止神効

歸尾一錢二分生地二錢白芍生用八分川鬱金

一錢天冬去心一錢麥冬去心二錢丹皮七分支

仁一錢生甘草五分澤泄七分黃柏鹽水炒三分

醫品補遺

卷三 失血

止

煨暉堂

紅花五分桃仁去皮尖碾粉八分藕節五枚同煎

熟兒童便半盞服或加煨過爭髮灰五分沖服尤

妙彭玉懸傳

天門冬丸 治咯血吐血潤肺止嗽

天冬一兩去心阿膠炮甘草貝母去心白茯苓杏

仁去皮尖各五錢為細末蜜丸彈子大噙化公麟

吐血不止

荆芥連根洗搗汁半盞服或用乾穗為末生地黃

汁調服二錢新驗方

又方

木耳槐花各一兩為末井水調服急救方

又方

麥門冬一觔去心搗取自然汁入蜜二合分作二服即止活人心鏡

又方

蒲黃末每服半錢生地黄汁調下量人加減或入髮灰等分聖濟方

七情所感酒色內傷氣血妄行口鼻俱出心肺脉破

醫品補遺

卷三

失血

廿五

熙輝堂

血如湧泉須臾不救

用人參焙側柏葉蒸焙荆芥穗燒存性各五錢為末每二錢入飛簫麝二錢以新汲水調如稀糊服

少頃再啜一服立止中藏經方

鼻衄不止

用紫蘇葉為細末吹之立效劉子超傳

又方

山梔子燒灰吹之屢用有效易簡方

又方

蒼耳莖葉搗爛取汁一小盞服聖惠方

又方

人參一錢煎湯同童便服即止至重者用二錢急救方

齒縫出血

人參赤茯苓麥冬各二錢水一鍾煎七分食前溫服日再試效方

又方

五倍子燒存性研末敷之即止易簡方

醫品補遺

卷一

失血

廿六

熙輝堂

肺病咯血

杏仁四十個以黃蠟炒黃研細入青黛一錢作餅用柿餅一個破開包藥濕紙裹煨熟食之取效冊

漢方

甲乙餅治嗽出血片涎內有血絲不問久新即聲

音啞者一服效

青黛一分牡蠣二錢杏仁七粒去皮尖研勻用黃

蠟溶化和丸捏成餅子一枚每日中用乾柿餅一

枚去核入藥在內濕紙裹煨約藥溶方取出用火

毒食後細嚼糯米飲下急救方

欬喘嗽血吐血脈無力者

人參末勿服三錢鷄子清調之五更初服便睡去

枕仰卧只一服愈年深者再服咯血者服盡一兩

甚效忌醋鹹腥蟹鮮醉飽常死方

痰嗽帶血

青州大柿餅飯上蒸熟批開每用一枚摻真青黛

一錢卧時食之薄荷湯下纂要方

又方

醫品補遺

卷二

失血

廿七

娛暉堂

欬冬花百合蒸焙等分爲末蜜丸龍眼大每卧時

嚼一丸薑湯下濟生方

灸瘡出血

酒炒黃芩二錢爲水酒服卽止怪證方

耳中出血

蒲黃炒黑研末摻入簡便方

脚縫出血行走不得

鷄內金鳳凰衣研細各一兩泥固火煨爲末燭油

調入縫內次早卽能行急救方

虛勞門

痰火 汗症 消渴

淋濁 夢遺

補陰丸 治虛勞發熱肌瘦食少咳嗽吐血

白花粉人乳并蒸曬麥冬去心各二兩天冬去心

皮蜜蒸曬貝母去心各一兩二錢地骨皮去骨酒

洗當歸各一兩五錢生地黃酒浸砂鍋炒二兩白

芍酒炒一兩百合酒拌蒸曬二兩川皮酒洗一兩

八錢知母蜜拌蒸一兩香附童便浸透炒熟地白

茯苓山藥各二兩生甘草八錢遠志肉去骨淨一

醫品補遺

卷二

虛勞

廿八

娛暉堂

兩五錢威靈二兩蜜拌蒸焙以上共爲細末蜜丸

梧子大每服三錢白湯下早晚各一服效鼎氏方

提金不換 治全上

用十餘年舊尿壺以清水浸每日換水一遍浸過

七日用純黑毛脫豬腿精肉一斤去淨筋油碎切

入壺內着水大半壺以木槌塞口外用鹽泥封固

入糠火內煨一夜取肉出搗極爛如泥并入白茯苓

苓末四兩懷山藥末四兩再搗勻爲丸每空心以

淡鹽湯送下方錢效重者不過兩料全愈

男婦勞瘵腰腿疼痛咳嗽吐痰七日見效

九月經霜桑葉陰乾一斤紅棗去皮核一斤無灰

酒五斤浸入罈內懸煮文武火二炷香空心服三

小杯海上方

虛勞寒熱肢體倦痛不拘男婦

入九月青蒿成實時采之去枝梗以童便浸二日

曬乾為末每服二錢烏梅一個煎湯服靈苑方

五種尸注

用忍冬草葉剉數斛煮取汁煎濃每服雞子大

醫品補遺

卷三 虛勞

廿九

娛暉堂

許溫酒化下一日二三服用後方

男女一應勞怯但脉有神者

用上好箭頭硃砂一兩明雄黃五錢如無單用硃

砂亦可為細末單層綿紙包固選未行經童女一

個將藥貼放女子臍內汗巾縛住一週時取下稱

藥比前重三錢餘者更妙即拴病人臍上先脩

人乳十餘碗候病者口乾發渴燥與乳飲之渴止

乳亦止然後解下臍上之藥其病自去再用補劑

十八九活急救方

傳尸勞症背脊內必然有虫

取鴿糞三五合炒極熱布包從尾間起擦背脊上

至大椎又從大椎擦背脊下至尾間如此上下數

十遍冷則易之日擦十餘次夜擦五六次三日內

外長擦其虫必死服藥可愈急救方

又方

用桑葉搗汁和童便煎熬露至五更時服之被蓋

暖一固而起頻服取効此神方也急救方

燒香治勞

醫品補遺

卷二 虛勞

卅

娛暉堂

玄參一斤甘松六兩為末煉蜜一斤和勻入瓶中

封閉地上埋窖十日取出更用炭末六兩煉蜜六

兩同和入瓶更窖五日取出燒之常令聞香疾自

愈初入瓶中封固煮一伏時後破瓶取搗入蜜及

炭末別以瓶盛埋地中窖過用亦可熏經驗方

痰火

消金利膈膏 治勞心過甚膈痛噎痰不咽苦最

效

馬兜鈴去蔓桔梗各四兩沙參圓眼肉陳皮去白

公傳

寧嗽清金丹 治痰火咳嗽生津止渴利氣

廣陳皮米泔水浸畧刮去白取大片晒乾一斤先用枳壳四兩用淨水六碗浸一宿濃煎汁二碗拌皮浸一夜蒸透晒乾二次甘草三兩去皮照前浸蒸晒三次欸冬花去蘆梗四兩照前法製四次桔梗四兩照前法煎汁去渣加白礬煅玄明粉青鹽各四錢入汁化開拌蒸晒五次用竹漚照前拌六次梨汁照前拌七次出汁雜餅汁照前拌蒸晒為

久年痰火咳嗽

人乳童便各一盞竹瀝半盞薑汁二匙重湯煮熟服效 王駿公傳

又方

末每用陳皮一斤沉香六錢山查肉二兩細茶二兩白藥煎二兩烏梅肉三兩白礬煅一兩此五味一兩人參二兩花粉二兩薄荷三兩共為細末加水糖十兩甘草一斤熬成膏加煉蜜少許和勻杵千餘下印餅臨卧時含嚥之最妙 娛暉堂原集

又方

石膏一塊炭火煅紅淬入好燒酒內響定取出又煅又淬如此七次燒酒頻換取研細末少加白糖拌勻每茶匙挑服二錢津嚥下 周義扶方

生薑生梨牛藕白果蘿蔔荸薺各取汁七錢砂鍋熬加白糖四兩煎數沸下蜜二兩再煎入猪油二錢煎成膏丹用白伏苓三兩去皮白礬煅一兩為細末入膏內攪勻丸如芡大每用一丸嚥佳五更再進一九以愈為度 王駿公傳

痰火咳嗽失血

天冬去心一兩阿膠炒甘草貝母去心白茯苓
仁各五錢為細末蜜丸彈子大噙化王駿公傳

汗症

盜汗不止

麻黃根椒目等分為末每服一錢無灰酒下外以
麻黃根故蒲扇焙為末撲之奇效方

夜出盜汗

黑豆一合浮麥一合水一鍾煎七分臨卧服三次

醫品補遺

卷三 汗症

世三

娛暉堂

即好急救方

傷寒後盜汗不止兼治婦人小兒盜汗

龍膽草研末每服一錢猪膽汁三兩點入溫酒少
許調服家藏方

自汗無度

麻黃根黃芪等分為末每服一錢九梧子大每用浮
麥湯下百九以上為度試驗方

心汗

用茯神為末艾葉煎湯服一錢日一次二日效忌

生薑急救方

自汗怔忡不寐

東仁炒研細末三錢用竹葉黃芪湯下極效王駿
公傳

自汗盜汗

艾蛤一兩硃鍋片煆過冷定為末龍骨五錢火煆
枯礬二錢五分共一處每用五七分本入津唾調
入臍中以膏藥或濕紙護急救方

消渴

醫品補遺

卷三 消渴

世

娛暉堂

消渴引飲

白芍藥甘草等分為末每用一錢水煎日三服効
勿以易平而忽之經驗方

消渴骨節煩熱

生芭蕉根搗汁時飲一二合聖惠方

消渴不止

兔絲子煎汁任意飲之以止為度世林廣記

又方

乾浮萍瓜萎根等分為末人乳汁為丸梧子大空

腰米飲服二十九三年者數日即愈千金方

又方

薏苡仁煮粥飲并粥食之用後方

救苦丸

治腎虛消渴難治者

黑大豆炒天花粉等分爲末糊丸梧子大每黑豆

湯下七十九日二普濟方

淋濁

諸淋

大蒜淡豆豉蒸餅爛研爲丸溫水下三四十九日

醫品補遺

卷二 淋濁

世

娛輝堂

三服三日愈

王駿公傳

又方

海金沙七錢滑石五錢爲末每服二錢燈心木通

麥冬煎湯入蜜一匙調下神效王駿公傳

又方

釅茶滿調益元散空心服一茶鍾愈王駿公傳

血淋

用向陽側柏葉一兩人乳一茶杯將側柏搗爛同

乳以布絞汁空心服效急救方

新法腹痛欲死

烏汁調髮灰每服三錢三日血止痛除時珍方

血淋或出沙管如條痛如刀割

血磨香五分葱白一根同磨香搗取汁孩兒茶三

錢五分琥珀二分五厘各爲細末用百沸湯調前

藥入葱汁空心同服如神急救方

五種淋疾

苧麻根兩莖打碎以水一碗半煎半碗頓服即通

大妙斗門方

醫品補遺

卷三 淋濁

世

娛輝堂

白濁遺精

熟地三錢山萸肉一錢半澤泄五分山藥用皮白

茯苓各一錢續斷蓮鬚各八分石蓮肉二錢牡礪

童便煨淬九次一錢五味子九粒白芍升麻醋炒

各五分水煎日服一劑効王駿公傳

又方

椿根白皮兩半乾薑煨黑白芍煨黑黃柏煨黑

各二錢爲末粥九梧子大每空腹白湯下百丸

溪方

赤白濁

大黃為末每服六分以鷄子一枚破頂入藥攪勻
蒸熟空心食之不過三服愈倘便方

又方

兔絲子煮汁飲效 范方

夢遺

約精丸 夢遺諸藥不效服此立愈

黃連生地歸身酒洗半兩 神遠志 杏仁炒人

麥石蓮肉等分 蜜丸 梧子人早晚各服二錢 淡鹽

醫品補遺

卷三 夢遺

七七

娛暉堂

湯下 王駿公傳

八寶丹 治夢遺

白茯苓炒去刺 知母去毛 鹽水炒 金櫻子去毛 刺

麥冬去心以上各一兩二錢 牡蠣醋煨六錢 白蓮

鬚八錢 龍骨忌鐵煨五錢 北五味三錢 共為細末

煉蜜為丸如梧子人每日早晚各服一錢五分 鹽

湯送下十服效 娛暉堂原集

又方

大生地酒洗一錢 山萸肉一錢 白茯苓八分 梧子

仁一錢 遠志肉五分 菖蒲五分 蓮鬚五分 芡實肉

炒一錢 山藥炒一錢 白朮七分 麥冬去心一錢 棗

二枚 竹葉十片 水煎服 娛暉堂原集

虛勞傷腎夢中泄精

用韭子二兩微炒為末 食前溫酒服二錢效 普濟

方

泄瀉門

痢疾 便血

椒附丸 治腎虛脾虧大便滑瀉

醫品補遺

卷三 泄瀉

八八

娛暉堂

椒紅桑螵蛸炙 龍骨火煨 存性 山茱萸炒 附子炮

鹿茸酒蒸焙 共為細末 神麴丸 桐子大 空心米飲

下七十丸 王駿公傳

暴泄不止小便不通

車前子炒為末 米飲調十二錢 其根葉亦可搗汁

飲此藥利水道而不傷元氣 故妙 急救方

麴丸 治飲食所傷 胃月暴泄

神麴炒 蒼朮米泔浸 夜焙等分為末 糊丸 梧子

人每服二十五丸 米飲下 和劑方

腹脹忽泄日夜不止諸藥不效此氣脫也

用益智仁二兩濃煎飲之立愈得效方

寒濕泄瀉小便清者

以頭燒酒飲之立止急救方

脾瀉久有熱者

黃連一兩生薑四兩俱切碎慢火同炒待薑枯去之取連為細末空心米飲服二錢急救方

濕熱虛泄

乾山藥蒼朮等分飯九水飲服大人小兒皆宜經

醫品補遺

卷一

痢疾

世元

娛暉堂

驗方

痢疾

經驗神效方 治痢或紅或白或紅白相兼裏急後

重身熱等症俱有奇效

川黃連去蘆生用條黃芩生用生白芍山查肉各

一錢二分陳枳殼煨榔厚朴薑汁炒青皮各八

分當歸地榆甘草各五分紅花酒洗三分南木香

二分桃仁去皮尖研粉一錢製仁者不用右剉劑

水三碗煎一碗空心服湯再煎服若未過小兒止

用數匙可愈有便純紅血便揚塵水大孔如竹筒

等惡症古書云不治者急服此藥亦可救治但

服之遲緩則清及厚難治以救中有禁口者盡

入胃口也將此方煎熟去渣每服一匙分五六次緩

緩服之令其胃口漸開服至一劑後不惟藥

可進而飲食亦可進不可更用他藥若單白無紅

者去地榆桃仁二味加木香三分去白陳皮四分

滯澀甚者加酒炒大黃二錢服一二劑仍除之此

方用之于三五日效用之于旬日內亦效惟半月

醫品補遺

卷三

痢疾

世元

娛暉堂

外則當加減其方法詳後黃連黃芩白芍三味生

用各四分酒炒各六分山查一錢厚朴陳皮青皮

檳榔各四分甘草生熟各二分地榆醋炒當歸各

五分蒼仁六分紅花三分木香二分如延至月餘

覺脾胃虛滑者酒炒黃連黃芩白芍山查各六分

陳皮厚朴桃仁檳榔木香各一分醋炒地榆四分

紅花二分當歸人參白木熟地草各五分以上三

方有孕婦人去蒼仁紅花檳榔方可服之以上方

法隨用必效 附方

千金不換散 治赤白痢疾

川黃連一兩薑汁拌炒黃芩一兩酒炒神麴炒四錢五分白芍二兩酒拌炒大麥芽炒去壳三錢五分蓮肉去心四錢五分山查肉八錢炒當歸二兩酒洗枳殼炒五錢木香三錢不見鐵器研共為末久痢虛滑加肉豆蔻麵包煨去油五錢每服大人一錢小兒五分紅痢蜜湯調下白痢薑湯下紅白痢蜜薑湯下久痢虛滑者人參白朮湯下 娛暉堂原集

醫品補遺

卷三 痢疾

聖

娛暉堂

治禁口痢

水蠶仁六個研泥分作二分用麵燒餅一個切作兩半每用半餅作一竅納藥在內乘熱覆在病人臍上一時再換半個熱餅其痢遂止即思飲食 經方驗方

又方

黃連三錢人參一錢五分水鍾半煎七分溫服藥入口即甦 王駿公傳

木香檳榔丸 治一切痢疾神效

醫品補遺

卷三 痢疾

聖

娛暉堂

隔不寬及口唇外生瘡皆可治孕婦忌服 張昭遠傳

治久痢不止

黃丹水飛黃蠟各二兩杏仁九十八個去皮尖飛礬一兩五錢木香檳榔取頭末肉蔻人參各三錢巴豆霜一兩五錢為末先將杏仁研爛入藥同搗以細為度再將黃蠟化開入藥和勻捏成塊大人每服黃豆大三九小兒零粒人三九空心服紅白痢薄荷湯下紅痢青皮地榆湯下白痢淡薑湯下

久痢虛者用人參湯或白朮散湯下 王駿公傳

便血

中氣下陷大便下血不止

補中益氣湯倍參芪加真三七一錢如不止再加

黑薑肉桂各五分如虛寒甚加製附子五分即止

孕婦去附子三七 王駿公傳

腸風下血

猪大腸一段煮去內外油槐花四兩揀洗淨晾干

入腸內用無鹽多年陳米醋鍋內煮旋添旋煮極

醫品補遺

卷三 便血

聖一 娛暉堂

爛為度九菜豆大極細百草霜為衣每服百九空

心滾白湯下日飲小便一碗自愈 王駿公傳

又方

蜜炙蘿蔔任意食之 百一選方

又方

皂角刺灰二兩胡桃仁破故紙炒槐花炒各一兩

為末每服 錢米飲下 普濟方

熱毒便血食熱物即發

生葛根搗汁一碗入藕汁半碗和服 梅師方

酒毒便血

麴一塊濕紙包煨為末空心米飲服二錢神效 千金方

醫品補遺

卷三 便血

聖一 娛暉堂

廣寧郎廷模貞若父彙集

文淵 文淵 全載

癰毒門

附內癰 疔瘡 楊梅

治搭背對口疔瘡及陰毒不起一切無名腫毒

用南方水牛大牙即盡頭牙不拘多少敲碎如漿

豆大用銅鍋炒黃色研末籬過每服一錢黃酒送

下多飲更佳內毒者托出流膿者生肌未成形者

醫品補遺

卷四

癰毒

癰毒

即散如無水牛牙即早牛牙亦效 史璞菴傳

玉杵千錠膏 治無名腫毒

松香透明者一斤為末單麻子仁同搗萬餘下稀

添松香稠添麻仁務要得宜投入水中扯拔三四

次再入乳香沒藥血竭乳茶各二兩搗勻每用一

塊厚貼瘡上如年久頑瘡加輕粉龍骨末各二兩

麝香二錢磁瓶密收 張昭遠傳

白龍骨膏 專治搭背對口無名腫毒瘡癰癰疽

魚火燎危難不治者若未成形即消已成敷上拔

剪長肉其效如神

乳香沒藥二味俱炙去油切為細末一錢龍骨火

煨一錢兒茶一錢輕粉一錢官粉二兩赤石脂一

錢焙以上俱研為細末以重篩羅過聽用再用香

油四兩黃蠟一兩先將香油入鍋熬數滾又將黃

蠟另行化開以綿紙隔去蠟渣入前油內再熬一

滾取出少溫將前藥末共入油內攪勻貯磁罐中

封口又入土埋一宿出火毒方可敷用 史璞庵傳

治發背經驗方

醫品補遺

卷四

癰毒

二

癰毒

官粉一兩龍骨一錢沒藥一錢黃丹一錢豬子前

蹄即豬糞子煨灰一錢童男女頭髮煨灰一錢以

上共為細末香油猪油等分入鍋煎滾加黃蠟一

錢化為一處取起將前藥末調勻敷搽患處不可

及及好肉仍用油紙照依患處大小攤藥蓋之每

日三次擦洗換藥數日即愈若粘結佳不能潰發

須于煎油之時倍加黃蠟此方百發百中無有不

愈者如有別種惡瘡此方亦能治之直敷上不痛

即是對症否則不效 史璞菴傳

治發背對口已經潰爛生肌方

夏秋間取腐草及糞土內蟬蛻虫形如蝨黑頭烏嘴看瘡大小的量取用若上搗爛成汁畧加蒼麥麩如稀糊樣敷于潰爛之上去腐生肌重者不過二次即愈矣恐冬入無此虫須預為尋取去頭尾蟲頭亦如前法和以等分或餅陰乾俟遇前瘡研碎為末以雞蛋清調敷患處如別處頑瘡久不收口常流膿血者以此虫一根去頭尾放入乳中用艾放火上灸七次其氣入肉自愈

醫品補遺

卷四 雜方

蝦蟇堂

烏龍膏 治發背對口一切無名腫毒

用七八年陳小粉不拘多寡置鍋內每粉一斤用大黃當歸各五錢拌入粉內以文火炒之或以錘子鐵杓之類不住手攪攪月令生熟不均俟粉麩起紅紫色然後點火向鍋內燎着則火候到矣用瓦盆蓋上聽其燒盡為度將粉灰取出研末置餅內封固如遇前瘡取出用餅貼敷患處如有頭者單為留出俟毒出其膿自消

治搭背神驗方 無論已潰未破

用生黑狗頭一個連毛將腦頂上鑿一小孔入上好銀珠二錢以火煨煉存性研末細篩篩過用坑中死水將患處擦洗潔淨以香油將前末藥調勻用鴨翎刷于患處隨乾隨刷不可間斷不出三日全愈

又方

土貝母四錢生知母四錢獨活一錢半防風一錢半僵蚕一錢蟬蛻一錢川山甲一錢五分火煨少焦以上各味用酒一大碗水一大碗煎八分入麝

醫品補遺

卷四 雜方

蝦蟇堂

香三厘溫服渣再煎不論大毒俱可用孕婦忌之

史璞菴傳

治無名腫毒或搭背脚背等處初起者皆可治

蜜陀僧入火煨過研末簍過以生桐油調敷患處立愈潰破者忌之

史璞菴傳

治各色腫毒

癩蝦蟆一隻剖腹取肝其患處用銀簪挑一小孔將前肝敷上聽其自然半吸孔內則毒盡散其腫消將肝取下如不能吸入則棘于矣

史璞菴傳

仙傳三妙膏方 專治癰疽發背對口疔瘡無名腫毒濕痰流注楊梅結毒天泡頭瘡及瘰癧馬刀婦人乳症小兒丹毒湯火燒燭蜚蟻叮或金刃所傷出血不止或跌撲打損疼痛難禁或風寒濕痺入經絡以致筋攣骨痛或濕入榮衛閃腰挫氣舉動難伸並大人小兒積聚痞塊疔瘡癰疽俱宜用之不拘外利一切惡瘡異形怪症隨手用之無不響應貼之未成形者即消已成者即潰已潰者即斂故立名為三妙

醫品補遺

卷四

癰毒

五

娛暉堂

紫荆皮獨活白芷石菖蒲赤芍以上五味各二兩川大黃川黃連川黃柏片黃芩千金子當歸桃仁紅花蘇木肉桂防風荆芥川羌活麻黃北細辛半夏牙皂川貝母烏藥天花粉黃芪金銀花牛蒡子連喬川山甲苦參僵蚕白附子九肋鼈甲全蝎蜈蚣蜈蚣三條蛇蛻一條草烏大戟天麻巴豆草麻子牛膝防己海風藤良薑白及白欬耳草節頭髮童男者佳以上各五錢桃柳桑槐枝長寸者各二十一段右藥各咀片用香油十斤入大鍋內將藥

醫品補遺

卷四

癰毒

六

娛暉堂

浸七日夜取起慢熬至黑枯色盡去渣將鍋展淨再用密絹過濾入鍋內將得清潔為美再用慢火熬油大約淨油可得七斤為準入上好水飛黃冊四斤半用油俱依一兩一斤為率以一手持棍棍一手下冊不住手攪滴水成珠而膏自成再入預製細末藥乳香八錢去油沒藥八錢去油血竭五錢明雄五錢此四味另研先入攪均再入十珍香水香檀香降香丁香楓香沉香霍香各研細末三錢真麝香一兩真珍珠圓白二錢為末大水片二錢研末徐徐添入攪極勻再入朝腦五錢以收藥味以上如法將藥味俱下完仍用棍攪攪千轉至油花揚起方佳每用瘡痛以油紙攤貼瘡痛以青布攤貼瘡塊用狗皮攤貼製藥時忌婦人雞犬

然暉堂原集

癰疽及一切腫毒

帶泥山藥草麻子糯米等分水浸研敷普濟方

治一切無名腫毒

鷄蛋五個挖孔去黃白淨填入灯草以銀線上

下合住火煨紅取出以碗蓋之研灰入乳香沒藥
川貝母俱為末各五錢和勻每服三錢以酒盡量
送下覆被取汗即愈陶逸消傳

諸惡瘡腫

山慈菇搗爛塗之即便消退燕治小兒赤遊丹毒
蘇頌方

治癰疽初發黑而不痛

艾葉一斤礪黃雄黃末各五錢以水同煮半日搗
極爛候溫敷上再煮再易十條通知疼者可生全

醫品補遺

卷四 癰毒

七

娛暉堂

不覺痛者不治急救方

禹應膏

五月五日采蒼耳根葉數担洗淨晒到大鍋內水
煎濃淨再熬成膏磁罐密收每用敷貼一切腫毒
即愈或用酒服一匙極效集簡方

瘡氣嘔吐

萊豆粉三錢乾懸脂半錢研勻新汲水調下一服
立止普濟方

弩肉瘡突

糊似黃色者一錢片腦少許切木燈草蘸點之效
並指方

丹連陰卵癰急解問疼痛牽入小腹不可忍

苗香苗葉搗汁一升日三四服渣敷冬用根范汪

囊癰

用野紫蘇葉面青背紅者是焙乾為末敷之如燥
以香油調敷囊脫無皮者外以青荷葉包其皮自

生保元方

醫品補遺

卷四

內癰諸方

八

娛暉堂

內癰諸方

腸癰一足拘攣口有臭氣即是此症

桑結一塊即系樹上結蠟以陳米醋磨服先脩爭
桶并煎補中益氣藥候服前藥坐爭桶瀉訖即服
補氣藥以防氣脫也神效史氏菴傳

腹內生毒在腸臟不可藥治者

取皂角刺不拘多少好酒一碗煎至七分溫服其
膿血盡從小便中出極效不忌酒者水煎亦可經

脫方

肺毒生癰

綠橘葉洗搗絞汁一盞服之吐出膿血即愈經驗方

⑤疔瘡

疔瘡惡毒初起

白礬末三錢葱白七莖同搗極爛分作七塊每用熱酒一盃送下服盡蓋暖再飲葱白湯一杯少頃汗出如淋即愈簡便方

又方

醫品補遺

卷一 疔瘡

娛暉堂

紫花地丁搗汁服或用根去粗皮同白茯苓為末

油調塗神效千金方

又方

稀薺草五爪龍小薊大蒜等分搗爛入熱酒一碗

絞汁服得汗立效生真方

又方

王不留行子為末礬酥丸黍米大用酒服一九升

即愈集簡方

又用菊花葉同蒼耳葉搗汁服效保元方

又方

蒲公英搗汁和酒煎服取汗外搗爛貼患處唐氏方

又唇疔瘡

銀珠一錢荔枝肉一個陳年乾梅一個共搗爛敷上留頭出毒愈史瑛菴傳

⑥楊梅瘡

楊梅惡瘡

白鷄冠花一株連根葉以水四碗煎二碗病者先

醫品補遺

卷四 楊梅瘡

娛暉堂

須醉飽然後飲之即蓋被救管汗出為度搗被須

用蒜頭塞鼻漸次掀揭置空處勿令人觸其毒氣

沾染史瑛菴傳

又方

每日候至半夜用上茯苓一斤忌鐵器以竹刀刮

去粗皮石塊搗爛用井水四碗河水四碗同煎至

四碗為度五更時分取六分三錢另加硃砂一

錢和土茯苓湯服之其餘湯代茶飲之午後照前

再煎一料吃至睡時忌油鹽醬醋葷腥止可食猪

肚和土茯苓淡煨食十二日愈史璞菴傳

又方

雄黃一錢半杏仁三十粒去皮輕粉一錢為末將瘡洗淨以雄猪胆汁調藥搽上二三日愈黃德堂

治楊梅面上黑疤

黑丹牛糞捻作小餅灰火煨半熟乘熱貼患處一貼許取去即轉白意救方

七帖散

細葉野艾根二兩無則用金銀花土茯苓四兩生

藥品補遺

卷四 楊梅瘡 土

娛暉堂

猪油一兩直僵蚕七箇蟬蛻翅足全七箇肥皂核肉七箇皂角子去壳七箇空心用水六茶盞煎至三杯服午前四盞煎二盞臨卧二盞煎一盞每服一帖連服七帖凡楊梅瘡毒未發者暗消已發者收斂永無後患毒深者不過十四帖全愈濟世方

治楊梅天泡服輕粉致筋骨疼痛

以黑鉛一斤鍋內化開投入桑白皮炒成粉黃酒淬入乘熱飲以醉為度急救方

瘡癰門

附火丹 瘰癧 瘰癧

通身風癢生瘡疥

茵陳煮濃汁洗之立瘥千金方

一切瘡疥

荆芥末以地黃自然汁熬膏和九梧子大每服二十五丸茶酒任下普濟方

乾疥瘡

用香油四兩花椒一兩熬至焦黑去渣冷定入大

藥品補遺

卷四 瘡癰

土

娛暉堂

楓子肉七枚輕粉一錢硫黃一錢人言三分為末攪入油內搽之壽世方

坐板瘡痛癢難愈

蜜陀僧三分硫黃二錢石膏一錢五分人言二分為末猪油調搽傳愛泉傳

膿瘡

雄黃二錢五分硫黃二錢黃芩二錢石膏一錢為細末菜油調塗立效急救方

瘡孔漏瘡流膿不止不拘遠年近日

上茯苓一斤銅刀刮去皮牛旁子熟地當歸川芎
各一兩沒藥五錢共為細末早中晚每服三錢上
好酒調服史璞卷傳

切諸瘡腫痛

五倍子黃柏等分為末敷之普濟方

黃水瘡

用番木整一兩以香油焙紫色乘熱將粗布拭去

毛即碾為細末入硼砂二錢研勻以檳榔磨水調

用鷺翎掃搽患處神效南嶽僧大鐸傳

醫品補遺

卷四 瘡癰

十三

娛鍾堂

又方

松香不拘多少為末用紙捲藥在內搓成條以線

縛定入香油內一浸取出火燃着滴藥入碗內取

搽瘡上效急救方

血風濕瘡

千年陳石灰研搽痛即止瘡即愈神效蘭氏方

脚肚風瘡如癩

桐油人乳等分搽敷次即愈集驗方

切熱癰時毒腫痛

用芙蓉葉菊花葉同煎水煎熟洗或搽敷效蘇氏方

瘡傷風水腫痛

取慈青葉同乾薑黃柏等分煮湯浸洗立愈食療方

治頭黑門

蕎麥麴煮食即發起普濟方

忍冬膏 治諸般腫毒及金刃傷瘡

金銀藤四兩吸鐵石三錢香油一斤熬枯去渣入

醫品補遺

卷四 瘡癰

十四

娛鍾堂

黃丹八兩至滴水不散布帛如常攤集秘製方

一切無名腫毒初起

牙皂七個燒存性為末真蛤粉炒過七錢攪勻生

酒調敷救急方

火疳

用方

水藻搗敷極厚乾即易效無比並治一切熱毒保

生方

又方

浮萍搗汁過塗之妙或用蛭蝟糞水調塗之更效
秘錄方

又方

大黃皮硝各五錢為細末以柏枝葉搗汁調稀搽
患處即退急救方

又方

伏龍肝一兩亂頭髮二兩煨灰研水調敷或鷄子

清調塗 譚氏方

纏腰丹

醫品補遺

卷四 丹毒

十五

吳暉堂

鏡面草入塩搗爛敷 壽域方

腰生一紅瘤兩邊生紅筋纏至腰臍必死

金墨水磨濃和推黃末塗之神效 急救方

治赤遊風

芭蕉根搗爛塗 急救方

（癰瘡）

治癰袋 即粗脖子

海帶火焙乾海螵蛸火炙過俱末以蛇皮蜈蚣川

椒輕搗細黃酥神龍骨血竭白草霜石青以上各

二錢共為末聽用先用紋銀一兩二錢打頂圈一

個要空心如粗脖子大其頂圈同內處留一線之縫

前藥由縫內填入後將頂圈帶在粗脖子之上其藥

氣由圈縫出患於患處此圈須帶二三年其患始

消如一月之內見有消息即將頂圈微收緊此亦

不可太緊恐患者難受其圈內藥逐月一換 史璞

卷傳

頂後結核或赤腫硬痛

生山藥一挺去皮草麻子二個去壳同研貼之如

醫品補遺

卷四 癰瘡

十六

吳暉堂

神急救方

牙面上生疣目

蝸蝓研破鐵鋪磨香等分研搽三次自落 集效方

又方

蠟紙捲硫黃末少許點火淬有聲自去 普濟方

面上黑痣

蔡藍燒灰五分雄黃一錢鷹爪白炒礬砂各一錢

蟾酥殿二分人言蝦半份白丁香炒五分斑蝥炒

一分共為細末臘醋調膏先將黃參為末用鐵鋪

磨水調糊圈痔四圍將痔頂用針刺破以膏子塗
照痔大小塗上俟痛一二時以葱椒湯洗去塗二
三次即退落矣 娛睡堂原集

紫癰

治瘰癧經驗方

用毛老人藤一各雪裡紅生樹林陰翳之地枝葉
皆生毛故曰毛老人子經霜始紅採取根苗陰乾
切碎不拘多少黃酒濃煎空心飯後多飲不能飲
酒者水煎濃汁入黃酒一半沖服不可間斷瘡上

醫品補遺

卷四 瘰癧

十七

娛睡堂

貼萬應膏俟膿水流盡其口漸小將收口時上生
肌散數次全愈忌房事發物 周子全傳

又方

肥皂子仁去黑皮壳半斤夏枯草一斤玄參一斤
共為細末煉蜜丸梧子大每服三錢食遠服至齒
者二片即愈無不應驗忌一切發物並栗子醋精
肝腸猪首鴨蛋 急救方

瘰癧初作未破作寒熱

草烏頭半兩水龍子二個以米醋磨細入爛葱

頭蛆蚋糞少許調勻敷上留孔通氣效 正宗方

又方

玄參浸酒日飲之效 開寶方

頭核腦痺頭枕後生痰核

用輕虎白浮石燒存性為末入輕粉少許麻油調

掃塗之勿用手按即漲或加焙乾黃牛糞尤好亦

治頭瘰 指方

斑癰門

附頑癬 風癩

醫品補遺

卷四 斑癰

其

娛睡堂

紫白癰斑

貝母南星等分為末生薑帶汁擦之或用貝母百
部為末自然膏汁調搽 聖惠方

白癰風疾

白痰藜子六兩生搗為末每湯服二錢日二服一
月絕根服至半月白處見紅點神效 孫真人方

面上紫塊如錢大或滿面俱有

羊蹄根四兩取汁用山甲十片燒存性椒末五錢
生薑四兩取汁和研生絹包擦如乾加醋潤 積德方

夏月汗斑如疹

用蜜陀僧八錢雄黃四錢先以薑片擦熱仍以薑片蘸末擦之次日即愈 治人心統方

少年面皰汁以熨風

紫背浮萍四兩防己一兩煎濃汁洗之仍以萍於斑點上熱擦日三五次 清濟方

粉萍面野

山慈菰根搗汁夜塗旦洗 薄濟方

面上雀斑

醫品補遺

卷四 斑疹 七九 娛暉堂

三奈鷹糞蜜陀僧草麻子等分研勻乳汁調夜塗

旦洗 經驗方

肺風而磨起白屑或微有赤瘡

用草麻子仁四十九粒白果膠末各三枚瓦松三

錢肥皂一個搗為丸洗而用之良 扶壽方

肺風毒痛遍身疥癩如癰及癰瘰癧癰面上風刺婦

人粉刺

用梓皮燒灰四兩枳殼去蘆燒四兩荆芥穗二兩

炙甘草五錢杏仁水煮過去皮尖二兩研細和勻

每服二錢食後溫酒調下甚者日三服和劑方

肺熱生瘡遍身皆是

用苦參末粟米飲九梧子人每服五十九空心米

飲下 藥院方

平發風疹

醋漿合石灰塗之隨手滅 外臺方

頑癬

多年頑癬神方

五梧子研碎以陳米醋熬成膏將癬抓破川前藥

醫品補遺

卷四 斑疹 七九 娛暉堂

敷上乾則復敷以不癢為度去藥其患處之皮一

同粘起盡除根 史璞菴傳

身面惡癬

紫背天葵草入生礬研敷二三次即斷根而愈 直指方

蟲癬

斑貓七個糯米炒去翅足入杭粉一錢研為細末

用檳榔磨香油調塗之效 醫景常傳

又方

馬蜂窩一箇仰放瓦上以枯礬末填滿孔中炭火
炙焦爲末脚醋調塗癬上卽愈萬萬鶴傳

乾濕頑癬不論久新

硫黃八兩生礬四兩紅川椒二兩爲末土大黃根
搗汁和成膏磁器收新癬抓破擦多年頑癬加醋
擦牛皮癬以穿山甲刮破擦須擦一二時極透乃
效日久藥乾以醋調塗正宗方

又方

鉛一塊搥匾以綠豆撮許加水煮鉛片時取出將

醫品補遺

卷四 頑癬

二十一

娛聊堂

穿山甲刮破頑皮用鉛勤搽不拘時日以愈爲度

永不再發月義扶方

(大風瘡)

八味胡麻丸 治大風癩疾

大楓子一斤去油淨白炭炭一斤苦參一斤小胡
麻一斤蒼耳子二斤羌活半斤防風半斤荆芥半
斤以上除蒼耳子用水煎汁如梨膠餘七味以銅
鍋炒乾研細爲末入蒼耳汁內爲丸梧子大每服
三錢日三服重者百日愈此仙方也忌葷腥油醬

宜淡食史璞傳

又方

用黃栢末皂角刺灰各三錢研勻空心酒服取下
蟲物並不損人食白粥兩三日服補氣藥數貼如
四肢麻用鍼刺去水可服忘一切魚肉發風之物
取下蟲大小長短其色不一約二升其病乃愈
正宗方

大風及肺毒頭面生瘡

苦參荆芥穗等分爲末皂角濃煎湯爲丸梧子大

醫品補遺

卷四

大風瘡

二十一

娛聊堂

空心米湯下五七十九急投方

面生紫塊疙搭漸成麻風

用穿山甲燒灰炒川椒爲末各二錢生薑汁土大
黃根汁調稠細絹包擦忌動風發物正宗方

疔癰陰瘡門

附痔瘡 疔瘡

瘰癧

小腸疝氣

荔枝一個將鹽填滿泥固服過取灰研末以豆腐
衣捲食卽愈急救方

玉環來笑冊 治疝氣癰腫

荔枝核四十九箇陳皮連白九錢硫黃四錢為末
搗水打麪糊九葉豆大過痛時空心酒服九錢良
久再服不過三服神效亦治諸氣痛皆效方

大人小兒外腎腫痛或疝氣風熱暴腫

小茴香穿山甲全蝎俱炒南木香等分為末空心
酒下二錢腫消痛止急救方

偏墜象痛

槐子一錢炒為末入鹽三分空心熱酒送下腫痛

醫品補遺

卷四 疝氣陰瘡 二十三

娛暉堂

不可忍者立消而止保元方

陰囊潰爛

以鳳仙花子甘草等分為末麻油調敷即便生肉
急救方

女子陰瘡

硫黃末敷之瘡乃止用後方

婦人陰中作癢及內外生瘡

杏仁去皮尖輕粉雄黃鉛溶化入水銀冷定各一
錢為細末每用五分束肉為丸絲綿繫納陰內

宗方

陰毛際肉中生蟲如或或紅或白癢不可忍者

白果仁嚼細頻擦之取效劉長春方

女人陰腫

井蒴苗搗爛煎湯先熏後洗得效方

婦人陰痛

青布裹搗熨之藥性方

婦人陰癢

蛇床子乙兩白礬二錢煎湯洗再以桃仁杵爛綿

醫品補遺

卷四 疝氣陰瘡 二十三

娛暉堂

裹塞之用後方

痔漏

槐角九 治五種腸風瀉血

槐角去梗炒二兩地榆當歸酒焙防風黃芩枳壳

麩炒各半兩為末酒糊丸梧子大每服五十九米

飲下和劑方

痔漏 不拘久近通腸汚濁孔出先服此追盡膿毒

服後藥取效

胡黃連切片薑汁拌炒刺蝟皮炙切片再炒黃各

一兩麝香二分爲末軟飯和丸麻子大食前酒下

一錢服後膿水父多是藥方到勿懼後用創黃連

爭一兩穿山甲麻油塗灸黃色石次明蝦蟇化微

炒各五錢爲末煉蜜丸麻子大清水湯下一錢早

晚一服至重者四十日愈如漏四邊有硬肉突出

加蚕蠶二十個炒研入丸服效 正宗方

痔瘡有核

白鵝膽二三枚取汁入熊膽二分片腦半分研勻

磁器密封勿泄氣手指蘸塗立效 保壽堂方

醫品補遺

卷四 痔漏瘡 五 娛暉堂

又方

五倍子一個鑽孔入水銀一錢黃泥固火煨紅冷

定加水片半分研爲末津唾調搽如疼加乳香沒

藥急救方

痔血神效

山漆一兩桐柏草一兩燒灰有性爲細末無灰酒

下或米湯下二錢三服即愈 急救方

內痔下血

木耳燒枯存性研末每三錢同青柿餅服忌辛辣

齊世方

（痔瘡諸毒）

生陰莖頭上者爲下疳

壁錢逐箇燈上燒存性爲末加水片少許搽上立

刻止痛 急救方

又方

鳳凰衣炒黃孩兒茶等分細研甘草瓦松煎湯洗

淨用藥敷之 急救方

又方

醫品補遺

卷四 痔瘡諸毒 五 娛暉堂

取溪港年久螺螄壳燒灰敷 奇效方

又方

紅棗一枚去核以明礬填入棗內外用大五倍子

一個將棗放入炭火煨過研末加血竭水片共研

極細米泔水洗淨瘡敷之一二次即愈 急救方

又方

五倍子炒黃色一錢黃柏炒紅色二錢輕粉五分

水片三厘研極細搜細掃患處 濟世方

妒精陰瘡

鉛粉二錢銀杏仁七個銅銚內炒至杏黃去杏取粉出火毒研搽集簡方

腫毒生右邊勝縫者為便毒

棉地榆四兩白酒三碗煎一碗空心服有膿者亦愈加穿山甲同患處者二片土炒引經更妙急救方

又方

金銀花甘草黃芪各五錢水酒各一碗空心煎服濟世方

醫品補遺

卷四 疔瘡諸方 二十七

靈應堂

腫毒生左邊勝縫者為魚口

槐子七錢炒黃酒煎熱服取汗為度急救方

又方

白礬枯研寒食麪調敷消腫無膿急救方

橫痃生小腹下陰毛間者

生山藥砂糖同搗敷即消先以麪塗四圍後敷急救方

廉瘡

廉瘡爛瘡

杏仁去皮尖紙壓去油取霜五錢輕粉五分和勻將雄猪脊髓掟和先川黃柏水洗淨拭乾敷上外以絹帛包好三四日效急救方

廉瘡朽臭者

新龜板醋炙黃更煨存性出火氣入輕粉麝香研勻以葱湯洗淨搽之效急救方

濕毒脛瘡

夏月采穉不食草晒乾為末每五錢加入米粉五分桐油調作隔紙膏周圍縫定冷茶洗淨將膏將

醫品補遺

卷四 廉瘡 二十八

靈應堂

上黃水出五六日愈簡便方

久潰廉瘡

用蘆葦石如羊脂髓白而輕者火煨醋淬以一研即碎色白為度置地下去火毒研為細末以真香油或生豬油調勻先將患處茶湯洗淨拭乾以前藥敷上中留一孔再以陳雨傘油紙包裹仍留一孔不可行動洗換二十日愈史璞菴傳

又方

鉛粉一兩五錢黃蠟五錢陀僧二錢水銀一錢水

片四分麻油一兩五錢先將黃臘麻油與鉛粉陀
僧同煎取起後將水片研末水銀用唾沫擦
入藥內洗瘡淨以紙攤貼患處水銀木片不可熱
死須後攪入若痛甚加乳香七分沒藥七分六月
間加白蠟五分張昭遠傳

又方

用麝做油燴微子研細末葱白搗爛調敷神效張
昭遠傳

翻花瘡肉如飯粒破之血出隨生反出

醫品補遺

卷四

瘡毒

三九

張暉堂

蒼耳葉搗汁服三合并日塗二次聖濟方

又方

胭脂貝母各三錢硃砂沒藥各二錢胡粉二錢五
分爲細末先用湯藥水洗淨敷之壽世方

金瘡門

附折傷

破傷風

刺傷

湯火傷

荔枝散 治刀斧傷

用真降香火上炙去油荔枝核白錫各等分爲極
細末乾敷患處卽住痛作癢不三日卽愈功能止

血止痛極效急收方

刀傷及刎頸未漸喉者

急用白蠟爲細末敷傷處卽止血數日卽復舊急
救方

金瘡神藥

蜜陀僧二兩童便浸入火內煨淬七次川黃連三
錢黃栢六錢紅花一錢五分共爲細末搽之卽愈
張昭遠傳

跌打損傷

醫品補遺

卷四

跌打損傷

三九

張暉堂

奪命金丹 專治跌打損傷無論將死未死只將此
藥送下卽甦並鶴膝痺等症俱效患者在十日內
易好

開陽花卽羊躑躅俗名滿山黃又謂之牛黃花又
謂之老虎花不拘多少取來揀去梗葉惟存花頭
用銅鍋炒微黃色攤地上出火氣研碎爲末凡遇
前症看老弱輕重重者不過七分次者五分輕者
三分五厘俱用黃酒調服如將死之人氣已欲斷
胸頭尚熱用葱一根去其兩頭投入喉內待半餘

在口外然後以藥九分用酒調之好人含在口中
將藥吐入葱管內噴于患者喉中其藥至腹即活
如骨折者先用木片棉花夾好每日臨睡時服之
服後不可言語宜就睡不用半時其藥即行過體
俱麻昏迷不省是其驗也輕者五六服重者十餘
服俟其傷全好即止 史璞菴傳

金雀萬靈膏 治跌打損傷接骨風濕流毒諸般瘰
癧立效如神

肉桂一兩升皮一兩五錢紅花二兩生地一兩金
龜板一兩

卷四 跌打損傷 三十一 娛暉堂

雀花根四兩金銀花白芷川烏草烏各一兩五加
皮一兩五錢防風荆芥各一兩桃仁一兩五錢蘇
木一兩牛旁子一兩甘松一兩歸尾一兩三稜一
兩莪朮一兩赤芍藥一兩續斷一兩骨碎補一兩
古銅錢六個另用朝腦半斤狗胎一個松香十五
斤薑韭汁煮過入水去火毒聽用以銅鍋先入麻
油五斤次入群藥熬至枯焦去渣再熬滴水成珠
入蜜過黃州半斤次入松香再入朝腦成膏聽用
外用麝香一錢阿魏二錢乳香一兩沒藥一兩自

然銅一兩全古銅錢煨醋淬七次血竭一兩以上
共為細末用磁罐盛貯臨用散膏藥上敷貼痛處
史璞菴傳

白蠟護傷膏 治刀傷及跌打損傷見血者并湯火
諸傷久不收口等瘡

香油一斤煎滾三次白蠟四兩入油內再熬一二
滾俟蠟化盡再用研極細末藤黃四兩將前油鍋
置地上入藤黃攪勻收入磁器內封固備用遇患
搽敷油紙蓋之立時止血止疼 史璞菴傳

秘傳鶴頂丸 專治跌打損傷過勞負重一切症服
五六丸即愈永不復發

卷四 跌打損傷 三十二 娛暉堂

紅花酒拌晒乾二兩當歸二錢酒洗晒川山甲炙
二錢降香即打研一錢五分桃仁去皮尖炒茯苓
炒紅麴微炒蘇木酒拌丹皮酒浸小青皮炒陳皮
炒麥芽炒山查肉微炒香附米童便製炒枳殼炒
枳實炒沉香剉檳榔微焙砂仁炒各一錢通草一
錢五分薄漿洗以上各如法製過晒乾為細末以
黃沙糖拌和為丸每丸重一錢五分老酒化下飲

定痛立效膏 治跌打損傷及腿折斷者其效如神

龍骨陳皮桔梗象皮枳殼實川芎當歸白芷大

黃三稜莪朮桂皮黃連漏蘆官桂麻黃防風木通

以上各四錢蒼朮生地熟地蜈蚣僵蚕黃芩連翹

川山甲荆芥三七大楓子全蝎川烏草烏青皮人

指甲木鱉子以上各二錢右藥用真香油二斤將

前藥入內浸炙三日春秋五日冬十日同入砂鍋

用文武火煎至老黃色用麻布濾去藥渣入飛過

醫品補遺

卷四 跌打損傷

二十二

娛脾堂

黃丹一斤再熬至滴水成珠後入阿魏一錢輕粉

乳香沒藥血竭兒茶朝腦以上爲細末各二錢麝

香五分冰片五分珍珠五分赤石脂一錢俱爲細

末槐條攪勻攤貼患處效如神 璞菴傳

接骨紫金丹

象鱉京中象房有如無卽以土鱉代之俱要去足

焙乾用一錢骨碎補乳香沒藥俱去油自然銅煨

大黃血竭歸尾白礞砂各等分爲末每服七八厘

黃酒送下其骨碎而斷者自合只要將骨碎處或

斷者湊接停妥或綿花或布裹纏妥服藥後或半

月重者一月內自然合卽如有瘀血自大頸而下

卽跌打損傷服之其瘀血亦去骨傷處不可受風

其後不致遇陰雨時有疼痛之患藥用瓶盛蠟固

口不可泄氣其效如神 史璞菴傳

打傷垂危者

用松節槌碎一二升入鐵鍋內炒起青烟爲度以

老黃酒二三斤四圍中入卽濾淨候半熟開牙灌

入卽活 急救方

醫品補遺

卷四 跌打損傷

三十四

娛脾堂

跌傷皮破血出風寒所著疼不可忍

川葱杵碎入塩少許炒熱卷上其疼卽止冷則再

易 急救方

墜傷撲損瘀血在腹內者

劉寄奴骨碎補玄胡各一兩水二升煎七合入酒

及童便各一合頓溫服千金方

治斷筋神效

旋覆花一束絞自然汁以筋相對取汁瀝瘡中以

渣塗封日三易半月卽相續如故 急救方

打撲青腫疼痛

青欖核磨水頻掃患處青腫立退急救方

獨聖散 治破傷風

蘇木為末每三錢酒下立效普濟方

又方

威靈仙半兩獨頭蒜一箇香油一錢同搗爛熱酒

冲服汗出即愈易簡方

追風散

蟬蜋為末葱涎調塗破處即時取去惡水立效普濟方

卷四

跌打損傷

三五

娛輝堂

解方

刺傷損

刺抓傷損竹木簪刺等毒

用糯米三升於端午前四十九日以冷水浸之一

日兩換水輕淘轉勿令攪碎至端午日取出陰乾

絹袋仍掛通風處每用旋取炒黑為末冷水調如

膏藥隨瘡大小裹定瘡口外以布包定勿動直候

瘡瘡若金瘡犯生水作膿腫甚者急搗一二食頃

即不作膿腫若癰疽初發綿覺掀腫急貼之一夜

便消喉痺炸腮用此膏貼項下及腫處一夜便消

乾即換之常令濕為妙竹木刺用此膏貼一夜刺

出在藥內靈苑方

刺傷中水腫痛

煮韭熱搗之千金方

骨刺入肉

象牙刮末水煮白梅肉調塗自軟簡要濟衆方

刺傷

用草麻子去壳一面先以帛襯傷處敷之類看若

卷四

刺傷損

三六

娛輝堂

見刺出即拔去恐藥緊弩出好肉或加白梅肉同

研敷甚好易簡方

抓破面皮

生薑自然汁調輕粉末搽無痕急救方

面皮跌破或抓破

以人乳頻塗立結醫即日愈急救方

湯火燒灼

湯火燒灼

劉寄奴搗末先以糯米漿雞翎掃上後搽不痛無

痕凡湯火傷先將鹽末搽之或和米醋敷護肉不壞後用藥如本事方

又方

苦參末油調敷衛生方

又方

石苔焙研敷海上方

又方

菜子油調蚯蚓屎搽之簡便方

又方

絲瓜葉焙研入辰砂一錢蜜調搽生者搗敷一日

即好海上方

又方

軟石膏二錢黃丹二錢水一分桐油二分和勻敷

上神效急救方

湯火傷瘡嫩未疼痛毒腐成膿用此拔熱毒止痛

欬瘡口

麻油四兩當歸一兩煎焦去渣入黃蠟一兩攪化

放冷帛攤貼之神效醫林方

解藥食諸毒門

金石藥毒

用黑鉛一斤溶化投酒一升如此十餘次待酒至

半升頓服勝金方

服藥過劑煩悶及中毒欲死

搗藍汁服數升效別後方

解雄黃毒

防已煎汁服脩急方

解川藥毒

萱草根研汁服事林方

狼州入口

醋少許飲之秘方

凡烟薰垂危

蘿蔔汁嚥下即避急救方

中蠱吐血

大力子煮汁服易簡方

桃生蠱胸口痛

胆礬二錢茶清泡服卽吐出也衛生方

大乙紫金丹 解一切蠱毒神效

山茨茹洗去毛皮爭焙二兩川文蛤搥碎爭焙二兩麝香揀淨三錢千金子去油爭一兩紅芽大戟去梗焙乾一兩五錢硃砂飛淨三錢雄黃透明者三錢以上各選揀好藥子爭室中製畢候端陽午時香花供奉至誠脩合入石臼內漸加糯米濃飲調和杵千餘下或爲丸或成錠臨用以水磨服並塗諸毒傷卽愈 婦科堂原集

卷四 解諸食諸毒 三十九 蜈蚣堂

解狼毒毒

杏仁搗爛水和服之千金方

硫黃毒發令人背膊疼悶目暗漠漠

烏梅肉焙一兩入砂糖半兩漿水一大盞煎七分

叩之搥錄方

閉口椒毒吐白沫身冷欲死

以地漿飲之急救方

諸鳥肉毒

生何豆末冷水服之 華林方

土肉及閉口椒毒

人尿飲之卅後方

服鹽瀉毒

豆腐漿灌之吐卽解或青黛調服卽愈 急救方

六畜毒

犀角磨濃汁水調服良 卅後方

五散毒傷門

毒蛇螫傷

卷四 五散毒傷 四十 蜈蚣堂

鳳仙花搗酒服卽解 聖惠方

又方

蒲公英搗爛貼 聖濟方

又方

五靈脂一兩雄黃半兩共末酒調二錢灌之滓敷 聖惠方

聖惠方

又方

耳垢蚯蚓屎和塗黃水出盡立愈 奇效方

又方

青黛雄黃等分細研新汲水調下二錢毒即散
救方

傷爛成瘡

香白芷二錢鴨嘴胆礬麝香各少許先用淨水洗
去腐膿敗肉搽上侯惡水湧盡即肉生急救方

凡咬傷即縛定勿令毒行

以貝母末酒服半兩至醉良久酒化為水從瘡口
出水盡仍用末敷直指方

又方

醫
新
法

卷四 毒瘡

四十一

蜈蚣

鷄子一箇輕敲小孔合之立瘥 手集方

蜈蚣螫傷

菜子油傾地上搽之即好勿令四眼人見 楊德堂

方

又方

胡椒嚼封即不痛 劉事方

又方

五靈脂末塗之立愈 劉主方

又方

人頭垢苦參末酒調敷 簡中方

蝎毒螫傷

醋調黃丹塗 附後方

又方

水調礬砂塗立愈 千金方

蜘蛛咬傷

雄黃末敷 朝野僉載方

又方

雞冠血塗 廣記方

醫
新
法

卷四 毒瘡

四十二

蜈蚣

花蜘蛛咬人與毒蛇無異

蒼耳草搗汁一盞服以渣敷 摘主方

蠅虻尿瘡初如疹粟漸大如豆更大如火烙漿泡疼

痛至其透身即死

速以草茶并蠟茶俱可生油調敷 勝金方

又方

大黃末塗 醫統方

又方

敗醬煎汁塗之良 楊氏方

風犬咬傷

用地榆三兩銅鎖一把入新罐內酒水各一大碗半煎至碗半空心溫服其毒內消并無後患黃芩關

又方

膽礬末敷立愈濟急方

又方

斑蝥七個糯米炒去頭足杏仁七個去皮尖礬黃八分白芷八分共末黃酒下毒從小便出急救方

惡犬咬傷

舊屋瓦上刮下青苔屑按之即止經驗方

又方

白礬末納入罌之止痛尤妙肘後方

又方

番木鱉為末敷之千金方

虎狼咬傷

以草屨燒研服臨死者亦得活李珣方

又方

山漆研末米飲服三錢仍嚼塗集簡方

馬氣馬汗馬毛入瘡皆致腫痛煩熱入腹則殺人多飲醇酒至醉即愈肘後方

馬汗毒氣入腹

亭廬子一兩炒研水一升浸湯服取下惡血即效千金方

鹽馬汗毒瘡痛

白礬飛過黃丹炒紫等分貼之傳濟方

2034443

S
Z122-5
106



21181888443459

普門醫品四十八卷附醫品補遺四卷

浙江巡撫
採進本

明王化貞撰化貞字肖乾諸城人萬曆癸丑進士
官至僉都御史巡撫遼東以僨事伏誅事迹附見
明史熊廷弼傳是編摘錄本草綱目諸方叅以諸
家論述詳列病證分類彙編每門冠以總論但有
證候而不載診法其凡例謂是書爲不知醫者設
然望聞問切猶或審證未真用藥多舛况舍脈而
論方則虛實寒熱之相似者其誤必多執影響之
見而苟冀一效其貽誤封疆亦此學問矣